TÁJÉKOZTATÓ A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK RENDELÉSÉRE

VI. kiadás

AZ
ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET
KIADVÁNYA

MEDICINA KÖNYVKIADÓ · BUDAPEST, 1971

Szerkesztette:

DR. SIFTÁR ENDRE

A kiadásért felel a Medicina Könyvkiadó igazgatója
Szerkesztette: Dr. Gutai Magda
Műszaki vezető: Fraunhoffer Ferenc
Műszaki szerkesztő: Kilinszky Jenő
Terjedelem: 26,5 (A/5) ív — Példányszám: 33 000
MD 38069—a—7100
70.0833 — Kossuth Nyomda

TARTALOM

Előszó 5
Gyakrabban használt rövidítések és jelzések 7
A gyógyszerkészítmények hatástani csoportosítása 9
A gyógyszerkészítmények indicatiók szerinti csoportosítása 31
Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 48
Törzskönyvezett szerobakteriológiai készítmények 339
Törzskönyvezett gyógyszertápszerek 403
Törzskönyvezett reagensek (Biogal) 410
Infúziós oldatok (Human) 418
Magyar természetes keserű- és gyógyvizek 428
Kötszerek 431
Ragtapaszok 433
Gyógyiszap 433
Mérgezésekkel kapcsolatos elsősegélynyújtás és therapiás eljárások 434
Mértékegységek 467
Számnevek 468
Gyermekek súly- és hosszmértéktáblázata 469
Vitamin- és kalóriatáblázat 474
Inkubációs táblázat 482
Vér- és liquor-táblázat 485
Terhességi naptár 488
Rendeletek, utasítások
Társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő gyógyszerrendelés szabályozása [40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M.] .. 490
Gyógyszerrendelésre jogosult orvosok körének kiterjesztése [37/1962. (Eü. K. 16.) Eü. M.] 514
Társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerrendelés szabályozásának módosítása

("Másolat"-hoz kötött gyógyszerek) [41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. M.] 516
Vasutasok orvosi ellátása [8/1961. (Eü. K. 4.) Eü. M.] 519
Közgyógyellátás [15/1958. (Eü. K. 7.) Eü. M.] 526
Közgyógyellátás terhére gyógyszerkülönlegességek rendeléséről [28/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M.] 538
Fegyveres testület egészségügyi ellátása [32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. M.] 539
A néphadseregből, fegyveres és rendészeti testületekből kivált személyek betegségi ellátása [1/1961. (Eü. K. 1.) Eü. M.] 553
Hadkötelesek orvosi vizsgálata, kötelező gyógykezeltetése [23/1964. (Eü. K. 12.) Eü. M.] 554
Tbc-gondozóintézetekben kezelt betegek antituberculoticumokkal ellátása [27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. M.] 566
Glutarec rendelése [117/1956. (Eü. K. 3.) Eü. M.] 571
Gonorrhoea gyógykezelése Streptomycinnel, Chlorociddal [22/1957. (Eü. K. 11.) Eü. M.] 572
Gyógytápszerek rendelése (3180—89/2/1951. Eü. M.) 573
Infecundin rendelése [9/1967. (Eü. K. 8.) Eü. M.] 576
Insulin és oralis antidiabeticumok rendelése [5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. M.] 583
Külföldi gyártmányú insulin és oralis antidiabeticum rendelése [20/1967. (Eü. K. 16.) Eü. M.] 586
Kábítószerek rendelése [29/1968. (Eü. K. 12.) Eü. M.] 590
Külföldről importált gyógyszerkülönlegességek rendelése [60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M.] 606
Saccharin rendelése [116/1951. (VIII. 28.) Eü. M.] 611
Spiritus vini rendelésének szabályozása [3406/Á(20) 1951. VII. 1. sz.] 611
Pótlások 613

ELŐSZÓ

A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" VI. kiadása a társadalombiztosítás szolgáltatásaira és a közgyógyellátásra jogosultak részére történő gyógyszerrendeléssel kapcsolatos utasításokat tartalmazza és tájékoztatást nyújt a magyar gyógyszerkészítményekről.

A kiadványban fel vannak sorolva a törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek, szerobakteriológiai készítmények, gyógytápszerek és tápszerek, reagensek, valamint az infúziós oldatok, a magyar természetes gyógyvizek, kötszerek, ragtapaszok.

A hatástani és indikációk szerinti csoportosításban a gyógyszerkülönlegességek mellett utalás van a szabványos vénymintákra (Formulae Normales, FoNo) is.

A gyógyszerkülönlegességek felsorolásánál a *címben* a készítmény neve, majd a gyártó cég, alatta a készítmény kiszerelési formája (formái) szerepel. A cím jobb oldalán római számmal a készítmény hatástani csoportosítására történik utalás.

Az *összetételben* először a kiszerelés legkisebb egysége (1 tabl., 1 amp., 1 üveg stb.), majd annak hatóanyaga, nem közömbös segédanyaga van feltüntetve a VI. Magyar Gyógyszerkönyv, ill. az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott elnevezés szerint. Azoknál az injekcióknál, amelyeknél a hatóanyag olajban oldott, a címszó alatt erre külön utalás van (olajos inj.).

A *javallatoknál* általában csak a legfontosabb indikációk vannak felsorolva.

Az *adagolásnál* közölt adatok a legáltalánosabb adagolási utasításoknak tekintendők. További részletek az egyes készítmények használati utasításaiban, ismertetőiben stb. találhatók. — A gyermekadagok testsúlykg-ra vonatkozó adagjai úgy vannak feltüntetve, hogy a ha-

tárértékek közül a magasabb adag szerepel elöl és a kisebb adag utána, jelezve, hogy a korcsoporton belül általában a fiatalabbak kapják testsúlykg-ra számítva a nagyobb, az idősebbek a kisebb adagot.

A *megjegyzések* című rovatban a kereszt jelzés (✠ kábítószert jelent!), a társadalombiztosítás (SZTK) és a közgyógyellátás terhére történő rendelésre vonatkozó szabályozás, a készítmény lejárati ideje, valamint a készítménynek esetleges vény nélküli kiadhatóságára vonatkozó megjegyzés vannak felsorolva. — A 28/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasítás értelmében a közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyszerellátás keretében — bizonyos kivételekkel — ugyanazok a készítmények rendelhetők, mint a társadalombiztosítás terhére. Ezért a Megjegyzés rovatban a közgyógyellátás terhére történő rendelésre csak akkor található utalás, ha a készítmény közgyógyellátás terhére nem rendelhető; amennyiben a társadalombiztosítás terhére való rendelhetőség mellett erre külön utalás nincsen, ez azt jelenti, hogy a készítmény a közgyógyellátás terhére hasonlóképp rendelhető, mint a társadalombiztosítás esetében. — (A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ [SZTK], továbbá a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet [KSZKBI] megszűnt. Jogutódjuk a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság. Ennek megfelelően — ebben a kiadványban —, ahol SZTK vagy KSZKBI szerepel, helyette a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság értendő.)

A *csomagolás* alatt a különböző kiszerelések árai és a bonthatóság (b.) van feltüntetve.

A leggyakrabban előforduló mérgezések elsősegélynyújtásával és gyógyításával foglalkozó fejezet, valamint néhány táblázat hasznos segítséget kíván nyújtani az orvosnak. — Végül a kiadvány a gyógyszerek rendelésével foglalkozó fontosabb rendeleteket, illetőleg utasításokat is tartalmazza.

A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" VI. kiadása az 1970. április 30-i állapotnak megfelelő adatokat tartalmazza. Megjelenése után az V. kiadás és annak pótfüzete hatályát veszti.

ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET
Budapest, XIV., Uzsoki u. 36/a

GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELZÉSEK

!	Vigyázat, maximális adag!
amp.	ampulla
b.	bontható csomagolás
BE	bőregység
CoE	coagulatiós egység
comb.	combinatum
db	darab
dr	drazsé
FoNo	Formulae Normales
g	gramm
gtt.	csepp
IE	internacionális egység (szerobakteriológiai készítményeknél)
inj.	injekció
i. art.	intra arteriam
i. cut.	intra cutim
i. musc.	intra musculum
i. ven.	intra venam
kúp	végbélkúp
LF	limes flocculans
m	meta
masc.	masculinum
mg	milligramm
µg	mikrogramm
ml	milliliter
n (0,1 n stb.)	normál (tized- stb. normáloldat)
NE	nemzetközi egység (gyógyszerkészítményeknél)
o	orto
old.	oldat
p	para

SAE	scarlatina antitoxin egység
s. cut.	sub cutim
tabl.	tabletta

GYÓGYSZERGYÁRAK RÖVIDÍTÉSEI

A.	Alkaloida Vegyészeti Gyár, Tiszavasvári
B.	Biogal Gyógyszergyár, Debrecen
Ch.	Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest, IV.
E.Gy.T.	Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár, Budapest, X.
Human	Human Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet, Budapest, X.
K. Gy.	Kőbányai Gyógyszerárugyár, Budapest, X.
R.	Reanal Finomvegyszergyár, Budapest, XIV.

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK HATÁSTANI CSOPORTOSÍTÁSA

A KÖZPONTI IDEGRENDSZERRE HATÓ GYÓGYSZEREK

I. Általános érzéstelenítők (anaesthetica, narcotica)

Aether ad narcosim
Chloraethyl

II. Altatók (hypnotica)

1. Savureidek, savimidek

Albroman
Noxyron
Somben

2. Barbitursav-származékok

Barbituralum
Belletoval
Belloid
Dorlotyn
Etoval
Etovaletta
Hypnoval
Hypnoval-Calcium
Novopan
Pulv. somnifer, FoNo 190.
Sevenal
Sevenaletta
Sol. brombarb. FoNo 183.
Venobarbital

3. Nyújtott hatású altatószerek

Tardyl

III. Csillapítók (sedativa). — Az epilepsia gyógyszerei (antiepileptica)

1. Valeriana

Gutt. valer. c. menthol. FoNo 175.
Gutt. vegetosed. FoNo 52.
Hovaletten
Inf. valer. FoNo 176.
Legatin
Medivaler
Pil. valerosed. FoNo 193.
Tinct. valer. spirit. FoNo 188.
Valeriana composita

2. Brómsók

Calcium bromatum
Mixt. chloralo-brom. FoNo 179.
Mixt. sedat. FoNo 180.
Mixt. sedat. comp. FoNo 181.
Neupon
Pil. brombarb. FoNo 191.
Polybrom
Pulv. sedans FoNo 189.
Sir. phosphobrom. FoNo 182.
Sol. brombarb. FoNo 183.
Sol. bromida FoNo 184.
Sol. coffobrom. FoNo 172.

3. Alkoholok, aldehidek

Dalgol
Klysm. chloral. FoNo 177.
Klysm. chloral. pro infant. FoNo 178.
Sol. parald. FoNo 187.

4. Antiepileptica

Diphedan
Fedibaretta
Neophedan
Perlepsin
Ptimal
Sacerno
Sertan

IV. Ideg- és elmebetegségek gyógyszerei (psychopharmaca)

1. Nagy trankvillánsok

Frenolon
Haloperidol
Hibernal
Hibernaletta
Hirepin
Rausedyl
Trisedyl

2. Kis trankvillánsok

Andaxin
Seduxen
Trioxazin
Nuredal
Tisercin
Tisercinetta

3. Antidepresszív szerek, thymolepticumok

Melipramin

4. Szkopolamin

Scopolaminum hydrobromicum

V. Fájdalomcsillapítók (analgetica)

1. Morfin, ópium

Dithescop
Domatrin
Morphinum hydrochloricum
Morphinum hydrochloricum — Atropinum sulfuricum
Noscapin
Pulv. codacetin. FoNo 25.
Pulv. codein. c. stib. FoNo 228.
Pulv. coffacyl. c. codein. FoNo 27.
Supp. analg. FoNo 32. és 33.
Supp. anodyn. FoNo 35.

2. Kodein, etilmorfin, narcotin

Codeinum hydrochloricum
Codein-acisal
Codein-stibium
Coderit
Coderetta
Diacodon
Dolor
Gutt. aethylmorph. FoNo 11.
Gutt. codein. FoNo 12.
Hydrocodin

3. Szintetikus fájdalomcsillapítók

Depridol
Dolargan
Oxycodon

4. Egyéb

Vasalgin

VI. Hőcsökkentők (antipyretica). — A reuma gyógyszerei (antirheumatica)

1. Pirazolon-származékok

Algopyrin
Amidazophenum
Antineuralgica
Azophenum coffeinum citricum
Barbamid

Demalgon
Demalgonil
Germicid
Hypanodin
Karil
Pulv. analg. FoNo 19.
Pulv. antidolor. FoNo 20.
Pulv. antineuralg. FoNo 21.
Pulv. azoph. coff. citr. FoNo 22.
Pulv. barbamid. comp. FoNo 23.
Pulv. combinat. FoNo 28.
Rheopyrin
Rheosolon
Salvador
Sol. amidazoph. pro inf. FoNo 14.
Supp. amidazoph. 0,1 g FoNo 29., 0,2 g FoNo 30., 0,5 g FoNo 31.
Supp. analg. FoNo 32.
Supp. analg. forte FoNo 33.
Supp. analg. pro par. vul. FoNo 34.

2. Szalicilsav-származékok

Eggosalil
Istopirin
Kalmopyrin
Klysm. nátr. salic. FoNo 76.
Natrium salicylicum intestinosolvens
Pulv. chinacisal. c. vit. C FoNo 24.
Pulv. coffacyl FoNo 26.
Pulv. Petersi FoNo 82.
Susp. salicylamid. 2% FoNo 16., 4% FoNo 17.

3. Kinin

Chinin hydrochloricum
Diapulmon

4. Kinolin- és fenilkinolin-származékok

Acitophosan
Delagil
Pulv. antirheum. FoNo 81.
Tofamid

VII. Központi idegrendszert izgatók (excitantia). — Glutaminsav

1. Excitantia

Aktedron
Centedrin
Gracidin
Strychninum nitricum

2. Glutaminsav

Glutarec

A KÖRNYÉKI IDEGEKRE ÉS IZMOKRA HATÓ GYÓGYSZEREK

VIII. Helyi érzéstelenítők (localanaesthetica)

Cofocain
Corbocain
Eleosacchar. anaesth. FoNo 18.
Lidocain
Lidocain kenőcs
Lidocain—Adrenalin
Neotonocain
Oticur
Otogutt. phenol. FoNo 249.
Procainum hydrochloricum
Susp. anaesth. FoNo 15.
Tetracain
Ung. anaesth. FoNo 126.
Ung. lidocain. ad rhagad. FoNo 145.

IX. Cholinerg végkészülék izgatók (parasympathomimetica)

Stigmosan

X. Cholinerg végkészülék bénítók (parasympatholytica)

Atropinum sulfuricum
Bellafit
Bispan
Gapona
Gastrixon
Gastropin
Gutt. methylhomatrop. comp. FoNo 13.
Neopepulsan-duplex
Tinct. bellad. FoNo 56.
Triospan

XI. A harántcsíkolt izmok tónusát csökkentők

1. Relaxantia

Relaxil-G
Myoflexin
Scutamil-C

2. Antiparkinson szerek

Aparkazin
Mydeton
Parkan

XII. A simaizmok görcsét oldók (spasmolytica)

Halidor
Meristin
Neotroparin
No-Spa
Papaverinum hydrochloricum
Pil. atropin. comp. FoNo 279.
Pulv. antispasmodolor. FoNo 57.
Pulv. antispast. FoNo 58.
Pulv. spasmalg. FoNo 60.
Ridol
Steralgin
Supp. spasmolyt. FoNo 65.
Troparin
Troparin combinatum

A LÉGZÉSRE ÉS A VÉRKERINGÉSRE HATÓ GYÓGYSZEREK

XIII. A légző- és a vasomotor-központot izgatók (analeptica)

1. Lobelin-csoport

Lobelinum hydrochloricum
Spiractin

2. Pentametazol, koretamid

Corediol
Gutt. analept. FoNo 36.
Tetracor
Tetracor-Epherit
Tetracor-Neocod

3. Koffein

Coffeinum natrium benzoicum
Kofka
Pil. coff. FoNo 39.

4. Ammonia

Ammonia párna

5. Glutársav-származékok

Redimyl

XIV. Cardiotonica. — Antiarrhythmica

1. Digitálisz

Acigoxin
Carditoxin
Digoxin
Isolanid
Neo-Adigan
Pulv. digit. FoNo 37.
Supp. digit. FoNo 40.
Supp. digit. fort. FoNo 41.
Supp. digitheobr. FoNo 42.

2. Sztrofantin

K-Strophantomusc
K-Strophantosid

3. Kinidin

Chinidinum sulfuricum

4. Egyéb

Panangin

XV. Adrenerg végkészülék izgatók (sympathomimetica). — Érszűkítők (vasoconstrictorica)

Epherit
Noradrenalin
Pil. analept. FoNo 38.
Pulsotyl
Sympathomim
Tonogen

XVI. Adrenerg végkészülék bénítók (sympatholytica). — Értágítók (vasodilatorica)

1. Sympathicus-bénítók

Bivelin
Corontin
Kefalgin
Redergam
Rigetamin
Secadol

2. Ganglion-bénítók

Synapleg

3. Salétromsav-és salétromossav-észterek

Amylnitrit párna
Natrium nitrosum
Nitromint
Nitropenton
Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59.
Rigedal

4. Nikotinsav

Acidum nicotinicum
Paniverin
Pil. nicophyllin. FoNo 62.

5. Teobromin, teofillin

Diaphyllin
Etopurin
Pil. nicophyllin FoNo 62.
Pulv. theophyllin. comp. FoNo 61.
Rutophyllin
Supp. theophyllin. FoNo 66.
Supp. theophyllin. comp. FoNo 67.

6. Szervkivonatok

Atriphos
Corhormon

7. Perifériás értágítók

Bupatol
Mydeton
Tolazolin

8. A hypertonia és az arteriosclerosis gyógyszerei

Agatheosan
Aljodan
Dopegyt
Erpozid
Intrajod
Jodpapaverintheosan
Jodtheosan
Miscleron
Niton
Rausedyl
Sanotensin
Sol. kal. jod. FoNo 53.
Sol. kal. jod. comp. FoNo 54.
Sol. theobromojod. FoNo 55.
Tensatrin
Vasobroman

XVII. Az asztma gyógyszerei (antiasthmatica). — Köptetők (expectorantia). — A nátha gyógyszerei

1. Antiasthmatica

Anasthim
Asthmamid
Asztma elleni cigaretta
Inhal. asthmalyt. FoNo 43.
Inhal. isoprenalin. FoNo 44.
Pil. asthmalyt. pro infant. FoNo 50.
Propylon
Pulv. asthmalyt. FoNo 45.
Pulv. asthmalyt. c. atropin. FoNo 46.
Pulv. asthmalyt. fort. FoNo 47.
Pulv. bronchodil. FoNo 48.
Pulv. dyspnosed. FoNo 49.
Solvasthmin
Spec. antiasthm. ad. fumig. FoNo 51.

2. Expectorantia

Aetherol. pro inhal. FoNo 216.
Asaropect
Decoct. primul. FoNo 217.
Decoct. sapon. FoNo 218.
Elix. thymi comp. FoNo 220.
Erigon
Expectin
Fagifor
Gutt. expect. FoNo 221.
Gutta expect. comp. FoNo 222.

Inf. ipecac. FoNo 223.
Inf. ipecac. pro infant. FoNo 224.
Mixt. pector. FoNo 225.
Mixt. solv. FoNo 226.
Pulv. codein. c. stib. FoNo 228.
Pulv. expect. FoNo 229.
Radipon
Spec. thymi comp. FoNo 230.
Supp. broncholyt. FoNo 231.
Supp. broncholyt. pro infant. FoNo 232.
Susp. terpin. hydr. FoNo 206.

3. A nátha gyógyszerei

Depersolon orr- és fülcsepp
Naphazolin
Nasogutt. argent. prot. FoNo 233.
Nasogutt. ephedr. FoNo 234.
Nasogutt. ephedr. pro infant. FoNo 235.
Ung. nasal. FoNo 237.
Ung. nasal. comp. FoNo 238.

4. Szintetikus köhögéscsillapítók

Exangit
Libexin
Baltix

A VÉRRE HATÓ GYÓGYSZEREK

XVIII. Véralvadást szabályozók

1. Véralvadást fokozók

Calcium chloratum
Natrium chloratum

2. Véralvadást gátlók

Heparin
Natrium citricum
Syncumar

XIX. Vérképzők (haematopoetica)

1. Vas

Athenstaedt
Athenstaedt arzénes
Fercupar
Ferroplex
Gutt. ferrars. FoNo 254.
Pil. ferri red. FoNo 258.
Pil. robor. FoNo 259.
Sir. ferr. chlor. oxydul. FoNo 256.
Vas-Arsotonin

2. B_{12}-vitamin-csoport. Májkészítmények

Hydroxocobalamin
Neoperhepar
Vitamin B_{12}

3. Folsav

Folsav

XX. Folyadékpótlók. Infúziós oldatok

Human Albumin
Infusio glucos. FoNo 281.
Infusio glucos. c. kal. FoNo 282.
Infusio glucos. salin. FoNo 283.
Infusio invertos. 10% FoNo 284.
Infusio natr. bicarb. FoNo 285.
Infusio natr. chlor. FoNo 286.
Infusio natr. lact. FoNo 287.
Infusio natr. lact. c. kal. FoNo 288.
Infusio natr. lact. salin. FoNo 289.
Infusio salina FoNo 290.
Plazmaprotein 5% Human
Plasmodex
(Nem törzskönyvezett infúziós oldatokat Human lásd a 418. oldalon)

AZ EMÉSZTÉSRE HATÓ GYÓGYSZEREK

XXI. Emésztést elősegítők (stomachica)

1. Savpótlók, savközömbösítők

Acid. hydrochlor. FoNo 261.
Aluminium hydroxydatum
Betacid
Gran. magn. trisil. FoNo 269.
Gutt. stomach. FoNo 264.
Optacid
Pulv. alcal. c. bellad. FoNo 270.
Pulv. alumin. antacid. FoNo 271.
Pulv. antacid. FoNo 272.
Pulv. antacid. c. bellad. FoNo 273.
Pulv. digest. FoNo 276.
Pulv. neutracid. FoNo 277.
Sol. gastr. FoNo 266.

2. Enzimek

Dipankrin
Lukullin
Pulv. pepsin. FoNo 278
Sol. pepsin. FoNo 267.

XXII. Epehajtók (cholagoga). — Májvédők (hepatica)

1. Cholagoga

Bilagit
Bilocid
Gutt. cholagog. FoNo 263.
Pulv. cholagog. FoNo 275.
Spec. cholagog. FoNo 280.
Suprachol

2. Hepatica

Koliniumklorid
Methionin
Sirepar

XXIII. Hányáscsillapítók (antiemetica)

Daedalon
Daedalonetta
Supp. antiemet. FoNo 63.
Supp. antiemet. pro infant FoNo 64.

XXIV. Hashajtók (laxantia). — Végbélkiürítők. — Obstipansok

1. Laxantia

Artin
Bolus laxans
Diotilan
Emuls. ol. ricin. FoNo 161.
Emuls. paraff. c. phenolpht. FoNo 162.
Inf. sennae c. natr. sulf. FoNo 163.
Magnes. sulf. FoNo 167.
Natr. sulfuric. FoNo 168.
Neocarbolax
Ol. ricin. FoNo 164.
Paraff. aromat. FoNo 165.
Phenolphthaleinum
Pil. lax. FoNo 172.
Pulv. Caroli FoNo 274.
Pulv. purgat. FoNo 169.
Pulv. purgat. c. bellad. FoNo 170.
Pulv. sennae comp. FoNo 171.
Sir. lax. FoNo 166.
Spec. lax. FoNo 173.
Supp. lax. FoNo 174.
Taxin
Videx

2. Végbélkiürítők

Glicerines végbélkúp

3. Obstipansok

Pulv. Doveri c. bism. FoNo 73.
Pulv. obstip. FoNo 74.

A HŰGYIVARSZERVEKRE HATÓ GYÓGYSZEREK

XXV. Húgyhajtók (diuretica). — Vizeletfertőtlenítők (urodesinficientia)

1. Diuretica

Chlorurit
Fonurit
Hypothiazid
Novurit
Spec. diuret. FoNo 159.
Uregyt

2. Kémhatás-szabályozók

Ammonium chloratum

3. Urodesinficientia

Coerulamin
Gutt. antinephrolit. FoNo 158.
Hexamethylentetraminum
Spec. uvae. ursi. FoNo 160.
Vestin

XXVI. Méhre ható gyógyszerek (uterotonica)

1. Hypophysis pars posterior

Glanduitrin
Oxytocin

2. Secale cornutum

Ergam
Ergometrin
Neo-Gynofort

XXVII. Hüvelyfertőtlenítők. — Fluorcsökkentők. — Fogamzást gátlók

Acid. lact. dil. FoNo 1.
Boragin
Glicerin. ichthyol. FoNo 3.
Hexetidin
Infecundin
Klion
Ovul. jodchloroxychin. FoNo 296.
Pulv. ad irrig. FoNo 6.
Pulv. zinc. alum. FoNo 7.
Sol. zinci. chlor. FoNo 5.
Timidon
Bisecurin

XXVIII. Nemi ösztönt fokozók (aphrodisiaca)

Yohistrin masculinum

AZ ANYAGCSERÉRE HATÓ GYÓGYSZEREK

XXIX. Mész- és fluorpótlók

1. Mészpótlók

Calcimusc
Calciphedrin
Calcium bromatum
Calcium chloratum
Calcium lacticum
Gran. calc. phosph. FoNo 293.
Pulv. calc. lactophosph. FoNo 294.

2. Fluorpótlók

Dentocar

XXX. Arzén. — Sztrichnin

Arsotonin
Gutt. ferrars. FoNo 254.
Pil. arsen. FoNo 257.
Pil. robor. FoNo 259.
Pil. tonisans FoNo 260.
Strychnotonin

XXXI. Vitaminok

1. A-vitamin

Vitamin-A

2. B-vitamin-csoport

Acidum nicotinicum
Hydroxocobalamin
Nikotinsavamid
Polybé
Vitamin-B_1
Vitamin-B_2
Vitamin-B_{12}

3. C-vitamin, rutin

Rutascorbin
Rutin
Vitamin-C

4. D-vitamin-csoport

Vitamin-D_3

5. E-vitamin

Vitamin-E

6. K-vitamin

Vitamin-K

7. Polivitamin-készítmények

Caldea

Emuls. ol. jecor. FoNo 252.
Emuls. ol. jecor comp. FoNo 253.
Gerovit
Ol. jecor. FoNo 255.
Polyvitaplex 8
Polyvitaplex 10
Vitamin A+D_2

XXXII. Jód és pajzsmirigy

1. Jódvegyületek

Jodostrumit

2. A hypothyreosis gyógyszerei

Liothyronin
Thyreoidea

3. A hyperthyreosis gyógyszerei

Dityrin
Metothyrin
Perchlorat-K

XXXIII. Agyfüggelék. Hypophysis

1. Hypohpysis pars anterior. Gonadotrop-hormon. Adrenocorti-cotrop-hormon

Choriogonin
Exacthin

2. Hypophysis pars posterior

Glanduitrin
Hypophysis-szippantópor

XXXIV. Szteroid-hormonok

1. Tüszőhormon, egyéb ösztrogén hatású gyógyszerek

Akrofollin
Ambosex
Dienoestrol
Hogival
Menotheosan
Mikrofollin
Syntestrin

2. Progeszteron, egyéb progeszteron hatású gyógyszerek

Colutoid
Glanducorpin
Hormofort
Infecundin
Limovan
Limovanil

3. Hím nemi hormonok

Ambosex
Androral
Retandrol

4. A mellékvesekéreg hormonjai

Decosteron
Depersolon
Hydrocortison
Prednisolon
Prednisolon-J

XXXV. Insulin, egyéb vércukor-csökkentők

Adebit
Bucarbon
Insulin
Oradian
Oterben
Zinkprot-insulin

XXXVI. Cukorkészítmények

Glucosum

XXXVII. Anabolikus és geriatrikus hatású gyógyszerek

Gerovit
Nerobol
Neroboletta
Nerobolil
Retabolil

GYULLADÁSRA HATÓ GYÓGYSZEREK

XXXVIII. Hisztamin. — Antihisztaminok. — Allergica

Azulenol
Dehistin
Histazolin
Peremin
Pernovin
Pernovinetta
Pipolphen
Suprastin

XXXIX. Nem specifikus inger-, proteinterápia gyógyszerei (irritantia, alterantia)

Neurolysin
Polysan
Pyrago

XL. Adszorbeálók (adsorbentia)

Bolus adstringens
Carbo activ. FoNo 71.
Carbo medicinalis
Gran. carb. activ. FoNo 72.
Susp. bism. subsalic. pro infant. FoNo 68.
Tannocarbon

XLI. Összehúzók (adstringentia)

Alum. acet. tart. FoNo 2.
Burofix

XLII. A visszértágulás és az aranyér gyógyszerei (antivaricosa, haemorrhoidalia)

Hemorid
Nodicid
Noditran
Reparon
Supp. ad nod. FoNo 116.
Supp. haemorrhoid. FoNo 117.
Ung. haemorrhoid. FoNo 138.

XLIII. A rheuma külsőleges gyógyszerei (antirheumatica externa)

Aciphen
Capsoderma
Gerosan
Linim. ammon. FoNo 77.
Mixt. antirheum. FoNo 78.
Opodeldoc
Phenylbutazon kenőcs
Spir. antirheum. FoNo 80.
Ung. antirheum. FoNo 83.

XLIV. A bőrgyógyászat gyógyszerei (dermatologica)

Alsol
Bism. subgall. FoNo 107.
Biung
Chlorosan
Bórsavas vazelin
Chlorocid kenőcs
Chlorocid H kenőcs
Chlorosan
Cinkoxidos vazelin és kenőcs
Collod. c. acid. salic. FoNo 84.
Dermasept
Deterg. sulf. FoNo 118.
Elastosan cinkenyvpólya
Excoriatin
Higanykenőcs
Hydrocortison kenőcs
Lidocain kenőcs
Linim. calc. FoNo 88.
Linum. ad pernion. FoNo 87.
Neogranormon
Ólom-kaucsuktapasz
Past. jecor. FoNo 119.
Past. Lassari FoNo 120.
Past. zinc. oleos. FoNo 121.
Past. zinc. oxyd. FoNo 122.
Pernovin kenőcs
Phenylbutazon kenőcs
Phlogosam
Plastubol
Prednisolon kenőcs
Prednisolon J kenőcs
Pulv. boropermang. FoNo 109.
Sárga vazelin
Sol. antisudor. FoNo 93.
Sol. Castellani FoNo 94.
Sol. Castellani sine fuchsin. FoNo 95.
Sol. contra rhagades mamillae FoNo 4.
Spars. antisudor. FoNo 111.
Spars. infant. FoNo 114.
Spars. ichthyol FoNo 113.
Spars. sulfabor. FoNo 115.
Spir. salic. FoNo 101.
Spir. salic. c. resorcin. FoNo 102.
Spir. jodosalic. FoNo 100.
Sudeol
Susp. antiseborrh. FoNo 103.
Susp. sicc. FoNo 104.
Susp. zinc. aquos. FoNo 105.
Susp. zinc. oleos. FoNo 106.
Szalicilsavas kaucsuktapasz
Tetran kenőcs
Tetran-hydrocortison kenőcs
Trypsin sebhintőpor
Ung. ad manum. FoNo 123.
Ung. ad pruritum FoNo 124.

Ung. alum. acet. tart. FoNo 125.
Ung. anaesth. FoNo 126.
Ung. antisept. FoNo 128.
Ung. antierythem. solar. FoNo 127.
Ung. benzosalic. FoNo 129.
Ung. borax. FoNo 130.
Ung. borosalic. FoNo 131.
Ung. camph. ad pernion. FoNo 132.
Ung. chlorogen. FoNo 133.
Ung. contra dolor. FoNo 134.
Ung. contra rhagad. mamill. FoNo 10.
Ung. diachylon salic. FoNo 136.
Ung. hydrarg. amidochlor. FoNo 140.
Ung. hydrarg. sulf. FoNo 141.
Ung. ichtyolsalic. FoNo 142.
Ung. infant. FoNo 143.
Ung. jodat. ad pernion. FoNo 144.
Ung. Mikulitz FoNo 146.
Ung. refrig. FoNo 147.
Ung. salic. FoNo 148.
Ung. salic. 10% FoNo 149.
Ung. stearin. FoNo 150.
Ung. sulfadimid. FoNo 151.
Ung. sulfur. salicyl. FoNo 152.
Ung. tolazol. FoNo 153.
Ung. zinc. alum. FoNo 154.
Ung. zinc. oxyd. FoNo 155.
Vasel. acid. boric. FoNo 156.
Zenon
Zinc. gelatin. FoNo 157.

XLV. A szemészet gyógyszerei (ophthalmica)

Bór-cink szemkenőcs
Chinorto
Chlorocid H
Collyr bor. FoNo 194.
Depersolon szemcsepp
Hydrocortison szemkenőcs
Noviform-cink szemkenőcs
Oculent. alb. FoNo 209.
Oculent. antisept. FoNo 210.
Oculent. borozinc. FoNo 211.
Oculent. chloramphen. FoNo 212.
Oculent. flav. FoNo 213.
Oculent. sulfacetamid FoNo 214.
Oculent. tolazol. FoNo 215.

Oculogutt. argent. acet. FoNo 195.
Oculogutt. argent. prot. FoNo 196.
Oculogutt. atrop. FoNo 197.
Oculogutt. chloramphen. FoNo 198.
Oculogutt. chloramphen. c. vit. A FoNo 199.
Oculogutt. neomycin. FoNo 200.
Oculogutt. neonator. FoNo 201.
Oculogutt. physost. mit. FoNo 202.
Oculogutt. pilocarp. FoNo 203.
Oculogutt. sulfacetamid FoNo 204.
Oculogutt. viscos. FoNo 206.
Oculogutt. tetracain. FoNo 205.
Oculogutt. zinc. FoNo 207.
Oculogutt. zinc. c. ephedr. FoNo 208.
Septosyl
Tetran szemkenőcs

KÓROKOZÓKRA ÉS ÉLŐSDIEKRE HATÓ GYÓGYSZEREK

XLVI. Fertőtlenítők (desinficientia, antiseptica) — Gombás fertőzések gyógyszerei (antimycotica)

1. Fertőtlenítők

Chlorosan
Formaldehyd. solut. FoNo 85.
Hyperol
Jód-párna
Liquor formald. sap. FoNo 90.
Liquor peroxyd. comp. FoNo 242.
Neomagnol
Ritosept
Sol. hexachloroph. 0,5% FoNo 96.
Sol. kal. permangan. FoNo 98.
Sol. xanthacridin. FoNo 243.
Sparsor. hexachlorophen. FoNo 112.
Sterogenol

2. Sebfertőtlenítők

Chlorocid sebhintőpor
Dermaforine
Glycosept
Reseptyl-urea
Tetran sebhintőpor

3. Antimycotica

Fungifen
Glycerin. borax. FoNo 86.
Mycosid
Nystatin
Otogutt. fungicid. FoNo 247.
Sol. ad intertrig. FoNo 92.
Sol. tricolor. FoNo 99.

XLVII. A kemoterápia gyógyszerei (chemotherapeutica)

1. A malária gyógyszerei

Delagil
Pentilen

2. A lues gyógyszerei

Medobis

3. A tuberkulózis gyógyszerei

Cycloserin
Isonicid
Phtyson
Pyrazinamid
Rigenicid
Tebaminal-készítmények
Viomycin

4. Bélfertőzések gyógyszerei

Enteroseptol
Sulfaguanidin
Susp. jodchloroxychin. FoNo 69.

5. Szulfanilamidok

Quinoseptyl
Salvoseptyl
Superseptyl
Susp. sulfadimidin. FoNo 70.
Triaseptyl

6. Antibiotica

Beacillin
Chlorocid
Chlorocidetta
Chlorocid-S
Meticillin
Nystatin
Oxacillin
Penicillin
Promptcillin
Retardillin
Streptomycin
Tetran
Tetranetta
Tetran-B
Tetrinfan
Vegacillin
Viomycin
Xantomycin

7. Húgyivarszervi fertőzések gyógyszerei

Nevigramon
Nitrofurantoin

8. Virostaticumok

Morgalin

XLVIII. Féreghajtók (anthelmintica)

Genticid
Piperascat
Ung. contra oxyur. FoNo 135.

XLIX. Rovarirtók (insecticida)

1. A scabies gyógyszerei

Linim. scabicid. FoNo 89.
Novascabin

2. A pediculosis gyógyszerei

Neociklotox
Spars. antiparasit. FoNo 110.

EGYÉB GYÓGYSZEREK ÉS SEGÉDANYAGOK

L. Sejtosztódást gátlók (cytostatica)

Degranol
Leupurin
Myelobromol
Vinblastin
Zitostop

LI. Enzimek

Hyase
Trypsin
Trypsimusc

LII. Mérgezés elleni gyógyszerek (antidota). — Az alkoholizmus gyógyszerei

1. Antidota

Dicaptol
Nalorphin
Redimyl

2. Az alkoholizmus gyógyszerei

Antaethyl

LIII. Kórjelzők (diagnostica)

1. Röntgenologia

Barium. sulf. cond. FoNo 292.
Bilospekt
Novobarium

2. Diagnostica

Acidotest

LIV. Oldószerek

Aqua destillata

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK INDICATIÓK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA

Ablactatio: Dienoestrol, Hogival, Mikrofollin, Syntestrin.

Abortus habitualis: Colutoid, Choriogonin, Depofollan, Dienoestrol, Hogival, Limovan, Syntestrin, Vitamin-E;
— **imminens:** Choriogonin, Colutoid, Glanducorpin, Neotroparin, No-Spa, Troparin comb.;
— **incipiens:** Chinin, Glanduitrin;
— **incompletus:** Ergam, Ergometrin, Neo-Gynofort;
— **septica:** Penicillin-készítmények, Superseptyl, Tetran-B, Triaseptyl.

Abscessus: Beacillin, Chlorocid sebhintőpor, -kenőcs, Penicillin, Reseptyl-urea, Superseptyl, Tetran sebhintőpor, -kenőcs, Vegacillin.

Abscessus frigidus: Isonicid, Tebaminal.

Abscessus pulmonum: Beacillin, Isonicid, Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Superseptyl, Tetran-B.

Achylia gastrica: Betacid, Dipankrin, Lukullin, Optacid, Pulv. pepsin. FoNo 278., Sol. pepsin. FoNo 267., Vitamin-C.

Acne: Akrofollin, Biung, Dienoestrol, Hogival, Susp. antiseborrh. FoNo 103.

Actinomycosis: Penicillin, Superseptyl.

Addison-kór: Decosteron, Depersolon, Natrium chloratum inj. 10%, Prednisolon.

Adipositas: Akrofollin, Choriogonin, Glandubolin, Gracidin, Hogival, Liothyronin, Novurit, Thyreoidea.

Adnexitis acuta: Beacillin, Calcium inj., Calcimusc, Penicillin, Promptcillin, Rheopyrin, Rheosolon, Retardillin, Superseptyl, Vegacillin;

— **chronia:** Beacillin, Calcimusc, (vérzés esetén) Calcium inj., Penicillin, Promptcillin, Pyrago, Retardillin.

Agranulocytosis: Exacthin, Folsav, Neoperhepar, Penicillin, Prednisolon, Vitamin-B_6, -B_{12} és -C.

Alcoholismus: Antaethyl.

Allergia: Calcimusc, Calcium chloratum, Calc. lacticum, Dehistin, Exacthin, Histazolin, Pernovin, Pipolphen, Prednisolon, Suprastin, Tonadrin.

Amenorrhoea: Akrofollin, Dienoestrol, Glanducorpin, Limovan, Mikrofollin, Syntestrin, Vitamin-E.

Anaemia: hypochrom: Arsotonin, Athenstaedt arzénes, Ferroplex, Gutt. ferrars. FoNo 254., Pil. arsen FoNo 257., Pil. ferri red. FoNo 248., Pil. robor. FoNo 259., Sir. ferr. chlor. oxydul. FoNo 256., Strychnotonin, Vas-Arsotonin;

— **hyperchrom:** Folsav, Hydroxocobalamin, Neoperhepar, Vitamin-B_{12}.

Anaphylaxia: Calcimusc, Calcium chloratum, Dehistin, Depersolon, Epherit, Exacthin, Noradrenalin, Pipolphen, Prednisolon, Suprastin, Tonogen.

Angina follicularis: lásd **Tonsillitis.**

Angina Ludovici: Beacillin, Hyperol, Penicillin, Quinoseptyl, Superseptyl, Vegacillin, Tetran.

Angina pectoris: Acidum nicotinicum, Amylnitrit párna, Ambosex, Atriphos, Barbituralum, Corontin, Diaphyllin, Natr. nitros., Nitromint, Nitropenton, No-Spa, Nuredal, Oxycodon, Panangin, Papaverin, Rigedal, K-Strophantosid, Supp. theophyllin. FoNo 66., Supp. theophyllin. comp. FoNo 67., Troparin.

Angiospasmus: Agatheosan, Corontin, Etopurin, Niton, No-Spa, Paniverin, Papaverin, Pil. nicophyllin. FoNo 62., Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59., Vasobroman.

Anthrax: Lépfene-lószérum, Penicillin, Tetran-B.

Apoplexia cerebri: Intrajod, Relaxil-G, Mydeton.

Arrhythmia: Carditoxin, Chinidin, Digoxin.

Arteriosclerosis: Agatheosan, Aljodan, Barbituralum, Intrajod, Jodpapaverintheosan, Jodtheosan, Miscleron, Niton, Paniverin, Rutophyllin, Sol. kal. jod. FoNo 53., Sol. theobromojod. FoNo 55., Vasobroman.

Arthritis rheumatica: Aciphen, Acitophosan, Amydosan, Capsoderma, Delagil, Eggosalil, Exacthin, Gerosan, Hydrocortison, Istopirin, Myoflexin, Natrium salicylicum, Linim. ammon. FoNo 77., Opodeldok, Peremin, Phenylbutazon kenőcs, Prednisolon, Rheosolon, Rheopyrin, Scutamil-C, Susp. salicylamid. 2% és 4% FoNo 16., és 17., Tofamid, Ung. antirheum. FoNo 83., Vitamin-B_1.

Asphyxia: Corediol, Lobelinum, Spiractin, Tetracor, Tetracor-Epherit.

Asthenia: Arsotonin, Decosteron, Elix. tonis. FoNo 251., Pil. arsen. FoNo 257., Pil. robor. FoNo 259., Pil. tonisans FoNo 260., Strychnotonin, Vas-Arsotonin.

Asthma bronchiale: Anasthim, Atropin, Asthmamid, Asztma cigaretta, Calcimusc, Corediol, Dehistin, Depersolon, Diaphyllin, Epherit, Exacthin, Expectin, Inhal. asthmalyt. FoNo 43., Inhalasolum isoprenalin FoNo 44., Noradrenalin, Pernovin, Pil. asthmalyt. pro infant. FoNo 50., Pil. nicophyllin. FoNo 62., Prednisolon, Propylon, Pulv. asthmalyt. FoNo 45., Pulv. asthmalyt. c. atropin. FoNo 46., Pulv. asthmalyt. fort. FoNo 47., Pulv. bronchodil. FoNo 48., Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59., Pulv. theophyllin. comp. FoNo 61., Solvasthmin, Spec. antiasthm. ad fumig. FoNo 51., Suprastin, Tetracor-Epherit, Tetracor-Neocod, Tonogen.

Asthma cardiale: Depridol, Diaphyllin, Dolargan, Morphin, K-Strophantosid, K-Strophantomusc, Supp. theophyllin. FoNo 66.

Atonia uteri: Ergam, Ergometrin, Glanduitrin, Neo-Gynofort, Oxytocin.

Barbitural-intoxicatio: Redimyl, Spiractin.

Basedow-kór: lásd **Hyperthyreosis.**

Blepharitis: Chlorocid-H, Hydrocortison szemkenőcs, Oculent. alb. FoNo 209., Oculent. borozinc. FoNo 211., Oculent. chloramphen. FoNo 212., Oculent. flav. FoNo 213., Oculent. sulfacetamid. FoNo 214., Septosyl, Tetran szemkenőcs.

Bronchitis: Aetherol, pro inhal. FoNo 216., Aljodan, Ammonium chloratum, Asaropect, Baltix, Coderit, Decoct. primul. FoNo 217., Decoct. sapon. FoNo 218., Diapulmon, Diacodon, Elix. thymi comp. FoNo 220., Expectin, Exangit, Fagifor, Gutt. expect. FoNo 221., Gutt. expect. comp. FoNo 222., Noscapin, Mixt. pector. FoNo 225., Mixt. solv. FoNo 226., Oxycodon, Radipon, Supracodin, Susp. terpin. hydr. FoNo 227., Supp. broncholyt. FoNo 231., Supp. broncholyt. pro infant. FoNo 232., Tetracor-Neocod, Trypsin.

Bronchopneumonia: Beacillin, Corediol, Diapulmon, Penicillin, Promptcillin, Retardillin, Quinoseptyl, Superseptyl, Supp. broncholyt. FoNo 231. és 232., Supracodin, Sympathomim, Tetracor-Epherit, Tetracor-Neocod, Tetran, Vegacillin, Vitamin-C.

Carcinoma mammae: Androral, Nerobolil, Retandrol, Zitostop.

— **prostatae:** Dienoestrol, Syntestrin.

Caries: Calcium chloratum, Calcium lacticum, Calcimuse, Dentocar, Vitamin-C és -D.

Chlorosis: lásd **Anaemia hypochrom.**

Cholecystitis: Atropin, Bilocid, Bilagit, Bispan, Depridol, Ditonal, Gapona, Gutta cholagog. FoNo 263., No-Spa, Papaverin, Pil. atropin. comp. FoNo 279., Pulv. cholagog. FoNo 275., Ridol, Salvoseptyl, Spec. cholagog. FoNo 280., Suprachol, Triospan, Troparin, Troparin comb.

Cholelithiasis: Algopyrin, Depridol, Dolargan, Domatrin, Gapona, Gastrixon, Neopepulsan-duplex, No-Spa, Morphin, Oxycodon, Papaverin, Pulv. antidolor. FoNo 20., Ridol, Salvoseptyl, Steralgin, Troparin, Troparin comb., Supp. spasmolyt. FoNo 65.

Chorea: Arsotonin, Sevenal, Sevenaletta.

Cirrhosis hepatis: Chlolurit, Cholinchlorid, Fonurit, Hypothiazid, Methionin, Novurit, Neoperhepar, Prednisolon, Sirepar, Suprachol, Vitaplex-K.

Climax: Ambosex, Belloid, Dienoestrol, Limovan, Melipramin, Menotheosan, Mikrofollin, Syntestrin.

Colitis: Bispan, Bolus adstringens, Chlorocid, Enteroseptol, Gapona, Gastrixon, Neopepulsan-duplex, No-Spa, Papaverin, Salvoseptyl, Sulfaguanidin, Susp. jodchloroxichin. FoNo 69., Tannocarbon, Tetran, Triospan, Troparin, Troparin comb., Supp. spasmolyt. FoNo 65.

Collapsus: Coff. natr. benz., Corediol, Epherit, Noradrenalin, Pulsotyl, Sympathomim, Tetracor-Epherit, Tonogen.

Colpitis: lásd **Fluor albus.**

Coma: Aktedron, Coff. natr. benz., Corediol, Depersolon, Lobelinum, Noradrenalin, Spiractin, Sympathomim, Tetracor.

Coma diabeticum: Insulin + Glucosum, Pulsotyl, K-Strophantosid, Sympathomim.

Combustio: Azulenol kenőcs, Chlorocid kenőcs, Lidocain kenőcs, Neogranormon, Phenylbutazon kenőcs, Reseptyl-urea, Trypsin sebhintőpor.

Conjunctivitis: Chlorocid-H, Dehistin, Depersolon szemcsepp, Hydrocortison szemkenőcs, Oculent. borozinc. FoNo 211., Oculent. chloramphen. FoNo 212., Oculogutt. argent. prot. FoNo 196., Oculogutt. chloramphen. FoNo 198., Oculogutt. neomycin. FoNo 200., Oculogutt. sulfacetamid. FoNo 204., Oculogutt. zinc. FoNo 207., Oculogutt. zinc. c. ephedr. FoNo 208., Pernovin, Septosyl, Suprastin.

Cretinismus: Glutarec, Thyreoidea.

Cystitis: Coerulamin, Hexamethylentetramin, Nevigramon, Nitrofurantoin, Penicillin-készítmények, Salvoseptyl, Superseptyl, Quinoseptyl, Spec. uvae ursi FoNo 160., Triaseptyl, Vestin.

Decompensatio: Digitalis-készítmények (FoNo 37., 41., 42.), K-Strophantomusc, K-Strophantosid.

Decubitus: Azulenol kenőcs, Biung, Bórsavas vazelin, Bupatol Chlorosan, Cinkoxidos kenőcs, Dermasept, Neogranormon, Past. jecor. FoNo 119., Ung. tolazol. FoNo 153.

Depressio: Centedrin, Melipramin, Nuredal, Pil. anaslept. FoNo 38., Tisercin, Tisercinetta, Trisedyl.

Dermatitis: Alsol, Azulenol, Dermasept, Hydrocortison kenőcs, Lidocain kenőcs, Linim. calc. FoNo 88., Neogranormon, Past. Lassari. FoNo 120., Phenylbutazon kenőcs, Plastubol, Prednisolon kenőcs, Phlogosam, Susp.zinc. aquos. FoNo 105., Susp. zinc. oleos. FoNo 106., Ung alum. acet. tart. FoNo 125., Ung. chlorogen. FoNo 133., Ung. refrig. FoNo 147.

Diabetes insipidus: Glanduitrin, Hypophysis-szippantópor.

Diabetes mellitus: Adebit, Bucarban, Insulin, Oradian, Oterben, Zinc-protinsulin.

Diathesis exsudativa: Calcimusc, Calcium bromatum, Calcium chloratum, Calcium lacticum, Gran. calc. phosph. FoNo 293., Hydrocortison kenőcs, Prednisolon kenőcs, Pulv. calc. lactophosph. FoNo 294., Rutascorbin, Rutin, Vitamin-A, -D;
— haemorrhagica: lásd **Scorbut.**

Diphtheria: Coff. natr. benz., Corediol, Diphtheriaszérumok (lásd: *Szerobakteriológiai készítmények* fejezetében) Pulsotyl, Sympathomin, Tetracor.

Dysenteria: Bolus adstringens, Carbo activ. FoNo 71., Carbo medicinalis, Chlorocid, Enteroseptol, Furazolidon, Domatrin, Neotroparin, No-Spa, Sulfaguanidin, Superseptyl, Susp. jodchloroxychin. FoNo 69., Tannocarbon, Tetran.

Dyshidrosis: Fungifen, Mycosid, Prednisolon-J kenőcs, Sol. Castellani FoNo 85., Sterogenol.

Dysmenorrhoea: Akrofollin, Bispan, Depofollan, Dienoestrol, Glanducorpin, Infecundin, No-Spa, Menotheosan, Meristin, Mikrofollin, Ridol, Steralgin, Supp. spasmolyt. FoNo 65., Syntestrin.

Dyspepsia: Betacid, Bolus adstringens, Carbo medicinalis, Dipankrin, Enteroseptol, Gutt. stomach. FoNo 264., Lukullin, Neocarbolax, Susp. jodchloroxychin. FoNo 69, Tinct. amar. FoNo 268.

Dystrophia (izom): Decosteron, Retabolil, Stigmosan, Vitamin-B_1, -B_6, -E.

Eclampsia: Etoval, Novurit, Sevenal, Sevenalil.

Ekzema: Alsol, Biung, Calcimusc, Chlorosan, Dermasept, Hydrocortison kenőcs, Past. Lassari FoNo 120., Phlogosam, Pil. arsen. FoNo 257., Plastubol, Prednisolon, Prednisolon kenőcs, Prednisolon-J kenőcs, Pulv. boropermang. FoNo 109., Ung. alum. acet. tart. FoNo 125., Ung. ichthyolsalic. FoNo 142., Ung. refring. FoNo 147., Vitamin-B_1 és -A.

Embolia: Acid. nicotinicum, Bivelin, Heparin, Natr. nitrosum, Papaverin, Syncumar.

Emphysema: Corediol, Diapulmon, Epherit, Intrajod, Sol. theobromojod. FoNo 55., Trypsin.

Empyema: Isonicid, Penicillin, Quinoseptyl, Superseptyl, Streptomycin, Tebaminal, Tetran-B.

Encephalitis chron.: Aktedron, Aparkazin, Bellafit, Etoval, Hibernal, Hirepin, Mydeton, Relaxil-G, Scopolaminum hydrobromicum, Sevenal.

Endarteriitis obl.: Acidum nicotinicum, Hogival, Mydeton, Paniverin, Tolazolin, Bupatol.

Endocarditis: Digitalis-készítmények, Penicillin-készítmények, Superseptyl, Tetran-B.

Endocarditis rheumatica: Amidazophen, Eggosalil, Natrium salicylicum, Predniloson, Rheopyrin, Rheosolon.

Endometritis: Fájdalomcsillapítók, Neomagnol, Penicillin-készítmények, Superseptyl, Triaseptyl.

Enteritis: Bellafit, Betacid, Bolus adstringens, Carbo activ. FoNo 71. és 72., Carbo medicinalis, Dipankrin, Enteroseptol, Lukullin, Sulfaguanidin, Susp. bism. subsalic. pro infant. FoNo 68., Tannocarbon.

Enuresis nocturna: Epherit, Polybrom, Strychnin.

Epididymitis: Neurolysin, Penicillin-készítmények, Polysan, Superseptyl, Tetran, Triaseptyl.

Epilepsia: Diphedan, Fedibaretta, Glucosum 40%, Neophedan, Perlepsin, Ptimal, Sertan, Sacerno, Seduxen, Sevenal, Tisercin.

Erysipelas: Penicillin-készítmények, Sertésorbánc-szérum, Superseptyl, Triaseptyl, Tetran.

Étvágytalanság: Fercupar, Ferroplex, Insulin, Tinct. amar. FoNo 268.

Fagyás: Azulenol kenőcs, Biung, Dienoestrol kenőcs, Linim. ad. pernion. FoNo 87., Superseptyl Urea, Ung. camph. ad pernion. FoNo 132., Ung. jod. ad pernion. FoNo 144., Ung. tolazol. FoNo 153.

Febris puerperalis: Analeptica, Penicillin-készítmények, Streptomycin, Superseptyl.

Febris rheumatica: Exacthin, Prednisolon, Rheosolon, Szalicilátok.

Fluor albus: Acid. lact. dil. FoNo 1., Boragin, Hexetidin, Hogival, Klion, Ovul. jodchloroxychin. FoNo 296., Pulv. ad irrig. FoNo 6., Pulv. zinc. alum. FoNo 7., Sol. zinc. chlor. FoNo 5., Sterogenol, Sulfavagin.

Gáz-oedema: Gáz-oedema-szérum, Penicillin-készítmények, Reseptyl-Urea.

Gingivitis: Hyperol, Tinct. adstr. FoNo 244., Vitamin-C.

Glaucoma: Chinorto, Ergam, Oculogutt. physost. mit. FoNo 202., Oculogutt. pilocarp. FoNo 203., Rutascorbin.

Gonorrhoea: Chlorocid, Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Streptomycin, Superseptyl, Tetran, Triaseptyl.

Haematuria: Calcimusc, Calcium chloratum, Rutin, Rutascorbin, Vitamin-C, -K.

Hányáscsillapítás: Atropin, Deadalon, Domatrin, Neotroparin, Novatropin, Scopolamin, Sevenal, Supp. antiemet. FoNo 63., Supp. antiemet. pro infant. FoNo 64., Vitamin-B_6.

Herpes zoster: Lidocain kenőcs, Morgalin, Vitamin-B_1.

Hordeolum: Bór-cink szemkenőcs, Chlorocid kenőcs, Oculent. flav. FoNo 213., Tetran szemkenőcs.

Hyperaciditas: Aluminium hydroxydatum, Atropin, Bellafit., Gran. magn. trisil. FoNo 269., Optacid, Pulv. alcal. c. bellad. FoNo 270., Pulv. alumin. antacid. FoNo 271., Pulv. antacid c. bellad. FoNo 273., Pulv. neutracid. FoNo 277.

Hyperemesis gravidarum: Belloid, Daedalon, Glanducorpin, Insulin, Neopepulsan-duplex, Neoperhepar, Sevenal, Supp. antiemet. FoNo 63., Vitamin-A és -B_6.

Hyperthyreosis: Arsotonin, Belloid, Dityrin, Etoval, Etovaletta, Metothyrin, Perchlorat-K, Sevenal, Sevenaletta.

Hypertonia: Agatheosan, Chlorurit, Erpozid, Etoval, Etovaletta, Hypothiazid, Intrajod, Jodpapaverintheosan, Natr. nitros., Niton, Pil. nicophyllin. FoNo 62., Pulv. nitrotheobarb. FoNo 59., Pulv. theophyllin. comp. FoNo 61., Rausedyl, Redergam, Rutophyllin, Sanotensin, Sevenal, Sevenaletta, Synapleg, Sol. kal. jod. FoNo 53., Sol. kal. jod. comp. FoNo 54., Sol. theobromojod. FoNo 55., Supp. theophyl. comp. FoNo 67., Tensatrin, Vasobroman.

Hypothyreosis: Liothyronin, Sanotensin, Thyreoidea.

Hypotonia: Corediol, Epherit, Noradrenalin, Pil. analept. FoNo 38., Pulsotyl, Strychnotonin, Sympathomim, Tetracor, Tetracor-Epherit,

Hypovitaminosis: Gerovit, Polyvitaplex-8, Polyvitaplex-10.

Icterus: Bilagit, Bilocid, Cholinchlorid, Insulin, Methionin, Neoperhepar, Nikotin-savamid, Polybé, Pulv. cholagog. FoNo 275., Spec. cholagog. FoNo 280., Vitamin-C, Vitaplex-K.

Impetigo: Biung, Chlorocid kenőcs, Chlorocid-H, Chlorosan, Dermasept, Sterogenol, Tetran kenőcs, Tetran-Hydrocortison kenőcs, Zenon.

Influenza: Chinin, Coderit, Germicid, Hydrocodin, Istopirin, Kalmopyrin, Pulsotyl, Pulv. chinacisal. c. vit. C FoNo 24., Pulv. codacetin. FoNo 25., Quino-

septyl, Superseptyl, Supracodin, Susp. sulfadimidin. FoNo 70., Sympathomim, Tetracor-Neocod, Triaseptyl, Vitamin-C.
— *Szövődmények esetében:* antibioticumok és chemotherapeuticumok.

Insuff. cordis: lásd **Decompensatio.**

Ischias: Acitophosan, Algopyrin, Cofocain, Demalgon, Dolor, Eggosalil, Istopirin, Natr. salicyl., Peremin, Polybé, Pulv. antidolor. FoNo 20., Pulv. analg. FoNo 19., Rheopyrin, Scutamil-C, Steralgin, Tofamid, Trifavit, Vitamin-B_1, Vitamin-B_{12}.

Laryngitis: Codein, Coderit, Hydrocodin, Istopirin, Oxycodon, Supracodin.

Leukaemia: Arsotonin, Degranol, Leupurin, Myelobromol, Pil. arsen. FoNo 257., Prednisolon, Vinblastin, Zitostop.

Lues: Medobis, Penicillin.

Lymphogranuloma: Chlorocid, Degranol, Prednisolon, Superseptyl, Triaseptyl, Zitostop.

Malaria: Delagil, Chinin, Pentilen.

Malleus: Neomagnol, Penicillin, Superseptyl, Triaseptyl.

Mastitis: Penicillin-készítmények, Superseptyl.

Mastoiditis: Penicillin-készítmények, Superseptyl, Triaseptyl.

Menière-tünet: Daedalon, Neotroparin, Stigmosan, Troparin.

Meningitis epid.: Penicillin, Superseptyl, Tebaminal.

Menorrhagia: Akrofollin, Ergam, Ergometrin, Glanducorpin, Neo-Gynofort, Vitaplex-K.

Meteorismus: Atropin, Bolus laxans, Carbo medicinalis, Dipankrin, Gran. carbo. activ. FoNo 72., Gutt. carminat. FoNo 262., Lukullin, Neocarbolax, Neotroparin, Papaverin, Troparin.

Metropathia haemorrhagica: Ergam, Ergometrin, Glanducorpin, Neo-Gynofort.

Migraine: Algopyrin, Amidazophen, Antineuralgica, Azophenum coff. citr., Barbamidum, Belloid, Coffein, Demalgon, Diaphyllin, Dienoestrol, Hogival, Istopirin, Kalmopyrin, Karil, Kefalgin, Nitromint, Pipolphen, Pulv. analg. FoNo 19., Pulv. azoph. coff. citr. FoNo 22., Redergam, Ridol, Secadol, Rigetamin, Vasalgin.

Moniliasis: Nystatin.

Morbilli: Gamma-globulin.

Morphinum intoxicatio: Nalorphin, Spiractin.

Myalgia: Aciphen, Capsoderma, Cofocain, Demalgon, Demalgonil, Eggosalil, Istopirin, Natr. salicyl., Linim. ammon. FoNo 77., Myoflexin, Peremin, Pulv. analg. FoNo 19., Pulv. combinat. FoNo 28., Rheopyrin, Steralgin.

Myocarditis: Atriphos, Digitalis-készítmények, Penicillin, Prednisolon, Pulsotyl, Vitamin-B_1 és -C.

Myopathia cordis: Corhormon.

Myxoedema: Thyreoidea.

Nephritis: Diaphyllin, Digitalis-készítmények (Supp. digit. FoNo 40., Supp. digit. fort. FoNo 41., Supp. digitheobr. FoNo 42.), K-Strophantosid.

Nephrolithiasis: Demalgonil, Depridol, Dolargan, Domatrin, Gastrixon, Gutt. antinephrolith. FoNo 158., Gutt. methylhomatrop. FoNo 13., Hypanodin, Morphin, Neotroparin, No-Spa, Oxycodon, Papaverin, Pulv. antidolor. FoNo 20., Ridol, Steralgin, Stigmosan, Supp. spasmolyt. FoNo 65.

Nephrosis: Diaphyllin, K-Strophantosid, Prednisolon.

Neuralgia: Acitophosan, Algopyrin, Cofocain, Demalgon, Dolor, Eggosalil, Istopirin, Kalmopyrin, Natr. salicyl., Polybé, Pulv. antineuralg. FoNo 21., Pulv. barbamid. comp. FoNo 23., Pulv. codacetin. FoNo 25., Pulv. coffacyl. FoNo 26., Pulv. coffacyl. c. codein. FoNo 27., Ridol, Scutamil-C, Steralgin, Tofamid, Vitamin-B_1 és -B_{12}.

Neurasthenia: Andaxin, Arsotonin, Belloid, Etovaletta, Dalgol, Hovaletten, Legatin, Medivaler, Neupon,

Mixt. sedat. FoNo 180,, Polybrom, Pulv. sedans FoNo 189., Seduxen, Sevenaletta, Sir. phosphobrom. FoNo 182., Sol. coffobrom. FoNo 186., Trioxazin.

Neuritis: Algopyrin, Barbamidum, Demalgon, Depridol, Dolargan, Dolor, Polybé, Pulv. barbamid. comp. FoNo 23., Pulv. combinat. FoNo 28., Rheopyrin, Steralgin, Vitamin-B_1, -B_{12}.

Neurosis: Albroman, Andaxin, Dalgol. Etovaletta, Frenolon, Gutt. valer. c. menthol. FoNo 175., Inf. valer. FoNo 176., Legatin, Mixt. sedat. FoNo 180., Mixt. sedat. comp. FoNo 181., Pil. Brombarbit. FoNo 191., Polybrom, Sevenaletta, Sol. brombarb. FoNo 183., Sol. bromida FoNo 184., Tinct. valer. spir. FoNo 188., Tisercin, Tisercinetta, Trioxazin, Valeriana comp.

Nodus haemorrhoidalis: Azulenol, Hemorid, Nodicid, Noditran, Reparon, Supp. ad nod. FoNo 116., Supp. haemorrhoid. FoNo 117., Ung. haemorrhoid. FoNo 138.

Obesitas: Gracidin, Liothyronin, Thyreoidea.

Obstipatio: Artin, Bolus laxans, Diotilan, Emuls. ol. ricin. FoNo 161., Emuls. paraff. c. phenolphth. FoNo 162., Inf. sennae c. natr. sulf. FoNo 163., Neocarbolax, Ol. ricin. FoNo 164., Paraff. aromat. FoNo 165., Phenolphthalein, Pil. lax. FoNo 172., Pulv. purgat. FoNo 169., Pulv. sennae comp. FoNo 171., Spec. lax. FoNo 173., Sir. lax. FoNo 166., Taxin, Videx.
spasmus esetén: No-Spa, Papaverin, Pulv. purgat. c. bellad. FoNo 170., Supp. lax. FoNo 174., Troparin, Troparin comb.

Oedema cardialis (lásd **Decompensatio**): Chlorurit, Fonurit, Hypothiazid, Novurit, Uregyt.
— **glottitis:** Calcium chlorat., Calciumsc, Noradrenalin, Tonogen.
— **Quincke:** Calciphedrin, Calc. chlorat., Epherit, Hogival, Prednisolon, Pipolphen, Sympathomim, Syntestrin, Thyreoidea.

Osteomalacia: Ambosex, Androral, Calcimusc, Calc. chlorat., Calc. lact., Caldea, Gerovit, Gran. calc. phosph. FoNo 293., Emuls Ol. jecor. comp. FoNo 252., Nerobol, Nerobolil, Ol. jecor. FoNo 255., Pulv.

calc. lactophosph. FoNo 294., Vitamin A + D_3, Vitamin-D_3.

Otitis media: Beacillin, Chlorocid sebhintőpor, Depersolon orr- és fülcsepp, Otogutt. boric. FoNo 245., Otogutt. chloramphen. FoNo 246., Otogutt. peroxyd. FoNo 248., Otogutt. phenol. FoNo 249., Otogutt. sulfadimid. FoNo 250., Penicillin, Promptcillin, Superseptyl, Triaseptyl, Vegacillin.

Oxyuriasis: Ascaricid, Genticid, Piperascat, Ung. contra oxyur. FoNo 135.

Parametritis: Calcimusc, Calc. chlorat., Glycerin. ichthyol. FoNo 3., Glob. ichthyol. FoNo 9., Neotroparin, Penicillin-készítmények, Streptomycin, Tetran, Triaseptyl, Trypsimusc.

Parkinsonismus: lásd **Encephalitis.**

Pediculosis: Neociklotox, Spars. antiparasit. FoNo 110.

Pellagra: Acid. nicotinicum, Nikotinsavamid, Vitamin-B_6.

Pemphigus: Dienostrol, Exacthin, Hogival, Neoperhepar, Polybé, Prednisolon.

Pericarditis: Digitalis-készítmények (!), Hydrocodin, Natr. salicyl., Prednisolon, Supracodin, Vitamin-C.

Peritonitis: Chlorocid, Penicillin-készítmények, Pulsotyl, Streptomycin, Superseptyl, Sympathomim, Tetran.

Pernio: lásd **Fagyás.**

Pertussis: Chlorocid, Expectin, Gutt. expect. FoNo 221., Hydrocodin, Pertussis-vaccina, Tetran B, Tetrinfan.

Pharyngitis: Codein-Stibium, Coderit, Fagifor, Germicid, Glycosept, Gargarism. chlorof. FoNo 239, Istopirin, Kalmopyrin, Naphazolin, Natr. salicyl.

Phlegmone: Burofix, Chlorocid sebhintőpor, Penicillin-készítmények, Reseptyl-Urea, Tetran sebhintőpor.

Pleuritis sicca: Eggosalil, Natr. salicyl;
— **exsudativa:** Calcimusc, Calc. chlorat., Chlorurit, Novurit;

— **purulenta:** Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Superseptyl, Streptomycin.

Pneumonia: Chlorocid, Penicillin-készítmények, Pulsotyl, Quinoseptyl, Salvoseptyl, K-Strophantosid, Superseptyl, Sympathomim, Tetran B, Triaseptyl, Vitamin-C.

Polyneuritis: lásd **Neuritis.**

Prostata-carcinoma: Ambosex, Dienoestrol, Glandubolin, Syntestrin;
— **hypertrophia:** Androral, Retandrol, Syntestrin.

Prostatitis: Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Superseptyl, Triaseptyl.

Prurigo: Dehistin, Arsotonin, Calc. bromat., Chlorocid H, Lidocain kenőcs, Pernovin, Pipolphen, Strychnotonin, Suprastin.

Pruritus: Calcimusc, Calc. bromat., Calc. chlorat., Dienoestrol, Hibernal, Hogival, Hydrocortison kenőcs, Legatin, Polybrom, Prednisolon kenőcs, Prednisolon-J kenőcs, Spir. salic. FoNo 101., Susp. sicc. FoNo 104., Susp. zinc. aquos. FoNo 105., Syntestrin, Ung. ad prurit. FoNo 124., Ung. anaesth. FoNo 126., Ung. contra dolor. FoNo 134., Ung. refrig. FoNo 147.

Psychasthenia: Glutarec.

Psychosis: Andaxin, Dalgol, Hibernal, Hirepin, Frenolon, Seduxen, Trisedyl.

Pyelitis: Coerulamin, Hexamethylentetraminum, Nevigramon, Nitrofurantoin, Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Spec. uvae ursi FoNo 160, Tetran, Vestin.

Rachitis: Calcium lacticum, Caldea, Emuls. ol. jecor. FoNo 252., Emuls. ol. jecor. comp. FoNo 253., Gran. calc. phosph. FoNo 293., Ol. jecor. FoNo 255., Pulv. calc. lactophosph. FoNo 294., Vitamin A + D_2 Vitamin-D_3.

Raynaud-kór: Acid. nicotinicum, Ambosex, Akrofollin, Atriphos, Bupatol, Dienoestrol, Hogival, Papaverin, Syntestrin, Tolazolin, Vasalgin.

Reconvalescentia: Arsotonin, Elix. tonis. FoNo 251., Emuls. ol. jecor. FoNo 252., Fercupar, Ferroplex, Gerovit, Nerobol, Neroboletta, Nerobolil, Ol. jecor. FoNo 255., Pil. arsen. FoNo 257., Pil. tonisans. FoNo 260., Polybé, Polyvitaplex, Stychnotonin, Vitamin-B_1 és -C.

Rheumatismus: Acitophosan, Aciphen, Capsoderma, Eggosalil, Linim. ammon. FoNo 77., Mixt. antirheum. FoNo 78., Myoflexin, Opodeldok, Prednisolon, Pulv. antirheum. FoNo 81., Pulv. Petersi FoNo 82., Rheopyrin, Rheosolon, Sol. sulfurat. pro baln. FoNo 79., Spir. antirheum. FoNo 80., Susp. salicylamid. 2% és 4% FoNo 16 és 17, Szalicilátok, Ung. antirheum. FoNo 83.

Rhinitis: Calcimusc, Calcium chlorat., Dehistin, Depersolon orr- és fülcsepp, Histazolin, Naphazolin, Nasogutt. ephedr. FoNo 234., Nasogutt. ephedr. pro infant. FoNo 235., Nasogutt. zinc. FoNo 236., Pernovin, Prednisolon, Suprastin, Tonogen, Ung. nasal. FoNo 237., Ung. nasal. comp. FoNo 238.

Röntgencsömör: Acid. nicotinic., Neoperhepar, Polybé, Vitamin-B_6.

Scabies: Linim. scabicid. FoNo 89., Novascabin.

Scarlatina: Penicillin-készítmények, Vörheny-szérum.

Sclerosis multiplex: Mydeton, Neoperhepar, Nikotinsavamid, Vitamin-E.

Scorbut: Rutin, Rutascorbin, Vitamin-C és -D.

Seborrhoea: Spir. salic. FoNo 101., Spir. salic. c. resorcin. FoNo 102., Sterogenol, Ung. hydrarg. sulf. FoNo 141., Ung. ichthyolsalic. FoNo 142., Ung. sulfur. salic. FoNo 152.

Sepsis: Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Streptomycin, Superseptyl, Tetran, Triaseptyl.

Shock: Coff. natr. benz., Corediol, Depersolon, Exacthin, Human Albumin 15% és 25%, Noradrenalin, Plasmodex, Plazmaprotein Human 5%, Prednisolon, Pulsotyl, Sympathomim, Tetracor, Tonogen.

Simmonds-kór: Decosteron, Exacthin, Choriogonin, Prednisolon.

Soor: Garagrism. chlorogen. FoNo 240., Glycerin. borax. FoNo 86.

Spasmophylia: Calcimusc, Calcium chlorat., Calcium lact., Emuls. ol. jecor. comp. FoNo 252., Granul. calc. phosph. FoNo 293., Sol. chloral hydr. pro infant. FoNo 185., Vitamin-D_2.

Sprue: Folsav, Neoeperhepar forte, Nikotinsavamid, Vitamin-B_{12}. Vitamin-K.

Sterilitas: Dienoestrol, Glanducorpin (+ Thyreoidea), Hogival, Infecundin, Syntestrin, Vitamin-E.

Stomatitis: Acidum nicotinicum, Hydrogen. peroxyd. 3% FoNo 241., Hyperol, Sol. xanthacridin. FoNo 243., Tinct. adstr. FoNo 244., Vitamin-C.

Syphilis: lásd **Lues.**

Szülés: *Fájdalomcsillapító:* Dolargan, Steralgin. — *Fájáselősegítő:* Chinin, Glanduitrin, Oxytocin. — *Vérzéscsillapító:* Ergam, Ergometrin, Neo-Gynofort.

Tabes dorsalis: Medobis, Pyrago, Strychnotonin.

Tachycardia paroxysmalis: Atriphos, Carditoxin, Chinidin, Chinin, Digitalis-készítmények, K-Strophantosid.

Tenesmus: Dolargan, Dolofort, Neotroparin, Oxycodon, Papaverin, Ridol, Steralgin, Troparin comb.

Tetania: Calcimusc, Calc. chlorat., Relaxil-G, Vitamin-D_3, Klysm. chloral. FoNo 177.

Tetanus: Etoval, Klysm. chloral. FoNo 177., Relaxil-G, Sevenal, Tetanusz-szérum.

Thrombopenia: Folsav, Vitamin-C és -K.

Thrombophlebitis: Bivelin, Phenylbutazon kenőcs (csak felületes thrombophlebitisben), Trypsimusc.

Thrombosis: Heparin, Syncumar;
— **coronaria:** Atriphos, Atropin, Etoval, Morphinum, Sevenal, K-Strophantosid, Syncumar;
— **cerebri:** Aljodan, Intrajod, Jódpapaverintheosan, Sol. kal. jod. FoNo 53.

Tonsillitis: Eggosalil, Gargarism. chlorogen. FoNo 240., Hyperol, Istopirin, Kalmopyrin, Penicillin-készítmények, Quinoseptyl, Superseptyl, Triaseptyl.

Trichomonas fluor: Boragin, Hexetidin, Klion, Sterogenol, Sulfavagin.

Tuberculosis: *Chemotherapiára:* Cycloserin, Isonicid, Phtyson, Pyrazinamid, Rigenicid, Streptomycin, Tebaminal, Viomycin. — *Izzadás ellen:* Atropin, Gastropin, Gutt. methylhomatrop. comp. FoNo 13. — *Köhögéscsillapító:* Codein, Coderit, Diacodon, Gutt. aethylmorph. FoNo 11., Gutt. codein. FoNo 12., Libexin, Noscapin.

Typhus abdominalis: Amidazophenum, Chlorocid, Germicid, Supp. amidazoph. FoNo (29., 30., 31.), Tetran, Vitamin-C.

Ulcus corneae: Noviform-Zinc;
— **cruris:** Azulenol, Bupatol, Chlorosan, Elastonpólya, Past. jecor. FoNo 119., Prednisolon-J kenőcs, Trypsimusc, Ung. anaesth. FoNo 126., Ung. contra dolor. FoNo 134., Ung. tolaz. FoNo 153;
— **ventriculi:** Alum. hydroxyd, Ambosex, Bellafit, Belletoval, Dienoestrol, Gapona, Gastrixon, Hogival, Neopepulsan-duplex, Neotroparin, No-Spa, Papaverin, Pil. atropin. comp. FoNo 279., Pulv. alcal. c. bellad. FoNo 270., Pulv. alumin. antacid. FoNo 271., Pulv. antispast. FoNo 58., Susp. anaesth. FoNo 15., Syntestrin, Troparin, Troparin. comb.

Urethritis simplex: Coerulamin, Hexamethylentetramin, Tetran B, Quinoseptyl, Vestin;
— **gonorrhoica:** Penicillin, Quinoseptyl, Salvoseptyl, Superseptyl, Triaseptyl.

Urticaria: Calcimusc, Calciphedrin, Calc. chlorat., Calc. lact., Dehistin, Lidocain kenőcs, Pernovin, Prednisolon, Pipolphen, Suprastin, Susp. sicc. FoNo 104., Susp. zinc. aquos. Fono 105.

Varicositas: Elastosan-pólya.

Vérzéscsillapítás: Calcimusc, Calc. chlorat., Rutascorbin, Rutin, Vitamin-C és -K.

Vitium cordis: lásd **Decompensatio.**

Vizeletfertőtlenítés: Hexamethylentetramin, Salvoseptyl, Vestin.

TÖRZSKÖNYVEZETT GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

ACEPRAMIN E.Gy.T. XVIII.
inj., gran.

Összetétel: 1 amp. (20 ml) 8 g acid. aminocaproic.-ot, 1 doboz (240 g) 90 g acid. aminocaproic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Az Acepramin indicatiós területéhez azok a kórállapotok tartoznak, amelyekben a vérzékenység okozója a kórosan fokozott fibrinolysis. Így elsősorban a primaer hyperfibrinolysis okozta coagulopathiák gyógykezelésére ajánlott, de általános tapasztalat szerint olyan coagulopathiákban is jó therapiás hatás érhető el, ahol a fibrinolysis nem fokozott.

Belgyógyászat: haemophilia, leukaemiák, thrombopenia, cirrhosishoz társuló vérzékenység egyes eseteiben, thrombolytikus therapia során alkalmazott streptokinase, ill. plasmin okozta súlyos vérzés esetén.

Sebészet: nagy mellkasi műtétek, extracorporalis keringést igénylő beavatkozások, porto-cavalis-shunt műtétek stb.

Urológia: prostata-carcinoma, prostata-hypertrophia miatt végzett műtétek.

Szülészet-nőgyógyászat: korai lepényleválás, fenyegető vetélést kísérő vérzékenység.

Ellenjavallatok: Gravidáknak az első két trimenonban. valamint a veseelégtelenség esetén ellenjavallt. A diffus intravascularis alvadás talaján kifejlődött consumptiós coagulopathiák esetében nem alkalmazható, ha azonban a fibrinolysis is közrejátszik az alvadászavar létrejöttében, a kezelést Acepramin therapiával kell kiegészíteni! Szív-infarctus és thromboemboliás szövődmények esetén csak elővigyázatosan adagolható.

Adagolás: A gyors felszívódás és kiválasztás miatt az Acepramint folyamatosan kell adni, általában 4—6 óránként 0,05—0,07 g/testsúlykg-ot, átlagos testsúlyú felnőtteknek tehát napi 15—30 g-ot. (Egy csapott kávéskanál 1 g, 1 csapott gyermekkanál 2 g, egy csapott evőkanál 3 g hatóanyagnak felel meg.) Huzamos kezelés esetén az Acepramin napi mennyisége a 20 g-ot lehetőleg ne haladja meg, ilyenkor a beteget — elsősorban veseműködését — ellenőrizni kell. A prophylaxist kisebb mennyiség is kielégítően biztosítja. Streptokinase-túladagolás esetén 10—16 g Acepramin lassú i. ven. bevitele szükséges.

Az Acepramint lehetőleg szájon át adagoljuk. I. ven.-an csak sürgős esetben vagy olyankor, ha az oralis adagolás nehezített vagy lehetetlen. Az i. ven. injekciót lassan (5—10 perc alatt) kell beadni. Csepp-infúzió formájában csak isotoniás konyhasó vagy 5%-os glukóz vagy Ringer-oldattal alkalmazható.

Mellékhatások: Émelygés, hányinger, hányás, orthostatikus collapsus, ritkábban erythema és hasmenés fordulhat elő, különösen a napi 20 g fölötti Acepramin-dosisok alkalmazásakor. Ergotamin-tartaráttal az orthostatikus kórtünetek javíthatók.

Megjegyzés: ✠ Az *inj.* csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van forgalomban. Orvosi vényen nem rendelhető.

A *gran.* társadalombiztosítás terhére csak fekvőbeteg-gyógyintézetben vagy haematologiai gondozóban történt beállítás alapján, rendszeres ellenőrzés esetén rendelhető. A vényen a javaslatot adó fekvőbeteg-gyógyintézetet, gondozót és a javaslat keltét fel kell tüntetni.

Csomagolás: 10×20 ml amp. 185,— Ft
1 doboz (240 g gran.) 95,— Ft.

ACIDOTEST Ch. LIII.

tabl. + drazsé, diagnosticum a gyomor savtartalmának vizsgálatához

Összetétel: 1 tabl. (I) 0,2 g coff. natr. benz.-ot; 1 drazsé (II) 0,05 g etaxazenumot tartalmaz.

Javallat: Minden olyan eset, amelyben a frakcionált próbareggeli javallatot képez, de adható neuropathiás vérzékenységben szenvedő vitiumos, hypertoniás stb. egyéneknek is, akiknek a frakcionált próbareggeli alkalmazása ellenjavallt.

Ellenjavallatok: Súlyos máj- és vesekárosodások, továbbá gyomor-resectio utáni állapot, amikor is a vizsgálat eredménye nem értékelhető.

Adagolás: A csomagoláshoz mellékelt részletes használati utasítás szerint alkalmazzuk. Egy beteg egyszeri vizsgálatához a testsúlytól és életkortól függetlenül 1—2 db koffein tabletta és 3 db testdrazsé szükséges. Megfelelő előkészítés után, a vizsgálat — a hólyag teljes kiürítése után (ez a vizeletmennyiség nem kerül felhasználásra) — 1—2 db fehér koffein tabletta bevételével kezdődik. 1 óra múlva vizeletürítés. Erre a teljes mennyiségű vizeletet tartalmazó üvegre felragasztjuk a csomagoláshoz mellékelt „Kontroll vizelet" szövegű címkét. Ezután a beteg kevés vízzel szétrágás nélkül a 3 db sárga test-drazsét beveszi. A drazsék bevételétől számított 1½ óra múlva a másik üvegbe ismét vizeletürítés következik. A teljes mennyiségű vizeletet tartalmazó második üvegre a csomagoláshoz mellékelt „1½ órás vizelet" szövegű címke kerül.

Miután a vizelet festődését bizonyos faktorok befolyásolják, ezért a vizsgálat mielőbbi elvégzése szükséges. A vízzel felhígított vizeletmintákból kb. 5 ml-t kémcsövekbe öntünk, majd azonos mennyiségben 25%-os sósavat keverünk hozzá. A 1½ órás vizeletet tartalmazó kémcsőben a festékanyag jelenlétében piros elszíneződés keletkezik. Ennek intenzitását a csomagoláshoz mellékelt színskála segítségével azonnal lemérjük. Pozitív reakció esetében a piros szín a színskála A területének felel meg. Ilyen színárnyalatú azon betegek vizelete, akiknek gyomornedve szabad sósavat tartalmaz.

Az anaciditas a színskála B területének felel meg. Az A és B terület közötti színárnyalat hypaciditast, az A jelnél normaciditast, illetve intenzívebb színárnyalat esetében hyperaciditast jelez. — Anaciditasra utaló esetekben a frakcionált próbareggeli elvégzése a helyes diagnózis felállítása érdekében szükséges.

Megjegyzés: ✠ Nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhető be.

Csomagolás: 1 csomag (2 tabl. + 3 drazsé) 5,10 Ft; 1 csomag 10×(2 tabl. + 3 drazsé) 47,90 Ft.

ACIDUM NICOTINICUM

K.Gy. XVI/XXXI.

inj. 0,5%, tabl. 50 mg

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,025 g acid. nicot.-ot, 1 tabl. 0,05 g acid. nicot.-ot tartalmaz.

Javallatok: Ér-spasmusok, migraine, szulfamidok detoxikálása, fagyás, anaciditas, sclerosis multiplex.

Ellenjavallatok: Vérzésre való hajlamosság, haemorrhagiás diathesis.

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 ampulla s. cut., i. musc., i. ven. vagy háromszor naponta 1 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 2,90 Ft, 100 tabl. 7,30 Ft; 5×5 ml amp. 15,20 Ft, 50×5 ml amp. 88,90 Ft.

ACIGOXIN K.Gy. XIV.

inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,2 mg acetyldigitoxin.-ot, 1 tabl. 0,2 mg acetyldigitoxin.-ot tartalmaz.

Javallatok: A keringési elégtelenség (cardialis decompensatio) helyreállítása és a compensatio fenntartása.

Adagolás: A compensatio helyreállítására az első (esetleg második) napon nagyobb adag — 2—3 ampulla i. ven., illetve 3—5 tabletta — alkalmazható, amit a következő napokban akkor is helyes csökkenteni, ha toxikus jelenség egyáltalán nem mutatkozik. A helyreállított compensatio fenntartására általában napi ½—2 tabletta szükséges. — Az Acigoxin *mellékhatásai* megegyeznek más digitaliskészítmények mellékhatásaival (étvágytalanság, hányinger, látászavarok, bigeminia, bradycardia). Az ingerképzést és az ingervezetést kifejezetten csökkenti.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 5×2 ml amp. 8,50 Ft, 100×2 ml amp. 128,— Ft;
40 tabl. 11,— Ft, 250 tabl. 49,60 Ft.

ACIPHEN Ch. XLIII.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 2 g diaethylamin. salic.-ot tartalmaz 20 g lemosható kenőcsalapanyagban.

Javallatok: Krónikus polyarthritis (rheumatoid arthritis), egyéb arthritisek és tendovaginitisek, arthrosis, myalgia. Spondylosishoz és spondylarthrosishoz csatlakozó neuralgiák stb.

Alkalmazás: A fájdalmas területet meleg szappanos vízzel lemossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel vékonyan bedörzsöljük naponta 1—2-szer. Akut gyulladás esetén csak száraz (flanel) kötést alkalmazzunk.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 5,40 Ft.

ACITOPHOSAN K.Gy. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,27 g calc. phenylchinolincarb., 0,25 g acid. acetylsal., 0,07 g calc. carb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Influenza, bronchitis, tonsillitis, neuralgiák, polyarthritis, rheuma, köszvény.

Adagolás: Háromszor napjában 1—2 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 10 tabletta orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 20 tabl. 8,— Ft.

ADEBIT K.Gy. XXXV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 50 mg butylbiguanidin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: A diabetes mellitus minden olyan típusának kezelésére alkalmazható önmagában vagy sulfonylcarbamid készítménnyel együtt, ahol a saját insulin termelés nem szűnt meg. Ezenkívül bizonyos esetekben insulinnal kombinált alkalmazása indokolt lehet. Elsősorban *felnőttkori* sulfonylcarbamidra rezisztens diabetesben önállóan, vagy sulfonylcarbamid készítménnyel kombinálva, ha ez utóbbival egymagában a megfelelő anyagcsereegyensúly nem volt elérhető. — Felnőttkori diabetesben sor kerülhet elsődleges alkalmazására is, ami igen előnyös lehet sulfonylcarbamid-túlérzékenységben.
Fiatalkori, labilis anyagcseréjű diabetes jobb kompenzálására, a vércukor-ingadozások csillapítására, *insulinnal kombinálva*. Tapasztalat szerint várható az insulin-szükséglet csökkenése, némelykor az insulin-rezisztencia javítása. — Az Adebit a fiatalkori diabetes önálló kezelésére nem alkalmas.

Ellenjavallatok: Acidosisos anyagcserezavar, így természetesen praecoma és coma diabeticum, fertőzéses, lázas állapot, terhesség, gangraena, veseműködési elégtelenség, májbetegségek (annak ellenére, hogy adagolására visszavezethető májkárosodást nem észleltek). **Műtét előtt** a beteget insulinra kell beállítani.

Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az adagolás beállítása, illetve átállítása csak gyógyintézetben

vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt állandó orvosi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett végezhető. Helyesen akkor járunk el, ha a kezdeti adagot fokozatosan növeljük az egyéni optimális adag eléréséig. Az átlagos kezdeti adag naponta 2—3-szor 1 tabletta (100—150 mg) étkezés után, kevés folyadékkal. A továbbiakban, a beteg állapotától függően, 2—4 naponként 1 tablettával növelhetjük az adagot. A maximális napi adag 6 tabletta (300 mg) 3—4-szeri elosztásban. A bevezetés időszakában (10—14 napig) a napi vizeletcukorürítés ellenőrzése és néhányszor az éhgyomori vércukorvizsgálat elvégzése szükséges, minthogy általában csak a kezelés 10—14. napján dönthető el, hogy a beteg reagál-e a kezelésre. A további időszakban (kb. 2 hónapig) az ellenőrzést 1—2 hetenként végezzük. *A vérkép, a máj- és vesefunkciók félévenként ellenőrizendők.* — Napi fenntartó adagja leggyakrabban naponta reggel 1—2 tabletta és este 1 tabletta.

A diaeta szigorú betartása természetesen elengedhetetlen.

Kombinált kezelés esetén a sulfonylcarbamid-készítmény, illetve az insulin adagja az anyagcserekontrollnak megfelelően csökkenthető. Amennyiben a normális anyagcsere a kombinált kezelés (pl. 2 tabl. sulfonylcarbamid + 3 tabl. Adebit) alkalmazására helyreállt, megkísérlendő a sulfonylcarbamid-készítmény fokozatosan történő teljes elhagyása. Az adag csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzéssel csökkenthető vagy növelhető. Insulinról való átállításkor az insulin elhagyása csak fokozatos lehet.

Mellékhatások: A ritkán előforduló mellékhatások (étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés, fémes szájíz) az adag átmeneti csökkentésére általában mérsékelhetők, illetve megszüntethetők.

Megjegyzések: ✠ Rendelését az insulin és az orális antidiabeticumok rendeléséről, kiszolgáltatásáról kiadott 5/1967, (Eü. K. 2.) Eü. M. számú utasítás szabályozza (lásd: 583. oldalon).

Csomagolás: 40 tabl. 6,80 Ft, 200 tabl. 30,50 Ft.

AETHER AD NARCOSIM Ch. I.

Összetétel: 1 üveg 100 g aether ad narc.-ot tartalmaz.

Javallat: Narcosis.

Megjegyzés: A biztosítottak ellátásához nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhető be. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 üveg (100 g) 23,30 Ft.

AGATHEOSAN E.Gy.T. XVI. tabl.

Összetétel: 1 tabl. 250 mg theobromin., 20 mg phenobarbital., 5 mg pentaerythrityltum tetranitric.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, stenocardia, arteriosclerosis, neurosis, cordis.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 9,40 Ft.

AKROFOLLIN K.Gy. XXXIV. olajos inj. 5 mg.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg oestradiol prop., 30 mg alcohol benzylic.-t tartalmaz.

Javallatok: Primaer és secundaer amenorrhoea, raro- és hypomenorrhoea, menorrhagia, genitalis hypoplasia, castratiós és climaxos tünetek, ablactatio.

Adagolás: *Primaer amenorrhoeában:* Naponta 1—3 mg vagy 3 naponként 5—10 mg kúraszerűen. A kúra alatt (20—25 nap) adagolandó összmennyiség 30—60 mg i. musc. A kúra utolsó 5—7 napján célszerű a kezelést sárgatesthormon-adagolással kiegészíteni. 5—10 napos szünet után a kúra 3 ízben

megismételhető. *Secundaer amenorrhoeában, valamint raro- és hypomenorrhoeában* a ciklus közepidejében (annak 11—12. napján) 10—10 mg Akrofollint adunk i. musc. Ha a vérzés megindul, úgy a kezelést több hónapon át megismételjük. Ha a kezelés eredménytelen, úgy a primaer amenorrhoeánál leírt adagolási mód alkalmazandó.
Menorrhagia esetén a vérzés első napjától 5—10 mg pro die i. musc. a menstruatio végéig.
Genitalis hypoplasiában a ciklus 16—26. napjáig naponta 2 mg, összesen 20 mg i. musc. Eredménytelenség esetén az Akrofollin adagolását a ciklus elején kezdjük, és kéthavonként összesen 30 mg-ot adunk i. musc. — A kezelés utóbbi módja gátolhatja az ovulatiót.
Castratiós és climaxos tünetek befolyásolására havonta 3—5—10-szer 1 mg i. musc. — esetleg androgenekkel kombinálva — adható a szükséges egyéb tüneti kezelés kiegészítésére.
A lactatio megszüntetésére, az előrehaladott terhesség megszakadása vagy a szülés után azonnal 5—10 mg, majd ezt követően további 2—3 napon át naponta 5—10 mg.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×5 mg amp. 23,90 Ft, 50×5 mg amp. 239,— Ft.

AKTEDRON Ch. VII.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg amphethamin. phosph.-ot,
1 tabl. 5 mg amphethamin. phosph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fokozott szellemi vagy fizikai teljesítmény kiváltása, fáradékonyság, kimerültség, nervosus és climaxos depressio, elmezavar depressiós szaka, enyhébb melancholia, narcolepsia, altatószer-mérgezés, alcoholismus, morfinelvonás, enuresis.

Adagolás: Reggel vagy délelőtt, étkezés után 1—2 tabl., ill. ½—1 amp. s. cut. Alkalmazása délután vagy este kerülendő.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 amp. 6,30 Ft;
10 tabl. 2,20 Ft.

ALBROMAN Ch. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,50 g bromvalerocarb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Sedativum, enyhe hypnoticum. Gyermekeknek is adható. Neurosis, alcoholismus, climaxszal kapcsolatos ingerlékenység, kimerültségen, az idegrendszer izgalmán alapuló alvászavar, pruritus, fülzúgás.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: neuropathia.

Adagolás: Mint sedativum: naponta 3×1 tabletta; mint hypnoticum: 2—3 tabletta lefekvés előtt. *Gyermekadagok:* 2—12 hónapos korig 0,25—0,50 g/die, 2—3 adagra elosztva; 1—6 éves korig 0,5—1 g/die, 2—3 adagra elosztva; 7—14 éves korig 1—2 g/die, 2—3 adagra elosztva.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — 5 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 20 tabl. 16,— Ft.

ALGOPYRIN Ch. VI.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2, ill. 5 ml) 1, ill. 2,5 g novamidazoph.-ot,
1 tabl. 0,5 g novamidazoph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Mindennemű fájdalmas állapot, még a leghevesebb fájdalmak is (epe- és vesekólika). Izületi és izom-rheumatismus, lumbago és ischias. Neuralgiák, hűléses betegségek.

Adagolás: 3—4-szer naponta 1—2 tabletta vagy 1—2-szer naponta 0,5—1—2 ml i. musc. Heves fájdalmak esetén 5 ml i. musc., görcsös fájdalmak esetén (kőkólika) 5 ml i. ven.

Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 0,04—0,03 g/kg/die per os, illetve 0,01 g/kg i. musc. 1—2-szer naponta.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 24,20 Ft, b. 100×2 ml amp. 484,— Ft,
b. 5×5 ml amp. 42,80 Ft,
b. 10 tabl. 13,10 Ft, 100 tabl. 114,40 Ft.

ALJODAN Ch. XVI.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g jodaethyl. allophanic.-ot (J = 49%) tartalmaz.

Javallatok: Arteriosclerosis, encephalitis, bronchitis, scrophulosis, stenocardia, ólommérgezés, alcoholismus, lues III. és IV. stad., hypofunctiós struma.

Adagolás: Naponta 3—4×1—2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak az egyéb jódkészítményt rosszul tűrő beteg részére rendelhető.

Csomagolás: b. 20 tabl. 10,50 Ft.

ALSOL E.Gy.T. XLIV.

kenőcs

Összetétel: 1 tubus (18 g) 0,27 g alum. acet. tart. bor. sol. (Al_2O_3 = 23,4%, H_3BO_3 = 1%)-ot tartalmaz, 18 g vazelin típusú kenőcsben. 1 tubus (45 g) 2,5-szeres hatóanyag-mennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Enyhén antiseptikus, adstringens hűsítő kenőcs.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (18 g) 5,80 Ft, 1 tubus (45 g) 8,50 Ft.

ALUMINIUM HYDROXYDATUM E.Gy.T. XXI.

tabl., por

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g alum. hydr.-ot, 1 doboz 100 g alum. hydr.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hyperaciditas, pyrosis, ulcus ventriculi et duodeni.

Adagolás: Étkezés előtt és után a porból 1 késhegynyit, a tablettából 2—2 darabot jól szétrágva lenyelni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 50 tabl. 9,— Ft,
b. 100 g por 9,90 Ft.

AMBOSEX K.Gy. XXXIV.

sublingualis tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,004 mg aethyniloestradiol., 4 mg methyltestosteron.-ot tartalmaz.

Javallatok: Climaxos zavarok, climaxos arthritis, frigiditas, hypophysaer cachexia, climaxos hólyag-incontinentia, involutiós melancholia, climaxos ostitis deformans, osteoporosis senilis, otosclerosis, Raynaud-kór, ulcus ventriculi et duodeni.

Adagolás: Naponta 2—4 sublingualis tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 6,20 Ft.

AMBOSEX prolongatum K.Gy. XXXIV.

olajos inj.

Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 1 mg oestradiol benz., 4 mg oestradiol phenylprop., 20 mg testosteron. prop., 40 mg testosteron. phenylprop., 40 mg testosteron. isocapron.-ot tartalmaz.

Javallatok: Climaxos kiesési tünetek, férfi vagy női climax-szal kapcsolatos osteoporosis, arthritis, incontinentia, spondylosis, involutiós melancholia, ostitis deformans, osteoporosis senilis. Perifériás keringési zavarok, Raynaud-kór, angina pectoris, ulcus ventriculi et duodeni, Cushing-kór, hypophysaer cachexia és panhypopituitarismus, Chiari—Frommel-syndroma.

Adagolás: Általában havonta 1 ml (1 ampulla) szükséges. Osteoporosisban havonta 2 ml egyszerre vagy két adagban. Az injekció kizárólag intramuscularisan, mélyen a farizomba adható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1×1 ml amp. 18,70 Ft.

AMIDAZOPHENUM Ch. VI.
tabl. 0,1 g és 0,3 g

Összetétel: 1 tabl. 0,10 g, ill. 0,30 g amidazoph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Antipyreticum és analgeticum.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: febris rheumatica.

Adagolás: Naponta 3×1 tabl.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig *a)* lázas állapot (hyperpyrexia) szüntetésére — néhány órán át, illetve a kellő hatás eléréséig, de semmiképpen sem folyamatosan — 39 °C felett óránként, 38—39 °C között kétóránként 0,1 g; *b)* tartós kezelésre, lázas betegségben 5-ször 0,1 g;
1—14 éves korig *a)* láz megszüntetésére: mint fent, de 0,1 g helyett 0,15 g; *b)* tartós kezelésre: mint a 2—12 hónapos korúaknál, de 0,10 helyett 0,15 g; *c)* rheumás lázban: 0,07—0,05 g/kg/die, 5—6 részre elosztva, hetekig.
Mellékhatásként hányás, cyanosis, görcsroham jelentkezhet (az utóbbi kettő túladagolási tünet). Tartós adás esetén a fehérvérsejtszám hetenként ellenőrizendő (agranulocytosis, angina agranulocytotica).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 0,1 g 2,80 Ft, b. 100 tabl. 0,1 g 28,— Ft;
b. 10 tabl. 0,3 g 5,50 Ft, 100 tabl. 0,3 g 55,— Ft.

AMMONIA párna B. XIII.

Összetétel: 1 pólyázott amp. 1 ml ammon. sol. 10%-ot tartalmaz.

Javallat: Ájulás esetén elsősegélynyújtásra.

Adagolás: Szükség esetén 1 amp. tartalmát belélegeztetni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 3 db 3,— Ft.

AMMONIUM CHLORATUM B. XXV.
bélben oldódó drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,5 g ammon. chlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: A Hg-vegyületek vizelethajtó hatásának fokozására. A vizelet savanyítására (spasmophilia, tetania stb.).

Adagolás: Naponta 6×1—4 drazsé.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 drazsé 8,70 Ft.

AMYLNITRIT párna E.Gy.T. XVI.
kizárólag belélegzésre

Összetétel: 1 (pólyázott) amp. 0,045 g amyl. nitros., 0,455 g paraff. liqu.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, spastikus migraine, heveny agyi anaemia, kokainmérgezés esetén elsősegélynyújtásra.

Adagolás: A párnába csomagolt ampullát összetörni és a gőzt belélegezni. Szükség esetén ½—1 óra múlva ismételhető.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Hypertonia esetén collapsust okozhat!

Csomagolás: 5 db 9,10 Ft.

ANASTHIM K.Gy. XVII.

inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,6 NE hypophys. p. post. extr., 0,5 mg adrenal.-ot tartalmaz.

Javallat: Asthma bronchiale.

Adagolás: Roham esetén ½—1 ml s. cut. vagy i. musc. Legfeljebb naponta 3-szor.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml. amp. 20,70 Ft, b. 100×1 ml amp. 414,— Ft.

ANDAXIN E.Gy.T. IV.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,2 g meprobamatumot tartalmaz.

Javallatok: Psychoneurotikus félelmi állapot, psychopathia, konfliktus-reakciók, neurasthenia, neurosis, endogen depressio, vegetatív és psychotikus dystonia, electroshock előtti félelemérzés. — Izomrelaxansként rheumatismusban, pyramidalis spasmusban.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: neuropathia.

Adagolás: 1—3-szor naponta 1—2 tabletta. Altató adagként lefekvés előtt 2—3 tabletta.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig 20 mg/kg/dosi 3—5-ször naponta; 1—14 éves korig 10 mg/kg/dosi 3—5-ször naponta.

Mellékhatás: Álmosság, fáradtságérzés, izom-tonus-csökkenés.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: b. 20 tabl. 15,— Ft; b. 200 tabl. 150,— Ft.

ANDRORAL K.Gy. XXXIV.

sublingualis tabl.

Összetétel: 1 tabl. 10 mg methyltestosteron.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypogenitalismus masculinus, eunuchoidismus, cryptorchismus, castratio utáni kiesési tünetek, késői pubertas, férfi climacterium és kísérő psychés tünetek, potentia-zavarok egyes alakjai. Prostata-hypertrophia. — Mastodynia, krónikus mastopathia, endometriosis, pubertas praecox, climax-zavarok, carcinoma mammae. — Egyéb, nem hormonális eredetű megbetegedések: angina pectoris, peripheriás keringési zavarok, ulcus ventriculi et duodeni, osteoporosis, csökkent callus-képződés, acne vulgaris, pruritus senilis.

Ellenjavallatok: Prostata-carcinoma abszolút ellenjavallatot képez.

Adagolás: Androgen-terápia céljaira általában naponta 1—2 tabletta, prostata-hypertrophiában napi 1—3 tabletta. Mamma-carcinomában napi 3—5 tabletta 8—10 hétig a műtét után, majd az adagolás napi 1—2 tablettára csökkenthető. Egyéb javallatokban a szükséglet szerint individuálisan napi 1—2 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Emlőrákból kiindult áttétes csontrák esetében a megyei onkológus (Budapesten: Onkológiai Gondozók főorvosai) által kiállított vényen, vagy az általuk engedélyezett, aláírásukkal, bélyegzőlenyomatukkal ellátott szakorvosi, körzeti

stb. orvosi vényen térítésmentesen rendelhető. Minden más megbetegedés esetében térítésköteles, illetőleg csakis a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás 6. §-ában említett esetekben rendelhető térítésmentesen. — Aphrodisiacumként a társadalombiztosítás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 10,10 Ft.

ANTAETHYL Ch. LII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g disulfiram.-ot tartalmaz.

Javallat: Alcoholismus.

Adagolás: Egyéni, csak gyógyintézet javaslata alapján.

Megjegyzés: ✠ Gyógyintézeti ápolás alatt nem álló betegek részére csak abban az esetben rendelhető, ha az Antaethyl-elvonókúrát elme-, illetőleg ideggyógyintézetben kezdték meg. Továbbá, ha a gyógyintézet a gyógyintézeti ápolás befejezése után a kórházi zárójelentésben az elvonókúra folytatását javasolta, és vállalta, hogy a gyógyintézeten kívüli elvonókúra tartama alatt a beteget rendszeresen ellenőrzi. A gyógyintézet az Antaethyl-elvonókúra továbbfolytatásának javasolása esetében köteles a kórházi zárójelentésben egyben a rendelendő Antaethyl mennyiségére és adagolására vonatkozó javaslatát is feltüntetni. Az állami egészségügyi szolgálat orvosai az Antaethyl rendelésénél a gyógyintézet javaslata szerint kötelesek eljárni. A gyógyintézetek a betegnek a gyógyintézeten kívüli elvonókúra tartama alatti ellenőrzésébe a területileg illetékes ideggondozót, az alkoholelvonó szakrendelést bevonhatják.
Társadalombiztosítás terhére csak kivételesen, az esetben rendelhető, ha az elvonókúrát gyógyintézeti osztályon kezdték el és a kúrának rendszeres ellenőrzését gyógyintézet vállalta. A vényre az orvos köteles rávezetni: „A szükséges ellenőrzést gyógyintézet vállalta."

Csomagolás: 20 tabl. 24,10 Ft, 250 tabl. 266,20 Ft.

ANTINEURALGICA E.Gy.T. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g coffein., 0,20 g amidazoph., 0,30 g phenacetin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalmak, neuralgia, láz.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1—2 tabletta.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 7,50 Ft.

APARKAZIN E.Gy.T. XI.
drazsé, inj.

Összetétel: 1 drazsé 50 mg, ill. 250 mg N-(2'-diaethylaminoaethyl)-phenothiazin. hydrochlor.-ot;
1 inj. (5 ml) 250 mg N-(2'diaethylaminoaethyl)-phenothiazin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Parkinson-kór tünetkomplexuma (egyaránt hatásos mind a postencephalitises, mind a senilis formákban).

Adagolás: A per os adagolást egyénileg kell beállítani, szigorúan ragaszkodva ahhoz, hogy a kezelést kis adagokkal kezdjük és lassan emeljük az optimális határig. Eleinte — az esetek súlyossága szerint — napi 100—500 mg-os adagokat adjunk 4—5 részre osztva, melyek közül a reggeli adag a legerősebb. Később a napi adagot 4—5 naponként 100—150 mg-mal emelhetjük a könnyű, 250—400 mg-mal a súlyos esetekben. A legmagasabb napi adag, a kórkép súlyossága szerint, 500—1500 mg között lehet. — Parenteralis alkalmazása csak ritkán szükséges. Gyors hatás elérésére ½—1 ampullát injiciálunk i. musc. vagy lassan i. ven. (pl. torticollis, oculogyriás roham esetén).

Melléktünetek: Főként az adagok túl gyors emelésekor somnolentia vagy részegséghez hasonló tünetek, továbbá: ataxia, paraesthesia, szájszárazság, hányinger. Hosszan tartó kezelésnél orvosi felügyelet, időnként vérkép- és vizeletvizsgálat szükséges,

mert olykor agranulocytosist és vesekárosodást észleltek.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 50×50 mg drazsé 14,90 Ft, 20×250 mg drazsé 22,60 Ft,
5×5 ml amp. 14,60 Ft.

AQUA DESTILLATA B. LIV.
pro inj.

Javallat: Oldószer.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×5 ml amp. 15,— Ft, b. 100×5 ml amp. 150,— Ft,
b. 10×10 ml amp. 19,20 Ft, 100×10 ml amp. 192,— Ft.

ARSOTONIN Ch. XXX.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,05 g natr. methylarson.-ot 1 tabl. 3 mg calc. methylarson.-ot tartalmaz.

Javallatok: Különféle anaemiák, leukaemia, reconvalescentia, neurasthenia, Basedow-kór, malaria, tbc, psoriasis, lichen ruber, ekzema chron.

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 amp. s. cut.; 1—9 tabl. emelkedő adagolásban vagy hosszabb időn át naponta 3-szor 1—2 tabl.
Gyermekadagok naponta: 10—15 éves: 1—6 tabl., 5—10 éves: ½—4 tabl., 1—5 éves: ¼—3 tabl. emelkedő adagolásban, a készítményhez mellékelt utasítás szerint.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20×1 ml amp. 19,70 Ft, 100×1 ml amp. 98,50 Ft,
100 tabl. 4,50 Ft.

ARTIN B. XXIV.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 16 mg aloin., 32 mg phenolphth., 4 mg extr. strychni sicc., 2,4 mg extr. bellad. sicc., 4 mg ipecac. rad.-ot tartalmaz.

Javallatok: akut és krónikus obstipatio.

Adagolás: Felnőtteknek este lefekvés előtt 1—3 drazsé.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 drazsé 3,20 Ft.

ASAROPECT K.Gy. XVII.
cseppek

Összetétel: 1 üveg 5 mg aethylmorph. hydrochlor., 25 mg chinin. hydrochlor., 25 mg *dl*-ephedrin., 50 mg methyl. p.-oxybenz., 0,15 ml acid. hydrochlor. concentratiss., decoct. asari. europ. herb. (0,5 : 25) ad 25 ml-t tartalmaz.

Javallatok: Bronchitis catarrhalis acuta et chronica, bronchitis chronica spastica és bronchiectasia eseteiben köptetőként; adjuváns kezelésre asthma bronchialéban a közismert egyéb antiasthmaticumok használata mellett.

Adagolás: Napi 3×5 csepptől 3×10 cseppig emelkedő adagban. Használat előtt felrázandó.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. — 25 ml (1 üveg) orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 üveg 7,80 Ft.

ASTHMAMID E.Gy.T. XVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,00035 g atrop. sulf., 0,10 g theophyllin., 0,20 g amidazoph., 0,04 g papaver. hydrochlor., 0,04 g phenobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Asthma bronchiale, migraine, stenocardia.

Adagolás: Naponta 1—2-szer 1—2 tabletta.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 34,— Ft.

ASZTMA ELLENI CIGARETTA B. XVII.

Összetétel: 1 cigaretta 0,15 g bellad. fol., 0,175 g hyosc. fol., 0,15 g stramon. fol.-ot tartalmaz.

Javallat: Asthma bronchiale.

Adagolás: Roham kezdetén 1 cigarettát elszívni.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 20 db orvosi vény nélkül is kiadható. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 20 db 10,60 Ft.

ATHENSTAEDT B. XIX.
oldat

Összetétel: 1 üveg (250 g oldat) 5 g ferr. oxyd. sacch.-ot ($Fe''' = 0{,}5$ g) tartalmaz 250 g szeszes-vizes oldatban. 1 üveg (500 g) 2-szeres anyagmennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Chlorosis, másodlagos anaemia, lábadozás.

Adagolás: Naponta 3-szor 1 evőkanál. Gyermekeknek 3-szor 1 gyermekkanál.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak 12 éven aluli gyermekek részére rendelhető. Társadalombiztosítás terhére ennél idősebbeknek nem rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (500 g) 27,10 Ft.

ATHENSTAEDT arzénes B. XIX.
oldat

Összetétel: 1 üveg (250 g) 0,01 g acid. arsenicos., 5 g ferr. oxyd sacch.-ot ($Fe''' = 0{,}5$ g) tartalmaz szeszes-vizes oldatban. 1 üveg (500 g) 2-szeres anyagmennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Chlorosis, másodlagos anaemia, reconvalescentia.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 1 evőkanállal, gyermekeknek naponta 2—3-szor 1 gyermekkanállal étkezés után. *6 évnél fiatalabb gyermekeknek nem adható.*

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak 12 aluli gyermekek részére rendelhető. Társadalombiztosítás terhére ennél idősebbeknek nem rendelhető. — 250 g orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható.

Csomagolás: 1 üveg (250 g) 13,90 Ft, 1 üveg (500 g) 27,10 Ft.

ATRIPHOS K.Gy. XVI.
inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 20 mg acid. adenosintriphosph.-ot (70%-os nátriumsó alakjában) tartalmaz.

Javallatok: A koszorúerek és a környéki véredények görcsei, angina pectoris, coronaria-thrombosis, infarctusok, hypertonia, paroxismalis tachycardia, claudicatio intermittens, hemicrania, Raynaud-féle betegség, vérkeringési zavarok nikotinártalom következtében.

Adagolás: Naponta 1—2 amp. i. musc. Kúraszerű adagolás: 30 napon át naponként 1 ampulla. Paroxysmalis tachycardiás roham alatt 1—2 amp. i. ven. *óvatosan!* (asystolia).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 20×2 ml amp. 86,60 Ft, b. 100×2 ml amp. 433,— Ft.

ATROPINUM SULFURICUM

E.Gy.T.—B. X.
inj. 0,05% és 0,1%, tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5, ill. 1,0 mg atrop. sulf.-ot, 1 tabl. 0,33 mg atrop. sulf.-ot tartalmaz.

Javallatok: Simaizomgörcsök, hyperaciditas, kóros izzadás, asthma bronchiale, mérgezések (morfin, pilokarpin, légyölő galóca) esetében.

Adagolás: Naponta 1 amp. s. cut. vagy 3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 0,05% 10,50 Ft, b. 50×1 ml amp. 0,05% 52,50 Ft.
b. 10×1 ml amp. 0,1% 11,80 Ft, b. 50×1 ml amp. 0,1% 59,— Ft.
b. 50 tabl. 3,80 Ft, b. 500 tabl. 38,— Ft.

AZOPHENUM COFFEINUM CITRICUM

K.Gy. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g azoph. coff. citr.-ot tartalmaz.

Javallatok: Migraine, fejfájás.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 tabl. 12,— Ft, b. 100 tabl. 60,— Ft.

AZULENOL B. XXXVIII.

kenőcs

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,03 g azulenumot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Sarjadzás elősegítése, portio-erosio, ulcus cruris, égési és fagyási sebek, decubitusok.

Alkalmazás: Vékonyan a beteg testfelületre kenni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,10 Ft.

BALTIX E.Gy.T. XVII.

cseppek

Összetétel: 1 üveg 0,5 g 1-(o-chlorphenyl)-1-phenyl-3-dimethylaminopropanol-(1) hydrochlor.-ot tartalmaz 10 ml propilénglikol tartalmú szeszes-vizes oldatban.

Javallatok: Akut és krónikus köhögés. Krónikus bronchitisek okozta pharyngealis köhögés, tonsillectomia utáni köhögési inger. Pleuritis, tüdő-tumor, silicosis okozta köhögés. Specifikus tüdőfolyamatok esetében is, főképp, ha a betegnél a kodeinszármazékok megszokása már fennáll. Bronchoscopia, bronchographia, tüdőtöltés előtt prophylactikusan.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3—4-szer 20—30 csepp, kevés vízzel vagy gyümölcslével. Gyermekeknek naponta 3-szor 5—15 csepp, csecsemőknek 3-szor 5 csepp.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 8,40 Ft.

BARBAMID Ch. VI.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,13 g barbitalnatrium, 0,284 g amidazoph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalomcsillapítás. Migraine, neuralgia, dysmenorrhoea, rheumatismus, arthritis.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 5 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 10 tabl. 9,10 Ft, b. 100 tabl. 91,— Ft.

BARBITURALUM K.Gy. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g barbital.-ot tartalmaz.

Javallat: Hypnoticum.

Adagolás: 1—2 tabl. lefekvés előtt.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 12,80 Ft, 100 tabl. 128,— Ft.

BEACILLIN B. — E.Gy.T. XLVII.
tabl., szirup, szuszpenziós inj. 600 000 NE és 1 200 000 NE

Összetétel: 1 tabl. 200 000 NE benzath. benzylpenicillin.-ot,
1 üveg szirup (60 ml) 2 400 000 NE benzath. benzylpenicillin.-ot,
1 üveg inj. 600 000 NE, ill. 1 200 000 NE benzath. benzylpenicillin.-ot tartalmaz.
1 oldószerampulla 3 ml, ill. 5 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallatok: az összes penicillin-érzékeny fertőzések megelőzése vagy kezelése, különösen azokban az esetekben, amelyekben hosszantartó penicillin-adagolás szükséges.
Megelőzésre: Streptococcus-fertőzés létrejöttének, illetve recidiválásának megakadályozására, elsősorban reumás láz és nephritis esetében. Reumás lázban nemcsak az aktív szakban, hanem ennek lezajlása után is szükséges adagolása, továbbá streptococcus-fertőzés megelőzésére az utolsó rohamot követő hosszabb időn át. A kezelés során streptococcus-mentessé lett skarlátos betegek újra fertőzésének megakadályozására, különösen intézetekben. Tonsillitis tömegesebb felléptekor a betegség terjedésének meggátlására zárt közösségekben. Tonsillectomia után másodlagos fertőzések megakadályozására. A felső légutak streptococcusoktól való mentesítése céljából (pozitív bakteriológiai lelet esetén) olyankor, amikor ez a baktériumhordozó vagy annak környezete szempontjából kívánatos.

Mindazon beavatkozásban, melyben penicillin megelőző adagolása szükséges.
Kezelésre: Minden olyan enyhe és középsúlyos fertőzés leküzdésére, amelyet penicillin-érzékeny kórokozók, elsősorban streptococcus, gonococcus idéznek elő (angina, ill. tonsillitis, erysipelas, scarlatina, pneumonia, gonorrhoea, syphilis, továbbá aktinomycosis, mély pyodermiák, otitis media stb.).

Ellenjavallatok: A beteg penicillin-allergiája és a kórokozók penicillin-rezisztenciája. Túlérzékenységre utaló jelek esetében nem szabad alkalmazni.

Adagolás: *Megelőzésre:* Tartós megelőzés céljára gyermekeknek általában napi 1 tabletta vagy 1 kávéskanál szirup (200 000 NE).
Felnőtteknek általában napi 2 tabletta vagy 2 kávéskanál szirup (400 000 NE) a reggeli étkezés után.
Streptococcus-fertőzés közvetlen veszélye esetén kétszer ennyi az adag (a második adag a déli étkezés után).
Streptococcus-hordozás megszüntetésére napi 3—6 tabletta, vagy 3—6 kávéskanál szirup 10 napon át, egész napra elosztva.
ACTH-, Cortison- stb. kezelés alatt általában napi 1—2 tabletta vagy 1—2 kávéskanál szirup. Műtéti beavatkozások előtt és után napi 3—6 tabletta vagy 3—6 kávéskanál szirup.
Kezelésre: A beteg kora, ill. testsúlya és a betegség súlyossága szerint általában napi 3—6 tabletta vagy 3—6 kávéskanál szirup, egész napra elosztva az étkezések után.
Gyermek terápiás adagja 6600—7000 NE/testsúly-kg-nak felel meg 6—8 órás időközökben történő adagolás mellett. Ha a beteg állapota súlyos, a kezelést penicillin-befecskendezésekkel kezdjük, majd fokozatosan per os kezelésre térhetünk át. A tablettákat, ill. szirupot a láz megszűnése, ill. a tünetek visszafejlődése után is, még legalább 2—3 napon át tovább kell adnunk.
Az inj.-adagok nagyságát és számát a beteg állapota szabja meg. Általában 600 000 NE-t 5 naponként, 1 200 000 NE-t pedig legalább 2 hetenként kell adni. Syphilis kezelésében kezdeti 200 000 NE után napi 600 000 NE, vagy 5—6 naponként 1 200 000 NE, kúránként 10 000 000 NE összmennyiségben. Car-

diovascularis syphilisben kezdeti 100 000 NE után naponta 200 000 NE 2—3 000 000 NE összmennyiségben. — Ha a beteg állapota súlyos, a kezelést vízben oldódó kristályos káliumpenicillin-befecskendezésekkel kezdjük, majd Beacillin-kezelésre térhetünk át. — Műtéti beavatkozások előtt és után 600 000 NE egyszeri befecskendezése elégendő. — Beacillin inj. alkalmazása előtt — minden esetben, tehát akkor is, amikor feltételezhető, hogy a kezelendő személy még semmilyen penicillin-terápiában nem részesült — az esetleges túlérzékenység megállapítására scarificatiós bőrpróbát kell végezni. Folyamatos Beacillin-kezelés esetén ez azonban csak a kezelés megkezdésekor szükséges. (A scarificatiós bőrpróba elvégzésére vonatkozó tájékoztatás a csomagoláshoz mellékelve van.)

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a tabl. és inj. szabadon rendelhető. A szirup csakis 12 éves életkoron alulinak rendelhető. — Lejárati idő: tabl., inj. 3 év, szirup 1 év.

Csomagolás: 12 tabl. 30,90 Ft, 250 tabl. 643,70 Ft; 60 ml szirup 37,40 Ft;
1 üveg à 600 000 NE + 1 amp. oldószer 16,50 Ft, 50 üveg à 600 000 NE + 50 amp. oldószer 718,— Ft.
1 üveg à 1 200 000 NE + 1 amp. oldószer 30,40 Ft, 50 üveg à 1 200 000 NE + 50 amp. oldószer 1400,— Ft.

BELLAFIT K.Gy. X.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,3 mg l-hyoscyamin. sulf.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hyperaciditas, ulcus ventriculi et duodeni, cholelithiasis, asthma bronchiale, gyomor- és bélgörcs, hólyag-tenesmus, dismenorrhoea, terhességi hányás, postencephalitises parkinsonismus, vegetatív idegrendszeri zavarok, éjjeli izzadás, nyálfolyás.

Adagolás: Naponta 2—3-szor 1 tabl.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 50 tabl. 8,50 Ft.

BELLETOVAL A. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 mg l-hyoscyamin. sulf., 50 mg butobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Paralysis agitans, extrapyramidalis mozgászavarok, migraine, dysmenorrhoea, hyperemesis.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1 tabl.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 7,60 Ft, 100 tabl. 28,70 Ft.

BELLOID K.Gy. II.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,1 mg l-hyoscyamin. sulf., 0,3 mg secal. corn. alkaloidae totales (ergotoxinban kifejezve), 30 mg butobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Vegetatív dystonia, hyperthyreosis, tachycardia, vasoneurosis, centralis vegetatív zavarok, angiospastikus diathesis, migraine, hyperhydrosis, asthma bronchiale.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé, kúraszerű adagolásban is.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 50 drazsé 23,40 Ft, b. 250 drazsé 117,— Ft.

BETACID K.Gy. XXI.
pasztilla

Összetétel: 1 paszt. 0,1 g pepsin., 0,4 g betain. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Achylia gastrica (anaemia perniciosában is), anaciditas, hypaciditas, gastrogen diarrhoea, rothadásos dyspepsia.

Adagolás: Felnőtteknek 1—2 tabl., gyermekeknek 1 tabl., csecsemőknek ½ tabl. vízben oldva étkezés közben vagy után.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak is olyan munkavállaló részére rendelhető, aki munkaköre-nek természete miatt folyékony gyógyszert nem vihet magával.

Csomagolás: 10 tabl. 10,— Ft.

BILAGIT Ch. XXII.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 60 mg natr. choleinic., 20 mg phenolphth., 80 mg hexameth.-tetr., 20 mg papaver. hydrochlor., 1 mg methylhomatrop. brom., 7,5 mg menthol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Cholelithiasis, cholecystitis, cholecystectomia utáni panaszok.

Adagolás: Naponta 2—3-szor 1—2 drazsé étkezés után.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 drazsé orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 30 drazsé 10,20 Ft, b. 250 drazsé 85,— Ft.

BILOCID K.Gy. XXII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g oxymethylnicotinamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Cholecystitis, cholangitis, hepatitis epidemica utáni cholepathiák, cholelithiasis, gastroduodenitis, enteritis acuta.

Adagolás: Lökés-therapia: 2—4 napig 3-szor 2 tabletta étkezés után, majd napi 4 tablettával folytatjuk a kezelést. Súlyos esetekben 2 óránként 1 tabletta.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg

gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer nem biztosítaná megfelelően.

Csomagolás: 20 tabl. 36,70 Ft, 100 tabl. 166,70 Ft.

BILOSPEKT E.Gy.T. LIII.
por

Összetétel: 1 üveg (4 g) 3 g acid. pheniodolic., 0,01 g dihydrocodein. bitart., 0,03 g papaver. bas.-ot tartalmaz.

Javallatok: Röntgenkontrasztanyag per os cholecystographiához.

Ellenjavallatok: A máj funkciós zavarai: hepatitis, icterus stb. Urobilinogenuria, májfunkciós próbák gyenge pozitivitása.

Adagolás: Megfelelő diétás előkészítés után a röntgenfelvételt megelőző napon este az üveg tartalmát apránként vízzel vagy teával bevenni, majd egy órát jobb oldalon feküdni. A másnapi felvételig enni, inni, gyógyszert fogyasztani tilos. Ha az epe összehúzódóképességét vizsgáljuk, akkor kevés csokoládé, rántotta vagy étolaj fogyasztása után 30 perccel újabb felvételt készítünk. Az adag 70 kg-os emberre vonatkozik, ettől eltérő súlyú betegnek az adag a testsúly arányában változtatandó.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (4 g) 9,50 Ft.

BISECURIN K.Gy. XXVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabletta 1 mg aethynodiolum diaceticum.-ot, 0,05 mg aethyniloestradiolum.-ot tartalmaz.

Javallatok: Kizárólag fogamzásgátlás céljából alkalmazható.

Ellenjavallatok: Hepatitis utáni állapot, májműködési zavarok, cholecystitis, thrombosis-készség, súlyos organikus szívbetegségek, chronikus colitis, diabetes mellitus. Az endocrin mirigyek egyéb betegségei. Malignus tumorok, elsősorban emlő-carcinoma, továbbá lactatio és intolerantia.

Adagolás: A Bisecurin tabletta szedését a menstruatio első napjától számított 5. napon kell elkezdeni és 21 napon át napi 1 tablettát kell bevenni minden nap azonos időpontban, lehetőleg este. Ezt követően 7 nap szünetet kell tartani. Ezalatt szabályos reakciókészség esetén a kezelési szünet 2—5. napján menstruatiószerű vérzés mutatkozik. A hétnapos tablettaszedési szünet eltelte után a következő hét azonos napján ismét el kell kezdeni a Bisecurin tabletta szedését — tekintet nélkül arra, hogy a vérzés tart-e még — és ismét 21 napon át kell szedni. Az egyes kúrák kezdete tehát mindig a hét azonos napjára esik. — Amennyiben a 7 napos kezelési szünet végéig sem jelentkezne vérzés, úgy a kezelőorvosnak kell eldöntenie, hogy újabb tablettaszedési időszak megkezdhető-e.
Ez az alkalmazási mód folytonosan ismételendő. A fogamzásgátló hatás rendszeres szedés esetén az egyhetes tablettaszedési szünetre is kiterjed. Ha a tabletta bevétele egy napon elmarad, ezt a lehető leghamarabb pótolni kell és a következő tablettát a szokott időpontban be kell venni. 2 tabletta bevétele között 36 óránál hosszabb idő ne teljen el, különben az ovulatio-gátló hatás folyamatossága nem biztosított. Az ovulatio-gátló hatás kifejlődéséhez kb. 1 hétre van szükség. A kúra első hetében tehát a fogamzásgátlásra biztonsággal számítani nem lehet.

Mellékhatások: Fejfájás, hányinger, mellfeszülés, testsúlynövekedés, bélpanaszok a kúra kezdetén előfordulhatnak s a későbbi cyclusokban többnyire megszűnnek. Varicositasban, epilepsiában, hypertoniában, depressióval járó psychiatriai kórképekben a készítmény alkalmazása körültekintést igényel.

Megjegyzés: ✠ Rendelhetőségét külön utasítás szabályozza (lásd 613. oldal).

Csomagolás: 21 tabl. 24,— Ft.

BISPAN Ch. X.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg isopropamidum jodat., 60 mg drotaverinum hydrochlor. (No-Spa)-ot tartalmaz.

Javallatok: A gyomor—bél huzam motoros és secretiós funkciójának zavarai, gastralgiák, akut és krónikus hyperacid gastritis, pylorospasmus, ulcus ventriculi és duodeni, colitis, meteorismus, cholecystopathia, cholangitis, cholecystitis, az ureter és húgyhólyag görcse, a méh simaizomzatának görcsével járó állapotok, dysmenorrhoea stb.

Ellenjavallatok: Glaucoma és prostata-hypertrophia.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek akut esetben szükség szerint 1—2 tabletta, krónikus esetben kúraszerűen 3—6 héten át, naponta 3-szor 1 tabletta, amely adag — a klinikai állapot javulásával arányosan — fenntartó adagra csökkenthető. Kúraszerű adagolás esetében a hatékonyság és tűrőképesség figyelembevételével egyéni adagolásra törekedjünk. Az étrend-, nyugalmi stb. előírások betartandók.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 tabl. orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 tabl. 9,60 Ft, 200 tabl. 96,— Ft.

BIUNG B. XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g ammon. bitumensulfon., 2 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz, vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Gyulladásos beszűrődéssel és viszketéssel járó bőrelváltozások, heveny és idült ekzema, pernio, congelatio, decubitus.

Adagolás: A beteg testfelületre kenni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 11,30 Ft.

BIVELIN K.Gy. XVI.
inj.

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,3 mg dihydroergotoxin. aethansulfon., 200 mg p-aminobenzoyl-N-diaethyl-leucinol methansulfonic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Thromboemboliák megelőzése és terápiája. Akut thrombophlebitis, phlebotrombosis, tüdő-embolia, arteriás embolia.

Adagolás: Thrombosis veszélyében prophylactikusan, továbbá felületes végtag-thrombosisban és phlebitisben 6—8 napig napi 2 ampulla adható intramuscularisan. Kifejlődött thrombosisban nem teszi nélkülözhetővé az anticoagulansok alkalmazását. Prophylactikusan azonban önállóan is alkalmazható. Súlyos, mély thrombosisban, tüdő-emboliában, anticoagulansok mellett 4 napig napi 2×2 amp. cseppinfúzió 400 ml fiziológiás konyhasó oldatban, vagy 5%-os dextrózban (az infúzió tartama 90—120 perc), továbbiakban a beteg állapotától függően napi egy infúzió, majd naponta 2×1, később 1×1 ampulla Bivelin intramuscularisan. A Bivelin inj. kizárólag muscularisan, vagy lassú cseppinfúzióban adható.
Venás adása ellenjavallt!

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×5 ml 71,40 Ft, 50×5 ml 701,90 Ft.

BOLUS ADSTRINGENS E.Gy.T. XL.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,15 g albumen tannic., 0,15 g bismuth. subgallic., 0,3 g bolus alba-t tartalmaz.

Javallatok: Acut fertőzéses bélmegbetegedések, mérgezéses gyomor és bélbántalmak, krónikus enterocolitis (rothadásos és erjedéses dyspepsia, gastrogen diarrhoea).

Adagolás: Naponta 3-szor 1—3 tabletta.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 10,60 Ft.

BOLUS LAXANS E.Gy.T. XXIV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g extract. rhei siccum, 0,05 g sulfur praecipitat., 0,1 g sennae folii pulvis, 0,4 g bolus alba-t tartalmaz.

Javallatok: Obstipatio, flatulentia, meteorismus, bélerjedés, intestinalis autointoxicatio.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—3 tabletta, étkezés után, vagy esténként 1—4 tabletta.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 40 tabl. 5,20 Ft, 100 tabl. 13 Ft.

BORAGIN Ch. XXVII.
hüvelytabletta

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g acetarsolum, 0,03 g acid. boric.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fluor albus, különösen Trichomonas-colpitis, valamint a hüvelyfal működési gyengeségén alapuló minden egyéb fluor. Hüvelyi műtétek előkészítésére.

Adagolás: Kezdetben naponta 1—2 tabl., mélyen a hüvelybe vezetve. Abban az esetben, ha a folyás napokon belül nem csökkenne, naponta 2, esetleg 3 tabletta is behelyezhető a hüvelybe. A kezelést követő reggel ülőfürdő; hüvelyöblítés hetenként egyszer. Ha secretiós rendellenesség miatt a tabletták nem esnek szét, akkor célszerű azokat behelyezés előtt vízbe mártani.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak Trichomonas okozta fluor esetében rendelhető.

Csomagolás: 15 tabl. 18,— Ft.

BÓR-CINK B. XLV.
szemkenőcs

Összetétel: 1 tubus (5 g) 0,25 g acid. bor., 0,25 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Blepharitis ulcerosa, ulcus corneae. Fertőtlenítő, adstringens, secretiót csökkentő szemkenőcs.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 3,— Ft.

BÓRSAVAS SÁRGA VAZELIN B. XLIV.

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g acid. bor., 19 g vasel. flav.-ot tartalmaz.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft.

BUCARBAN Ch. XXXV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g N_1-sulfanylil-N_2-n-butylcarbamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Diabetes mellitus per os terápiája.

Adagolás: Kizárólag gyógyintézeti vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen történt beállítás után és csak állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. A kezelést általában lökéssel kezdjük meg, a következő adagolás szerint: első nap 5 tabl., második nap 4 tabl., harmadik és negyedik nap 3 tabl., ötödik nap 2 tabl., hatodik nap 1 tabl. Ezután (esetleg 1—2 heti szünet után) naponta 1—2 tabl. fenntartó adagot adunk. A tablettákat kevés vízzel, az étkezéssel kapcsolatosan, egyesével arányosan elosztva vétetjük be. A beállítás idején gyógyintézetben fekvő betegen naponta kétszer, ambuláns betegen egyszer vértükörszint-meghatározást végzünk, valamint a 24 órás vizeletből megállapítjuk a cukorürítés mennyiségét. A kezelés alatt a diétás előírásokat be kell tartani.

Megjegyzés: ✠ Rendelését utasítás szabályozza, l. 583. oldal.

Csomagolás: 20 tabl. 27,10 Ft, 250 tabl. 293,80 Ft.

BUPATOL K.Gy. XVI.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 50 mg 1-(4'-hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-n-butylaminoaethan. sulfuric.-ot;
1 tabl. 25 mg 1-(4'-hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-n-butylaminoaethan. sulfuric.-ot tartalmaz.

Javallatok: Obliteratív verőérbetegségek: arteriosclerosis obliterans, angiopathia diabetica, thromboangiitis obliterans (Buerger-kór). Raynaud-kór, sclerodermia diffusa. Érbeidegzési zavaron alapuló kórképek: acrocyanosis, acroparaesthesia, digitus mortuus, dysbasia angioneurotica intermittens. Postthrombotikus venás és nyirokkeringési zavar, ulcus cruris, decubitus. Hypertoniával, arteriosclerosissal kapcsolatos fejfájás, szédülés.

Ellenjavallatok: Cardialis decompensatio, coronariasclerosis, stenocardiás panaszok, szív-infarctus utáni állapot, hypotonia.

Adagolás: Általában naponta 3×½-től 5×1 tablettáig kúraszerűen, több héten, ill. hónapon keresztül. Súlyos esetekben célszerű a kezelést intramuscularisan injekcióval elkezdeni (az első adag ½ ampulla, a második ¾ ampulla, majd naponta 1—2 ampulla) és később áttérni per os adagolásra. Nagy adagok alkalmazásakor átmeneti kipirulás, izgatottság, izzadás, remegés léphet fel, mely az adagok csökkentésekor megszűnik.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Lejárati idő: inj.: 2 év.

Csomagolás: 20 tabl. 12,60 Ft, 200 tabl. 110,— Ft. 5×1 ml amp. 12,80 Ft, 50×1 ml amp. 117,— Ft.

BUROFIX A. tabl. XLI.

Összetétel: 1 tabl. I. 2,2 g calc. acetic.-ot, 1 tabl. II. 3 g alum. sulf.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalmas duzzanatok, gyulladások, zúzódások, rándulások borogatására; bőrgyulladásokban a bőrfeszülés enyhítésére.

Adagolás: Külsőleg: az I. és II. jelzésű csomagolásból 1—1 tablettát külön-külön ¼—¼ liter vízben oldunk és összeöntjük borogatáshoz.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 4 tabl. I. + 4 tabl. II. 3,50 Ft.

CALCIMUSC K.Gy. inj. XXIX.

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,5 g calc. glucon.-ot tartalmaz.
1 amp. (10 ml) 2-szeres mennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Vérzés, gyulladásos, allergiás betegségek, asthma, urticaria, haemoptoe, szérumbetegség, adnexitis.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1 ampulla i. musc. vagy i. ven.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Ha az oldatban esetleg kiválás figyelhető meg, ez az ampulla meleg vízbe helyezésével néhány perc alatt oldódik. Kizárólag kristálytiszta oldat használható.

Csomagolás: b. 10×5 ml amp. 27,70 Ft, b. 50×5 ml amp. 138,50 Ft,
b. 10×10 ml amp. 34,80 Ft, 50×10 ml amp. 174,— Ft.

CALCIPHEDRIN E.Gy.T. tabl. XXIX.

Összetétel: 1 tabl. 0,285 g calc. phosph., 0,024 g ephedr. hydrochlor., 0,028 g calc. glucon.-ot tartalmaz.

Javallatok: Allergiás betegségek, gyulladások.

Adagolás: 3-szor naponta 1 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 6,50 Ft.

CALCIUM BROMATUM K.Gy. inj. 10 % III/XXIX.

Összetétel: 1 amp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. 1 g calc. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Általános nyugtató, spasmophilia, tetania.

Adagolás: Naponta 1—3×1 amp. Kizárólag i. ven. alkalmazható.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×5 ml amp. 22,20 Ft, b. 50×5 ml amp. 111,— Ft;
b. 5×10 ml amp. 14,50 Ft, b. 50×10 ml amp. 145,— Ft.

CALCIUM CHLORATUM B. inj. 10% XVIII/XXIX.

Összetétel: 1 amp. (5, ill. 10 ml) 0,5, ill. 1 g calc. chlor. cryst.-ot tartalmaz.

Javallat: Calcium-therapia.

Adagolás: 1 amp. i. ven.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×5 ml amp. 18,— Ft, b. 100×5 ml amp. 180,— Ft;
b. 10×10 ml amp. 21,20 Ft, b. 100×10 ml amp. 212,— Ft.

CALCIUM LACTICUM B. XXIX.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g calc. lact.-ot tartalmaz.

Javallatok: Urticaria, szénaláz, jodismus, haemorrhagiás diathesis, asthma, hypertonia. A szervezet mészveszteségének pótlására: szoptatás, osteoporosis; tbc.

Adagolás: Naponta 3—5-ször 1—4 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 50 tabl. 8,50 Ft.

CALDEA A. XXXI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 500 NE axerophth. (A-vitamin), 750 NE ergocalciferol. (D_2-vitamin), 400 mg calc. phosph., 200 mg calc. lactic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Rachitis, csontanyagcsere-zavar, terhes anyáknak a graviditas második felében, tetania, spasmophilia, csonttörés, exsudativ diathesis. Rachitis-prophylaxis.

Adagolás: Csecsemőknek 1—2, gyermekeknek 2—3, felnőtteknek 3—5 tabl. naponta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. — 20 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 tabl. 5,30 Ft.

CAPSODERMA B. XLIII.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,02 g capsaicin., 0,5 g camphor., 0,5 g aetherol. tereb.-t tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Arthrosis (osteoarthrosis), myalgia, spondylarthrosishoz csatlakozó neuralgiák, krónikus polyarthritis (rheumatoid arthritis), egyéb arthritisek és tendovaginitisek megnyugodott szakában.

Ellenjavallatok: Minden gyulladás aktív szaka. Capsoderma kenőcs által okozott ízületi folyamat aktiválódása. A bőr túlérzékenységi reakciója.

Alkalmazás: A fájdalmas területet langyos szappanos vízzel lemossuk, szárazra töröljük és a kenőccsel vékonyan bekenjük. A bekenés után a kezeket meleg vízben, szappannal alaposan meg kell mosni! A kezelést 3 napon át egyszer, majd naponta kétszer — reggel és este — végezzük, a panaszok megszűntéig. — A gyulladásos fellobbanás subacut szakában vizes párakötés alkalmazható.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 16,60 Ft.

CARBO ACTIVATUS E.Gy.T. XL.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g carbo activ.-ot tartalmaz.

Javallatok: Szén-therapia; bélhurut, typhus, vérhas és egyéb fertőző gyomor-, bélbetegségekben. Mérgezések esetén a még fel nem szívódott méreg abszorbeálására.

Adagolás: Szükség szerint 2—3-szor 2—6 tabl.-t kevés vízzel lenyelni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 25 tabl. 4,75 Ft, b. 250 tabl. 47,50 Ft.

CARDITOXIN K.Gy. XIV.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,1 mg digitoxin.-ot tartalmaz.

Javallatok: A keringési elégtelenség (decompensatio cordis) helyreállítása és a compensatio fenntartása. Vezetéses zavarok esetén nagy óvatosság szükséges.

Adagolás: A compensatio helyreállítására ajánlatos a kezelést nagyobb adaggal (napi 5—8 drazsé) elkez-

deni, amit a következő napokban csökkenteni helyes akkor is, ha semmi toxikus jelenség nem mutatkozik. A helyreállított compensatio fenntartására napi 1—1½ drazsé szükséges általában. Kumulációs tendenciája miatt krónikus fenntartó kezeléskor célszerű heti 1—2 szünnap beiktatása.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 40 drazsé 13,90 Ft, 250 drazsé 70,90 Ft.

CENTEDRIN K.Gy. tabl. VII.

Összetétel: 1 tabletta 0,01 g methylphenydat. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Gyors szellemi kifáradás, a koncentrációképesség hiánya, gyenge emlékezés, a koordinációs és asszociációs képesség elégtelensége, depressiós állapotok (climaxban vagy reconvalescentiában), föhn-panaszok. Az elmekórtanban a Centedrin figyelembe jön Reserpin-kúráknál, éspedig olyan esetekben, amikor a feszültség megoldódása mellett stimuláló hatás is kívánatos.

Ellenjavallatok: Magas vérnyomás, agyvérzésre való hajlam, angina pectoris, hyperthyreosis.

Adagolás: Az átlagos napi adag 2×1 tabletta, depressiós állapotokban esetleg 2×2 tabletta. A készítményt általában ne alkalmazzuk 16 óra után, hogy az alvászavarokat elkerüljük.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. A vényt két példányban („másolattal") kell kiállítani.

Csomagolás: 10 tabl. 8,20 Ft.

CHINIDINUM SULFURICUM A. tabl. XIV.

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g chinidin. sulf.-ot tartalmaz.

Javallatok: Extrasystolia, arrhythmia absoluta, pitvari remegés, pitvari lebegés, paroxismalis tachycardia.

Ellenjavallatok: Szív-block és súlyos decompensatio.

Adagolás: Naponta 1—4-szer 1 tabl. fokozatosan emelkedve; vagy este 1 tabl., következő reggel 2 tabl., majd öt napon át 3—4-szer 1 tabl. Nyolc nap után szünet. Ennél nagyobb adag alkalmazása csak gyógyintézetben ajánlatos.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 10,10 Ft.

CHININUM HYDROCHLORICUM K.Gy. tabl. 0,15 g VI.

Összetétel: 1 tabl. 0,15 g chinin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Malária, hűléses betegségek, influenza, pneumonia.

Ellenjavallatok: Status asthmaticus, graviditas.

Adagolás: Maláriában: naponta háromszor 0,15—0,3 g-ig egy héten át étkezés után. Lázcsillapításra: naponta háromszor 1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás tehére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×0,15 g tabl. 4,60 Ft, b. 100×0,15 g tabl. 46,— Ft.

CHINORTO Ch. szemcsepp és *forte* szemcsepp XLV.

Összetétel: 5 g szemcsepp 0,00083 g p-nitrophenylium diaethylphosph., 4,99917 g paraffin. liquid.-ot;
5 g *forte* szemcsepp 0,00167 g p-nitrophenylium diaethylphosph., 4,99833 g paraffin. liquid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Atropin és vele rokon vegyületek által okozott pupillatágulás megszüntetése. Elsődleges heveny glaucomás roham megszüntetése. Idült glaucoma kezelése, pilocarpinra érzéketlen esetekben is, továbbá pilocarpin-hurut esetén. Szürke-

hályog műtéti utókezelése. Összetérő kancsalság, továbbá rejtett összetérítéssel járó szemkifáradás kezelése. Szemhéjszéli tetvesség és a szem légyfertőzésének kezelése.

Adagolás: Becseppentéshez az alsó szemhéjat ujjunkkal lehúzzuk és az így megnyílt kötőhártyazsákba egyetlenegy cseppet ejtünk. A becseppentés után a szembogár összeszűkülése miatt néhány órára vagy egy napra sötét látás támadhat. Általában célszerű a cseppentést este, lefekvés előtt végezni. — Hosszú ideig tartó alkalmazása vagy túladagolása szem- és fejfájást, néha hányingert, hányást és hasmenést okozhat. Ilyenkor a cseppentést a tünetek megszűnéséig ki kell hagyni. A szemtünetek ellen 1%-os homatropin-, vagy 0,5%-os atropin-szemcsepp alkalmazható, naponta többször is, kivéve a glaucomás vagy glaucomára gyanús szemeket.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Szemészeti szakrendelések a biztosítottak ellátására nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 5 g szemcsepp 14,— Ft; 5 g *forte*-szemcsepp 21,90 Ft.

CHLORAETHYL Ch. (Eichhorn) I.

Összetétel: 1 palack 100 ml aeth. chlor.-ot tartalmaz.
Javallatok: Külsőleg. Inhalációs bódítás, fagyasztásos érzéstelenítés.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 100 ml 18,20 Ft.

CHLOROCID E.Gy.T. XLVII.
drazsé, szirup

Összetétel: 1 drazsé 250 mg chloramphenicol.-ot, 1 üveg szirup 46 ml-ben 2,5 g chloramphenicol. palmit.-ot (= 1,44 g chloramphenicol.) tartalmaz.

Javallatok: Mindazon megbetegedések, amelyek pathogenesisében, pathogen agensként, az egyéb therapiára nem vagy nem eléggé reagáló, chloramphenicolra azonban érzékeny kórokozók kizárólagos vagy jelentős szerepet játszanak: dysenteria, dyspepsia coli, pertussis, typhus abd., paratyphus A és B, anthrax, typhus exanthematicus, brucellosis, coli-cystitis, coli-pyelitis, coli-fertőzés okozta súlyos megbetegedések, bármilyen gennyes folyamat, ha a penicillin, szulfanilamid hatástalannak bizonyult, a gonorrhoea valamennyi kórformája, vírus-pneumonia, mononucleosis infectiosa, ornithosis, Q-láz.

Ellenjavallatok: Hosszantartó intermittáló kezelés, aetiologiailag tisztázatlan megbetegedések, vérképző rendszeri károsodások, májbetegségek, veseelégtelenség, valamint besugárzás utáni állapot, továbbá koraszülöttek, újszülöttek kezelése. *Prophylaxis céljára nem alkalmazható.* Vérképző rendszerre ható gyógyszerekkel (hydantion származékok, phenylbutazon, phenothiazin, cytostaticumok, sulfonamid stb.) együtt nem adagolható.

Adagolás: Általános adagja naponta testsúlykg-onként 40 mg (2—3 g), ezt a napi mennyiséget 4 egyenlő részre elosztva (6 óránként) kell beadni. Gyermekek részére 50 mg hatóanyagot tartalmazó Chlorocidetta drazsét, illetve Chlorocid szirupot adagoljunk a csomagoláshoz mellékelt adagolókanállal, amely 125 mg chloramphenicolumot tartalmaz. Pl. 10 kg-os gyermek naponta 0,5 g-ot, 6 óránként 2½ Chlorocidetta drazsét, ill. 1 adagolókanál szirupot (125 mg hatóanyag) kap.

A kezelés időtartama dysenteria és dyspepsia coli esetén általában 4—5 nap, pertussisban pedig általában 7 nap. Typhus abdominalis esetén felnőtteknek napi 1,5—2 g a láz kifejezett csökkenéséig (általában 2—3 napon át). Ha ez 3 napon belül bekövetkezik, a recidiva elkerülése céljából fokozatosan (kb. 5 nap alatt) lecsökkentjük a „fenntartó adag"-ra: napi 0,5—0,75 g-ra, és ezt a kezelést legalább 14 napig folytatjuk a typhus-diéta fenntartásával.

Hosszantartó és nagy adagokat alkalmazó chloramphenicol therapia esetén ajánlatos a *teljes vérképet rendszeresen ellenőrizni.* (Különös tekintettel a reticulocyta-szám és granulocyta-szám csökkenésre.) Egy éven belüli ismételt kúra — elővigyázatosságból — csak előzetes kivizsgálás után kezdhető meg.

Mellékhatások: Nausea, stomatitis, lingua nigra, allergiás reakciók fordulhatnak elő. A megadott adagok túllépésekor vagy hosszú kezelés során granulocytopenia, esetleg aplastikus anaemia, valamint neurotoxikus tünetek (opticus-neuritis, peripheriás neuritis) jelentkezhetnek.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére történő rendelés feltételei:

1. *Dysenteriában:* a szokásos szulfanilamid-készítményekkel (Sulfaguanidin stb.) történt előzetes kezelés eredménytelensége.
2. *Brucellosisban:* ha kórház, klinika vagy rendelőintézet vállalta az ellenőrzést.
3. *Coli-cystitisben és -pyelitisben és egyéb coli-fertőzés okozta súlyos megbetegedésben:* ha a vizelet colipozitív és a gyógyszert kórház vagy szakrendelés javasolta.
4. Bármilyen *gennyes, gyulladásos folyamat* esetében, ha ezt penicillin- vagy szulfanilamid-resistens, Chlorocidra érzékeny kórokozó okozza.
5. *Gonorrhoeában,* amennyiben a penicillinnel való kezelés contraindicalt vagy az eredménye nem volt kielégítő. Gonorrhoeában a Chlorocidot az illetékes bőr-nemibeteggondozó intézettől a beteg számára természetben kell igényelni.
6. *Vírus-pneumonia, mononucleosis infectiosa és szövődményei, ornithosis, Q-láz esetei.*

Társadalombiztosítás terhére való rendelése esetében mindenkor térítésmentesen kell rendelni, ill. kiszolgáltatni, még akkor is, ha a gyógyszer rendelése úgynevezett térítésköteles vényen történt. A vényen a kórismét és a bejelentésre kötelezett fertőző betegség bejelentésének megtörténtét is fel kell tüntetni.

Chlorocid szirup társadalombiztosítás terhére csakis 12 éves életkoron alulinak rendelhető, ennél idősebbnek nem rendelhető. Chlorocid végbélkúp alakjában a társadalombiztosítás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: b. 40 drazsé 250 mg 136,— Ft, b. 200 drazsé 250 mg 680,— Ft;
1 üveg szirup 30,30 Ft.

CHLOROCID E.Gy.T. XLVII.

szuszpenziós inj.

Összetétel: 1 üveg (I) 1 g chloramphenicol.-ot;
1 oldószerampulla (II) 5 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallatok: Olyan megbetegedések vagy kóros helyi elváltozások, amelyek pathogenesisében, pathogen agensként az egyéb therapiára nem vagy nem eléggé reagáló, chloramphenicolra azonban érzékeny kórokozók kizárólagos vagy jelentős szerepet játszanak és amelyeknél emellett chloramphenicol más alkalmazásmódja nem jár kellő therapiás hatással vagy nem vihető keresztül.

Ellenjavallatok: Hosszantartó intermittáló kezelés, aetiologiailag tisztázatlan megbetegedések, vérképzőrendszeri károsodások, májbetegségek, veseelégtelenség, valamint besugárzás utáni állapot, továbbá koraszülöttek, újszülöttek kezelése. Prophylaxis céljára nem alkalmazható. Vérképző rendszerre ható gyógyszerekkel (hydantion-származékok, phenylbutazon, phenothiazin, cytostaticumok, sulfonamid stb.) egyidejűleg nem adagolható.

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek: 40 mg/kg (2—3 g); gyermekeknek 50 mg/kg, 2—3 részletben adva. A therapia teljes időtartama nem haladhatja meg a 7—8 napot. A készítményt intramuscularis alkalmazásakor mélyen az izomba kell adni. Localis alkalmazásra mind a por, mind a suspensio felhasználható. Az adagok azonban ilyenkor sem léphetik túl a parenterálisan megadott adagokat. — Hosszantartó és nagyobb adagokat alkalmazó chloramphenicol-therapia esetén ajánlatos a teljes vérképet rendszeresen ellenőrizni. Különös tekintettel a reticulocyta- és granulocyta-szám csökkenésére. Egy éven belüli ismételt kúra — elővigyázatosságból — csak előzetes kivizsgálás után kezdhető meg.

Mellékhatások: Nausea, stomatitis, lingua nigra, allergiás reakciók fordulhatnak elő. A megadott adagok túllépésekor vagy hosszú kezelés során granulocytopenia, esetleg aplastikus anaemia, valamint neurotoxikus tünetek (opticus-neuritis, peripheriás neuritis) jelentkezhetnek.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére a Chlorocid drazsé rendelésére megállapított szabályozás szerint rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (I) 1 g + 1 oldószeramp. 23,— Ft, 50 üveg (I) 1 g + 50 oldószeramp. 215,60 Ft.

CHLOROCID E.Gy.T. XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,075 g chloramphenicol.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben; 1 tubus (15 g) háromszoros anyagmennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Impetigo, pyoderma, ekzema impetiginosum, ecthyma, ulcus cruris, folliculitis, sycosis vulgaris, otitis externa.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 5 g és 15 g orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 4,60 Ft, 1 tubus (15 g) 10,50 Ft.

CHLOROCID E.Gy.T. XLVI.
sebhintőpor

Összetétel: 1 szóródoboz 0,40 g chloramphenicol., 0,24 g carbamid.-ot tartalmaz 6 g sebhintőporban.

Javallatok: Prophylactikusan, fertőzött területen végzett műtéti sebekbe, valamint szennyezett sérülésekhez. Renyhén gyógyuló fekélyekre, sérülés és műtét utáni gennyesedésekre, felnyitott furunculusokba. Égések minden stádiumában.

Adagolás: A sebhintőport a seb megtisztítása után a sebre hintjük, és száraz, steril fedőkötést alkalmazunk. Adagolásának mennyisége a seb nagyságától függ, de 10—15 g-nál lehetőleg többet ne használjunk egyszerre.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — 1 doboz orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 szóródoboz 13,70 Ft.

CHLOROCID H E.Gy.T. XLIV/XLV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,0375 g hydrocortison. acet., 0,05 g chloramphenicol.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: *Szemészetben:* Keratoconjunctivitis phlyctaenulosa, allergiás keratoconjunctivitis, krónikus conjunctivitisek, tavaszi hurut, keratoconjunctivitis sicca, keratitis parenchymatosa, keratitis rosacea, sclerokeratitis, keratitis punctata, keratitis disciformis, a szem égési és marási sérülései, szemhéji dermatitis és ekzema, krónikus blepharitis, iritis, akut és krónikus iritis glaucomatosa, iridocyclitis, postoperativ uveitis, ophthalmia sympathica. *Bőrgyógyászatban:* Impetigo, folliculitis, sycosis vulgaris, ekzema nummulare, atopiás ekzema, ekzema seborrhoica, neurodermatitis minden formája, növényekkel, vegyi anyagokkal, gyógyszerekkel stb. szemben fennálló túlérzékenység következtében fellépő allergiás dermatitis és ekzema, különösen a kontakt esetek; anogenitalis ekzema, prurigo, intertrigo, lichen simplex acutus, erythema multiforme, lupus erythematodes lokalizált alakja, alopecia areata. Egyéb dermatosisokat kísérő nedvező ekzemás elváltozások. Dishydrosis. Otitis externa.

Ellenjavallatok: Hypopyon-keratitis és -iritis. Bármilyen eredetű, nagyobb terjedelmű szaruhámhiány. Keratitis dendritica és herpes zoster corneae. Trachoma. Átfúródás veszélye miatt mély szaruhártyafekély (ulcus serpens) esetén. Óvatossággal használható friss szaruhártyahegek esetén, ahol megfelelő

tapasztalattal és óvatos adagolással jó eredmény érhető el.

Adagolás: Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően naponta 1—3 alkalommal.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti-, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott időtartamú gyógykezelésre.
Lejárati idő: 2 év. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 22,20 Ft.

CHLOROCID S inj. E.Gy.T. XLVII.

Összetétel: 1 üveg 1 g chloramphenicol.-ot (1378 g chloramphenicol. succin. natr. alakjában) tartalmaz.
1 oldószer amp. 5 ml. aqua dest. pro inj. tartalmaz.

Javallat: Mindazon megbetegedések, amelyek pathogenesisében, pathogen agensként, az egyéb therapiára nem, vagy nem eléggé reagáló, chloramphenicol.-ra azonban érzékeny kórokozók kizárólagos vagy jelentős szerepet játszanak és amelyeknél emellett a chloramphenicol más alkalmazásmódja nem jár kellő therapiás hatással, vagy nem vihető keresztül.

Ellenjavallat: Hosszantartó intermittáló kezelés, aetiologiailag tisztázatlan megbetegedések, vérképzőrendszeri károsodások, májbetegségek, veseelégtelenség, valamint besugárzás utáni állapot, továbbá koraszülöttek, újszülöttek kezelése. Prophylaxis céljára nem alkalmazható. Vérképző rendszerre ható gyógyszerekkel (hydantoin-származékok, phenylbutazon, phenothiazin, cytostaticumok, sulfonamid stb.) egyidejűleg nem adagolható.

Adagolás: Szokásos napi adagja felnőtteknél 40 mg/kg (2—3 g), gyermekeknek 50 mg/kg, 2—3 részletben adva. A therapia teljes időtartama nem haladhatja meg a 7—8 napot.
Parenteralisan csak i. ven. és i. musc. alkalmazható

20%-os oldatban (1 üveg tartalmát 5 ml oldószerben oldva). Venába lassan — 1 perc alatt — kell injiciálni, i. musc. pedig mélyen az izomba. Hosszantartó és nagy adagokat alkalmazó chloramphenicol-therapia esetén ajánlatos a *teljes vérképet rendszeresen ellenőrizni*, különös tekintettel a reticulocyta-szám meghatározására. Egy éven belül ismételt kúra — elővigyázatosságból — csak előzetes kivizsgálás után kezdhető meg.
A Chlorocid-S könnyen oldódik, oldata tiszta, hosszabb állás után sötétedik. Lehetőleg frissen készült oldatot használjunk. Az elkészített inj.-oldat szobahőmérsékleten 5 napig tárolható.

Mellékhatás: Nausea, stomatitis, lingua nigra, allergiás reakciók fordulhatnak elő. A megadott adagok túllépésekor vagy hosszú kezelés során granulocytopenia, esetleg aplastikus anaemia, valamint neurotoxikus tünetek (opticus-neuritis, peripheriás neuritis) jelentkezhetnek.

Megjegyzés: ℞ ✠✠ Társadalombiztosítás terhére a Chlorocid drazsé rendelésére megállapított szabályozás szerint rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 1 üveg 1 g + 1×5 ml oldószer 16,70 Ft, 50×1 g + 50×5 ml oldószer 720,— Ft.

CHLOROCIDETTA drazsé E.Gy.T. XLVII.

(régi neve: Chlorocid drazsé gyermekeknek)

Összetétel: 1 drazsé 50 mg chloramphenicol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Lásd Chlorocid.

Ellenjavallatok: Lásd Chlorocid.

Adagolás: Általános adagja naponta testsúlykg-onként 50 mg, ezt a napi mennyiséget 4 egyenlő részre elosztva (6 óránként) kell beadni. Pl. 10 kg-os gyermek naponta 0,5 g-ot, 6 óránként 2½ drazsét kap. (Továbbiakban lásd Chlorocidnál.)

Mellékhatások: Lásd Chlorocid.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére a Chlorocid drazsé rendelésére megállapított szabályozás szerint rendelhető.

Csomagolás: b. 30 drazsé 14,40 Ft.

CHLOROSAN E.Gy.T. kenőcs XLIV/XLVI.

Összetétel: 1 tubus 1 g chlorquinaldolumot tartalmaz 20 g lemosható kenőcsben.

Javallatok: *Bőrgyógyászat:* Staphylococcus, streptococcus és gombák okozta bőrfertőzések, ill. társfertőzések esetén: impetigo contagiosa, ekzema impetiginosum és mycoticum, sycosis staphylogenes, folliculitis, mycosis interdigitalis.
Gyermekgyógyászat: Impetigo bullosa (pemphigoid), pyodermia és a fent felsorolt bőrfertőzések.
Sebészet: Gennyező sebek és a környező bőrfelület prophylaxisára, decubitus, ulcus cruris.
Szülészet-nőgyógyászat: A lactatio folyamán fellépő mellbimbó berepedezések és az emlő gyulladásos megbetegedéseinek megelőzése és therapiája (mastitis, abscessus mammae).
A nyálkahártyát izgatja, ezért — különösen a szem és az orr megbetegedéseiben — használata nem javallt.

Alkalmazás: A kenőcsöt a kezelendő bőrfelületre vékony rétegben kenjük. A kötés gondos felhelyezésére különösen ügyeljünk, kötéscserét általában 24 óránként végezzük. Kötés előtt a hámfoszlányokat és a pörköket gondosan letisztítjuk.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus kenőcs (20 g) 9,— Ft.

CHLORURIT Ch. tabl. XXV.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g chlorothiazidumot tartalmaz.

Javallatok: Cardialis és renalis eredetű oedemák, májcirrhosis-okozta ascites és oedema, praemenstruatiós és praeeclampsiás oedema, víz-retentiós obesitas, valamint a kortikoszteroid-kezelést követő oedema esetében. Elősegíti — kombinált adagolásban — más vérnyomáscsökkentő (ganglion-blokkoló) szerek hatását, sőt egymagában is vérnyomáscsökkentően hat.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Nephrosis.

Adagolás: Egyéni. A szokásos adag felnőtteknek 1—4 tabletta (0,5—2 g) másodnaponként, vagy a hét egymást követő 3—5 napján. Viszonylag gyors hatása miatt a készítményt este ne alkalmazzuk. — Hosszabb időn át adagolva a hypokalaemia elkerülésére ajánlatos a kálium-iont naponta 1—6 g kalium chloratummal vagy kalium citricummal pótolni.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig 2-szer $^1/_4$ tabl., 1—6 éves korig 2-szer ½ tabl., 7—14 éves korig 2-szer 1 tabl. (reggel-délben) 2—5 napig, utána 2—4 nap szünet, vagy: másodnaponként.
Fenntartó kezelésre hetente kétszer 1—1 napra a fenti adagokat adjuk. Testsúlyra számított adagja: 15—20 mg/kg/die, testfelületre számított adagja 500—700 mg/m²/die. A diuresis a beadást követő 2 óra múlva kezdődik és 12 órán át tart.
Elhúzódó kezelés esetén fontos a bőséges káliumbevitel: gyümölcs, főzelék, csokoládé, esetleg KCl-por (1—2 g naponta, ostyában) vagy káliumacetát adása az alábbi ízesített oldat formájában: Rp. Kalii acet. sol. gta 16,0, Sirup. simpl. gta 24,0, Aqua dest. 60,0; ebből egy kk megfelel 0,20 g KCl-nak. Csecsemő kilónként és naponta 1 kk-lal, gyermek fele-ennyit kaphat.
Mellékhatás: Émelygés, hányás, bőrkiütés; hosszabb időn át történő adás esetén hypokalaemia (izomgyengeség, idegrendszeri tünetek, jellegzetes EKG).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 23,50 Ft.

CHORIOGONIN 500 NE és 1500 NE K.Gy. XXXIII. inj.

Összetétel: 1 szárazampulla 500 NE, illetve 1500 NE gonadotropin. chorionic.-ot tartalmaz. 1 oldószer ampulla 14,4 mg natr. chlor., aqu. dest. pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz.

Javallatok: Juvenilis metropathiák. Praeclimacterialis és ivarérettkorbeli metropathiák, amennyiben azok természetét nemrégen végzett endometrium szövettani lelete tisztázta. Primaer és secundaer amenorrhoea, ciklus-zavarok (hypo-, olygo-, polymenorrhoeák). Ovulatiós zavarokból (hiányzó vagy késői tüszőrepedésből) származó meddőség. Habitualis és imminens abortus a terhesség első harmadában. Kryptorchismus, dystrophia adiposogenitalis, hypophysaer cachexia, Simmonds-kór, alopecia.

Adagolás: Individuális. Szabálytalan, ciklust nem tartó vérzések esetén (metropathia juvenilis) 4—5 ampulla à 1500 NE i. musc. 1 hét alatt. Menstruatiós zavarok esetén általában 2—5 naponként 1—1 ampulla i. musc. Amennyiben a vérzés a sárgatest elégtelen működése miatt elnyúlt vagy szabálytalan, a ciklus második felében két héten át 1—2 vagy 3 naponként 1 ampulla à 1500 NE. — Kryptorchismusban 500 NE 2—3-szor hetenként, szükség esetén néhány hónapon keresztül. — Eunuchoidismusban és hypogenitalismusban felnőtteknek napi 700—1500 NE 3 hétig, amennyiben hatás mutatkozik, még 3 hétig azonos adagban, majd napi 500—1000 NE adandó további 2 hónapig. — Dystrophia adiposogenitalisban heti 2—3-szor 500—1000 NE.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések szabadon rendelhetik, körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×1500 NE + 5×2 ml 133,70 Ft, 5×550 NE + 5×2 ml 52,50 Ft.

CINKOXIDOS KENŐCS B. XLIV.

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,40 Ft.

CINKOXIDOS SÁRGA VAZELIN B. XLIV.

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,70 Ft.

CODEINUM HYDROCHLORICUM A. V.
tabl. 0,01 g és 0,02 g

Összetétel: 1 tabl. 0,01 g, ill. 0,02 g codein. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Köhögés- és fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Háromszor 1—2 tabl. (0,01) vagy háromszor 1 tabl. (0,02).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×0,01 g tabl. 2,90 Ft, b. 100×0,01 g tabl. 29,— Ft,
b. 10×0,02 g tabl. 4,— Ft, b. 100×0,02 g tabl. 40,— Ft.

CODEIN-ACISAL A. V.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g codein. hydrochlor., 0,50 g acid. acetylsal.-ot tartalmaz.

Javallatok: A légzőutak hurutos megbetegedései. Köhögés-, fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Háromszor 1—2 tabletta naponta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 4,50 Ft, b. 100 tabl. 45,— Ft.

CODEIN-STIBIUM A. V.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g codein. hydrochlor., 0,05 stib. sulfurat. aurant.-ot tartalmaz.

Javallatok: Kínzó, száraz, köpet nélküli köhögés csillapítása.

Adagolás: Háromszor 1—2 tabletta naponta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,60 Ft, b. 100 tabl. 26,— Ft.

CODERETTA A. V.
tabl.

(régi neve: Coderit gyermekeknek)

Összetétel: 1 tabl., 0,05 mg acid. primul., 5 mg codein. hydrochlor., 5 mg *dl*-ephedr. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Akut és krónikus bronchitis, tuberculosis pulm., laryngitis catarrhalis stb.

Adagolás: 1 éves korban ½ tabl., 3 éves korig 1 tabl., 6 éves korig 2 tabl., 9 éves korig 3 tabl., 12 éves korig 4 tabl. és 15 éves korig 5 tabl. 3—4-szer naponta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 3,20 Ft.

CODERIT A. V.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g codein. hydrochlor., 0,02 g *dl*-ephedrin. hydrochlor., 0,0025 g acid. primulae-t tartalmaz.

Javallatok: Akut és krón. bronchitis, laryngitis catarrhalis, pneumonia, tüdő-tbc, emphysema.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 6,10 Ft, b. 100 tabl. 61,— Ft.

COERULAMIN K.Gy. XXV.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,1 g hexameth.-tetr. phosph. (hexameth.-tetr. 59%), 0,02 g methylen. coerul.-ot tartalmaz.

Javallatok: Urethritis, cystitis, pyelitis.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 3,40 Ft, 250 drazsé 18,50 Ft.

COFFEINUM NATRIUM BENZOICUM B. XIII.
inj. 20%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,2 g coff. natr. benz.-ot tartalmaz.

Javallatok: Alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulás, szívműködés erősítése és szabályozása, vérnyomásemelés, collapsus.

Adagolás: 1—2 ml s. cut., i. musc., i. ven. naponta 1—2-szer, esetleg többször.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 13,30 Ft, b. 50×1 ml amp. 66,50 Ft.

COFOCAIN K.Gy. VIII.
inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,0284 g coffein., 0,04 g procain. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Különböző, feltehetően gócfertőzés eredetű ízület-, izom- és idegfájdalmak, fejfájás, érgörcsök.

Adagolás: i. cut., ill. s. cut. 0,5—2 ml, i. musc. 1—2 ml, i. ven. 0,5—2 ml lassan.
Alkalmazás előtt a prokainérzékenység kizárására intracutan próba végzendő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5×2 ml amp. 8,40 Ft, 50×2 ml amp. 62,20 Ft.

COLUTOID K.Gy. XXXIV.
sublingualis tabl.

Összetétel: 1 tabl. 15 mg aethisteronum.-ot tartalmaz.

Javallat: Hypermenorrhoea, terhességi, gyermekágyi és a climax időszakában jelentkező (ciklikusan fellépő, de erős, elhúzódó) vérzések. Habitualis és imminens abortus. Hyperplasia gland. cystica endometrii.

Adagolás: Az esetek súlyossága szerint naponta 1—2—3—4 sublingualis tabletta kúraszerű adagolásban. Pl. habitualis vetélés esetén 2—3×1 tabletta naponta legalább négy hónapon át. A menstruatiónak megfelelő időben több is. Glandular-cystikus hyperplasia esetén naponta 2—3 tabletta 6 napon át — a várható terminus előtti héten.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 16,70 Ft.

CORBOCAIN K.Gy. VIII.
inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 80 mg procain. hydrochlor., 0,2 mg o-dioxyphenyl-propanolamin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Helyi érzéstelenítésre; hypertoniásoknak, adrenalin-érzékenyeknek is.

Adagolás: Kisebb sebészi beavatkozáskor és foghúzáskor 1—2 amp.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20×2 ml amp. 23,— Ft, b. 100×2 ml amp. 115,— Ft.

COREDIOL K.Gy. XIII.
inj., csepp

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,5 g nicetamid.-ot, 1 üveg 2,5 g nicetamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Vérkeringési és légzési zavarok, collapsus, szívgyengeség, alkoholmérgezés, asthma bronchiale, bronchitis, emphysema.

Adagolás: Naponta 1—3×1 amp. s. cut., i. musc., i. ven.; az oldatból naponta 3×15—60 csepp.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 21,20 Ft, b. 50×2 ml amp. 212,— Ft.
1 üveg (10 ml) 12,50 Ft.

CORHORMON K.Gy. XVI.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,001 g extr. cordis embryonalist tartalmaz.

Javallat: Myopathia cordis chronica, compensatio fenntartása.

Adagolás: Naponta 1—3 amp. i. musc. vagy szőlőcukorral i. ven.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 10×1 ml 19,30 Ft, 30×1 ml amp. 52,40 Ft, 100×1 ml 136,30 Ft.

CORONTIN Ch. XVI.
drazsé, forte drazsé, végbélkúp

Összetétel: 1 drazsé 15 mg, 1 *forte* drazsé 60 mg prenylaminum lactic.-ot tartalmaz.
1 végbélkúp 50 mg prenylaminum lactic., 30 mg phenobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, organikus és functionalis eredetű coronaria-elégtelenség, neurovegetativ eredetű coronaria-syndromák. — Kedvező hatás észlelhető peripheriás érszűkület esetében is.

Ellenjavallatok: A szív súlyos atrioventricularis és intraventricularis vezetési zavarai esetében.

Adagolás: Az angina pectoris syndroma könnyebb eseteiben kezdeti adag felnőtteknek általában naponta 3×2 drazsé, súlyosabb eseteiben (gyakori, tartósabb éjszakai rohamok) naponta 2—3×1 *forte*-drazsé étkezés után, az éjszakai rohammentesség biztosítására elalvás előtt még 1 végbélkúp. Későbbiek során elégséges, ha az adagolást az egyénenként megállapított fenntartó adagokkal folytatjuk. A Corontin maximális egyszeri adagja 120 mg, maximális napi adagja 360 mg. Naponta összesen 180 mg-nál nagyobb adag csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható! A therapiás eredmény biztosítása megkívánja a rendszeres és több héten át tartó adagolást. — Egyébként szívre ható glikozidokkal és fájdalomcsillapítókkal együtt is nyugodtan adagolható. — Vérnyomáscsökkentőkkel együtt adagolva nemkívánatos hypotoniát okozhat, ezért a készítmények adagjainak megállapítása óvatosan történjék, a nemkívánatos hatásütközés elkerülésére.

Megjegyzés: ✠ drazsé, ✠ végbélkúp. Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 30 drazsé 7,80 Ft, 300 drazsé 44,40 Ft, 20 forte drazsé 13,80 Ft, 200 forte drazsé 73,— Ft, 10 kúp 15,— Ft.

CYCLOSERIN Ch. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g cycloserinum-ot (0,637 g cycloserinum bitart. alakjában) tartalmaz.

Javallatok: Főleg a tüdő-tuberculosis krónikus, INH-val és Streptomycinnel szemben resistens formái. Kedvező eredménnyel alkalmazható a húgyutak és nemi szervek fertőzéses eredetű megbetegedéseiben is, amennyiben a kezelés más készítményekkel sikertelen volt.

Ellenjavallatok: Psychés zavarok, epilepsia, veseelégtelenség.

Adagolás: Átlagos napi adagja felnőtteknek 3 tabletta. Ha ezt az adagot a beteg jól tűri, a napi adag 4 tablettára emelhető. Napi 1 g-nál többet semmiképp nem szabad adni. Ajánlatos a kúraszerű adagolást napi 1 tablettával kezdeni, és ha melléktüneteket nem okoz, az adagot másodnaponként fokozatosan további 1 tablettával növelni. Ezáltal kb. egy hét után elérjük a megkívánt átlagos napi adagot, azaz 3 tablettát.

Megjegyzés: ✠ Orvosi vényen Cycloserin nem rendelhető. A járóbetegeknek Cycloserinnel történő kezelését az illetékes TBC-gondozóintézet végzi.

Csomagolás: 40 tabl. 267,— Ft, 200 tabl. 1321,— Ft.

DAEDALON K.Gy. XXIII.
tabl., végbélkúp

Összetétel: 1 tabl. 50 mg dimenhydrinatum-ot,
1 kúp (1,4 g) 100 mg dimenhydrinat., 100 mg chlorbutanolumot tartalmaz.

Javallatok: Légibetegség, tengeribetegség és egyéb okokból fennálló (terhesség, uraemia, sugárbetegség, inhalatiós narcosis, labyrinthitis stb.) nausea és hányás. Menière-syndroma.

Adagolás: 1—2 tabletta vagy 1—2 kúp 4—6 óránként, a beteg állapotától függően. — Prophylactikusan kinetosis megelőzésére egy órával az utazás megkezdése előtt 1—2 tabletta vagy kúp.

Megjegyzés: tabl. ✠, kúp ✠. Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 4 tabl. orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható.

Csomagolás: b. 10 tabl. 4,60 Ft, 100 tabl. 17,80 Ft; 10 kúp 9,60 Ft; 100 kúp 69,20 Ft.

DAEDALONETTA K.Gy. XXIII.
végbélkúp gyermekeknek

Összetétel: 1 kúp 25 mg dimenhydrinat., 25 mg chlorbutanolumot tartalmaz.

Javallatok: Hányinger, ill. hányás csillapítása, angina, acetonaemia, heveny gastritis, lázas betegségek, otitis media, grippe esetében, postnarcotikus hányinger csillapítására. Légibetegség, tengeribetegség esetleges előfordulásakor prophylactikusan is.

Adagolás: Csecsemőknek és egy éven aluli gyermekeknek naponta 2×1 kúp, egy éven felüli gyermekeknek naponta 3×1 kúp. Prophylactikusan (kinetosis megelőzésére) 1 kúp ½ órával az utazás megkezdése előtt. — A készítmény érzékeny egyéneknél enyhe álmosságot, bágyadtságot okozhat.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 kúp 8,— Ft.

DALGOL K.Gy. IV.
cseppek

Összetétel: 1 ml oldat 0,67 g methylpentynolumot tartalmaz 15 ml szeszes oldatban.

Javallatok: Különböző félelmi állapotok, ideges állapotok és alvászavarok, climaxos panaszok, vegetativ dystonia, asthma bronchiale.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Neuropathia.

Adagolás: Átlagos napi adag 3-szor 20 csepp kevés vízben, vagy kockacukorra cseppentve.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 2—1 csepp/kg/die, 3—5 részre elosztva (édes közegben).
Mellékhatás: Hányás (kellemetlen íze miatt). Csecsemők viszonylag jobban tolerálják. Nem pótolja, csak kiegészíti az egyéb kezelési eljárásokat (psychotherapia, káros környezeti hatások kiiktatása, gondos ápolás stb.).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 1 üveg 15 ml 23,60 Ft.

DECOSTERON K.Gy. XXXIV.
olajos inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg desoxycorton. acet., 0,1 ml alcohol benzylic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Mellékvesekéreg hiányos működése (Addison-kór), (általános asthenia és ezek kapcsán fellépő izomgyengeség, valamint hypotonia). Elhúzódó reconvalescentia, Simmonds-kór, röntgenkater, égés utáni toxaemia, shock. Súlyos esetekben (diphtheria, typhus, pneumonia, grippe, tbc) célszerű C-vitaminnal együtt adni.

Ellenjavallat: Hypertonia, oedema.

Adagolás: Hetenként 2—3×1 amp. i. musc. Tartós Decosteron-kezelés beállítása, ami csak mellékvesekéreg-elégtelenség esetében indokolt, kizárólag intézetben történhet

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak akkor rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 5×1 ml 58,10 Ft, 25×1 ml 290,40 Ft.

DEGRANOL Ch. L.
inj.

Összetétel: 1 szárazampulla 50 mg mannomustinum dihydrochlor.-ot tartalmaz,
1 oldószerampulla 5 ml natr. chlor. inj. 0,9%-ot tartalmaz.

Javallatok: Lymphoid és myeloid leukaemia, lymphogranulomatosis, lymphosarcoma, reticulosarcoma, myeloma stb.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Főleg Hodgkin-kór és lymphosarcomatosis.

Adagolás: Átlagos adagja másodnaponként 50—100 mg intravenásan 5, ill. 10 ml fiziológiás konyhasóoldatban oldva. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. *Paravenás injiciálása súlyos necrosist okozhat!*
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 2—1 mg/kg/die, i. ven. másodnaponként, 6—8 alkalommal.
Mellékhatások: émelygés, hányás, szédülés, fehérvérsejtszám-csökkenés. Ha ez utóbbi kifejezett, alkalmazása felfüggesztendő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5×50 mg + oldószer 53,60 Ft, 25×50 mg + oldószer 250,— Ft.

DEHISTIN E.Gy.T. XXXVIII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g tripelennaminum hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Allergiás eredetű betegségek.

Adagolás: Naponta 3—4×1—2 tabl.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig: 2—3-szor ¼ tabl./die; 1—6 éves korig: 2—3-szor ½ tabl./die; 7—14 éves korig: 2—4-szer ½ tabl./die.

Mellékhatás: Álmosság.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 18,40 Ft, 100 tabl. 74,90 Ft.

DELAGIL E.Gy.T. VI/XLVII.
tabl., inj.

Összetétel: 1 tabl., ill. 1 amp. (5 ml) 0,25 g chlorochin. phosph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Polyarthritis chronica, melynél nincsenek reverzibilis destructiv elváltozások, és gerincoszlop eredetű gyök-neuralgiák. Malária, amoebiasis, lupus erythematodes, fotodermatosisok.

Ellenjavallatok: Nem amoebás eredetű májártalom, gastrointestinalis kórképek, vérképzőszervi elváltozások és a központi idegrendszer egyes megbetegedései.

Adagolás: *Polyarthritis chronica* esetén 10 napig 2×1 tabletta, majd naponta, később másodnaponként 1 tabletta. *Maláriában* prophylactikusan az első héten két különböző napon 2—2 tabletta, majd hetenként minden hét azonos napján 2 tabletta. Therapiás célra: 12 tabletta három napon belül. Az első napon, első alkalommal 4 tabl., majd 6—8 óra múlva 2 tabl.; a második és harmadik napon naponta egyszer 3 tabl. Súlyos esetekben (cerebralis formában) a kezelést 1—2 amp. i. ven. cseppinfúziójával kell kezdeni, majd 6—8 óra múlva ezt az adagot hasonló módon, vagy i. musc. meg kell ismételni. Ezután a kezelés per os folytatandó két napig, 2×2 tablettával. *Amoebiasisban* 7 napig 3×2 tabl., majd újabb 7 napig 3×1 tabl. pro die, utána 2—6 hónapon át hetenként 2×3 tabl. *Lupus erythematodes* esetében naponta 3×1 tabletta. *Fotodermatosisban* szükség szerint heteken keresztül naponta 1 tabl., majd hetente 2—3 tabl. — *Parenteralis kezelésre* i. musc. naponta 2 amp.
Cseppinfúzióban pro die i. ven. általában 1—2 amp. 50-szeres hígításban adandó. Szalicilátokkal és kéreghormon-készítményekkel együtt is adható. A kezelés butazolidin- és aranykészítményekkel kombinálva óvatosságot igényel, mert az együttes alkalmazás súlyos bőrelváltozásokat okozhat.
Delagil-kúra alatt a vérkép folyamatosan ellenőrizendő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 30 tabl. 29,10 Ft, 5×5 amp. 19,80 Ft.

DEMALGON Ch. VI.
tabl., végbélkúp

Összetétel: 1 tabl. 0,27 g amidazoph., 0,18 g bromacetocarbamid.-ot,
1 végbélkúp 0,27 g amidazoph., 0,18 g bromacetocarbamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalomcsillapítás. Fejfájás, neuralgia, neuritis, ischias, tabeses crisis, dysmenorrhoea, post-extractiós és postoperatív fájdalom, rheumatismus, polyarthritis, endocarditis, influenza, pneumonia eseteiben.

Adagolás: Felnőtteknek egyszeri adag 1—2 tabl., 1—2 kúp. Ez az adag erős fájdalmak és általuk előidézett álmatlanság esetén naponta többször adható (3—4-szer).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 5 tabl. és 5 kúp orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 5 kúp 9,40 Ft, b. 100 kúp 188,— Ft, b. 10 tabl. 9,10 Ft, b. 100 tabl. 91,— Ft.

DEMALGONIL Ch. VI.
inj., csepp

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,06 g allylbarbital., 0,4 g amidazoph., 0,6 g urethan.-ot,
1 üveg (15 ml) 0,45 g allylbarbital., 3 g amidazoph., 4,5 g urethan.-ot tartalmaz.
1 üveg (100 ml) 6,66-szoros anyagmennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Potenciált hatású fájdalomcsillapító és antirheumaticum, postoperativ állapotban morfin pótlására használható.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Hyperpyrexia, lázas eclampsia.

Adagolás: 1—2 amp. i. musc., 1 amp. i. ven. lassan befecskendezve. 30—60 csepp naponta többször. *Gyermekadagok:* 2—12 hónapos korig (10 kg-ig): 0,1 ml/kg/dosi i. musc.; 1—6 éves korig 1—1,5 ml/dosi i. musc.; 7—14 éves korig: 1,5—2 ml/dosi i. musc. Csecsemőknek 10 kg testsúly felett is csak

1 ml-t adjunk. 30 kg testsúly feletti gyermekeknek 2 ml adható. Görcs (lázas görcs) szüntetésére Sevenallal együtt (l. ott).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 13,90 Ft, b. 50×2 ml amp. 139,— Ft.
1 üveg (15 ml) 13,60 Ft.

DENTOCAR Ch. XXIX.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 mg natr. fluor.-ot tartalmaz (F = 0,23 mg).

Javallat: Caries dentis megelőzése

Adagolás: A napi adag a fogyasztott ivóvíz fluorid-ion tartalmától függ. Ha az ivóvíz fluorid-ion tartalma literenként nem haladja meg a 0,25 mg-ot, napi adagja: terhes és szoptató anyáknak 4-szer 1 tabletta (= kb. 1,0 mg F);
csecsemőknek 1-szer 1 tabletta (= kb. 0,25 mg F);
kisgyermekeknek 1—6 éves korig 2-szer 1 tabletta (= kb. 0,5 mg F);
iskolás gyermekeknek 6—14 éves korig 3—4-szer 1 tabletta (= kb. 0,75—1,0 mg F), lehetőleg étkezés közben.
Abban az esetben, ha az ivóvíz fluorid-ion tartalma 0,25 és 0,50 mg/liter között van, a *Dentocar* tablettát *csak kisgyermekek és iskolás gyermekeknek adjuk* a fent említett adagolás szerint.
Amennyiben az ivóvíz fluorid-ion tartalma 0,50 és 0,70 mg/liter között van, akkor a napi adag: 3—6 éves kisgyermekeknek 1 tabletta (= kb. 0,25 mg F); 7—14 éves iskolás gyermekeknek 2-szer 1 tabletta (= kb. 0,50 mg F).
Ha az ivóvíz fluorid-ion tartalma ennél magasabb, a *Dentocar* tabletta adagolása fölösleges, sőt esetleg káros is lehet.
Kisebb-nagyobb létszámú közösségekben (csecsemő- és gyermekotthonok, napközi otthonok, óvodák, iskolák) és a terhesrendeléseken az adagolás az *egészségügyi hatóság irányításával történik.*

Kerülni kell mind a tabletták rendszertelen bevételét, mind a kellő elővigyázat nélküli túladagolást. Ha rendszertelen a bevétel, hatás nem várható, a túladagolás viszont egyrészt heveny mérgezéshez (főképpen egyszeri nagy adag bevételekor), másrészt (huzamos túladagolás esetén) foltos zománc képződéséhez vezet. *Éppen ezért nem szabad az egy-egy napon elmaradt tablettákat összegyűjteni s utólag egyszerre pótlólag bevenni.*

Megjegyzés: ✠ Jelenleg nincs gyógyszertári forgalomban. Csecsemő- és gyermekotthonokban, óvodákban, iskolákban és terhesrendeléseken alkalmazása az egészségügyi hatóság irányításával történik.

Csomagolás: 50 tabl. 8,15 Ft, 500 tabl. 44,90 Ft.

DEPERSOLON K.Gy. XXXIV. inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 30 mg 21-desoxy-21-N-(N'-methylpiperazinyl)-prednisolon. hydrochlor., 100 mg urethan., 8 mg alcohol benzylic., 600 mg propylenglycolumot tartalmaz.

Javallatok: Elsősorban olyan akut kórképek, amelyekben a gyors glukokortikoid-hatás életmentő: égési, traumás, műtéti vagy intoxicatio következtében fellépő shock. Súlyos allergiás állapotok, anaphylaxiás shock, transfusiós shock, status asthmaticus, súlyos gyógyszer-túlérzékenység. Fertőző betegségek kapcsán fellépő toxikus állapot (huzamosabb alkalmazásakor megfelelő antibioticummal kombinálva). Akut mellékvese-elégtelenség (pl. Addison-crisis), máj-coma, myocardialis infarctus shock-stádiuma.

Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Anaphylaxia, allergia valamennyi formája; laryngitis, laryngotracheobronchitis; toxikus állapot; asthmás hörghurut súlyos alakjai és asthmás roham; shock.

Ellenjavallatok: Az akutan alkalmazott parenteralis prednisolon-kezelésnek gyakorlatilag nincs ellenjavallata. A huzamos kezelés ellenjavallatai megegyeznek a kortikoszteroid-kezelés ismert ellenjavallataival.

Adagolás: Shockban noradrenalinnal kombinálva 30—90 mg Depersolon (1—3 ampulla) lassan intravenásan vagy cseppinfúzióban, egyéb indicatiókban 30—40 mg (1—1½ ampulla) lassan intravenásan. Az akut állapot enyhültével célszerű a kezelést csökkenő adagban Prednisolon tablettával folytatni.

Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig: 3—2 mg/kg/dosi i. ven.; 1—14 éves korig: 2—1 mg/kg/dosi i. ven. Az injekciót lassan (kb. 3 perc alatt) kell beadni. Szükség esetén 20—30 perc múlva megismételhető.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére „statim" esetben az indicatio feltüntetésével szabadon rendelhető. Egyéb esetben a Prednisolon tablettára megállapított feltételek szerint rendelhető.
A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani. — Életmentő hatása miatt tanácsos a készenléti táskában tartani. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 3×1 ml amp. 58,50 Ft, 50×1 ml amp. 805,— Ft.

DEPERSOLON K.Gy. XXXIV/XVII. orr- és fülcseppek

Összetétel: 1 üveg (5 ml) 25 mg 21-desoxy-21-N-(N'-methyl-piperazinyl)-prednisolon. hydrochlor., 25 mg lidocain. hydrochlor., 50 mg *dl*-ephedr. hydrochlor., 15 mg alcohol *β*-phenylaethylic., 70 mg alcohol polyvinilic.-ot tartalmaz 5 ml vizes oldatban.

Javallatok: Fülbetegek műtéti utókezelése, allergiás, mucopurulens, mesotympanalis folyamatok, idült, gennyes középfülgyulladás akut exacerbatiója. Rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, az orrnyálkahártya heveny és idült gyulladása, oedemája, heveny orrmelléküreg-gyulladás.

Adagolás: Naponta több ízben 4—5 cseppet a fülkagylóba, ill. az orrnyílásba csepegtetni. A készítmény csecsemő- és gyermekgyógyászati célra nem alkalmazható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon, körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslata alapján rendelhetik. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 21,80 Ft.

DEPERSOLON K.Gy. XXXIV/XLV.
szemcsepp

Összetétel: 1 üveg 15 mg 21-desoxy-21-N-(N'-methyl-piperazinyl)-prednisolon. hydrochlor., 25 mg alcohol-β-phenylaethylic., 70 mg alcohol polyvinilic.-t tartalmaz 5 ml vizes oldatban.

Javallatok: A mellső segmentum különféle, elsősorban allergiás eredetű gyulladásai, továbbá kémiai és fizikai ártalmak okozta izgalmi állapotok. Félheveny is idült kötőhártya-gyulladás, conjunctivitis vernalis és follicularis, keratoconjunctivitis rosaceae és phlyctaenosa. Keratitis parenchymatosa és disciformis, keratoplasticai műtét után. Scleritis, episcleritis. Elülső uveitis: iritis, iridocyclitis különböző formái. Ophthalmia sympathica. Az adott kórképnek megfelelően, az esetleges fertőzés leküzdésére és a szövődmények kivédésére egyéni javallat alapján, célszerű a kezelést antibioticumokkal, értágítóval vagy aethylmorphinnal kiegészíteni. Hátsó folyamatoknál belsőleg is adandó prednisolon! Blepharitisben Hydrocortison szemkenőcs ajánlatos.

Ellenjavallatok: Herpes simplex corneae, továbbá minden olyan szemészeti megbetegedés, amelyben a szaruhártya hámfosztott vagy érzéketlen. Ulcus serpens corneae, vírus okozta gyulladások, keratoconjunctivitis epidemica korai stádiuma. Glaucoma. Égések és szaruhártya-felmaródások kezelésében individuális megítélés alapján alkalmazható az összenövések meggátlására. Szemészeti műtétek után csak a műtét napjától számított 4—5. naptól kezdve célszerű a készítmény alkalmazása.

Adagolás: A kórkép súlyosságának megfelelően naponta 1—3-szor 1—2 cseppet az alsó áthajlásba cseppenteni.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak szemészeti szakrendelések rendelhetik. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 16,20 Ft.

DEPRIDOL K.Gy. V.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg methadon. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 5 mg methadon. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalomcsillapítás és görcsoldás. Morfin helyettesítésére.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1 tabl., 1—2-szer 1 amp. s. cut. vagy i. musc.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 8,— Ft, 50×1 ml amp. 80,— Ft.
20 tabl. 6,40 Ft, 100 tabl. 16,60 Ft.

DERMAFORINE E.Gy.T. XLVI.
sebhintőpor

Összetétel: 1 szóródoboz 0,0152 g pyoktanin. aureum, 0,036 g hydrarg. amidochlor., 0,036 g hydrarg. chlor. mit., 0,036 g hydrarg. oxyd. flav., 0,112 g zinc. oxyd., 0,376 g bism. subnitric.-ot tartalmaz 10 g sebhintőporban.

Javallat: Sebhintőpor.

Megjegyzés: ✠ Társadalombizt. terhére szabadon rendelhető. — 10 g orvosi vény nélkül is adható.

Csomagolás: 1 szóródoboz (10 g) 1,40 Ft, 1 zacskó (100 g) 14,— Ft.

DERMASEPT B. XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,03 g argent nitric., 0,2 g monobrombenzol., 0,2 g acid. *o*-oxychinolin sulf.,

0,2 g res. pini, 0,2 g tereb. comm., 0,29 g bism. triobromphen., 0,5 g pix fagi redest., 0,8 g zinc. oxyd., 1 g ammon. bitum. sulfon., 1 g plumb. oxyd., 1 g sulfur praecip., 1,2 g bism. subnitric., 1,3 g ol. jecor.-t tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Fertőzött sebek kezelése, pyoderma, ekzema.

Adagolás: A beteg testfelületre kenni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,90 Ft.

DIACODON A. V.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg acetyldihydrocodeinon. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Bronchialis és tüdőmegbetegedésekben mint köhögéscsillapító.

Adagolás: Felnőtteknek napközben 2×½ tabletta, este 1 tabletta. Gyermekeknek 1 éven felül naponta egyszer ¼ tabletta adható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 11,40 Ft.

DIAPHYLLIN K.Gy. XVI.

tabl., végbélkúp

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g aminophyllinumot, 1 kúp (2 g) 0,36 g aminophyllinumot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, asthma cardiale és bronchiale, arteriosclerotikus és hypertoniás eredetű keringési zavarok, myopathia cordis chronica, claudicatio intermittens, decompenzált vitiumok, cardialis és nephrogen oedemák.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabl., naponta 1—2 kúp.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 20 tabl. 18,80 Ft, 100 tabl. 83,50 Ft. 10 kúp 41,80 Ft, 100 kúp 363,80 Ft.

DIAPHYLLIN GLUTEOSUM K.Gy. XVI.

inj. 24%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,24 g aminophyllin., 0,01 g norcain.-ot tartalmaz.

Javallatok: l. Diaphyllin.

Adagolás: 1 ampulla *kizárólag i. musc.!*

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 9,50 Ft. b. 50×1 ml amp. 95,— Ft.

DIAPHYLLIN VENOSUM K.Gy. XVI.

inj. 4,8%

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,24 g aminophyllin.-ot tartalmaz.

Javallatok: l. Diaphyllin.

Adagolás: 1 ampulla *kizárólag i. ven., lassan* befecskendezve.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×5 ml amp. 11,30 Ft, b. 50×5 ml amp. 113,— Ft.

DIAPULMON Ch. VI.

olajos inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,06 g chinin. anhydr., 0,05 g camphor., 0,16 g menthol., 0,4 ml aetherol. eucalyptit tartalmaz olajos oldatban.

Javallatok: Bronchitis, bronchopneumonia, hypostatikus és postoperativ pneumonia, bronchiectasia, tüdő-abscessus és -gangraena, grippés tüdőkomplikációk megelőzése, pertussis, asthma bronchiale, tbc-sek vegyes fertőzése, nikotin-abusus, laryngitis, rhinitis esetén inhalációban is.

Adagolás: Naponta 1—2-szer 1—4 ml i. musc. A kúra 1—3 hétig tart.
Gyermekadagok: Csecsemőnek naponta egyszer 0,3 ml, 5 éves korig 0,5 ml, 12 éves korig 1 ml. Inhalációs alkalmazása: 20—30 csepp forró vízre cseppentve, belélegezve.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×2 ml amp. 26,70 Ft, b. 100×2 ml amp. 267,— Ft.

DICAPTOL Ch. olajos inj. LII.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g dimercaprolum, 0,2 g benzyl. benzoic., oleum pro inj. ad 1 ml tartalmaz.

Javallatok: Nehézfémmérgezések, elsősorban arzén-, arzenobenzol-mérgezés.
Sajátos gyermekgyógyászati javallata: Akrodynia.

Adagolás: Heveny mérgezés esetén első nap 4—6-szor 1 amp., a 2—4. napon 3×1 amp., az 5—6. napon 1 amp. Befecskendezés mélyen, *intraglutaealisan*.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 3—2 mg/kg/dos. i. musc., 2—6-szor naponta (a naponkénti injekciók számát fokozatosan csökkentjük 6-ról 2-re, kb. 10 nap alatt).
Vaskészítmény adása egyidejűleg contraindikált.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10×1 ml amp. 43,40 Ft.

DIENOESTROL B. tabl. 0,5 mg és 2,5 mg XXXIV.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 mg, ill. 2,5 mg dienoestrol.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Tabl. 0,5 mg-os:* Menopausa, amenorrhoea, sterilitas, uterus-hypoplasia, lactatio megakadályozása.
Tabl. 2,5 mg-os: prostata-cc., mamma-cc.-ból eredő csont-metastasisok.

Ellenjavallat: Rákos hajlamosságra valló családi anamnesis. Praeclimacteriumos, rendszertelen menstruatio esetén csak szövettani diagnosis után javallható.

Adagolás: Menopausa enyhe tüneteinek kezelésében per os a szakaszos adagolás célszerű, pl. első héten napi 3×1 tabl. (0,5 mg-os), a második héten napi 2×1 tabl. (0,5 mg-os), a harmadik héten napi 1 tabl. (0,5 mg-os). Ezután néhány heti szünet, amíg a tünetek újra nem jelentkeznek. Néha kisebb adagok is elegendőek. Súlyosabb tünetek (ízületi folyamatok, psychés állapot, hypertonia stb.) kezelése esetén nagyobb adag, a fenti adagok kétszerese is indokolt lehet.

Amenorrhoea esetén az adagolásra a tüszőhormonkezelésben követett általános irányelvek a mértékadók. Ajánlatos naponta 4×1 tablettát (0,5 mg-os) három héten át adni. Egy heti szünet után az adagolás megismételhető.
Sterilitas esetén, amennyiben azt genitalis hypoplasia okozza, napi 2 tabletta (0,5 mg-os), mindenkor a ciklus egyik felében adandó.
Lactatio megállítására az első három napon át 3×2 tabl. (0,5 mg-os) szükséges a tejelválasztás megszűnéséig.

2,5 mg-os tabl.: Férfiaknak (prostata-cc.) a kívánt gyógyszerhatás eléréséig (6—8 hét) naponta 6—8! tabletta 2,5 mg-os, azaz 15—20 mg. Azután elegendő napi 3! 2,5 mg-os tabletta. Kedvező visszafejlődés esetén az oestrogen-szint napi 1 2,5 mg-os tablettával is fenntartható. Műtétre, alkalmatlan, főleg öregkori prostata-hypertrophiás vizeletürítési panaszok esetében naponta 3×1! 2,5 mg-os tabl.

szedése elegendő. A dysuriás panaszok enyhülése után naponta 1 2,5 mg-os tabl.
Nőknek: Climax-koron túli emlőrákból kiinduló csontáttételes megbetegedésekben 4—6 héten át napi 6—8 2,5 mg-os tabletta. Huzamosabb szedés után beálló hormontelítettség esetén — ha menstruatiós tünetek stb. jelentkeznek — a napi adagot csökkenteni kell vagy a készítmény szedését abba kell hagyni, ill. tesztoszteron adagolásával kell ellensúlyozni. Climax-koron belüli nőknek olyan esetben adjuk, ha a tesztoszteron-kezelés nem járt eredménnyel.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 5 év.
Egy 2,5 mg-os tabl. a legnagyobb egyszeri adagnál (2 mg) többet tartalmaz!

Csomagolás: 20 tabl. 0,5 mg 3,70 Ft,
50 tabl. 2,5 mg 20,50 Ft.

DIENOESTROL B. XXXIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,02 g dienoestrol.-ot tartalmaz 20 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Az ovarium dysfunctiójából eredő tünetek percutan kezelésére: ciklikusan fellépő ekzemák, pruritus, kraurosis vulvae, acne vulgaris és rosacea, ulcus cruris, fagyási sérülések.

Ellenjavallatok: Nem hormonális eredetű elváltozások (tbc, cachexia).

Adagolás: Ciklikusan jelentkező ekzemákra, pruritus és kraurosis esetén a hüvelybemenetet éjszakára és szükség szerint reggel is kenőccsel be kell kenni. Acne vulgaris és rosacea esetén a beteg területet hasonlóan kezeljük. Az emlőbimbó-rhagadok kezelésére bórsavoldatos lemosás után kb. babnyi mennyiségű kenőccsel bevont steril gézlemezt teszünk az emlőbimbóra; colpitis vetularum esetén kenőccsel fedett tampont helyezünk a hüvelybe. A vérkeringési zavarok folytán nehezen gyógyuló fekélyeket (ulcus cruris) és a fagyási sérüléseket a seb környékének megtisztítása után a kenőccsel bevont steril gézlemezzel fedjük. A kötést naponta váltjuk a teljes behámosodásig. Gyógyulás esetén (sarjképződés) néhány napig közömbös kenőcsre térünk át, azután ismét az előbbit alkalmazzuk.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,— Ft.

DIGOXIN K.Gy. XIV.
cseppek 0,1%, inj. 0,5 mg, tabl. 0,25 mg

Összetétel: 1 üveg 15 mg digoxin.-ot tartalmaz propilénglikol tartalmú szeszes-vizes oldatban.
1 amp. (2 ml) 0,5 mg digoxin.-ot tartalmaz propilénglikol tartalmú szeszes-vizes oldatban.
1 tabl. 0,25 mg digoxin.-ot tartalmaz.

Javallatok: A keringési elégtelenség (cardialis decompensatio) helyreállítása és a compensatio fenntartása.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Tachycardiával járó szívelégtelenség valamennyi formája, amelyben gyors digitalis-hatás kívánatos.

Adagolás: A compensatio helyreállítására az első (esetleg a második) napon nagyobb adag 2—2½ ampulla i. ven., illetve 40—60 csepp, illetve 4—6 tabletta alkalmazható. Az adagot a következő napokban csökkenteni helyes akkor is, ha semmilyen toxikus jelenség nem mutatkozik. A helyreállított compensatio fenntartására általában napi 10—20 csepp, illetve 1—2 tabletta szükséges. Tekintettel arra, hogy a Digoxin gyorsan eliminálódik és nem kumulálódik, a fenntartó kezelés során szünetek beiktatása nem indokolt, csak intoxicatiós jelenségek felléptekor.
Gyermekadagok: Digitalizáló v. telítő adag (2 hónapos kortól 14 éves korig): Per os: 2—1 csepp/kg. I. musc. vagy i. ven.: 0,1—0,08 ml/kg.
Gyors digitalizáláshoz a fenti összmennyiséget általában 48 óra alatt adjuk be úgy, hogy az első adag az összmennyiségnek kb. egyharmada (esetleg fele) legyen, a fennmaradt mennyiséget pedig egyenlő adagokra elosztva alkalmazzuk, 6—8 óránkénti adagokban.

Lassú digitalizáláshoz a telítő adag összmennyiségét 5—7 nap alatt adjuk be, napi 3—4 egyforma adagban.
Fenntartó adag: Mindhárom korcsoportban általában a telítő adag egynegyede.

Mellékhatás: Hányás, szédülés, látászavar, bradycardia, bigemin pulzus, extrasystolia.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 1 üveg 15 ml 21,30 Ft;
5×2 ml amp. 10,50 Ft;
50 tabl. 14,40 Ft, 250 tabl. 60,50 Ft.

DIOTILAN Ch. XXIV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g natr. dioctyl-sulfosuccin.-ot tartalmaz.

Javallat: Obstipatio.

Adagolás: Felnőttek átlagos adagja esetenként 1—2, esetleg 3 tabl., gyermekeknek ¼—½ tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 3,60 Ft.

DIPANKRIN K.Gy. XXI.
bélben oldódó drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,15 g pancreatin, 0,05 g duodenum sicc.-ot tartalmaz.

Javallatok: Achylia gastrica, dyspepsiák, a pancreasműködés csökkenésével vagy kiesésével járó emésztési zavarok, hasmenés.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé étkezés közben.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 30 drazsé 6,— Ft, b. 100 drazsé 20,— Ft.

DIPHEDAN E.Gy.T. III.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g phenytoin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepsia.

Adagolás: Napi 1 tabl.-ról emelkedve napi 3-szor, esetleg 4—5-ször 1 tabl.-ig. *Gyermekeknek* 4 éves korig 2×¼, 6 éves korig 4×¼, 12 éves korig 2×1 tabl. A beállítás ideje alatt Sevenal adandó. Csak orvosi felügyelet mellett szedhető! Bőrtünetek jelentkezésekor az adagot csökkenteni kell vagy a kezelést abba kell hagyni.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 25 tabl. 8,20 Ft.

DITHESCOP B. V.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hydrochlor., 30 mg aethylmorph. hydrochlor., 0,4 mg scop. hydrobrom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Narcosis bevezetése, elmebeteg erős motorikus izgalma, fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Szükség szerint 1 amp. s. cut.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 16,70 Ft.

DITYRIN Ch. XXXII.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 25 mg dijodtyrosin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hyperthyreosis, Basedow-kór, alkati soványság, climax.

Adagolás: Naponta 2—4—6 tabl., súlyos esetekben napi 10 tabl.-ig, krónikus intermittáló kezelés a pulzus, testsúly, alapanyagcsere kontrollja mellett.

Általában kétheti kezelés után 5 napos szünet. *Gyermekeknek* másodnaponként 1 tabl. Csak állandó orvosi ellenőrzés mellett adható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 8,40 Ft.

DOLARGAN Ch. V.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 100 mg pethidin. hydrochlor.-ot
1 tabl. 25 mg pethidin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Erős fájdalomcsillapító és görcsoldó: morfin helyettesítésére főleg epe- és vesekólikában.

Adagolás: Napi 1—3-szor 1 tabl. vízben oldva, étkezés után. Szükség szerint napi 1—3-szor 1—2 ml izomba vagy bőr alá. (Venába: 10 ml 10%-os szőlőcukor vagy élettani konyhasóval hígítva, lassan, 2—3 perc alatt.)
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: műtét vagy egyéb, nagy fájdalom enyhítésére 1 mg/kg/dosi s. cut.; az ún. lytikus cocktailban (Hibernallal és Pipolphennel együtt): 2 mg/kg/dosi s. cut. — A tabletta használata a gyermekgyógyászatban kerülendő.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 15,90 Ft, b. 100×2 ml amp. 318,— Ft.
20 tabl. 7,80 Ft.

DOLOR K.Gy. V.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g aethylmorph. hydrochlor., 0,3 g amidazoph., 0,3 g phenacetin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Migraine, fogfájás, neuralgiás fájdalmak.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 13,30 Ft, b. 100 tabl. 133,— Ft.

DOMATRIN Ch. V.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1,5 mg methylhomatrop. brom., 0,84 mg thebain. hydrochlor., 1,5 mg codein. hydrochlor., 1,76 mg papaver. hydrochlor., 9,1 mg noscapin. hydrochlor., 26,8 mg morph. hydrochlor.-ot tartalmaz szeszes vizes oldatban.
1 tabl. 2 mg methylhomatrop. brom., 0,21 mg thebain. hydrochlor., 0,38 mg codein. hydrochlor., 0,44 mg papaver. hydrochlor., 2,28 mg noscapin. hydrochlor., 6,7 mg morph. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Narkózis bevezetése, gyomorbántalmakkal kapcsolatos fájdalmak és görcsök, bélvérzés, epe-, vesekőkólika, dysmenorrhoea, éjjeli izzadás, angina pectoris.

Adagolás: Erős kólikás fájdalmak szüntetésére ½—1 amp., narkózis bevezetésére 1—1½ amp., s. cut. Naponta 2—3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 8,15 Ft, b. 100×1 ml amp. 164,— Ft.
10 tabl. 3,40 Ft.

DOPEGYT E.Gy.T. XVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,282 g methyldopumot (methyldopum 1,5 H_2O alakjában) tartalmaz.

Javallat: Alkalmazása olyan középsúlyos hypertensiv betegeknél javallt, akiknél a hypertensio már hosszabb ideje fennáll, vagy akiknek labilis hypertensiója sedativ therapiára nem reagált. A Dopegyt mind álló, mind fekvő helyzetben csökkenti a vérnyomást. A napi vérnyomásingadozás a szer alkal-

mazásával minimális; munka-hypotensio ritkán fordul elő. Az adag helyes megválasztásával a túlzott mértékű reggeli hypotensio elkerülhető anélkül, hogy a későbbi vérnyomáscsökkenés elmaradna. Hatása általában 12—24 óráig tart és a therapia leállításakor sem jelentkezik hypertensiv kiugrás. Sem a glomerularis filtratiót, sem a vese vérátfolyását nem befolyásolja jelentősen. Alkalmazásakor a perctérfogat rendszerint változatlan marad anélkül, hogy a pulsus-szám szaporodna.

Ellenjavallatok: Alkalmazása phaeochromocytomában szenvedő betegeknél, továbbá aktív hepatitis, veseelégtelenség esetén, valamint terheseknél ellenjavallt.

Adagolás: Adagolása egyéni beállítást igényel. *Kezdő adagja* felnőtteknek általában az első két nap estén-ként egy-egy tabletta, mely adag kétnaponként egy-egy tablettával emelhető a vérnyomás kellő csökkenéséig. A maximálisan alkalmazható napi adag: 8 tabletta. A kellő hatás elérése után — ugyancsak kétnaponként — a napi adag egy-egy tablettával csökkenthető, a megfelelő *fenntartó adagra*. Ez általában napi 2—3 tabletta szokott lenni. A Dopegyt-therapiát az egyéb medicatiók fokozatos elhagyásával célszerű bevezetni, az alkalmazott Dopegyt mennyiségének ugyancsak fokozatos — a kellő therapiás effektust biztosító — emeléséig. Egyéb antihypertensivummal vagy salureticummal kombinálva is adható, ebben az esetben additív hatás érhető el.

Mellékhatások: A therapia kezdetén vagy az adag növelésekor átmeneti sedativ hatás észlelhető. Néha szédülés, fejfájás, gyomor-bél tünetek is előfordulhatnak. Az orthostatikus hypotensio tünetei ritkábbak és enyhébbek, mint egyéb antihypertonicumnál. Enyhe szájszárazság, ritkán nausea is előfordul. Az esetleges oedema thiazid-származék alkalmazásával megszüntethető. Néhány alkalommal a fehérvérsejtszám reversibilis csökkenését észlelték, amely csökkenés elsősorban a granulocytákat érintette. A szer alkalmazásának első hetében depressio, hallucinatio, szórványosan láz jelentkezhet, egyes esetekben a máj-functiós próbák eltérésével együtt (májkárosodásra utaló klinikai jelenséget azonban nem találtak). A gyógyszer megvonása után ezek a tünetek rendszerint, rövid időn belül megszűnnek.

Tartós Dopegyt-kúra során célszerű a direkt Coombs-test (DCT) vizsgálattal ½—1 évenként az esetleges autoimmun haemolytikus anaemia lehetőségét kizárni. — A Dopegyt a katecholamin-próba hamis pozitivitását okozhatja, és így — tévesen — phaeochromocytoma gyanúját keltheti.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak fekvőbeteg-gyógyintézet vagy belgyógyászati szakrendelés javaslata alapján rendelhető, a hypertonia olyan eseteiben, ahol Rausedyl vagy Rausedyl-kombinációk nem vezettek megfelelő eredményre, illetőleg a beteg ezeket nem jól tűri. A vényen a javaslatot adó gyógyintézetet, illetőleg a szakrendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni.

Csomagolás: 50 tabl. 76,— Ft, 200 tabl. 386,— Ft.

DORLOTYN Ch. II. tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g amobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Sedativum, hypnoticum, tartós altatás.

Adagolás: Sedativumként naponta kétszer ¼—½ tabletta, hypnoticumként 1 tabl. lefekvés előtt fél órával. Tartós altatás: Az adagolást 3×1 tabl.-val kezdjük, majd a szükséghez képest emeljük, illetve csökkentjük az adagot a beteg állapotának és tűrőképességének figyelembevételével.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 7,10 Ft, 250 tabl. 65,30 Ft.

EGGOSALIL E.Gy.T. VI. tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g salicylamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hűléses és rheumás megbetegedések, fej-

fájás, és egyéb fájdalmak, lázas állapotok, poly. arthritis.

Adagolás: Naponta 3×2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 30 tabl. 11,10 Ft.

ELASTOSAN B. XLIV.
cinkenyv-pólya

Összetétel: 70—80 g cinkenyvvel impregnált pólya 4% zinc. oxyd., 0,06% natr. choleinic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Ulcus cruris, varicositas, ekzema.

Alkalmazás: A pólyát használat előtt két fapálcára helyezve, néhány percig lefedett edényben gőzölgő víz fölé helyezzük. Utána a pólyát zsindelyszerű menetekkel a megbetegedett végtagrészre csavarjuk. Enyhe simogatásra a pólya anyaga alapjához letapad és egyenletes, rugalmas masszává válik, amelyet 7—14 napig hagyunk a betegen. A pólyát levágással vagy meleg vízben való áztatás után lecsavarással távolítjuk el. Ulcus cruris, nedvező ekzema a pólyázás előtt szárazpárás kötéssel steril-len kötendő.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 pólya 5 m×10 cm 23,90 Ft.

ENTEROSEPTOL E.Gy.T. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g jodchloroxychinolin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Bacillaris és amoebás dysenteria, enterocolitis, erjedéses és rothadásos dyspepsia, nyári hasmenések.

Adagolás: Oralisan felnőtteknek általában 3×1—2 tabletta étkezések után.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig 3—4-szer

¼—½ tabl./die, 1—6 éves korig 3—4-szer ½—¾ tabl./die, 7—14 éves korig 3—4-szer 1—1½ tabl./die.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 16,50 Ft, 250 tabl. 151,60 Ft.

EPHERIT Ch. XV.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,05 g *dl*-ephedr. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 0,05 g *dl*-ephedr. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypotonia, collapsus, fenyegető légzőközponti bénulás, szív-block, asthma, bronchitis chron., emphysema, allergiás bőr- és bélbetegség, tengeribetegség, narcolepsia.

Adagolás: Naponta 3-szor ½—1 tabl. Asthmás roham előtt 1 tabl., roham alatt vagy akut vérnyomásesés megszüntetésére 1 amp. s. cut. Bélrenyheség esetén naponta 2-szer ½ tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 8,30 Ft, b. 50×1 ml amp. 83,— Ft.
b. 20 tabl. 6,40 Ft.

ERGAM K.Gy. XXVI.
inj., cseppek

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,3 mg ergotamin. tart.-ot, 1 üveg 3 mg ergotamin. tart.-ot tartalmaz. 5 ml propilenglikol-tartalmú vizes oldatban. (1 ml = kb. 25 csepp = 0,6 mg hatóanyag.)

Javallatok: *Szülészetben* korai gyermekágyi vérzés (atonia post partum), késői gyermekágyi vérzés, gyermekágyi subinvolutio megelőzésére és kezelésére, abortus incompletus esetén a vérzés csökkentésére, vetélés befejezése után a méh összehúzódásának elősegítésére; *nőgyógyászatban* (a szö-

vettani lelet ismeretében) a vérzés mennyiségének csökkentésére; *bel- és ideggyógyászatban* sympathicotonia, migraine, glaucoma, hyperthyreosis esetén.

Adagolás: Általában naponta 1—2-szer ½—1 ampulla s. cut. vagy i. musc., súlyos esetekben óvatosan, igen lassan, i. ven. A cseppekből naponta 2—3-szor 15—30 csepp.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 2 év, cseppek 1 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 8,75 Ft, b. 50×1 ml amp. 87,50 Ft.
b. I üveg (5 ml) 6,05 Ft.

ERGOMETRIN K.Gy. XXVI.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,2 mg ergometrin. malein.-ot tartalmaz.

Javallatok: Azonnali vérzéscsillapítás a *szülészetben*, a lepényi szakban és azt követően jelentkező atoniás vérzéseknél, sectio caesarea alkalmával a magzat megszületése után, terhességmegszakítás és vetélés befejezése közben előadódó atoniás vérzésnél, a *nőgyógyászatban* menorrhagiák és metrorrhagiák esetén.

Adagolás: 1 amp. i. musc. vagy i. ven.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml 12,— Ft, b. 50×1 ml 120,— Ft.

ERIGON E.Gy.T. XVII.
szirup

Összetétel: 1 üveg 0,044 g codein. hydrochlor., 0,618 g natr. hypophosph., 2,564 g calc. hypophosph., 6,18 g kal. guajacolsulfon.-ot tartalmaz 200 g szirupban.

Javallat: Meghűléses betegségek.

Adagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 1 evőkanállal; gyermekeknek: naponta 3-szor 1 kávéskanállal.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak 12 éven aluli gyermekek részére rendelhető szabadon. Társadalombiztosítás terhére 12 éven felüliek részére nem rendelhető. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — 200 g orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 üveg (200 g) 17,50 Ft.

ERPOZID Ch. XVI.
tabl. és *forte* tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 mg reserpin., 10 mg hydrochlorothiaz.-ot,
1 tabl. *forte* 0,25 mg reserpin., 25 mg hydrochlorothiaz.-ot tartalmaz.

Javallatok: A vese vagy érrendszer megbetegedéseiből eredő, továbbá idegrendszeri, hormonalis és toxikus eredetű hypertoniák, valamint hypertonia essentialis esetei.

Adagolás: A vérnyomás állapotától függően a kúraszerű adagolást naponta 2—3-szor 1—2 Erpozid tabl. vagy napi 2—3-szor ½—1 Erpozid forte tabl.-val célszerű elkezdeni. — A vérnyomáscsökkenés a kezelés 3—4. napján következik be. Ezután az adagot csökkenthetjük, amíg a beteg vérnyomása normalizálódik. Fenntartó adagnak az esetek jelentős részében napi 2×1 Erpozid tabl. már elegendőnek bizonyul. — Huzamos alkalmazáskor ajánlatos az elektrolitszint időnkénti ellenőrzése.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 10,80 Ft, 500 tabl. 47,20 Ft, 50 tabl. forte 13,80 Ft, 500 tabl. forte 76,20 Ft.

ETOPURIN A. XVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,03 g butobarbital., 0,1 g theophyllin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, szív-neurosis, migraine, arteriosclerosis, climaxos vasoneurosis, hypertonia.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 tabl. 11,40 Ft, 100 tabl. 46,10 Ft.

ETOVAL A. tabl. II.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g butobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Sedativum, hypnoticum, antiepilepticum.

Adagolás: Mint sedativum napi 2—3-szor ½ tabletta, mint altatószer este lefekvés előtt 1—2! tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 63,— Ft.

ETOVALETTA A. tabl. II.

Összetétel: 1 tabl. 0,03 g butobarbitalum.-ot tartalmaz.

Javallatok: A centralis idegrendszer izgalmi állapotai, neurasthenia, hysteria, hypertonia, essentialis angina pectoris, asthma cardiale, migraine.

Adagolás: Napi 2—3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható.

Csomagolás: b. 30 tabl. 6,30 Ft, b. 100 tabl. 21,— Ft.

EXACTHIN K.Gy. inj. XXXIII.

Összetétel: 1 szárazampulla (2 ml) 40 NE corticotropinumot tartalmaz. A készítményhez oldószer és kicsapószer van mellékelve.

Javallatok: Akut túlérzékenységi állapotok (súlyos szérumbetegség, angioneurotikus oedema, gyógyszerérzékenység), shock, status asthmaticus, asthma bronchiale, rheumás láz, carditis et polyserositis rheumatica, rheumatoid arthritis akut fellángolása, agranulocytosis, periarteriitis nodosa, hypophysis hypofunctiója (Simmonds-kór), égési shock, lupus erythematodes disseminatus acutus, dermatitis exfoliativa, pemphigus, allergiás ekzema, ophthalmia sympathica, iritis, iridocyclitis, uveitis, keratitis, scleritis, episcleritis.

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi et duodeni aktív szaka. Cushing-kór, osteoporosis, decompensatio cordis, arteriosclerosis, hypertonia, diabetes mellitus. Tuberculosis és egyéb fertőző betegségek. (Ha feltétlenül szükséges, úgy megfelelő antibioticummal.) Psychosis, psychoneurosis.

Adagolás: A mellékelt II. jelzésű oldószerben oldjuk az I. jelzésű szárazampulla tartalmát, majd oldás után a III. jelzésű ampulla tartalmával kicsapjuk az oldott anyagot és intramuscularisan injiciáljuk. Retard ACTH alkalmazásával 24 órán át állandó ACTH-szint biztosítható. Az esetek súlyossága szerint naponta 40 NE, súlyosabb esetekben 80 NE adása ajánlható intramuscularisan. A hatás beálltakor az adag fokozatosan mindaddig csökkenthető, míg a kórtünetek visszatérése nem észlelhető. Recidiva esetén ismét magasabb dosisokat adagolunk. *Kizárólag csapadékos formában intramuscularisan injiciálható.*

Melléktünetek: Cukorvizelés, testsúlyemelkedés, oedema, vérnyomásemelkedés jelentkezhet. Cushing-kór egyes tünetei is felléphetnek. (Holdvilágarc, hirsutismus, osteoporosis, striák.) A készítmény azoknál a betegeknél, akik előzőleg parenteralisan már állati fehérjét, főleg ACTH-t vagy hypophysis-hormont kaptak, túlérzékenységi reakciót válthat ki. Ezért alkalmazása előtt minden esetben indokolt az esetleges túlérzékenységet bőrpróbával megállapítani (a készítményhez mellékelt utasítás szerint). A túlérzékenységi próba minden újabb kúra előtt megismétlendő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendelhetik, körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott időtartam, de legfeljebb 4 héten belül történő gyógykezelés céljából. A vényen a javaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézet) és a javaslat keltét is fel kell tüntetni. A *vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 5×1 szárazampulla (+ II-oldószerampulla + III-kicsapószer-ampulla) 95,50 Ft, 50×1 szárazampulla (+ II-oldószerampulla + III-kicsapószer-ampulla) 955,— Ft.

EXANGIT E.Gy.T. XVII.
drazsé, inj.

Összetétel: 1 drazsé 0,05 g benzonatatum.-ot, 1 amp. (2 ml) 0,01 g benzonatatum.-ot tartalmaz.

Javallatok: Acut és chronikus bronchitisek és bronchitis-syndroma aetiologiáját képező megbetegedések: influenza, hűléses hurut, kanyaró, pertussis, pneumonoconiosis, cardialis decompensatio, tuberculosis, tüdőgennyesedések, bronchiectasia, bronchopneumonia, tüdő-mycosis, emphysema, pneumonitis, tüdő-carcinoma stb.
Javallt asthma bronchiale esetén is; ilyen betegnek ugyanis tilos beszednie minden olyan gyógyszert, amely a légzési ingert csökkenti és a respiratiót gátolja. Továbbá idegen test, vagy a belélegzett gázok által okozott bronchus-irritatio, valamint bronchoscopos vagy bronchographiás beavatkozások. A pleura irritatióját előidéző folyamatok: pleuritis sicca, pleuritis exsudativa vagy spontán pneumothorax és mindennemű pleuralis beavatkozás, mint pl. művi pneumothorax, pleura-punctio és a pleurán végzett műtétek után, utókezelésre. Műtét előtt és után köhögés csillapítására és megszüntetésére is javasolják.
Akut esetekben — a prompt hatás biztosítása érdekében — a kezelést célszerű parenteralisan kezdeni, majd oralis kezeléssel lehet kiegészíteni vagy folytatni.

Adagolás: *Paranteralisan* az inj. napi adagja nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek 1—3×1 amp. s. cut. vagy i. musc., ill. 1—2×1 amp. lassan i. ven. Gyermekeknek naponta 1—2-szer az alábbi adagolás szerint:

6 kg alatt	0,3 ml = 1,5 mg
1 éves korig	0,4 ml = 2,0 mg
3 éves korig	0,5 ml = 2,5 mg
6 éves korig	0,8 ml = 4,0 mg
6 év felett	1—1,5 ml = 5,0, ill. 7,5 mg

Per os: felnőtteknek és nagyobb gyermekeknek naponta 2—3×2—4 drazsé, kisgyermekeknek naponta 2—3×1—2 drazsé. A drazsét egészben kell lenyelni, mert szétrágáskor — időlegesen — érzésteleníti a száj nyálkahártyáját.

Mellékhatások: Ritkán fellépő és az alkalmazás megszüntetésével rövid időn belül elmúló somnolentia, nausea, bőrtünetek, tachycardia.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Lejárati idő: inj. 3 év. — 20 drazsé orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 10×2 ml amp. 9,80 Ft, 100×2 ml amp. 89,— Ft.
20 drazsé 8,— Ft.

EXCORIATIN B. XLIV.
old.

Összetétel: 1 üveg (30 g) 0,003 g isooctylhydrocuprein. hydrochlor., 0,003 g tyrosin., 0,75 g acid. tannic.-ot tartalmaz szeszes glicerines oldatban.

Javallatok: Decubitus, erosio, nedvező ekzema.

Adagolás: A beteg testfelületet beecsetelni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (30 g) 7,10 Ft.

EXPECTIN B. XVII.
cseppek

Összetétel: 1 üveg (10 g) extr. fluid. spir. (e thymi

vulg. herb. 2,5 g, primul. rad. 2,5 g, glycirrhizin. depur. 0,3 g)-ot tartalmaz.

Javallat: Köptető.

Adagolás: Felnőtteknek 3-szor 20 csepp naponta. *Gyermekeknek* naponta 3×3—10 csepp.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (10 g) 5,60 Ft, 1 üveg (100 g) 14,— Ft.

FAGIFOR B. XVII.

szirup

Összetétel: 1 üveg (150 g) 0,4 aethereol. cinnam., 0,8 mg aethereol. menth. pip., 15 mg menthol., 0,03 kreosot., 0,21 g ferr. lact. (= 40,7 mg Fe^{II}), 1,03 g calc. acet.-ot tartalmaz.

Javallat: Köptető.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3×1 evőkanállal, gyermekeknek naponta 3×1 kávéskanállal.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (150 g) 7,10 Ft.

FEDIBARETTA Ch. III.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. phetbarbitalumot tartalmaz.

Javallatok: Csecsemők és kisgyermekek bizonytalan eredetű görcsös állapotában, illetve olyanoknál, akiknél már előfordult lázas görcsroham, továbbá genuin, psychomotoros és symptomás (focalis) epilepsia, status epilepticus, hypermotilitas; szülési traumát követő és hyperthermiára hajlamos, valamint hydrolabil állapotok; neuropatha csecsemők gyakori és heves sírásával összefüggő hyperventillatiós görcsök, pavor nocturnus, neurogen fejfájás stb. esetén. — Petit mal rohamok kezelésére csak más gyógyszerrel kombinálva.

Adagolás: Átlagos adagja csecsemőknek és gyermekeknek kúraszerű alkalmazással naponta testsúly-kg-onként 0,02 g (pl. 20 kg-os átlagsúlyú gyermek adagja naponta 0,4 g). — Szükség esetén más antiepilepticumokkal is kombinálható. — Az adagolás megszüntetése, vagy más antiepilepticumra való áttérés csak fokozatosan történhet!

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 5,90 Ft, 200 tabl. 46,40 Ft.

FERCUPAR K.Gy. XIX.

drazsé, szirup

Összetétel: 1 drazsé 1 μg cyanocobalamin., 0,4 mg cupr. chlor. oxydul., 70 mg ferr. sulf. oxydul. (= 14 mg Fe^{II}), 150 mg hepatis extract. sicc.-ot (= 0,9 g hepar recens) tartalmaz.
1 üveg 100 μg cyanocobalamin., 0,7 g ferr. sulf. oxydul. (= 14 mg Fe^{II}), 2,4 g acid. ascorbic., 4 g hepatis extr. sicc.-ot (= 24 g hepar recens) tartalmaz 250 g szirupban.

Javallatok: Vashiányos és perniciosa típusú anaemiák, fokozott vasszükséglettel járó állapotok: graviditas, lactatio, koraszülés, fertőző és egyéb betegségek utáni reconvalescentia, dumping-syndroma, felszívódási zavarok következtében létrejövő másodlagos anaemiák, gyomorműtétek utáni hypochrom anaemiák, sprue, coeliakia, enteritis (amikor már a felszívódást gátló hasmenés lényegesen enyhült vagy megszűnt) és bélférgesség okozta anaemiák, toxikus anaemiák, csecsemő- és gyermekkori alimentaris anaemiák, vérvesztéses állapotok stb.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 3 drazsé. Nagyobb gyermekeknek naponta 5—6 drazsé. Kisebb gyermekeknek naponta 3 drazsé.
A szirupból felnőtteknek naponta 3-szor 1—2 evőkanállal evés után. Csecsemőknek 2—3-szor ½ kávéskanállal, gyermekeknek 2—3-szor 1—2 kávéskanállal evés után.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a tabl. csak abban az esetben rendelhető, ha az adott

esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. A szirup társadalombiztosítás terhére csak hatéves életkoron aluli gyermekek részére rendelhető, társadalombiztosítás terhére idősebbnek nem rendelhető. — A szirup lejárati ideje: 1 év. — 100 drazsé és 250 g szirup orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 100 drazsé 17,50 Ft, 500 drazsé 65,30 Ft, 1 üveg (250 g) szirup 16,50 Ft.

FERROPLEX B. XIX.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,03 g acid. ascorb., 0,05 g ferr. sulfur.-ot tartalmaz (= 10 mg Fe^{II}).

Javallatok: Vasszegény anaemia, reconvalescentia, anaemia perniciosában a máj-therapia kiegészítése.

Adagolás: Felnőtteknek: naponta 3-szor 2 drazsé. Főleg an- és hypacid egyéneknek nikotinsav egyidejű alkalmazása ajánlható.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig 3-szor 1 drazsé/die, 1—6 éves korig 4-szer 1 drazsé, 7—14 éves korig 3-szor 2 drazsé/die.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 5 év.

Csomagolás: 100 drazsé 12,80 Ft, 500 drazsé 48,— Ft.

FOLSAV A. XIX.
tabl. 3 mg

Összetétel: 1 tabl. 3 mg acid. folic.-ot tartalmaz.

Javallat: Hyperchrom macrocytás anaemia, B_{12}-vitaminra rosszul reagáló anaemia perniciosa, sprue, táplálkozási, terhességi, csecsemőkori macrocytás anaemia.

Adagolás: Lökésszerű adagolásra a kezelés elején napi 100—200 mg. Kúraszerű adagolásra napi 15—20 mg. A kúra ideje 2—3 héttől 2 hónapig, sőt tovább

is terjedhet. Időtartamát az időközönként végzett vérképkontroll szabja meg.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 50 tabl. 41,70 Ft.

FONURIT Ch. XXV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g azetazolamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Diureticum cardialis oedemák levezetésére; decompenzált cor pulmonale, balkamra-elégtelenség, valamint a keringési elégtelenség más formáiban és máj-cirrhosis esetében. Glaucoma, annak mind az akut rohamokkal járó, mind secundaer formája; epilepsia.

Adagolás: Keringési elégtelenségekben átlagos adagja naponta, illetve másodnaponként 1 tabletta. Ez az adag hetenként három ízben megismételhető. Az adagok emelésétől általában nem várható nagyobb hatás. Szükség esetén higanyos diureticumokkal kombinálható. A Fonurit tabl. adagolásakor a vizelet savanyítására használatos készítményeket ne alkalmazzuk. Glaucomában műtéti előkészítésre, a műtét előtti este 2 tabl., secundaer glaucomában reggel 4-szer ½ tabl. 1—1 órás időközökben, szükség esetén több hónapon át. Epilepsiában a kezdő napi adag 2-szer ½ tabl., amely szükség esetén 10 mg/testsúlykg-ig fokozható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 20 tabl. 36,40 Ft, 250 tabl. 417,50 Ft.

FRENOLON E.Gy.T. IV.
drazsé, inj.

Összetétel: 1 drazsé 5 mg metofenazatumot tartalmaz

(6,9 mg metofenazatum difumaricum alakjában), 1 amp. 5 mg metofenazatumot (6,8 mg metofenazatum diaethansulfonicum alakjában) tartalmaz.

Javallatok: *Psychiatriában* a schizophrenia paranoid, hebephren, cataton formáinak különösen akut és krónikus esetei, schizoform reakció, mania akut alakjai, oligophrenia izgalmi állapotai, cerebrovascularis insufficientiával kapcsolatos psychosisok. *Ideggyógyászatban:* anxietassal, ingerlékenységgel, psychomotoros hyperactivitassal, emotionalis zavarral színezett különböző eredetű neurosisok, különösen organikus eredetű szorongásos állapotok, „szerv-neurosisok" stb.
Belgyógyászatban, csecsemő- és gyermekgyógyászatban, sebészetben, gyermeksebészetben, urológiában, szemészetben, orr-fül-gégészetben, szülészet-, nőgyógyászatban és onkológiában nyugtatásra, hányáscsillapításra, műtétek és orvosi beavatkozások előkészítésére önmagában vagy adjuvánsként.

Ellenjavallatok: Epilepsia, depressio, leukopenia, súlyos vese- és májártalom, barbiturat, alkohol, narcoticum okozta coma.

Adagolás: Általában 3-szor 1—2 drazsé a felnőtt napi adagja, de psychiatriai kórképekben a napi dosis 3-szor 1—4 drazséig, sőt egyes esetekben a napi adag 3-szor 6 drazséig is emelhető. Az inj.-ból általában 3-szor 1—2 amp. (i. musc.) a felnőtt napi adagja, de psychiatriai kórképben a napi dosis 3-szor 1—4 ampulláig emelhető. — Szükség esetén egyénileg megállapított fenntartó adag (2—6 drazsé pro die) hosszú ideig adható. Heveny psychomotoros nyugtalansággal, agressióval jellemzett kórképekben helyes a Frenolont 3—4 napig kezdeti tompító hatású neurolepticummal (pl. Hibernal) kombinálni.
Csecsemő- és gyermekgyógyászatban az optimális adag napi 1—2 mg/kg, 3—6 részletre osztva, oralisan.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések (gondozóintézetek) szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (gondozóintézet, fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott

időtartam, de legfeljebb a javaslat keltétől számított két hónapon belül történő gyógykezelés céljából. A javaslatot adó szakrendelést (osztályt) és a javaslat keltét a vényen fel kell tüntetni.

Csomagolás: 50 drazsé 14,50 Ft.
5×1 ml amp. 8,20 Ft.

FUNGIFEN E.Gy.T. XLVI.
oldat

Összetétel: 1 üveg 0,5 g pentachlorphenol.-ot tartalmaz 50 g szeszes oldatban.

Javallat: Interdigitalis láb-mycosis, a nagyhajlatok gombás elváltozásai, ekzema és dyshidrosiform mycosis, piheszőrös területek gombás folyamatai, csecsemők epidermo- és trichophytiája, mély trichophytia (szakáll, bajusztáj, hajas fejbőr).

Ellenjavallatok: Vesegyulladás vagy nagy testfelületen nedvező folyamat.

Adagolás: A beteg bőrfelszínt naponta 1—2-szer Fungifen-oldattal átitatott vattával enyhén bedörzsöljük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 13,— Ft.

GAPONA E.Gy.T. X.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,5 mg N-methyl-tropinium xanthen-9-carboxylic. bromat. (Gastrixont), 50 mg bencyclan. hydrogenfumaric.-ot (Halidort);
1 tabl. 1 mg N-methyltropinium xanthen-9-carboxylic. bromat., 150 mg bencyclan. hydrogenfumaric., 1 mg benactyzin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallat: az ulcus-betegség különböző, főként hyperaciditással járó formái, ennek heveny és idült szakaszai: a gyomor-bél tractus hypermotilitásával járó gastrointestinalis megbetegedések, pl. colitis spastica, enterocolitis, cholecystopathia; húgyúti simaizom-spasmusok, ill. köves rohamok.

Ellenjavallat: glaucoma, myasthenia gravis, hypotonia, prostata-hypertrophia.

Adagolás: *akut kezelés* esetén a szokásos napi adag 3×1—2 tabl., közvetlenül étkezés után. Prompt hatás céljából vagy ha az oralis alkalmazást hányinger, hányás stb. akadályozza, napi 1—2-szer ½—1 ampulla adható i. musc., i. ven.; a beadás helyét váltogatva, mert localis érzékenységet, esetleg szövetkárosodást (thrombophlebitist) okozhat. A keringés és légzés súlyos zavarában, collapsus-hajlam esetén, a parenteralis adás óvatosságot igényel. *Krónikus kezeléskor* az első napokban a szokásos adag 3×1—2 tabletta közvetlenül étkezés után, majd—szájszárazság jelentkezésekor—a gyógyszer eddigi mennyiségét felére-harmadára kell csökkenteni. Ilyenkor általában napi 2—3-szor ½ tabletta is elegendő. A Gapona-kezelés során az alkoholfogyasztást kerülni kell. Magasban dolgozók és gépjárművet vezetők a Gapona tablettát kizárólag orvosi ellenőrzés mellett, az egyéni érzékenység figyelembevételével megállapított adagban szedhetik. A terhesség első harmadában a készítmény alkalmazása nem ajánlatos.

Mellékhatás: száj- és torokszárazság, mydriasis; *ritkábban:* tensio-csökkenés, álmatlanság, accomodatiós zavar, mérsékelt tachycardia és palpitatio cordis; *kivételesen:* hólyag-tenesmus, obstipatio, erythema, nausea.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő inj.: 2 év.

Csomagolás: 10×2 ml amp. 11,50 Ft, 100×2 ml amp. 105,80 Ft.
20 tabl. 17,90 Ft, 200 tabl. 167,70 Ft.

GASTROPIN E.Gy.T. X.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 2 mg xenytropium bromat., 200 mg urethanumot tartalmaz.

Javallatok: A gyomor-bélhuzam motoros és secretiós funkciójának zavarai (gastritis, ulcus ventriculi és duodeni, cholecystopathia, colitisek, spasmus pylori, meteorismus), ezenkívül a húgyutak, valamint a méh simaizomzatának görcsével járó állapotok, az ureter és húgyhólyag görcsei, dysmenorrhoea.

Adagolás: Egyszeri adagja 1 ampulla, egynapi adagja 3×1 ampulla s. cut. vagy i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 10×1 ml 16,20 Ft, 100×1 ml 115,20 Ft.

GASTRIXON E.Gy.T. X.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg N-methyltropinium xanthen-9-carboxylic. bromat.-ot,
1 tabl. 2 mg N-methyltropinium xanthen-9-carboxylic. bromat.-ot tartalmaz.

Javallatok: Az ulcus-betegség különböző, főként hyperaciditással járó formái és heveny szakai. A gyomor-bél tractus hypermotilitásával járó gastrointestinalis megbetegedések, pl. colitis spastica, hasmenést okozó enterocolitis stb., cholecystopathia. Fájdalomcsillapítóként húgyúti simaizomspasmusok, ill. kőrohamok esetén alkalmazható. Kőrohamok (cholelithiasis, nephrolithiasis) blockolására a Gastrixon csak az esetek kb. 60—70%-ában elegendő önmagában, hatástalansága esetén egyéb spasmolyticumok, esetleg opiatok adása szükséges.

Ellenjavallatok: Glaucoma, myasthenia gravis, hypotonia, prostata-hypertrophia stb.

Adagolás: Átlagos napi adagja: 3-szor ½—1½ tabl. (3—9 mg) étkezés után, 2—3-szor 1 ampulla (1—1,5 mg) i. musc.

Mellékhatások: Száj- és torokszáradás, ritkábban mydriasis, mérsékelt tachycardia, palpitatio cordis, accomodatiós zavar, hólyag-tenesmus, ill. enyhe vérnyomásesés és kivételesen erythema. A mellékhatások rendszerint elmúlnak, ha az adagot csökkentjük; a Gastrixon-kezelés leállítására csak kivételesen lehet szükség.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10×1 ml amp. 11,90 Ft, 100×1 ml amp. 105,— Ft.
20 tabl. 5,70 Ft, 200 tabl. 32,— Ft.

GENTICID E.Gy.T. XLVIII.
bélben oldódó drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,02 g methylrosanilin. chlor.-ot (genciánibolya) tartalmaz.

Javallatok: Oxyuris (enterobius) vermicularis, ankylostoma.

Ellenjavallatok: Súlyos szív-, máj- és vesezavarok.

Adagolás: A drazsékat mindig étkezés előtt — szétrágás nélkül — egészben (vízzel vagy tejjel) nyeljük le. Felnőttek napi adagja: 3×3 drazsé 8 napon át megszakítás nélkül, majd 1—3 heti szünet után szükség esetén ismét 1 héten keresztül.
Gyermekek napi adagja (a napi adag félannyi drazsé, ahány éves a beteg gyermek): 4 éves gyermeké napi 2×1 drazsé; 6 éves gyermeké napi 3×1 drazsé; 12 éves gyermeké napi 3×2 drazsé.
A Genticid-kúrát tisztasági rendszabályokkal egészítsük ki. Ha enterobius (oxyuris) mellett ascarissal is fertőzött a beteg, úgy a Genticid-kúra előtt az utóbbi férgeket hajtsuk el.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 drazsé 11,80 Ft.

GERMICID E.Gy.T. VI.
tabl., gyermekkúp

Összetétel: 1 tabl. 0,336 g amidazoph., 0,164 g acid. *o*-oxychinolinsulfon.-ot;
1 gyermekkúp (1,47 g) 0,168 g amidazoph., 0,082 g acid. *o*-oxychinolinsulfon.-ot tartalmaz.

Javallatok: Influenza, hűléses betegségek, lázcsillapítás, rheuma, myalgia.

Adagolás: Naponta 3×1—2 tabl.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig ½ gyermekkúp 3-szor naponta; 1—14 éves korig 3—5-ször 1 gyermekkúp naponta.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére a tabletta és a gyermekkúp szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 11,70 Ft, b. 100 tabl. 117,— Ft; b. 6 gyermekkúp 9,40 Ft, b. 100 gyermekkúp 156,70 Ft.

GEROSAN B. XLIII.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g menthol., 1 g camphor., 2 g aciphenochinolin. lith., 2 g methyl. sal.-ot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallat: Rheumás fájdalmak esetén bedörzsölésre.

Adagolás: Este-reggel mogyorónyit az előzőleg szappannal és meleg vízzel megtisztított bőrbe bedörzsölni és melegen tartani.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 g orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 12,80 Ft.

GEROVIT E.Gy.T. XXXI/XXXVII.
kapszula

Összetétel: 1 kapszula 75 NE ergocalciferol. (D_2-vitamin), 250 NE axerophth. (A-vitamin 0,5 mg axerophth. conc. alakjában), 0,5 cyanocobalamin. (B_{12}-vitamin), 0,25 mg pyridox. hydrochlor. (B_6-vitamin), 0,5 mg methandriolum, 0,75 mg thiaminum hydrochlor. (B_1-vitamin), 1 mg riboflav. (B_2-vitamin), 1 mg tocoph. acet. (E-vitamin), 2,5 mg menachin. natr. bisulf. (K-vitamin), 15 mg nicotinamid., 50 mg acid. ascorb. (C-vitamin), 100 mg cholin. jod.-ot tartalmaz.

Javallatok: Mindazon időskori kórállapotok, amelyekben csökkent a vitaminok bevitele vagy hiányos a

felszívódása, ill. fokozott a vitaminfelhasználás: így a savhiánnyal járó gastritis, idült enteritis és colitis; a diétás megszorítással járó betegség az idős korban (ulcus ventr. et duodeni, diabetes mell. stb.), továbbá öregkori hyperthyreosis, praesenilis és senilis csontelváltozás (osteoatrophia, osteoporosis). Idősebb korúak testi és szellemi kimerültsége, hypoproteinaemiája, reconvalescentiája, műtéti elő- és utókezelése.

Adagolás: Napi 3×1—2 kapszula, előrehaladott korúaknak napi 4 kapszula. Átlagos 4 heti szedés után 10—14 nap szünet beiktatásával a kúra azonos tartammal folytatható és 2—3-szor megismételhető.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. — 20 kapszula orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 kapszula 15,— Ft.

GLANDUCORPIN K.Gy. XXXIV.
olajos inj. 10 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 mg progesteron.-ot tartalmaz.

Javallatok: Poly-, hypermenorrhoea, dysmenorrhoea, serdüléskori, praeclimacteriumos és gyermekágyi vérzések, terhességi hányás, sterilitas, habitualis abortus, hyperfolliculianaemia.

Adagolás: 1—2 naponként 1 ampulla i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Az oldatban esetleg látható kiválás az ampulla meleg vízbe helyezésével néhány perc alatt oldódik, csak kizárólag kristálytiszta oldat használható. — Lejárati idő: 5 év.

Csomagolás: b. 3×1 ml. amp. 57,80 Ft, 50×1 ml amp. 859,20 Ft.

GLANDUITRIN K.Gy. XXXIII/XXVI.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10 NE hypophys. partis. post. extr., 3 mg chlorbutanolumot tartalmaz.

Javallatok: *Szülészet:* a szülés bevezetésére, fájásgyengeség esetén a tágulási és kitolási szakban. Gyermekágyi subinvolutio megelőzésére és vérzések csillapítására, abortus incompletus.
Sebészet: postoperativ bélhűdések, postoperativ vizelet-retentio. — Diabetes insipidus.

Adagolás: Szülészetben fájásgyengeség esetén elaprózott gyakori adagok, 0,2—0,5 ml ½—1 óránként i. musc. Sectio caesariában 1 ml az uterus izomzatába. Egyébként 1 ml s. cut. vagy i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 10 NE 10,50 Ft, b. 50×1 ml amp. 10 NE 105,— Ft.

GLICERINES végbélkúp B. XXIV.
2 g és 3 g

Összetétel: 1 kúp (2, ill. 3 g) 0,16 g, ill. 0,25 g sapo stearin., 1,64 g, ill. 2,46 g glycerin.-ot tartalmaz.

Javallat: Székelési inger kiváltására.

Adagolás: Szükség esetén gyermekeknek 1, felnőtteknek 1—2 kúpot.

Megjegyzés: b. 10×2 g 5,70 Ft, b. 25×2 g 14,30 Ft, b. 10×3 g 7,60 Ft, b. 25×3 g 19,— Ft.

GLUCOSUM E.Gy.T. XXXVI.
inj. 20% és 40%

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 2, ill. 4 g glucosum pro infus.-t tartalmaz.

Javallatok: Hypoglykaemia, agy- és tüdő-oedema, cardiomyopathia, májbetegségek, ólom-, arzén- stb. mérgezések, műtét utáni állapotok, coma diabeticum esetén insulinnal.

Adagolás: 20—40%-os oldatból 10—200 ml, gyermekeknek a 20%-os oldatból 5—100 ml kizárólag i. ven.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20%-os 10×10 ml 31,80 Ft, b. 50×10 ml 159,— Ft, 1×100 ml 20,70 Ft;
b. 40%-os 10×10 ml 33,90 Ft, 50×10 ml 169,50 Ft, 1×100 ml 22,40 Ft.

GLUTAREC A. tabl. VII.

Összetétel: 1 tabl. 0,50 g acid. glutamicumot tartalmaz.

Javallatok: Oligophrenia különböző fokai, mongolismus, szerzett agyi degeneratív laesiók, postencephalitises állapot; defect schizophrenia, circularis psychosis és psychopathia melancholiás alakja.

Adagolás: Az adagolás 20—30 tabletta naponta, de vannak esetek, amikor napi 1—2 tabletta is eredményes. Egyes súlyosabb esetekben legalább 6, de inkább 18 hónapos, sőt 2 évig tartó folyamatos kezelés is szükségessé válhat.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 0,50—0,20 g/kg/die, 3—5 adagra elosztva, hónapokig. A fenti adagok fokozatos emeléssel érendők el. *Mellékhatásként* nyugtalanság jelentkezhet. A nyugtalanság első jelekor az előző adagra kell visszatérni, s azt kell fenntartó adagnak tekinteni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését utasítás szabályozza (l. 571. oldal). Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: b. 500 tabl. 424,70 Ft.

GLYCOSEPT B. oldat XLVI.

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 0,01 g xanthacridin., 0,1 g menthol., 0,5 g natr. benzoic., 0,5 g resorcin.-ot tartalmaz propilénglikolos oldatban.

Javallatok: A felső légutak heveny és idült megbetegedései, gennyes arcüreggyulladások, valamint gennyes, fekélyes, egyéb szájüregi megbetegedések, akut és krónikus pharyngitis és laryngotracheitis.

Adagolás: Ecsetelésre és spray-hez eredeti töménységben, mellüreg-öblítésre 50%-os desztillváltvizes hígításban, száj- és garatöblítésre: 40 cseppet 100 ml vízhez adva.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 ml orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 10,30 Ft.

GRACIDIN E.Gy.T. tabl. VII.

Összetétel: 1 tabl. 25 mg 2-phenyl-3-methyl-tetrahydro-1,4-oxazin. hydrochlor.-t tartalmaz.

Javallatok: Adipositas. (Szív- és keringési zavarok, valamint hypertoniával társult adipositas esetében fokozott elővigyázattal kell adagolni.)

Ellenjavallatok: Coronaria-spasmus és hyperthyreosis.

Adagolás: Napi 2-szer 1 tabl., $^1/_4$—$^1/_2$ órával reggeli, ill. ebéd előtt. Az adagolást egyénenként kell beállítani és szükség szerint az adag csökkenthető vagy emelhető. Amennyiben a napi 2 tabl. emelése szükséges, úgy az utolsó adagot délután 3 óra előtt ajánlatos bevenni. — A kúra időtartama a súlycsökkenéstől függ. Általában 10 hetes kúra kielégítő szokott lenni.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak lényeges pathologiai elváltozás esetén, szakrendelések által szabadon, egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslata alapján rendelhető. — *A vényt két példányban („másolattal") kell kiállítani.* Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 25,— Ft, 200 tabl. 169,— Ft.

HALIDOR E.Gy.T. XII.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 50 mg., 1 tabl. 100 mg bencyclanum hydrogenfumaric.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Vascularis javallat:* peripheriás verőérmegbetegedés, coronaria-betegség, cephalalgia, agyi angiospasmus, vascularis eredetű szembetegség.
Visceralis görcsoldás: gastrointestinalis spasmus, gastritis, enteritis, colitis, tenesmus, cholecystopathia, cholelithiasis, postcholecystectomiás panaszok.
Urológiai alkalmazás: hólyag-tenesmus, valamint adjuvánsként nephrolithiasis esetén.
Egyéb gyógyszerekkel kombinálva alkalmas fekélybetegség kezelésére, duodenalis, ill. ventricularis ulcus fájdalmainak csökkentésére, a szubjektív panaszok javítására, továbbá bronchus-görcs oldásának elősegítésére, asthma bronchiale, bronchitis asthmatica esetén.

Ellenjavallat: A keringés és légzés súlyos zavara, collapsus-hajlam esetén a parenteralis alkalmazással óvatosság ajánlatos.

Adagolás: *Egyszeri adag* 1—2 tabletta per os, vagy szükség esetén 1, esetleg 2 ampulla i. ven., i. art., vagy 1 amp. i. musc. *Kúraszerűen a napi adag:* 3—4-szer 1 tabletta 3—4 héten át.

Mellékhatás: Az oralis alkalmazás mellékhatásmentesnek minősíthető. A ritkán előforduló szájszárazság, szédülés, nausea, fejfájás átmenetinek bizonyul. Parenteralisan csak acut esetben és óvatosan alkalmazható, a *kezelés helyét lehetőleg váltogatva*, mert localis érzékenységet, esetleg szövetkárosodást (i. ven. thrombophlebitist) okozhat.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 2 év, tabl. 3 év.

Csomagolás: 10×2 ml 17,70 Ft, 100×2 ml 165,— Ft. 20 tabl. 14,50 Ft, 200 tabl. 121,80 Ft.

HALOPERIDOL K.Gy. IV.
inj. 5 mg, tabl. 1,5 mg, cseppek 0,2%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg haloperidol.-ot,
1 tabl. 1,5 mg haloperidol.-ot,
1 üveg (10 ml) 20 mg (10 csepp — 1 mg) haloperidol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Minden olyan kórkép, amely motoros és psychés agitatióval jár, mania, paranoid hallucinatoros oligophrenia és epileptiformis psychosisok, delirium tremens. Csillapíthatatlan hányás.

Ellenjavallatok: Pyramidalis vagy extrapyramidalis tünetcsoporttal járó kórképek. Hysteria.

Adagolás: Az injekció alkalmazása általában akkor javallt, amikor az oralis adagolás valamilyen okból lehetetlen (pl. nagyfokú agitatio).
Adagja ilyenkor 1 ampulla (5 mg) intramuscularisan.
Az átlagos oralis napi adag 2—4 mg. Az egyéni tűrőképesség és szükséglet figyelembevételével azonban a napi adag 1,5—10 mg között váltakozhat, egyenlő részekre elosztva.
Gyermekek napi dózisa 5 éves korig a felnőttdózis negyede, 6—15 éves korig a felnőttdózis fele. Krónikus hányásban általában 2×10 cseppet (2 mg) adnak naponta.
A Haloperidol fokozza bizonyos centrálisan ható szerek, pl. barbiturátok, ópiumkészítmények hatását, ezért alkalmazása ilyen készítményekkel együtt *nagy körültekintést tesz szükségessé. Alkalmazása kizárólag orvosi kontroll mellett történhet.*

Mellékhatások: Huzamosabb ideig tartó kezelés után a betegek nagy részénél akinesia, tremor, izomhypertonia, vagy egyéb parkinson-szerű tünetek léphetnek fel. Ezek a tünetek az adag csökkentésére vagy a kezelés átmeneti abbahagyása után spontán megszűnnek, illetve antiparkinsonos szerekkel kupírozhatók.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére idegszakrendelések, ideggondozók szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak idegszakrendelés (ideggondozó, fekvőbeteg-gyógyintézeti, el-

me-, idegosztály) javaslatára rendelhetik. Lejárati idő inj. és cseppek: 2 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 14,70 Ft, 50×1 ml amp. 123,90 Ft;
50 tabl. 13,70 Ft, 250 tabl. 58,30 Ft;
1 üveg (10 ml) 17,20 Ft.

HEMORID Ch. XLII.
végbélkúp, kenőcs

Összetétel: 1 kúp 5 mg camphor., 6 mg chloral. hydr., 5 mg menthol., 0,1 mg aetherol. millefolii, 0,1 mg adrenal. hydrochlor., 30 mg procain., 30 mg dl-ephedr. bas.-ot tartalmaz.
1 tubus kenőcs 320 mg camphor., 350 mg chloral. hydr., 330 mg menthol, 0,6 mg aetherol. millefolii, 2 mg adrenal. hydrochlor., 500 mg procain. bas., 500 mg *dl*-ephedr. bas.-ot tartalmaz 20 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Nodi haemorrhoidales, pruritus ani, ekzema perianalis.

Adagolás: A kenőcsből babnyi nagyságút véve, az anus-nyílást naponta többször enyhén bekenjük. A kúpot lefekvés előtt helyezzük a végbélbe.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. A kenőcsből 20 g, a kúpból 10 db orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 10 kúp 13,20 Ft, 1 tubus (20 g) 9,50 Ft.

HEPARIN K.Gy. XVIII.
inj. 25 000 NE

Összetétel: 1 gumisapkás üveg (5 ml) 25 000 NE heparinnatrium, 15 mg kresol. pur.-ot tartalmaz. (1 ml = 5000 NE heparin).

Javallatok: Thrombosis, embolia kezelése és megelőzése.

Adagolás: Középsúlyos esetekben napi 40 000—50 000 NE (8—10 ml) 4 órás időközökben 24 órára szétosztva i. ven. vagy cseppinfúzió formájában; s. cut. és i. musc. is alkalmazható. Vitalis indicatióban vagy akut embolia esetében a napi adag 80 000—120 000 NE-ig is emelhető. A kezelés 2—3. napján az adagot csökkenteni kell, de a napi adag 25 000 NE (5 ml) alá ne menjen. A véralvadási idő gyakori meghatározása szükséges. A legnagyobb egyszeri adag 4 ml.

Ellenjavallatok: Belső szervek fekélyes betegségei (ulcus duodeni, colitis ulcerosa, ileum-fekély, rosszindulatú daganatok). Subacut bacterialis endocarditis. Súlyos máj- és veseártalmak. Agy- és gerincműtétek. A véralvadás zavarai.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csakis kivételesen, vitalis indicatióval rendelhető az esetben, ha a beteg nem szállítható gyógyintézetbe. *A vényt két példányban („másolattal") kell kiállítani.* — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 1×5 ml gumisapkás üveg 97,50 Ft.

HEXAMETHYLENTETRAMINUM K.Gy. XXV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g hexamethylentetramin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Húgyutak akut és krónikus fertőzései, cystitis, pyelocystitis.

Adagolás: 2—4 óránként 1 tabl. ½ pohár vízben. Ha a vizelet lúgos kémhatású, akkor acid. phosphoricumot (5 : 200) vagy ammonium chloratumot (5 : 200) rendeljünk naponta több evőkanállal.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 tabl. 2,70 Ft, b. 100 tabl. 13,50 Ft.

HEXETIDIN K.Gy. XXVII.
hüvelykúp 5 mg, oldat 4%

Összetétel: 1 kúp 5 mg hexetidinumot,
1 üveg oldat (100 ml) 4 g hexetidinumot tartalmaz.

Javallatok: Minden — nem gonorrhoeás — fertőzéses eredetű fluor (trichomonas, monilia stb.).

Adagolás: A hüvelykúpból kúraszerűen napi 1—2 darab. Az oldatból 2 gyermekkanálnyit adunk 1 liter vízhez, és az így hígított oldatot alkalmazzuk hüvelyöblítésre.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. Szakrendelések az oldatot a biztosítottak kezelésére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Az oldat közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 10 kúp 8,10 Ft,
1 üveg oldat (100 ml) 57,40 Ft.

HIBERNAL E.Gy.T. IV.

drazsé 25 mg, drazsé 100 mg, cseppek, inj. 0,5% és 2,5%, végbélkúp.

Összetétel: 1 drazsé 25 mg, ill. 100 mg chlorpromaz. hydrochlor.-ot,
1 üveg (10 ml) cseppek 0,4 g chlorpromaz. hydrochlor.-ot,
1 amp. (5 ml 0,5%) 25 mg, 1 amp. (2 ml 2,5%) 50 mg chlorpromaz. hydrochlor.-ot,
1 végbélkúp 0,1 g chlorpromaz.-ot tartalmaz.

Javallatok: Psychomotoros nyugtalanság, izgatottság, agressivitas, hallucinosis, szorongás. — Műtéti előkészítés, potenciált anaesthesia, hibernatio, eclampsia, terhességi hányás. — Vegetatív dystonia; malignomás fájdalmak esetén adjuvánsként. — Gyermekgyógyászatban: izgatottság, hányás.

Ellenjavallatok: Alkohol-, barbiturál- vagy bármilyen más coma. (Barbiturátokkal együtt adva óvatosság ajánlatos.)

Adagolás: *Parenteralis* alkalmazása i. musc. és i. ven. mindazon esetekben indokolt, amelyekben gyors hatást kívánunk elérni vagy a beteg állapota miatt

az oralis adagolás keresztülvihetetlen. — I. musc. a 0,5%-os 5 ml-es ampulla tartalmát mélyen a glutealis izomzatba adjuk. — I. ven. a 2,5%-os 2 ml-es ampulla tartalma csak megfelelő hígításban adható lassan (2—5 perc alatt).
Felnőttek egyszeri adagja általában 1 drazsé (25 mg) vagy 20 csepp (kb. 25 mg) vagy 1 végbélkúp (100 mg). Ezek a mennyiségek lassan emelhetők naponta 3-szor 2 drazséig, 3-szor 20 cseppig vagy 3-szor 1 végbélkúpig. — *A 100 mg-os drazsé adagolását súlyosabb psychiatriai és neurológiai kórformák esetében* mindig a kezelő szakorvos szabja meg.
Gyermekadagok: 5 éves korig oralis (drazsé, csepp) vagy intramuscularis alkalmazás esetén testsúly-kg-onként 1—2 mg, 5 éven felül a felnőttadag egyharmada vagy fele adagolandó. Szükség esetén ez az adag naponta 2—3-szor megismételhető. Rectalisan az átlagos adag 1 Hibernaletta kúp (25 mg); az adag legfeljebb napi 3-szor 1 kúpig (75 mg) emelhető.

Mellékhatások: Parkinsonos tünetek, tachycardia, mérsékelt vérnyomásesés. Ritkábban: a vérképző rendszer zavara, májártalom, photosensibilisatio.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. — Lejárati idő: drazsé 3 év; inj. kúp: 2 év; cseppek: 1 év.

Csomagolás: 50 drazsé (25 mg) 27,10 Ft, 500 drazsé (25 mg) 271,— Ft;
20 drazsé (100 mg) 35,90 Ft, 200 drazsé (100 mg) 359,— Ft;
1 üveg csepp (10 ml) 13,20 Ft;
10×2 ml (2,5%) 22,30 Ft, 100×2 ml (2,5%) 200,50 Ft;
10×5 ml (0,5%) 18,80 Ft, 50×5 ml (0,5%) 79,50 Ft;
6 db végbélkúp 18,90 Ft.

HIBERNALETTA E.Gy.T. IV.

végbélkúp
(régi neve: Hibernal végbélkúp gyermekeknek)

Összetétel: 1 végbélkúp 0,025 g chlorpromaz.-ot tartalmaz.

Javallatok: Lásd Hibernal.

Ellenjavallatok: Lásd Hibernal.

Adagolás: 1 kúp (25 mg); ez az adag legfeljebb napi 3-szor 1 kúpig (75 mg) emelhető.

Mellékhatások: Lásd Hibernal.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 6 db végbélkúp 10,20 Ft.

HIGANYKENŐCS fehér B. XLIV.

Összetétel: 1 tubus (20 g) 1 g hydrarg. amidochlor. (hydrarg. bichlorat. ammoniat.)-ot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallat: Hámlasztó dezinficiens.

Adagolás: Külsőleg, kenőcs.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 g orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 3,— Ft.

HIREPIN E.Gy.T. IV.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,5 mg reserpin., 5 mg promethazin. hydrochlor., 25 mg chlorpromaz. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: A psychosisok kezelésének olyan esetei, amelyekben a csak Hibernallal vagy Rausedyllel vagy a kettő együttes adagolásával folytatott kúrát extrapyramidalis tünetek zavarták vagy akadályozták meg. — Ajánlatos azonban a kúrát már eleve Hirepinnel folytatni (az injekciós szakasz befejezése után) olyan betegeknél is, akiknél a Hibernal-, Rausedyl-kombináció erőteljesebb hatása révén gyorsabb eredmény elérésére törekszünk. —

Különösen megfelel a Hirepin az intézetből elbocsátott beteg otthoni gyógykezelésére, mert a Pipolphen kivédi a két nagy tranquilláns huzamosabb szedésekor esetleg jelentkező késői parkinsonos tüneteket.

Ellenjavallatok: Alkohol-, barbiturál- vagy bármilyen más coma. (Barbiturálokkal együtt adva, óvatosság ajánlatos.)

Adagolás: Egyéni, és a beteg érzékenysége szabja meg, így az alábbi séma csak hozzávetőleges. A kúra kezdésekor 1 (esetleg ½) drazsé adásával győződjünk meg a beteg toleranciájáról. A kezdő adag bevétele után legalább 2 órán át feküdjön a beteg. Általános állapotát és vérnyomását — álló helyzetben is — ismételten ellenőrizzük. Az adagot fokozatosan — napi 1 drazséval — 3×2, 3×3, esetleg 3×4 drazséig emelhetjük. Az adag csökkentése — a klinikai tünetek alakulása szerint — ugyancsak fokozatosan történjen. Intézetből hazabocsátott betegnek 3×1 drazsénál ne rendeljünk többet, de itt is figyelembe kell venni az egyéni tűrőképességet. — Csak állandó orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 50 drazsé 36,50 Ft, 500 drazsé 326,— Ft.

HISTAZOLIN E.Gy.T. XXXVIII.
oldat

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 2,5 mg naphazolin. hydrochlor, 50 mg tripelennamin. hydrochlor., 280 mg acid. boric.-ot tartalmaz 10 ml vizes oldatban.

Javallatok: Szénanátha, akut és krónikus rhinitis, allergiás eredetű rhinitis. Helyi alkalmazása a nyálkahártyák allergiás eredetű gyulladásos duzzanatát tartósan csökkenti.

Adagolás: Külsőleg. A csomagoláshoz mellékelt részletes használati utasítás szerint, általában naponta

3—4-szer mindkét orrlyukba 2—3 csepp oldatot cseppentünk úgy, hogy a fejet hátrahajtjuk. Hosszabb ideig tartó kezelés esetén (8—10 napi kezelés után) átmenetileg több napos szünetet iktatunk be.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 3,80 Ft.

HOGIVAL K.Gy. XXXIV.

olajos inj. 1 mg és 5 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 mg oesteron. acet., 30 mg alcohol benzylic.-ot tartalmaz (1 mg = = 10 000 NE).

Javallatok: Primaer amenorrhoea, secundaer amenorrhoea, raro- és hypomenorrhoea, menorrhagia, genitalis hypoplasia, castratiós és climaxos tünetek, a lactatio megszüntetése.

Adagolás: *Primaer amenorrhoeában* kúraszerűen 20—25 nap alatt összesen 30—60 mg (naponta 1—3 mg vagy háromnaponként 5—10 mg), az utolsó 5—7. napon célszerű a készítményt sárgatesthormonnal együtt adagolni. 5—10 napos szünet után a kúra legalább 3-szor ismételendő. Ha a vérzés megindul, az adagot fokozatosan csökkentjük. A fenntartó adagot egyénenként kell meghatározni.
Secundaer amenorrhoea, raro- és hypomenorrhoeában a ciklus 11. és 12. napján 10—10 mg-ot injiciálunk i. musc. Ha két hét múlva vérzés indul meg, úgy a kezelés eredményes, és a fenti módon több hónapon át túladagolás veszélye nélkül megismételhető. Eredménytelenség esetén a feltételezett ciklus 23. és 25. napján 1—1 amp. Limovanil inj.-val kiegészíthető. Ha a vérzés ekkor sem jelentkezik, úgy a primaer amenorrhoeánál leírt adagolási mód követendő.
Menorrhagiás vérzésekben a vérzés első napjától annak megszűnéséig 5—10 mg pro die i. musc. Genitalis hypoplasiában a ciklus 16—20. napjáig összesen 20 mg-ot injiciáljunk i. musc., eredménytelenség esetén a ciklus elejétől kezdve kéthavonként összesen 30 mg Hogivalt adunk.

Castratiós és climaxos tünetek befolyásolására havonta összesen 3—5—10-szer 1 mg androgenekkel vagy más gyógyszerekkel együttesen, az egyéni szükséglet, tűrőképesség figyelembevételével, a klinikai tüneteknek megfelelően.
A lactatio megszüntetésére késői abortus és halva szülés esetén azonnal 5—10 mg, majd 2—3 napon át naponként 5—10 mg i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Zavarosodás esetén meleg vízbe mártjuk az ampullát. Csak kristálytiszta oldat használható.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 1 mg 12,10 Ft, b. 50×1 ml amp. 1 mg 121,— Ft;
b. 5×1 ml amp. 5 mg 24,90 Ft, b. 50×1 ml amp. 5 mg 249,— Ft.

HORMOFORT K.Gy. XXXIV.

olajos inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,25 g hydroxyprogesteron. capron., 0,05 g urethanum, 0,5 ml alcohol benzylicus-t tartalmaz.

Javallatok: Habitualis és imminens abortus, sterilitas (hypolutein esetei), hyperplasia glandularis cystica endometrii, juvenilis és praeclimaxos vérzészavarok, meno-, metrorrhagiák (az esetleges malignitas kizárása után). Alkalmazható még hypogenitalismus esetén, valamint primaer és secunder amenorrhoeákban oestrogen-adagolással együtt.

Adagolás: Habitualis és imminens abortusok esetén 1—2 ml (125—250 mg) intramuscularisan, nőgyógyászati megbetegedésekben az esetleg szükséges oestrogen-szint biztosítása mellett ciklusonként 1—2 ml (125—250 mg) intramuscularisan. A progesteronszint csökkenése individuálisan változó időpontban következik be. Amennyiben a hormonszint csökkenése miatt a várt időnél korábban vérzés jelentkezik, az injekció ismétlése szükséges.

Mellékhatás: Nagy adagok oedemát okozhatnak; asthmás, epilepsiás, migraine-es betegeknél rohamot provokálhat.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések szabadon rendelhetik, egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1×2 ml amp. 42,80 Ft.

HOVALETTEN B. drazsé — III.

Összetétel: 1 drazsé 0,025 g extr. valerian. sicc., 0,01 g extr. humuli lupuli sicc.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hysteria, neurasthenia, praeclimacterium, ideges ingerlékenység, neuropathia.

Adagolás: Nyugtatóként: naponta 3-szor 1—2 drazsé. Altatóként: egyszerre 4—5 drazsé félórával a lefekvés előtt.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 50 drazsé 4,60 Ft.

HYASE — Human inj. — LI.

Összetétel: 1 porampulla 150 NE hyaluronidase-t, 1 oldószerampulla 2 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallatok: A készítmény eredményesen alkalmazható a sebészetben, belgyógyászatban, nőgyógyászatban, orthopaediában és szemészeti gyakorlatban, pl. helyi érzéstelenítők hatásának gyorsítására és így nagy területek érzéstelenítésére, oedemák, exsudatumok és vérömlenyek felszívódásának elősegítésére, folyadékpótlás céljából adott hypodermoclysis felszívódásának gyorsítására stb.

Ellenjavallat: Rosszindulatú daganatokba, fertőzött területekre vagy azok közelébe a szóródás veszélye miatt Hyase-t fecskendezni nem szabad. A Hyase a test más, ép területein ilyenkor is alkalmazható.

Adagolás: A liofilezett ampulla tartalmát a mellékelt oldószerben (2 ml desztillált víz) feloldjuk. Az oldatot 1 órán belül fel kell használni, mert hatékonysága még 2—10 °C közötti hőmérsékleten is gyorsan csökken. Általában egy ampulla alkalmazása elegendő. Nagyobb terület infiltratiójához, szemcsepp készítéséhez vagy kötések nedvesítésére szolgáló oldat előállítására izotóniás nátriumklorid-oldattal 5-szörösre hígítjuk a Hyase-oldatot. A helyi érzéstelenítésre szolgáló oldathoz a Hyase-oldatot hozzákeverjük. Ugyanígy járunk el antibioticumok esetében is. Hypodermoclysis esetében a bőr alá olyan tűt szúrunk, amelyhez szorítóval zárt gumicső útján infúziós palack csatlakozik. A gumicsövet a szorító alatt fertőtlenítjük, és vékony tűvel ellátott fecskendő segítségével befecskendezzük a Hyase-oldatot. A csövet záró szorítót megnyitva megindítjuk az infúziót. Egy ampulla Hyase 1000 ml oldat gyors bevitelére elegendő. (Az infúziós oldat ne tartalmazzon C-vitamint, mert az gátolja a Hyase hatását.) A Hyase hosszabb, kúraszerű adagolásánál úgy járunk el, hogy az anyagot naponként vagy kétnaponként a test különböző helyeire i. musc. vagy s. cut. fecskendezzük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak szakrendelések rendelhetik. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás 5×1 porampulla + 5×2 ml oldószerampulla 40,50 Ft.

HYDROCODIN E.Gy.T. — A. — V.
inj., tabl., cseppek

Összetétel: 1 amp. (1, ill. 2 ml) 0,02, ill. 0,04 g dihydrocodein. bitart.-ot,
1 tabl. 0,01 g dihydrocodein. bitart.-ot,
1 üveg 0,6 g dihydrocodein. bitart.-ot tartalmaz 15 ml szeszes-vizes oldatban.

Javallatok: Köhögéscsillapítás, fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Naponta 1—3 ml s. cut., naponta 3-szor 1—2 tabl. vagy 5—10 csepp. Gyermekadag megfelelően kevesebb.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a tabl. és inj. szabadon rendelhető, a cseppek csak abban az esetben rendelhetők, ha az adott esetben a beteg

gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 12,90 Ft, b. 50×1 ml amp. 129,— Ft,
b. 5×2 ml amp. 15,60 Ft, b. 50×2 ml amp. 156,— Ft,
b. 20 tabl. 8,80 Ft, b. 100 tabl. 44,— Ft.
1 üveg (15 ml) 24,30 Ft.

HYDROCORTISON K.Gy. XXXIV.
szuszpenziós inj.

Összetétel: 1 üveg (5 ml) 125 mg hydrocortison. acet. microcryst., 25 mg lidocain. hydrochlor.-ot tartalmaz 5 ml propilénglikol tartalmú vizes szuszpenzióban.

Javallatok: Osteoarthritis, különféle (térd-, könyök-, csípő-) monarthrosisok, rheumás és egyéb eredetű arthritisek (tbc-s és gonorrhoeás arthritisek kivételével). — Periarthritis humeroscapularis, bursitis, epicondylitis, tendovaginitis, contracturák. — Ankylotikus ízületek műtétje előtt, továbbá általános kortikoid-therapia localis kiegészítésére.

Adagolás: Az ízület nagyságától és a megbetegedés súlyosságától függően 5—25 mg intra- és periarticularisan.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. *A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 1 üveg (5 ml) 31,60 Ft

HYDROCORTISON K.Gy. XXXIV/XLIV.
kenőcs 1% és 2,5%

Összetétel: 1 tubus 0,05, ill. 0,125 g hydrocortisont tartalmaz 5 g lemosható kenőcsben.

Javallatok: Ekzema különféle formái, akut és krónikus dermatitisek, erythrodermia, exsudativ diathesis bőrtünetei, pruritus senilis, pruritus ani et vulvae, fejbőr seborrhoeás ekzemája.

Adagolás: Az érintett bőrfelületet a kenőccsel naponta 2—3-szor vékonyan bekenjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére az 1%-os kenőcs abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.
A 2,5%-ost szakrendelések rendelhetik, illetőleg csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető, a javaslatban meghatározott időtartamú gyógykezelésre. A vényen fel kell tüntetni a javaslatot adó szakrendelést és a javaslat keltét. — A 2,5%-os közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 1%-os 26,— Ft; 1 tubus (20 g) 1%-os 80,40 Ft;
1 tubus (5 g) 2,5%-os 48,40 Ft; 1 tubus (20 g) 2,5 %-os 167,60 Ft.

HYDROCORTISON K.Gy. XLV.
szemkenőcs
(chloramphenicol-tartalommal)

Összetétel: 1 tubus (2,5 g) 12,5 mg hydrocortison. acetic. microcryst., 5 mg chloramphenicol.-ot tartalmaz 2,5 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: A szem különféle gyulladásos megbetegedései: ophthalmia sympathica, uveitis (általános — per os vagy parenteralis — steroid-kezelés mellett), allergiás conjunctivitisek, egyéb gyógykezeléssel nem befolyásolható blepharitis, iritis, iridocyclitis, nem gennyes keratitisek, a kötőhártya pemphigusa, a szemhéjak dermatitise és ekzemája, a szem fizikai és kémiai ártalmak következtében fellépő gyulladásos megbetegedései, ophthalmia electrica.

Ellenjavallatok: Minden felszínes és mély gennyes gyulladás (hypopyon-keratitis és -iritis, ulcus corneae stb.), trachoma, bármilyen eredetű hámsérülés.

Adagolás: Külsőleg, a klinikai képnek megfelelően naponta 1—2 alkalommal. Célszerű a kenőcs alkalmazása után rövid ideig kötést tenni a szemre.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak szemészeti szakrendelések rendelhetik. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 tubus (2,5 g) 19,60 Ft.

HYDROXOCOBALAMIN K.Gy.
inj. 100 μg XIX/XXXI.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 100 μg hydroxocobalaminum.-ot tartalmaz.

Javallatok: Anaemia perniciosa (neurologiai elváltozásokkal vagy anélkül), egyéb macrocytaer anaemiák, illetve minden olyan eset, amelyben a B_{12}-vitamin felszívódási zavara kimutatható vagy legalábbis feltételezhető. Megkísérelhető még neuralgiákban és neurotrop vírusbetegségekben — egyéb kezelés mellett — a kísérő tünetek enyhítésére.

Adagolás: Általában hetenként 2—3-szor egy ampulla, egy-két héten át i. musc. A reticulocyta-crisis és a vörösvérsejtszám emelkedése jelzi a therapia eredményességét. Fenntartó kezelésként havonta általában egy ampulla elegendő a vérkép ellenőrzése mellett.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak a kórisme vényen való feltüntetésével rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 1×1 ml 4,70 Ft, 25×1 ml 100,— Ft.

HYPANODIN B. VI.
inj., végbélkúp

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 500 mg amidazoph., 500 mg urethan., 10 mg coffein., 100 mg phenobarbitalnatr., 10 mg procain. hydrochlor., 0,05 mg scop. hydrobrom., 0,2 mg hyosciamin. hydrobrom.-ot tartalmaz.
1 kúp 0,6 g amidazoph., 0,2 g phenobarbital., 0,05 g coffein., 0,0004 g hyosciamin. hydrobrom., 0,0001 g scopol. hydrobrom.-ot tartalmaz.

Javallat: Fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Naponta 1—2 ml s. cut. vagy i. musc. vagy 1—2 kúp.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×2 ml amp. 13,30 Ft, b. 100×2 ml amp. 133,— Ft.
6 kúp 9,50 Ft, 100 kúp 130,— Ft.

HYPEROL K.Gy. XLVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 1 g carbamid. peroxydat.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fertőtlenítő, vérzéscsillapító.

Adagolás: Külsőleg 1—10%-os oldatban.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 4,50 Ft, 20 tabl. 5,70 Ft, 100 tabl. 25,30 Ft, 500 tabl. 90,20 Ft.

HYPNOVAL A. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g cyclobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Altatószer. Alvászavar, izgalmi állapotok, maniás depressio és encephalitis utáni zavarok. Félelemérzés, tachycardia, tremor.

Adagolás: Felnőtteknek: $^1/_2$—1 tabl. *Gyermekeknek:* $^1/_4$—$^1/_2$ tabl. A tablettákat kevés vízben oldva veszszük be, és cukros vizet vagy meleg teát itatunk utána.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 9,90 Ft.

HYPNOVAL-CALCIUM A. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g cyclobarbital. calc.-ot tartalmaz.

Javallatok és adagolás: lásd **Hypnoval.**

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 9,90 Ft.

HYPOPHYSIS SZIPPANTÓPOR K.Gy. XXXIII.

Összetétel: 1 fiola 200 NE hypophys. partis post., hypophys. total. ad 0,5 g-ot tartalmaz.

Javallat: Diabetes insipidus.

Adagolás: Orrbaszippantásra, két ujj közé fogott kis csipetnyit (kb. 0,05—0,010 g), szükség esetén naponta 2—3-szor, a beteg érzékenysége szerint.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 1 fiola (0,5 g) 8,— Ft.

HYPOTHIAZID Ch. XXV.
tabl. 25 mg és 100 mg

Összetétel: 1 tabl. 25 mg, ill. 100 mg hydrochlorothiazid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Oedemás állapot és hypertonia. Főbb indicatiós területei: congestiv szívelégtelenség, akut és krónikus glomerulonephritis, máj-cirrhosis okozta ascites és oedema, terhességi toxaemiás oedema, víz-retentiós obesitas, kortikoszteroidok által okozott oedema.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Nephrosis.

Adagolás: Intermittáló és continualis adagolás. Diureticumként való alkalmazásnál általában az intermittáló (a hét 3—5 egymást követő napján) adagolást részesítik előnyben. Átlagos napi adagja 50—250 mg felnőtteknek. — Hypertonia kezelésében néhány napos adagolás után a tensio az esetek többségében normalizálódik; ez az állapot napi 25 mg-os dosissal fenntartható. Vérnyomáscsökkentő szerekkel történő kombináció során azok szokásos adagja kb. $^1/_3$-ára csökkenthető. Ilyenkor, de különösen ganglion-blockolókkal egyidejűleg adva, fokozott óvatosság szükséges, a hypotoniás állapot vagy collapsus elkerülése céljából. — Intenzív sóürítő hatása miatt, hosszabb ideje folytatott adagolásakor a hypokalaemia megelőzésére ajánlatos napi 3—5 g kalium chlorat.-ot vagy kalium citric.-ot is adagolni.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 1 mg/kg/die 2—3 részre elosztva. 3—5 nap után 3—5 napos szünet közbeiktatása javasolt. Fenntartó kezelésre ugyanekkora adagból hetente kétszer 1—1 napon. — Hosszantartó kezelés esetén fontos a bőséges káliumbevitel (gyümölcs, főzelék, csokoládé stb.) vagy a fent ismertetett káliumpótlási eljárások valamelyikének bevezetése.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20×25 mg tabl. 4,— Ft, 200×25 mg tabl. 23,50 Ft,
20×100 mg tabl. 7,30 Ft, 200×100 mg tabl. 57,— Ft.

INFECUNDIN K.Gy. XXVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabletta 2,5 mg norethynodrelum, 0,10 mg mestranolum-ot tartalmaz.

Javallatok: Elsősorban fogamzásgátlás. További javallatok: functionalis sterilitas, functionalis vérzések (juvenilis vérzés, poly-hypermenorrhoea, anovulatios ciklus), functionalis dysmenorrhoea, endometriosis.

Ellenjavallatok: Thrombosis-készség, hepatitis és májműködési zavarok, epekő, epehólyaggyulladás, súlyos szívbetegség, krónikus vastagbélhurut, diabetes, belső secretiós betegségek, mellékhatás okozta intolerantia, szoptatás.

Adagolás: A menstruatio első napjától számított 5. napon kezdve, 21 napon át napi 1 tablettát kell esténként lefekvés előtt bevenni. Az utolsó tabletta bevétele után 1—4 napon belül várható a megvonásos (anovulatiós) vérzés, amelynek első napja az új ciklus kezdete. Amennyiben az utolsó tabletta bevétele után az 5. napon vérzés nem jelentkezne, az újabb Infecundin-kezelés a következő napon elkezdhető. A tabletták szedése alatt jelentkező, kis mennyiségű közti vérzés a kezelés megszakítását nem indokolja. Erősebb, ilyen jellegű, áttöréses vérzés esetében a készítmény szedését abbahagyjuk, s a vérzés első napjától számított 5. napon újból, elölről elkezdhetjük a 21 napos kezelést.
Egyes betegeken a havivérzések mennyiségének és tartamának csökkenése figyelhető meg, ami miatt a kezelés abbahagyása nem szükséges. A fogamzás csak a tabletták rendszeres, naponkénti szedése esetében kerülhető el. Amennyiben a tabletta bevétele este elmaradna, a mulasztást másnap reggel pótolni kell.

Megjegyzés: ✠ Rendelhetőségét külön utasítás szabályozza (l. 576. old.)

Csomagolás: 21 tabl. 31,10 Ft.

INSULIN K.Gy. XXXV.
inj. 200 NE (1 ml = 40 NE inzulin)

Összetétel: 1 gumidugós üveg 200 NE insulin. cryst.-ot tartalmaz 5 ml oldatban.

Javallatok: Diabetes mellitus és szövődményei, coma diabetica, hizlalókúra, hyperthyreosis, hepatitis, cirrhosis hepatis, schizophrenia shock-kezelése.

Adagolás: A beteg állapotától függően (vércukorvizsgálat).

Megjegyzés: ✠ Csak az insulin rendelésére vonatkozó Eü. Min. utasításban foglaltak szerint rendelhető (l. 583. old.). — *Lejárati idő:* 1½ év.

Csomagolás: 1×5 ml gumidugós üveg 17,50 Ft.

INTRAJOD E.Gy.T. XVI.
inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,48 g hexaethyl-diaminoisopropanolum dijod.-ot (=237 g J) tartalmaz.

Javallatok: Lues, arteriosclerosis, véredények megbetegedése, arthritis deformans.

Adagolás: Naponként vagy 2—3 naponként ½—1 amp. s. cut., i. musc., i. ven.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×2 ml amp. 26,40 Ft,
b. 100×2 ml amp. 204,— Ft.

ISOLANID K.Gy. XIV.
inj., tabl., cseppek, végbélkúp

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,4 mg desacetyl-lanatosid. C-t tartalmaz szeszes-vizes oldatban.
1 tabl. 0,25 mg lanatosid. C-t,
1 üveg sol. (10, ill. 100 ml) 10 mg, illetőleg 100 mg lanatosid C-t (1 ml = 40 csepp = 1 mg hatóanyag) tartalmaz szeszes-vizes oldatban.
1 kúp 1 mg lanatosid. C-t tartalmaz.

Javallatok: A keringési elégtelenség (cardialis decompensatio) helyreállítása és a compensatio fenntartása.

Adagolás: A compensatio helyreállítására naponta 1—2 ampulla i. ven. vagy i. musc., illetve 3—4-szer 20 csepp, illetve 6—8 tabletta, illetve 2—3 kúp alkalmazható.
Compensatio fenntartására napi 20—30 csepp vagy 2—3 tabletta, illetve 1—2 kúp szükséges.
Tekintettel arra, hogy az Isolanid-készítmények gyorsan eliminálódnak és nem kumulálódnak, a fenntartó kezeléskor szünetek beiktatása nem indokolt, csak intoxicatiós jelenségek felléptekor.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető

— gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: tabl., cseppek, kúp 2 év, inj. 3 év.

Csomagolás: 5×2 ml amp. 13,30 Ft, 50×2 ml amp. 104,20 Ft,
40 tabl. 19,70 Ft, 250 tabl. 118,30 Ft,
1 üveg (10 ml) 29,— Ft.
10 kúp 17,60 Ft.

ISONICID K.Gy. XLVII.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml és 10 ml) 50, ill. 250 mg isoniazid.-ot,
1 tabl. 50 mg isoniazid.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Tabletta:* Gümőkór pulmonalis és extrapulmonalis folyamatai.
Injekció: Pulmonalis és extrapulmonalis tuberculosis esetén, ha az oralis adagolás a beteg állapota miatt lehetetlen, továbbá gyomor- és bélzavarok, rossz felszívódási viszonyok esetén. Empyema thoracis, hideg tályog, tbc-s sipolyok, nyirokcsomók localis kezelésére.

Adagolás: *Tabletta:* Naponta átlagosan 5—10 mg/testsúly-kg. A napi adagot lehetőleg egyszerre, étkezés után adjuk be.
Injekció: Naponta 3—5 mg/testsúly-kg s. cut. vagy i. musc., ami 60 kg-os testsúly esetén kb. 8—12 ml Isonicid injekciónak felel meg.
Az Isonicid injekció intravenásan, valamint intrathecalisan is adható.
Empyemánál localisan 2—3 naponta 10—12 ml-t fecskendezünk be intrapleuralisan.
Isonicid-resistentia kialakulásának veszélye miatt a gyógyszert — kivéve, ha kis kiterjedésű folyamat esetében Koch-negatív betegen vagy utókezelés céljából alkalmazzuk — más, hatásos antituberculoticummal együtt kell adni.

Mellékhatások: Polyneuritis alakulhat ki, melynek első tünetei a kéz és láb zsibbadása, paraesthesiája.

Megjegyzés: ✠ Orvosi vényen Isonicid nem rendelhető. A járóbetegek Isoniciddel való kezelését az illetékes TBC-gondozó intézet végzi.

Csomagolás: 50×2 ml amp. 66,10 Ft, 50×10 ml amp. 277,— Ft,
200 tabl. 66,— Ft, 1000 tabl. 330,— Ft.

ISTOPIRIN B. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g acid. acetylsal.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hűléses és rheumás megbetegedések, fejfájás és egyéb fájdalmak, lázas állapotok.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2—5-ször 1 tabl. Gyermekeknek 9 éves korig naponta 2—3-szor ½—1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,50 Ft. b. 500 tabl. 125,— Ft.

JODOSTRUMIT B. XXXII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,66 mg kal. jod.-ot tartalmaz.

Javallatok: Struma prophylactikus és therapiás kezelése.

Adagolás: Prophylaxishoz: heti 1—3 tabl. Therapiához: napi 1—3-szor 1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 1,90 Ft.

JODPAPAVERINTHEOSAN A. XVI.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,02 g papaver. hydrochlor., 0,1 g kal. jod., 0,25 g theobromin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, angiospastikus folyamatok, arteriosclerosis, asthma bronchiale.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szaba-

don rendelhető. — 20 drazsé orvosi vény nélkül is kiszolgáltatható.

Csomagolás: 20 drazsé 11,20 Ft.

JÓD-PÁRNA B. XLVI.

Összetétel: 1 pólyázott amp. (1 ml) 1 ml sol. jodi spir.-ot tartalmaz.

Javallat: Sebellátás.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 6 amp. 8,10 Ft.

JODTHEOSAN A. XVI.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g theobromin, 0,10 g kal. jod.-ot tartalmaz.

Javallatok: Arteriosclerosis, aortitis, angina pectoris, asthma bronchiale.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 9,10 Ft.

KALMOPYRIN K.Gy. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,45 g acid. acetylsal., 0,135 g calc. carb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hűléses és rheumás megbetegedések, fejfájás és egyéb fájdalmak, lázas állapotok.

Adagolás: Naponta 2—5×1—2 tabl., bevétel előtt kevés vízben oldva.

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,80 Ft, b. 100 tabl. 28,— Ft.

KARIL E.Gy.T. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g coffein., 0,3 g phenacetin., 0,15 g amidazoph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Spastikus migraine, fejfájás, egyéb fájdalmak, neuralgiák, láz.

Adagolás: Szükség esetén 1 tabl., naponta legfeljebb 3×1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 7,50 Ft.

KEFALGIN E.Gy.T. XVI.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,2 mg ergotamin tart., 5 mg extr. bellad. sicc., 60 mg coffein., 150 mg amidazoph.-ot tartalmaz.

Javallat: Migraine.

Adagolás: Kezdeti adag egyszerre két drazsé. Amennyiben a fejfájás nem szűnik meg, úgy a fájdalom teljes megszűnéséig fél óránként 1—1 további drazsé bevétele szükséges. Az ergotamin-tartalom miatt napi 6 drazsénál, összesen 10—12 drazsénál többet nem szabad bevenni.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 12 drazsé 14,40 Ft, b. 100 drazsé 120,— Ft.

KLION K.Gy. XXVII.
tabl., hüvelykúp

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g metronidazolum.-ot,
1 hüvelykúp 0,5 g metronidazolum.-ot tartalmaz.

Javallat: Férfi és női húgyivarszervi Trichomonas-infestatio. *Giardia lamblia*-fertőzések. *Stomatitis ulcerosa.*

Adagolás: A trichomoniasisban szenvedő beteg házastársa, ill. sexualis partnere is fertőzöttnek tekintendő. Tartós gyógyulás csak mindkét fél egyidejű kezelésétől várható. A Klion adagja férfinál és nőnél egyaránt reggel-este 1—1 tabletta (250 mg) szájon át, 10 napon keresztül. A tablettát ajánlatos étkezés közben vagy étkezés után, szétrágás nélkül lenyelni. Nők egyidejűleg ugyancsak 10 napon keresztül, lefekvés előtt 1—1 kúpot is helyezzenek fel magasan a hüvelybe. Indokolt esetben a kúra megismételhető, a napi adag 3—4 tablettára is emelhető. Kúra alatt a beteg alkoholt ne fogyasszon, nemi életet ne éljen. *Giardia lamblia* fertőzésben felnőtteknek 5 napon át naponként 2 tabletta, 2 részre osztva.

Gyermekeknek: 0—1 éves korig naponta ½ tabl., 2—4 éves korig naponta 1 tabl., 5—8 éves korig naponta 1½ tabl., 8 év felett naponta 2 tabl. 5 napon át étkezés után, 2 részre osztva.

Stomatitis ulcerosában felnőtteknek naponta 2×1 tabletta, 3—5 napon át. Súlyos esetben 1—2-szer 1 db langyosítással képlékennyé tett és gaze-lapra helyezett hüvelykúppal a fekély területén 20 perces localis pakolás végezhető.

Mellékhatások: Ritkán fejfájás, keserű szájíz, bevont nyelv, enyhe hányinger, olykor hasmenés mutatkozhat. Ezek a tünetek a kúra befejezése után maguktól megszűnnek.

A Klion — mint nitroderivatum — enyhe leukopeniát is okozhat, ezért főként a 10 napos kúra esetén ajánlatos a vérkép ellenőrzése.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére nők részére mind a tablettát, mind a kúpot csakis laboratóriumi lelettel igazolt Trichomonas-fertőzés esetén, a nőgyógyászati terhesgondozó rendelések, bőr-, nemibeteggondozó intézetek és urológiai szakrendelések rendelhetik.

Férfiak részére a tablettát laboratóriumi lelettel igazolt vagy anamnestikusan stb. erősen valószerűsített Trichomonas-fertőzés esetén, a bőr-, nemibeteggondozó intézetek és urológiai szakrendelések rendelhetik. Kivételes esetekben, ha pl. a nő férje a szakrendelés székhelyén kívüli helységben lakik, a nő számára vényt író szakorvos javaslatot adhat a körzeti orvosnak a Klionnak a férj részére történő felírásra. Ilyen esetben a körzeti orvos a vényen köteles feltüntetni a javaslatot adó szakrendelést és a javaslat keltét. — *Giardia lamblia* fertőzés kezeléséhez a kórismének a vényen való feltüntetésével szabadon rendelhető. *Stomatitis ulcerosa* kezeléséhez a Klion tablettát a fogászati és szájsebészeti szakrendelések a kórismének a vényen történő feltüntetésével szabadon rendelhetik.

Stomatitis ulcerosa localis kezeléséhez a *Klion hüvelykúpot* a fogászati és a szájsebészeti szakrendelések biztosítottak ellátásához nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: b. 20 tabl. 44,— Ft, 250 tabl. 525,— Ft. b. 10 kúp 50,— Ft, 100 kúp 470,— Ft.

KOFKA B. XIII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g coffein. pur.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fáradtság, idegkimerülés esetén mint enyhe analepticum.

Adagolás: Szükség szerint 1—3-szor 1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl., 5,60 Ft.

KOLINIUMKLORID K.Gy. XXII.
szirup 20%

Összetétel: 1 üveg 20,0 g cholin. chlor.-ot tartalmaz. 100 g szirupban.

Javallatok: Hepatitis, máj-coma.

Adagolás: 3—4×1—2 kávéskanállal étkezés után (1 kávéskanál = 1 g hatóanyag).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető —

gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (100 g) 40,50 Ft.

LEGATIN B. III.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,025 g extr. valerian. sicc., 0,01 g extr. humuli lupuli sicc., 0,05 g phenacetin., 0,01 g phenobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Sedativum, hypnoticum; neurasthenia, hysteria, epilepsia.

Adagolás: Sedativumként: 3-szor naponta 1—2 drazsé, hypnoticumként: 3 drazsé ½ órával lefekvés előtt.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 drazsé orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 20 drazsé 3,70 Ft, b. 100 drazsé 18,60 Ft.

LEUPURIN Ch. L.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 50 mg 6-mercaptopurinum.-ot tartalmaz.

Javallatok: Rosszindulatú haematologiai megbetegedések, elsősorban akut leukaemiák és krónikus myeloid leukaemia. Krónikus myeloid leukaemia mind korai, mind későbbi szakaszában is klinikai és haematologiai remissio érhető el vele.

Ellenjavallatok: Krónikus lymphoid leukaemia, Hodgkin-kór és solid tumorok.

Adagolás: Egyéni. Az adagot úgy kell megállapítani, hogy a legkedvezőbb therapiás hatás minimális toxicitással legyen elérhető. A kezdeti adag általában naponta 2,5 mg/testsúlykg, tehát 2—4 tabletta, megfelelő elosztásban. Akut leukaemiában szenvedő gyermekek nagy része ezt az adagot általában jól tűri.

Az adagolás esetleg több héten át is folytatható. Ha négy heti adagolás után klinikai javulás nem mutatkozna és toxikus tünetek sem észlelhetők, a napi adag 5 mg/testsúlykg maximális mennyiségig növelhető. A vér leukocyta-számának rendszeres ellenőrzése szükséges. Miután a készítmény hatása elhúzódhat, a kezelést a leukocyta-szám esésének első jelére meg kell szakítani. Ha a továbbiakban a leukocyták száma 2—3 napon át változatlan marad vagy emelkedik, a kezelés folytatható. Fontos a megfelelő fenntartó adag meghatározása az esetleges korai visszaesés elkerülésére.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 25 tabl. 132,— Ft.

LIBEXIN Ch. XVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g 3-(β,β-diphenylaethyl)-5-(β-piperidinoaethyl)-1,2,4-oxadiazol. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Bronchialis eredetű köhögés csillapítására:* Akut és krónikus bronchitisek, grippe, bronchopneumonia, tumor vagy idegentest a bronchusokban, asthma bronchiale, emphysema, decompenzáltak éjszakai köhögése, bronchoscopiás vagy bronchographiás beavatkozások előkészítésére. *Pleuralis eredetű köhögés csillapítására:* Pleuritis sicca és exsudativa, pleuropneumonia, tüdő-infarctus, spontán pneumothorax, pleuralis beavatkozások (művi pneumothorax, pleura-punctio, pleurán végzett műtétek.)

Ellenjavallatok: Nagy váladékozással járó kórképekben és különösen postoperativ állapotokban (inhalatiós narkózis után) ellenjavallt.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3—4-szer 1 tabletta, makacs esetben 2 tabletta. *Gyermekek* szokásos adagja az életkornak és testsúlynak megfelelően arányosan kevesebb, általában naponta 3—4-szer ¼—½ tabletta.
Bronchológiai előkészítéshez testsúlykg-onként

0,9—3,8 mg-os adagban atropinnal kombinálva, 1 órával a beavatkozás előtt. A tablettát szétrágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szétrágása a száj nyálkahártyáján múló zsibbadást, érzéketlenséget válthat ki.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 tabl. orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 tabl. 11,— Ft, 200 tabl. 93,— Ft.

LIDOCAIN E.Gy.T. VIII.
inj. 1%, 2%

Összetétel: 1 amp. milliliterenként 10 mg, ill. 20 mg lidocain. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallat: Helyi érzéstelenítés.

Adagolás: A készítményhez mellékelt részletes használati utasítás szerint.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Szakrendelések a biztosítottak ellátásához nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 1% 10×10 ml 35,— Ft, 1% 10×20 ml 62,40 Ft,
2% b. 10×2 ml 15,10 Ft, 2% b. 100×2 ml 151,— Ft,
2% b. 10×10 ml 43,80 Ft.

LIDOCAIN-ADRENALIN E.Gy.T. VIII.
inj. 1%—0,001%, 2%—0,001%

Összetétel: 1 amp. milliliterenként 10 mg, ill. 20 mg lidocain. hydrochlor.-ot és 0,01 mg adrenal.-ot tartalmaz.

Javallat: Helyi érzéstelenítés.

Adagolás: A készítményhez mellékelt részletes használati utasítás szerint.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Szakrendelések a biztosítottak ellátásához nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 4 év.

Csomagolás: 1% 10×10 ml 35,60 Ft, 1% 10×20 ml 63,60 Ft,
b. 2% 10×2 ml 15,90 Ft, 2% b. 100×2 ml 159,— Ft,
b. 2% 10×10 ml 44,60 Ft.

LIMOVAN K.Gy. XXXIV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,01 mg aethinyloestradiol., 10 mg aethisteronum.-ot tartalmaz.

Javallatok: Primaer és secundaer amenorrhoea.

Adagolás: *Primaer amenorrhoeában* megelőző 3 heti ösztrogénkezelés után *5 napon keresztül napi 4 tabletta; secundaer amenorrhoeában* 5 napon keresztül napi 4 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 12,60 Ft.

LIMOVANIL K.Gy. XXXIV.
olajos inj., emulziós inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) olajos inj. 2,5 mg oestradiol. benz., 12,5 mg progesteron., 0,15 ml alcohol benzylicust,
1 amp. (1 ml) emulziós inj. 2,5 mg oestradiol. benz., 12,5 mg progesteron., 10 mg alcohol benzylic., 80 mg benzyl. benzoic.-ot tartalmaz vizes emulzióban.

Javallatok: Primaer és secundaer amenorrhoea, habitualis abortus és interruptiók előtti terhességi próba.

Adagolás: *Primaer amenorrhoeában* megelőző 3 heti ösztrogénkezelés után 5 napon keresztül napi 1 ampulla olajos injekció vagy 3 ampulla vizes emulzió egyszerre. — *Secundaer amenorrhoeában* 2 napon keresztül napi 1 ampulla olajos injekció vagy 2 am-

pulla vizes emulzió egyszerre. — *Habitualis abortusban* a kezelést célszerű mindjárt a menses elmaradásakor elkezdeni, és a kritikus időpont után egy hónapig folytatni. Adagja heti 2—3 olajos injekció 20 héten keresztül vagy heti 1—2 ampulla emulzió 5 héten keresztül, majd heti 1 ampulla 14 héten keresztül. — *Terhességi próbára:* ha az eddig rendszeresen jelentkező menses késik, 2 napon keresztül napi 1 ampulla olajos injekciót adunk. Amennyiben a második injekció alkalmazásától számított 48—72 óra múlva sem jelentkezik vérzés, a terhesség fennállása valószínű. Mindkét injekciót intramuscularisan kell alkalmazni.

Megjegyzés: ✠ Az olajos és emulziós inj. társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. olajos 34,— Ft, 50×1 ml amp. olajos 322,— Ft.
b. 5×1 ml amp. emulziós 34,— Ft.

LIOTHYRONIN K.Gy. XXXII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 mg (20 gamma) liothyronin hydrochlor.-t tartalmaz.

Javallatok: Hypothyreosis, hypofunctiós golyva, obesitas, anyagcsere-elégtelenség, hypercholesterinaemia (essentialis eredetű, diabetes, atherosclerosis vagy máj-cirrhosis következtében).

Ellenjavallatok: Coronaria-sclerosis, stenocardia. Cardialis decompensatióban csak nagy óvatossággal alkalmazható.

Adagolás: Egyéni: nagymértékben függ a javallattól, kortól és az egyéni tűrőképességtől. Általában célszerű a kezelést kis adagokkal (napi 20—60 gamma) kezdeni és jó tűrőképesség esetén minden harmadik napon 10—20 gammával növelni. Egy-két hónapos kezelés után kialakul az optimális egyéni fenntartó dosis.
Túlságosan gyorsan emelkedő adagolása palpitatiót,

ingerültséget, dyspnoet, álmatlanságot, fejfájást válthat ki, ami az adag csökkentésére, vagy a therapia ideiglenes szüneteltetésére elmarad. Ilyen szünet után célszerű a kezelést csökkentett adagokkal folytatni. — A Liothyronin-kezelés kizárólag orvosi ellenőrzés mellett történhet.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 3,40 Ft.

LOBELINUM hydrochloricum Ch. XIII.
inj. 0,3% és 1%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 3, ill. 10 mg lobelin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Narkózis, pneumonia, mérgezések stb. okozta légzésbénulás; gyermekek és újszülöttek asphyxiája.

Adagolás: *Felnőtteknek* 1 ml 1%-os injekció s. cut. vagy i. musc.
Újszülötteknek és csecsemőknek 4 hónapos életkorig 1 ml 0,3%-os injekció, 4 hónapos kortól 1 éves korig 2 ml 0,3%-os injekció i. musc., felnőtteknek i. ven. Felnőttek legnagyobb egyszeri adagja 0,02 g, legnagyobb napi adagja 0,1 g.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 0,3% b. 5×1 ml amp. 8,60 Ft,
1% b. 5×1 ml amp. 20,70 Ft.

LUKULLIN E.Gy.T. XXI.
bélben oldódó drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,10 g pancreatin., 0,05 g haemicellulas., 0,05 g natr. choleinic., 0,0125 g natr. sulf. sicc., 0,0125 g natr. carb. sicc., 0,025 g magn. phosph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Emésztési mirigyek elégtelen funkcióján alapuló dyspepsiák, achyliák, meteorismus, flatulentia.

Adagolás: Közvetlen étkezés után naponta 3-szor 1—2 drazsét egészben lenyelni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: b. 60 drazsé 21,40 Ft.

MEDIVALER B. III.

cseppek

Összetétel: 1 üveg (15 g) 0,0075 g atrop. sulf., 0,45 g phenobarbital., 0,30 g menthol., 14,24 g extr. valerian. spirit. fluid.-ot tartalmaz.

Javallatok: A központi idegrendszer vegetatív zavarai, vegetativ dystonia, vasolabilitas, vasoneurosisok, Menière-syndroma, essentialis hypertonia, trauma utáni vegatatív neurotikus tünetek, szívdobogás, szívfájás, hysteria, neurasthenia, félelmi érzések.

Adagolás: Naponta 3-szor 25—30 csepp.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (15 g) 13,60 Ft.

MEDOBIS Ch. XLVII.

olajos inj. gyermekek és olajos inj. felnőttek részére

Összetétel: 1 amp. *gyermekek részére* (0,2 ml) 0,054 g bismuth. diallyiacet. (= 0,018 g Bi), 0,05 g alcohol benzylic., oleum pro inj. ad 0,2 ml-t tartalmaz.
1 amp. *felnőttek részére* (0,5 ml) 135 mg bismuth. diallylacet. (0,045 g Bi), 125 mg alcohol benzylic., oleum pro inj. ad 0,5 ml-t tartalmaz.

Javallat: Lues, tonsillitis, herpes zooster.

Ellenjavallat: Bi-túlérzékenység.

Adagolás: Felnőtteknek hetenként 2—3-szor 0,5 ml,

gyermekeknek 2 éves korig hetenként 2-szer 0,05 ml, 2—5 évesnek 0,10 ml, 6—15 évesnek 0,20 ml. A befecskendezés hosszú tűvel a glutaeusba, annak a felső-külső területébe történjék. A kúra 15—24 inj.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10×0,2 ml amp. 12,50 Ft,
10×0,5 ml amp. 14,80 Ft.

MELIPRAMIN E.Gy.T. IV.

drazsé **25 mg** és **10 mg**, inj.

Összetétel: 1 drazsé 25 mg, ill. 10 mg imipramin. hydrochlor.-ot,
1 ampulla (2 ml) 25 mg imipraminum hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Endogen depressio, mania-depressio depressiv fázisa, reactiv depressiók, arteriosclerotikus depressio, involutiós depressio, kezdődő depressiós fázis kialakulásának megakadályozása. — *A Melipramin drazsé 10 mg: főként fenntartó adagnak alkalmazható*, valamint a gyermekkori enuresis nocturna gyógykezelésére.

Ellenjavallatok: Hepatitis, cardialis elégtelenség, tachycardiával járó kórképek, prostata-hyperthrophia, epilepsia, glaucoma.
Keringési elégtelenségben a kezelés előtt compenzálás szükséges. 65 éven felüli betegeknél (generalizált tremor veszélye), epilepsiás anamnesisű betegeknél (rohamkiváltás!) és ambulans kezelésnél (depressiós suicidium lehetősége) fokozott óvatosság, szigorú orvosi felügyelet szükséges.
Monoaminooxidase-bénítókkal (pl. Nuredal) *együtt adni veszélyes!*

Adagolás: Individuális. Általános irányelvek:
Intramuscularis és oralis kezelés kombinációja: Első nap 3×1 amp., majd naponta 1 ampullával emeljük az adagot. A 7. naptól 1—1 ampullát elhagyunk, és azokat 2—2 25 mg-os drazséval helyettesítjük a 12. napig. A 13. napon csak (25 mg-os) drazsét adunk, majd a 21. napig napi 1—1 drazséval csökkentve az adagot, elérjük a napi 4×1 (25 mg-os)

drazsé fenntartó adagot. Ha a drazséra való áttéréskor visszaesés mutatkozik, azonnal vissza kell térni az i. musc. kezeléshez. — *Az enyhébb, nem psychotikus depressziókban* napi 2 ampulla inj., ill. napi 3—6 25 mg-os drazsé elegendő.
Orális kezelés: 10—14 napig fokozatosan emeljük a napi adagot 6—10 25 mg-os drazséig, majd a 10—14. naptól fokozatosan csökkentjük azt napi 2—6 25 mg-os drazséig, amelyet fenntartó adagként adunk. A kezelést az esetek jelentős részében pyschotherapiával egészítjük ki. Az adagokat általában ébredéstől 15 h-ig ajánlatos elosztani. Az enyhébb depressziókban napi 3—6 25 mg-os drazsé elegendő, fenntartó adagként 1—2 drazsét adjunk. — A Melipramin nem contraindikálja az electroshock-kezelést, sőt kevesebb electroshockot tesz szükségessé.
A Melipramin drazsé 10 mg adásának általános irányelvei: Fenntartó adag napi 3×1 drazsé, ill. 3×2—4 drazsé. Nagyobb Melipramin-adagok szükségessége esetén a *Melipramin drazsé 25 mg* adagolandó! Helyes indicatio esetén a Melipramin drazsé 25 mg-ossal folytatott gyógyszerelést 3—4 hétnél korábban nem célszerű megszakítani, ezután következik a fenntartó adag, további néhány hétig.
Combinatióban jól alkalmazható: phenothiazinnal, főként levomepromazinnal (Tisercin), barbiturattal, promethazinnal (Pipolphen), meprobamattal (Andaxin).

Mellékhatás: Ha kisebb adagokat alkalmazunk, melléktünetek csak kismértékben vagy egyáltalán nem jelentkeznek. Nagyobb adagok után szájszárazság, izzadás, gyengeség, szédülés, mérsékelt vérnyomáscsökkenés, tachycardia, „szívdobogás", accomodatiós zavarok, fejfájás, kishullámú tremor, obstipatio, álmatlanság, fotosensibilitas, eosinophylia, a serum-fehérjeszint csökkenése fordulhat elő. Ritkábban: álmosság, fokozott fáradékonyság, elhízás, hányinger, hányás, collapsus, vizelet-retentio, urticaria, bőrpír, bőrviszketés, Quincke-oedema, élénkebb saját reflexek, fascicularis rángások, rigoros tónus-fokozódás, choreás mozgászavarok, generalizált tremor, grand mal, visceralis és peripheriás paraesthesiák, hallucinatio, izgatottság. Egyes esetekben megfigyelték a depressiók átcsapását hypomaniás, ill. maniás fázisba.
Melléktünetek esetén az egyes adagok mennyiségét és napi elosztását szükség szerint meg lehet változtatni, bár enyhébb melléktünetek rendszerint beavatkozás nélkül is elmúlnak vagy jelentősen csökkennek. A kúra megszakítására csak súlyosabb — ritkábban előforduló — esetek kényszerítenek. A sympathicotoniás (atropinszerű) melléktünetek sympathicolyticummal (pl. Redergam) jól befolyásolhatók. Izgatott és álmatlan betegeknél jó eredmény érhető el az esténként alkalmazott neuroplegicumokkal és altatókkal.
Figyelmeztetés: Huzamos adagolás esetén a vérkép és a máj-functio időnként ellenőrizendők.
Vesebetegeknek kellő óvatossággal adagolandó.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére idegszakrendelések (ideggondozók) szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak idegszakrendelés (ideggondozó, fekvőbeteg-gyógyintézeti elmeideg osztály) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott időtartam, de legfeljebb a javaslat keltétől számított két hónapon belül történő gyógykezelés céljából. A javaslatot adó szakrendelést (osztály) és a javaslat keltét a vényen fel kell tüntetni. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 50 drazsé (25 mg-os) 20,— Ft, 500 drazsé (25 mg-os) 173,— Ft,
50 drazsé 10 mg-os 12,80 Ft, 500 drazsé 10 mg-os 113,80 Ft,
10×2 ml amp. 20,— Ft.

MENOTHEOSAN B. drazsé XXXIV.

Összetétel: 1 drazsé 0,02 mg dienoestrol., 80 mg theobromin., 20 mg phenobarbital., 0,25 mg extr. strychni sicc., 20 mg papaverin., 0,2 mg extr. bellad. sicc., 1 mg aloin, 0,15 mg phenlaxinum.-ot tartalmaz.

Javallatok: A climacterium hormonalis, neurogen és keringési zavarainak egyidejű megszüntetése, ill. csökkentése.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 drazsé 14,10 Ft.

MERISTIN E.Gy.T. — K.Gy. XII.
végbélkúp, tabl.

Összetétel: 1 kúp 0,5 mg atrop. methylnitr., 11,6 mg codein, 32,8 mg phenobarbital., 35,6 papaver., 200 mg amidazoph.-ot;
1 tabletta 20 mg phenobarbital., 20 mg papaver. hydrochlor., 200 mg amidazoph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Visceralis görcsök, dysmenorrhoeás fájdalmak.

Adagolás: Szükség esetén 1—2 tabl. vagy 1 kúp.

Megjegyzés: ✠✠ kúp, ✠ tabl. Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 tabl. vagy 5 kúp orvosi vény nélkül kiadható.

Csomagolás: b. 5 kúp 17,30 Ft,
b. 20 tabl. 13,— Ft.

METHIONIN A. XXII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,50 g methioninumot tartalmaz.

Javallatok: Járványos hepatitis, táplálkozási egyensúlyzavarból eredő zsíros máj-degeneratiók, hepatotoxikus anyagok (széntetraklorid, kloroform, trinitrotoluol, tetraklóretilén, foszfor, arzénvegyületek) mérgezése útján keletkezett zsíros máj-degeneratiók, máj-cirrhosis, súlyos égés.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3×2 tabl. *Gyermekeknek* kor szerint 1—3 tabl. étkezéskor.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 tabl. 6,90 Ft.

METICILLIN Ch. XLVII.
inj.

Összetétel: 1 üveg (I) 1 g meticillinum natr.-ot tartalmaz,
1 amp. (II) 1,5 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallat: Resistens Staphylococcus-fertőzés.

Ellenjavallat: Penicillin-túlérzékenység.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 4—6 óránként 1 g, 1,5 ml desztillált vízben oldva, lassan és mélyen intramuscularisan, esetleg lassan intravenásan 5 ml desztillált vízben felhígítva, nehogy a magas koncentráció thrombophlebitist okozzon. *Gyermekek* napi adagja testsúlykg-onként 100 mg, négy egyenlő adagra elosztva.
Intravenás infúziója előnyös, de csak legfeljebb 8 órai időtartamra elegendő mennyiségű oldatot készíthetünk, mert az oldat fokozatosan „felhős" lesz. Ezért az infúziós üveget 8 óránként feltétlenül cseréljük ki.

Megjegyzések: ✠ Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van forgalomban. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 10×1 üveg (I)+10×1 amp. (II) oldószer 530,— Ft.

METOTHYRIN K.Gy. XXXII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,01 g methimazolumot tartalmaz.

Javallatok: Hyperthyreosis, thyreoidectomia előkészítése, fiatal és öregkori exophthalmiás golyva.

Ellenjavallatok: Graviditas, leukopenia, bármilyen lázas állapot.

Adagolás: A kezdő adag naponta 3×2 tabletta. Ezt az adagot 6—10 héten át célszerű adagolni. Ezután, amennyiben a szubjektív panaszok tartósan rendeződtek és az objektív tünetek is a pajzsmirigyműködés tartós normalizálódására utalnak (testsúly, pulzusszám, alapanyagcsere), az adag napi 4×1 tablettára csökkenthető. A kúra teljes időtartama

általában 1—1½ év. Az ez idő alatt alkalmazandó napi adag az egyéni szükséglet, és tűrőképesség figyelembevételével a klinikai kép gondos megfigyelése mellett változtatható. A minimális napi adag 2×1 tabletta. Tartós psychés terhelést jelentő időszakokban ajánlatos a napi adagot 3—4-szer 1 tablettára emelni.

A kúra során a vérképet legalább 2 hetenként rendszeresen ellenőrizni kell (fehérvérsejtszám, vörösvérsejtszám, minőségi vérkép). Minden hirtelen fellépő betegség vagy panasz (elsősorban a torok- és szájnyálkahártyatünetek jelentkezése) esetén a vérkép soron kívül ellenőrizendő. Ha a fehérvérsejtszám ismételten 4000 alatt van és a minőségi vérképben a granulocyták száma 50% alá csökken, a kúrát azonnal félbe kell szakítani.

A struma növekedése miatt a Metothyrin-kúrát megszakítani nem szabad, hanem a strumigen hatás ellensúlyozására jódkészítményt, Lyothyronint vagy pajzsmirigykivonatot tartalmazó gyógyszert célszerű adagolni. — Bármilyen okból fellépő lázas állapot észlelése esetén a kúrát azonnal félbe kell szakítani.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 25 tabl. 9,70 Ft, 50 tabl. 17,30 Ft, 250 tabl. 72,20 Ft.

MIKROFOLLIN K.Gy. XXXIV.
tabl. **0,01 mg** és tabl. **0,05 mg**

Összetétel: 1 tabl. 0,01, ill. 0,05 mg aethynyloestradiol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Amenorrhoea és oligomenorrhoea, metrorrhagia és menorrhagia, dysmenorrhoea, nemkívánatos lactatio, acne vulgaris, prostata-carcinoma, carcinoma metastaticum bizonyos eseteiben.

Adagolás: A Mikrofollin adagolása individualis. Az alábbiakban, a 0,01 mg-os tablettára vonatkoztatva, általános kezelési módokat adunk meg.

Amenorrhoeában és oligomenorrhoeában naponta 2—10 tabletta, 20 napon át, ezután 5 napon át naponként 5 mg i. musc. adagolható progesteron-készítmény. Dysmenorrhoeában 2—3 havonként 1—3 tabletta 20 napon át, a ciklus 4—5. napján kezdve az adagolást. Nemkívánatos lactatióban: a szülés után az első 3 napon át naponta 3×2 tabletta, további 3 napon át 3×1 tabletta, ezután pedig 3 napon át naponként 1 tabletta. Acne vulgarisban naponta 3—6 tabletta.

Prostata-carcinomában a bevezető adag naponta 3×1—2 tabletta (!) 0,05 mg, ezt az adagot fokozatosan csökkentjük, a napi 1 tabletta fenntartó adag eléréséig.

Carcinoma metastaticumban az adagolás módja a daganat jellegétől és a kórlefolyástól függ. Szükség esetén a kezelés castratióval kombinálható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 30 tabl. (0,01 mg) 3,90 Ft,
30 tabl. (0,05 mg) 7,20 Ft.

MISCLERON Ch. XVI.
kapszula

Összetétel: 1 kapszula 250 mg clofibratum-ot tartalmaz.

Javallatok: Olyan betegségek, amelyekben a serumlipidek (cholesterin triglyceridek) szintje kórosan megemelkedett. Ideértve elsősorban a következő betegségek hyperlipidaemiával járó eseteit: atherosclerosis (coronaria-sclerosis, cerebralis és peripheriás arteriosclerosis), arteriopathia diabetica, primaer biliaris cirrhosis, valamint essentialis (familiaris) hyperlipidaemia, továbbá a serum-lipidszinttől függetlenül xanthomatosisban.

Ellenjavallatok: Terhesség, valamint súlyosabb máj- és vesekárosodás esetén nem alkalmazható.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 3-szor 2—3 kapszula, étkezés után.

Mivel a véralvadásgátlók hatását fokozza, az esetleg egyidejűleg alkalmazott anticoagulans készítmény adagját ajánlatos a Miscleron-kezelés meg-

kezdésekor a felére csökkenteni és a továbbiakban a szükséges adagot újból meghatározni.
A Miscleron-kezelés alatt a serum-lipid-szint rendszeres (a beállítás után kb. 4 hét múlva, majd 2—3 havonkénti) ellenőrzés szükséges.

Mellékhatások: Szórványosan előforduló nemkívánatos mellékhatások (gyomorpanaszok, enyhe hányinger, esetleg hányás vagy hasmenés) csak átmenetiek. Bőrtünetekben megnyilvánuló túlérzékenységi jelenségek (bőrviszketés, esetleg exanthema), a kezelés megszakítása nélkül is megszűnnek.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére hypercholesterinaemiában és hypergliceridaemiában szenvedő betegek xanthomatosisa esetén, idiopathiás familiaris hyperlipidaemiában, diabeteses betegek lipaemiás exsudatív retinopathiája esetén, infarctuson átesett hypercholesterinaemiás vagy hypertriglyceridaemiás betegek részére rendelhető, csakis fekvőbeteg-gyógyintézetben történt kivizsgálás és beállítás alapján. A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani. A vényen fel kell tüntetni a javaslatot adó fekvőbeteg-gyógyintézetet és a javaslat keltét. A fekvőbeteg-gyógyintézet javaslata 6 hónapig érvényes. A gyógyszer további rendelése csakis újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálat és javaslat alapján történhet.

Csomagolás: 50 kapszula 31,80 Ft, 250 kapszula 153,—Ft.

MORGALIN Ch. XLVII.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 100 mg moroxydinum hydrochlor., 100 mg acid. ascorbic., 1 mg methylhomatrop. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Herpes zooster, herpes cornae, keratitis.

Ellenjavallat: Glaucoma.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek általában naponta 3-szor 2 drazsé, gyermekeknek napi 3-szor 1 drazsé 6—8 napon át.

Mellékhatások: Enyhe gyomorpanaszok, fejfájás, esetleg múló szédülés.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csakis herpes zooster, herpes corneae, keratitis esetén rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 24 drazsé 9,80 Ft, 250 drazsé 69,— Ft.

MORPHINUM HYDROCHLORICUM B. V.
inj. 1%, 2%, 3%, 4%

Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 10 mg, ill. 20 mg, 30 mg, 40 mg morph. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallat: Fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Szükség esetén naponta 1—3-szor 1 amp. s. cut.
Gyermekadagok: Csecsemők ne kapjanak morfint! 1—14 éves korig: 0,2—0,1 mg/kg/dosi, s. cut. 1—2-szer naponta. — A gyermekgyógyászatban a morfinnak csak elsősegélyként (a shock-ellenes küzdelemben és tüdő-oedema kezelésében), valamint — kivételesen — súlyos, kínzó fájdalom és moribund állapot esetén van helye.

Megjegyzés: ✠✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — A 4%-os inj.-ból 1 ml a legnagyobb egyszeri adagot túllépi!

Csomagolás: 1% b. 10×1 ml 10,60 Ft, b. 50×1 ml 53,— Ft,
2% b. 10×1 ml 13,30 Ft, b. 50×1 ml 66,50 Ft,
3% b. 10×1 ml 14,50 Ft, b. 50×1 ml 72,50 Ft,
4% b. 10×1 ml 15,90 Ft, b. 50×1 ml 79,50 Ft.

MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2% + ATROPINUM SULFURICUM 0,05% B. V.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 mg morph. hydrochlor., 0,5 mg atrop. sulf.-ot tartalmaz.

Javallat: Fájdalomcsillapítás.

Adagolás: Szükség esetén naponta 1—3-szor 1 amp. s. cut.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 13,50 Ft, b. 100×1 ml amp. 135,— Ft.

MYCOSID K.Gy. oldat, hintőpor XLVI.

Összetétel: 1 üveg (100 ml oldat) 4 g natr. p-chlorbenzoic.-ot,
1 szóródoboz (100 g) 4 g natr. p-chlorbenzoic., 10 g zinc. oxid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Mycotikus, felületi bőrfertőzések (epidermophytia inguinalis et axillaris, intertrigo mycotica, pityriasis versicolor, trychophytia superficialis).

Adagolás: Therapiás alkalmazás: A fertőzött területek ecsetelése naponta 1—2-szer vagy behintés. Prophylactikusan hetenként 1—2-szer a testhajlatok beecsetelése vagy behintése.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetők.

Csomagolás: 1 üveg (100 ml) 11,30 Ft,
1 szóródoboz (100 g) 15,80 Ft.

MYDETON K.Gy. inj., drazsé XI/XVI.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 100 mg 1-piperidino-2-methyl-3(4'-tolyl)-propanon-3-hydrochlor., 2,5 mg lidocain, hydrochlor., 0,3 ml diaethylenglycol-monoaethylaether-t,
1 drazsé 50 mg 1-piperidino-2-methyl-3-(4'-tolyl-)-propanon-3, hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: A harántcsíkolt izomzat bármilyen organikus neurológiai megbetegedés következtében (pyramis-pályák sérülései, sclerosis multiplex, myelopathiák, encephalomyelitis stb.) létrejött, tónusfokozódással járó állapotai: izom-hypertonia, izomspasmus, izom-contractura, rigiditas, spinalis automatismus. Postencephalitises és arteriosclerotikus parkinsonismus. Obliterativ érbetegségek (arteriosclerosis obliterans, angiopathia diabetica, thrombangiitis obliterans, Raynaud-kór, sclerodermia diffusa), továbbá érbeidegzési zavaron alapuló kórképek (acrocyanosis, dysbasia angioneurotica intermittens). Egyéni megítélés alapján: postthrombotikus venás és nyirokkeringési zavarok, ulcus cruris. *Sajátos gyermekgyógyászati javallat:* Little-kór (spastikus bénulás).

Adagolás: 3-szor 1—3 drazsé naponta, a beteg egyéni szükségletének és toleranciájának megfelelően. — Az injekció intramuscularisan, intravenásan lassan és intraarterialisan alkalmazható. — A Mydeton injekció intraarterialisan napi 1 ampulla mennyiségben fiziológiás konyhasóoldattal 10 ml-re hígítva adagolandó. — Intramuscularis alkalmazás esetén a napi adag általában 2×1 ampulla.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 6 éves korig a drazséból 5 mg/kg/die, 3 részre elosztva. 7—14 éves korig 4—2 mg/kg/die, 3 részre elosztva.
Mellékhatás: izomgyengeség, bódultság.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 13,80 Ft, 50×1 ml amp. 123,— Ft.
30 drazsé 19,60 Ft, 500 drazsé 272,70 Ft.

MYELOBROMOL Ch. tabl. L.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g mitobronitolum-ot tartalmaz.

Javallat: Myeloid leukaemia mind korai, mind későbbi szakasza, valamint polycythaemia vera.

Adagolás: Egyéni. Az adagot a vérkép és a beteg klinikai állapotának gondos ellenőrzésével úgy kell megállapítani, hogy a legkedvezőbb therapiás hatás minimális toxicitással legyen elérhető.
Átlagos adagolása: A kezdeti adag 50 kg-os testsúlyra számítva naponta 1 tabletta (250 mg), 25—75 kg testsúlyra számítva ½—1½ tabletta (125—375 mg). Ezen adagolással a leukocyták száma (esetleges átmeneti emelkedés után) fokozatosan csökken,

a lép kisebbedik, a minőségi vérkép összetétele és a csontvelő állapota javul. Ezután az adagolást kúraszerűen, a beteg állapotától függően 3—6 héten át folytatjuk.

Ha a leukocyták száma 20 000 alá csökken, akkor 2—3 naponként ½—1 tabletta fenntartó adagolásra térünk 8—12 héten át, a vérkép és a beteg állapotának rendszeres ellenőrzése mellett.

Fontos a megfelelő fenntartó adag meghatározása az esetleges korai visszaesés elkerülésére. A leukocyta-szám emelkedésének első jelére és a beteg klinikai állapotának rosszabbodása esetén ismét a kezdeti naponkénti adagolás (½—1—1½ tabl.) ajánlott, az újabb klinikai remisszió beálltáig.

A teljes vérkép és a thrombocyta-szám rendszeres ellenőrzése a kezelés kezdetén hetenként háromszor, a későbbiekben hetenként szükséges.

Mellékhatások: Jelentősebb mellékhatások a gyomor-bélhuzam részéről (étvágytalanság, hányinger, hányás, hasmenés) leginkább túladagolás következtében fordulhatnak elő. — A kezelés folyamán a készítmény anaemiát nem okoz, de a fennálló thrombopeniát fokozhatja, ezért 100 000 alatti thrombocyta-szám esetén csak transfusio védelmében adható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 45,50 Ft, 100 tabl. 445,50 Ft.

MYOFLEXIN Ch. tabl. XI.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g chlorzoxazonumot tartalmaz.

Javallatok: Myalgiák (lumbago, brachialgia, torticollis stb.), izom-rheumatismus, rheumatoid arthritis, contusiók, distorsiók, spondylarthrosis, discus-herniával járó panaszok, izom-contracturák, túlerőltetés okozta izompanaszok, derékfájás stb. Törésekkel, nyújtásokkal és gipszkötésekkel kapcsolatos görcsös fájdalmakban.

Ellenjavallat: Máj-laesio.

Adagolás: Individuális. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta, szükség esetén (csak súlyos esetekben) fokozatosan emelve naponta 3—4-szer 2 tablettára. A legnagyobb egyszeri adag 3 tabletta (750 mg). A kedvező hatás jelentkezésekor az adagok csökkenthetők.

Gyermekadagok: 2 éves korig 3-szor ¼ tabl., 2—6 éves korig 3—4-szer ¼ tabl., 6—10 éves korig 3-szor ½ tabl., 10 éven felül 3-szor 1 tabl.

Mellékhatások: Szórványosan előfordulhatnak hypotonia, szédülés, hányinger, abdominalis zavarok, valamint bőrjelenségek is. Ilyenkor a készítmény további adagolását azonnal beszüntetjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 19,— Ft, 200 tabl. 163,— Ft.

NALORPHIN Ch. inj. LII.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 mg nalorphin. hydrobrom.-ot tartalmaz.

Javallat: A morfinnal, annak egyes származékaival, továbbá a morfinszerűen ható szintetikus vegyületekkel (Dolorgan stb.) történő mérgezés és túladagolás esetében antidotumként.

Adagolás: A kívánt hatás szükségességének megfelelően i. ven., esetleg i. musc. vagy s. cut. alkalmazható. Felnőtteknek egyszeri adagja 5—10 mg (1—2 amp.), amely adag — ha a légzés megfelelően nem javul — 10—15 perc múlva megismétlendő. Hatása általában 3—4 órán keresztül tart. Súlyos mérgezésben is elegendő rendszerint összesen 40 mg, megfelelő elosztásban, de szükség esetén az összadag emelhető.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 7,20 Ft, 50×1 ml amp. 66,— Ft.

NAPHAZOLIN E.Gy.T. XVII.
oldat

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 0,01 g naphazolinum hydrochlor., 0,29 g acid. bor.-ot tartalmaz 10 ml vizes oldatban.

Javallatok: Rhinitis, pharingitis, laryngitis, conjunctivitis, keratitis ekzematosa.

Adagolás: Javallattól függően általában naponta többször 2—4 csepp oldat az orrlyukba vagy a kötőhártyatasakba cseppentve.
Gyermekadagok: Csecsemőknek és gyermekeknek 6 éves korig mérgezés veszélye miatt ne adjuk! 7—14 éves korig tiszta vízzel felére-kétharmadára hígítva, naponta 3-szor egy-egy cseppet az orrnyílásokba.
Mellékhatás: Vérnyomásemelkedés, ingerlékenység vagy depressio; coma. Hosszas használata a náthát idültté teheti. — Hígítatlan használata vagy túl gyakori alkalmazása súlyos mérgezést okozhat, mivel a gyulladt orrnyálkahártyán át felszívódhat.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 ml orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 3,80 Ft.

NATRIUM CHLORATUM B. XVIII.
inj 10% (hypertonica)

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 1 g natr. chlor. pro infusione-t tartalmaz.

Javallat: Vérzéscsillapítás.

Adagolás: Szükség szerint 1—2 amp. kizárólag i. ven.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×10 ml amp. 28,— Ft.

NATRIUM CHLORATUM B. XX.
inj. 0,9% (isotonica)

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 0,09 g natr. chlor. pro infusione-t tartalmaz.

Javallatok: Hiányzó folyadék pótlása, exsiccosis, laboratóriumi célokra.

Adagolás: I. ven.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×10 ml amp. 28,— Ft, b. 100×10 ml amp. 280,— Ft.

NATRIUM CITRICUM K.Gy. XVIII.
inj. 3,3%

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 0,38 g natr. citr. pro infusione-t tartalmaz (ami megfelel 0,33 g vízmentes trinátriumcitrátnak).

Javallat: Véralvadás gátlása.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×10 ml amp. 13,60 Ft, b. 50×10 ml amp. 136,— Ft.

NATRIUM NITROSUM B. XVI.
inj. 4% és 10%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,04 g, ill. 0,10 g natr. nitros.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypertonia, angina pectoris, epekőkólika, ólomkólika; cianmérgezésben antidotum.

Ellenjavallat: Jód-, illetve brómsókkal kezelés alatt álló betegeknél ellenjavallt.

Adagolás: Naponta 1—2 amp. s. cut. Cianmérgezésben intravenásan összesen 6—10 mg/testsúlykg-nak megfelelő mennyiség.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 4% 11,60 Ft, b. 100×1 ml amp. 4% 116,— Ft,
b. 10×1 ml amp. 10% 11,60 Ft, b. 100×1 ml amp. 10% 116,— Ft.

NATRIUM SALICYLICUM E.Gy.T. VI.
bélben oldódó drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,5 g natr. salic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Heveny sokízületi csúz, hűléses megbetegedések, izomfájdalmak, lumbago, pleuritis, iridocyclitis, polyneuritis.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Febris rheumatica.

Adagolás: Naponta 3—5-ször 1—6 drazsé.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 0,10 g/kg/die, 5 részre elosztva.
Mellékhatás: Érzékenység esetén acidosis („magas" légzés, szapora légzés stb.).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 drazsé 7,40 Ft, b. 100 drazsé 37,— Ft.

NEO-ADIGAN K.Gy. XIV.
inj., cseppek

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,4 mg digit. lanat. A+B+C glycosid. cryst.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban, 1 üveg (15 ml) 7,5 mg digit. lanat. A+B+C glycosid. cryst.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban (1 ml = 40 csepp = 0,5 mg hatóanyag).

Javallatok: A keringési elégtelenség (cardialis decompensatio) megszüntetése és a compensatio fenntartása.

Adagolás: A compensatio helyreállítására napi 1—3 ampulla i. ven., illetve 40—100 csepp (1—2,5 ml), amely adagot a következő napokban csökkenteni

helyes akkor is, ha toxikus jelenség egyáltalán nem mutatkozik. A helyreállított compensatio fenntartására általában napi 30—60 csepp (0,75—1,5 ml) szükséges.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 8,60 Ft,
1 üveg b. (15 ml) 10,10 Ft.

NEOCARBOLAX E.Gy.T. XXIV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g extr. rhei sicc., 0,05 g sulfur. praecip., 0,10 g sennae fol., 0,19 g carbo activ.-ot tartalmaz.

Javallatok: Obstipatio, flatulentia, meteorismus, bélerjedés, intestinalis autointoxicatio.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—3 tabl. étkezés után vagy esténként 1—4 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 40 tabl. 5,20 Ft, b. 100 tabl. 13,— Ft.

NEOCIKLOTOX B. XLIX.
oldat

Összetétel: 1 üveg (50 g) 0,25 g gamma-hexachlor-cyclohexan., 0,40 g acid. trichlorat., 10 g aether petrol., 24,10 g ol. petrae-t tartalmaz olajos oldatban.

Javallatok: Fej- és lapostetű irtása.

Alkalmazása: A száraz hajat vagy egyéb szőrzetet Neociklotox-szal bekenjük, hogy a haj vagy a szőrzet teljesen átivódjék a szerrel. Bekenés után a fejet 20 percre kendővel bekötjük, majd 20 perc eltelte után a hajat száraz ruhával átdörzsöljük. Utána szappannal, kenőszappannal enyhén szódás, bő meleg vízben alaposan megmossuk, majd gyengén ecetes vízzel leöblítjük. A bekenés alatt a szemet óvjuk! Nyílt láng közelében ne tartózkodjunk, hosszabb ideig ne tartsuk a bőrön, mert bőrizgató hatású.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 4,50 Ft.

NEOGRANORMON B. kenőcs XLIV.

Összetétel: 1 tubus (25 g) 0,9 extr. pancreatis, 2,5 g extr. testiculi, 300 NE axerophth. (Vitamin-A), 100 NE ergocalciferol. (Vitamin-D_2), 3,75 g zinc. oxyd.-ot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallat: Sebkenőcs.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 25 g orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 tubus (25 g) 9,10 Ft.

NEO-GYNOFORT K.Gy. cseppek XXVI.

Összetétel: 1 üveg 2,5 mg ergotam. tart., 1,25 mg ergometrin. malein.-ot tartalmaz 10 ml szeszes-vizes oldatban.

Javallatok: A *szülészetben* korai gyermekágyi vérzés (atonia post partum), késői gyermekágyi vérzés, gyermekágyi subinvolutio megelőzésére és kezelésére, abortus incompletus esetén a vérzés csökkentésére, vetélés befejezése után a méh összehúzódásának elősegítésére, a *nőgyógyászatban* (a szövettani lelet ismeretében) a vérzés mennyiségének csökkentésére.

Adagolás: Naponta 2—3-szor 15 csepp.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 18,90 Ft.

NEOMAGNOL A. tabl. XLVI.

Összetétel: 1 tabl. 1 g chlorogeniumot tartalmaz.

Javallatok: Fertőtlenítő, kéz-, seb-, hólyag-, hüvely-, méh-, toroköblítés, furunculosis, lemosások, has-, pleura-űr átmosása műtét kapcsán, fogfehérítés, gyökérkezelés, műszerek, gumieszközök, használati tárgyak (fodrászeszközök) fertőtlenítése, ivóvíz csírátlanítása, mustárgázsérülés kezelése.

Alkalmazás: Külsőleg, a készítményhez mellékelt tájékoztató szerint.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Bábatáskák részére hivatalosan előírva.

Csomagolás: b. 10 tabl. 4,20 Ft, b. 100 tabl. 42,— Ft.

NEOPEPULSAN-duplex Ch. drazsé X.

Összetétel: 1 drazsé 40 mg propanthelinum bromat.-ot tartalmaz (20 mg gyomorban, 20 mg bélben oldódó rétegben).

Javallatok: Ulcus ventriculi és duodeni, akut és krónikus gastritis hyperacida, spasmus pylori, hyperemesis gravidarum, akut és krónikus pancreatitis, colitis, cholelithiasis stb.

Ellenjavallatok: Glaucoma, prostata-hypertrophia, cardialis decomp., pylorus-obstructio, masszív gyomorvérzés.

Adagolás: Kezdeti adagja általában naponta 2—3×1 drazsé, amely adag a klinikai állapot javulásával arányosan fenntartó adagra csökkenthető. — A kúraszerű adagoláskor a hatékonyság és a tűrőképesség figyelembevételével egyéni adagolásra törekedjünk. Legutoljára az esti adagot mérsékeljük. Az étrendi, nyugalmi stb. előírások betartandók. A ritkán előforduló *mellékhatások* (szájszárazság, szívdobogás, esetleg látási zavarok) az adag csökkentésére rövidesen elmúlnak.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 18,— Ft, 200 drazsé 180,— Ft.

NEOPERHEPAR 20 μg K.Gy. inj. XIX.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 2 ml hepatis extr. fluid. standard.-ot (= 20 μg cyanocobalamin) tartalmaz.

Javallatok: Anaemia perniciosa, más makrocytás anaemiák, máj-cirrhosis, Röntgen-kater, agranulocytosis, ólommérgezéses toxikus neuritisek, roborálás.

Adagolás: Naponta 1 amp. i. musc. vagy depot-kezelésre 3—5 amp. 2—4 heti időközökben. — A therapiás eredményt a reticulocyta-krízis és a vörösvérsejtszám emelkedése szabja meg. — Kezeletlen anaemia perniciosában első adag kb. 120 μg, utána 5—7 naponként ez az adag megismételhető, majd a vérkép normalizálódása után fenntartó adag adható: 2—4 hetenként 1—2 ampulla. Amennyiben a vérkép normalizálódása nem kielégítő, nagyobb adagok is adhatók.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 3×2 ml amp. 16,70 Ft, b. 50×2 ml amp. 278,50 Ft.

NEOPERHEPAR 60 μg K.Gy. inj. XIX.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 2 ml extr. hepatis fluid. standard.-ot (=60 μg cyanocobalamin) tartalmaz.

Javallatok: Anaemia perniciosa, más makrocytás anaemiák, máj-cirrhosis, Röntgen-kater, agranulocytosis, ólommérgezéses toxikus neuritisek.

Adagolás: Naponta 1 amp. i. musc. vagy depot-kezelésre 1—2 amp. (=60—120 μg) 2—4 heti időközökben. — A therapiás eredményt a reticulocyta-krízis és a vörösvérsejtszám emelkedése szabja meg. —

Kezeletlen anaemia perniciosában első adag kb. 2 amp. (=120 μg), utána 5—7 naponként ezen adag megismételhető, majd a vérkép normalizálódása után fenntartó adag adható: 2—4 hetenként 1—2 ampulla. Amennyiben a vérkép normalizálódása nem kielégítő, nagyobb adagok is adhatók.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak igazolt anaemia perniciosa, más makrocytás hyperchrom anaemiák, Röntgen-kater, agranulocytosis esetében rendelhetik, a kórisme feltüntetésével. Egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, az indikáció és kelte, valamint az indikáló szakrendelés (osztály) megjelölésével. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 3×2 ml amp. 48,80 Ft, b. 50×2 ml amp. 813,30 Ft.

NEOPHEDAN Ch. tabl. III.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g phenacemidumot tartalmaz.

Javallatok: Genuin és organikus eredetű epilepsia egyéb szerekkel nehezen befolyásolható formái.

Ellenjavallatok: Májműködés zavarai, személyiségzavarok.

Adagolás: Napi 1—4 tabletta, óvatosan emelkedő adagolásban a görcsök meggátlásáig. Sevenallal (este 0,1 g), valamint Diphedannal, brómmal kombinálható. Személyiségzavar, májártalom, kiütés esetén, leukocyta-szám csökkenésekor az adagolást meg kell szüntetni. A kezelést célszerű kórházban kezdeni: a fehérvérsejtszám és a májfunkció a gyógyszer szedése folyamán rendszeresen ellenőrizendő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 25 tabl. 12,80 Ft.

NEOTONOCAIN K.Gy. VIII.
inj.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 80 mg procain. hydrochlor., 0,05 mg adrenalin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Helyi érzéstelenítés.

Adagolás: A készítményhez mellékelt használati utasítás szerint.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 5 év.

Csomagolás: b. 10×2 ml 15,— Ft, b. 25×2 ml 37,50 Ft, b. 100×2 ml 150,— Ft.

NEOTONOCAIN K.Gy. VIII.
injekciós tabl.

Összetétel: 1 tabl. 125 mg procain. hydrochl. 0,125 mg adrenal.-ot tartalmaz.

Javallat: Helyi érzéstelenítő oldatok készítéséhez. 100 ml oldat elkészítéséhez szükséges mennyiség: 0,25 %-os 2 tabl., 0,5%-os 4 tabl., 1%-os 8 tabl., 2%-os 16 tabl.

Adagolás: A megfelelő mennyiségű tablettát *neutrális fiz. sóoldatban* oldjuk és ha szükséges, sterilizáljuk. — Infiltratióra: 0,25%—0,50%-os, vezetéses érzéstelenítésre: 1%—2%-os oldat használandó.

Megjegyzések: ✠ Szakrendelések a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Csak injekciós és külsőleg alkalmazható oldat készítéséhez használható. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 10 tabl. 4,10 Ft, 100 tabl. 21,— Ft.

NEOTROPARIN Ch. XII.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 40 mg drotaverinum hydrochl. (No-Spa), 1,5 mg methylhomatrop. bromat.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban.

1 tabl. 40 mg drotaverinum hydrochl. (No-Spa), 1,5 mg methylhomatrop. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Pylorus-spasmus, ulcus ventr. et duod., kőkólikák, postoperatív bélgörcs, cholecystitis, hyperemesis gravidarum, asthma bronchiale, enteritis, obstip. spast., dysmenorrhoea, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, túl erős fájások.

Adagolás: Naponta 2—3-szor 1—2 tabl., ill. 1—2 amp. s. cut., i. musc.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 15,10 Ft,
20 tabl. 17,10 Ft.

NEROBOL K.Gy. XXXVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg methandrostenolonumot tartalmaz.

Javallatok: Súlyos betegségek utáni elhúzódó reconvalescentia. Krónikus betegségek által létrehozott cachexiás állapotok, kimerültség, gyengeség, súlycsökkenés, osteoporosis, destruáló csontelváltozások, elhúzódó callus-képződés, kortikoszteroid-kezeléssel kapcsolatos negatív nitrogénegyensúly. — *Rendelése előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét (pl. ellenjavallt prostata-cc. és férfi emlő-cc. esetében)!*

Adagolás: Felnőtteknek kezdetben napi 10—20 mg 1—2 adagra elosztva, majd fenntartó adagként 5—10 mg naponta. Gyermekeknek 2 éves korig napi 1—2 mg, 5 éves korig 2—3 mg, 14 éves korig naponta vagy másodnaponta 5 mg. Gyermekeknél és fejlődés korában levő fiataloknál célszerű 4 heti szedés után 1—2 hónap szünetet tartani.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak osteoporosis esetében; hónapokon át tartó mellékvesekéreg-hormon kezelés esetén időnként az osteoporosis elkerülésére; degeneratív természetű szervi

idegbetegségek (lateralsclerosis amyotrophica, atrophia musculorum spinalis, dystrophia musculorum progressiva); fejlődésükben elmaradt csontozatú és növekedésű gyermekeknek (pl. Scheuermann-betegségben); nem tumoros eredetű súlyos cachexia; mastopathia cystica esetén, ha az androgenekkel kezelés nem kívánatos; emlőrák csontáttételes esetében androgén-kezelés kiegészítésére vagy folytatására; petefészekrák hasi áttételekkel járó eseteiben szakrendelések rendelhetik. — Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) két hónapnál nem régibb keletű javaslata alapján rendelhetik. Ilyen esetben a vényen a javaslatot adó intézményt, szakrendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 41,70 Ft.

NEROBOLETTA K.Gy. XXXVII.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 1 mg methandrostenolonumot tartalmaz.

Javallatok: A csecsemőkor különböző testfelépítési zavara (sorvadás különböző alakjai), fertőző betegségek utáni reconvalescentia, krónikus infectiókkal kapcsolatos dystrophia, gyengeség, kimerültség, osteoporosis, elhúzódó callus-képződés, kortikoszteroid-kezelés katabolikus hatásainak (súlycsökkenés, osteoporosis stb.) ellensúlyozása, renalis fehérjevesztéség. *Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét (csontfugák korai károsodása, virilisatiós hatások)!*

Adagolás: Csecsemőknek és gyermekeknek 2 éves korig naponta-másodnaponta ½—1 tabletta (0,5—1 mg), 5 éves korig napi 1—2 tabletta (1—2 mg), 14 éves korig naponta 3—5 tabletta (3—5 mg). — Gyermekeknél és a fejlődés korában levő fiatalok-nál célszerű 4 heti szedés után 1—2 hónap szünetet tartani.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések, körzeti gyermekgyógyászok szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott időtartamú gyógykezelésre. A vényen fel kell tüntetni a kórismét, a javaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézetet) és a javaslat keltét. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 12,80 Ft.

NEROBOLIL K.Gy. XXXVII.

olajos inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 25 mg noradrostenolon. phenylprop., 0,03 ml alcohol benzylic., 0,1 ml alcohol isopropylic.-t tartalmaz.

Javallatok: *Mindkét nemű felnőttnek* adható fehérjevesztéség esetén, pl. súlyos traumák után, műtéti elő- és utókezelésre, kortikoszteroid-kezelés alatt a negatív nitrogénegyensúly helyreállítására, geriatriában, osteoporosisban, lassan gyógyuló törésekben, decubitusban, kimerültségben, reconvalescentiában és hizlalás céljára.
Nőknek: inoperabilis mamma-tumor kezelésére, főleg csontáttételtel szövődött esetekben, sebészi és röntgenkezelés adjuválására, valamint hyperemesis gravidarumban előforduló súlycsökkenés miatt.
Gyermekeknek: rosszul táplált, rossz étvágyú, leromlott, fejlődésben visszamaradt esetekben, sebészi beavatkozások előtt és után, traumák után, krónikus betegségekben adjuválásra, osteogenesis imperfectában.
Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét (pl. ellenjavallt prostata-cc. és férfi emlő-cc. esetében)!

Ellenjavallat: Prostata- és férfi emlő-carcinoma.

Adagolás: Felnőtteknek általában heti 25—50 mg (1—2 amp.) i. musc., gyermekeknek heti 12,5—25 mg (½—1 amp.) i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak osteoporosis esetében; hónapokon át tartó mellékvesekéreg-hormon-kezelés esetén időnként, az osteoporosis elkerülésére; degeneratív természetű szervi idegbetegségek (lateralsclerosis amyotrophica, atro-

phia musculorum spinalis, dystrophia myotonica progressiva); fejlődésükben elmaradt csontozatú és növekedésű gyermekeknek (pl. Schemann-betegségben); nem tumoros eredetű súlyos cachexia; mastopathia cystica esetén, ha az androgenekkel kezelés nemkívánatos; emlőrák csontáttételes esetében androgen-kezelés kiegészítésére vagy folytatására; petefészekrák hasi áttételekkel járó eseteiben szakrendelések rendelhetik. — Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) két hónapnál nem régibb keletű javaslata alapján rendelhetik. Ilyen esetben a vényen a javallatot adó intézményt, szakrendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 3×1 ml 54,— Ft, 50×1 ml 877,— Ft.

NEUPON B.
drazsé III.

Összetétel: 1 drazsé 0,1 g calcium glycerinophosphor. ($2\ H_2O$), 0,25 g kalium brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Idegesség, chorea, epilepsia, pertussis, neurasthenia, hysteria, alvászavar.

Adagolás: Naponta 3-szor 2 drazsé.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 40 drazsé 7,50 Ft.

NEVIGRAMON Ch.
kapszula XLVII.

Összetétel: 1 kapszula 500 mg acid. nalidixic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Főleg Gram-negatív kórokozók által okozott polyresistens akut és krónikus húgyúti fertőzések, a gyomor-bélhuzam Salmonella vagy Shigella által okozott fertőzése, valamint különösen a polyresistens E. coli fertőzések.

Ellenjavallatok: A légzőközpont depressiója esetén, továbbá máj- és veseelégtelenségben csak fokozott óvatossággal alkalmazható a funkciós vizsgálatok elvégzése mellett. A terhesség első harmadában és csecsemőknek 1 hónapos korig ne alkalmazzuk.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 4-szer 2 kapszula kúraszerű adagolással legalább 7 napon át, indokolt esetben hosszabb időn át csökkentett adagolással (napi 4-szer 1 kapszula).
Csecsemőknek 2 hónapos kortól 1 éves korig. 125 mg naponta 2—4-szer, 1 éves kortól 2 éves korig 250 mg 2—3-szor naponta.
Gyermekek adagja 2-től 6 éves korig 250 mg naponta 3—4-szer, 6-tól 14 éves korig 500 mg naponta 2—4-szer.

Mellékhatások: Nemkívánatos mellékhatásokat (émelygés, hányás, hasmenés, esetleg fejfájás, szédülés), valamint allergiás reakciókban megnyilvánuló túlérzékenységet (bőrpír, pruritus, láz, eosinophilia, urticaria) okozhat. Az érzékeny betegek egy részénél fény hatására kialakuló bőrelváltozást (photodermatosist) okozhat, amely a kezelés időszakos megszakítását teszi szükségessé. Ezért a beteg óvakodjon a napsugárzástól. Mivel a Nevigramon bakteriostatikus hatását a Nitrofurantoin csökkenti, a két gyógyszer együttesen nem alkalmazható!

Megjegyzés: ✠ Elsősorban fekvőbeteg-gyógyintézetek részére szolgál. Társadalombiztosítás terhére csak fekvőbeteg-gyógyintézet javaslatára rendelhető, utókezelésre, a szokásos antibioticumokra, chemotherapeuticumokra kellően nem reagáló, de Nevigramonra érzékeny polyresistens fertőzésekben.
A vényt minden esetben a javaslatot adó intézet és a javaslat keltének feltüntetésével, két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.

Csomagolás: b. 56 kapszula 370,— Ft.

NIKOTINSAVAMID K.Gy.
tabl. 0,2 g XXXI.

Összetétel: 1 tabl. 0,20 g nicotinamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Pellagra, pellagrás glossitis, stomatitis,

sclerosis multiplex, szulfanilamid- és arzenobenzol intolerantia.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 20 tabl. 19,— Ft, 100 tabl. 80,70 Ft.

NITON E.Gy.T. XVI.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,30 g theobromin., 0,025 g phenobarbital., 0,10 g natr. rhodanat.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypertonia, angiospasmus, arteriosclerosis.

Adagolás: Naponta 3—4-szer 1—2 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 12,90 Ft, 100 tabl. 48,30 Ft.

NITROFURANTOIN Ch. XLVII.

tabl. 0,1 g

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g nitrofurantoinumot tartalmaz.

Javallatok: Cystitis, pyelitis, pyelocystitis, pyelonephritis, esetleg pyelotomia és prostatectomia utáni kezelés.

Ellenjavallatok: Anuria, oliguria és súlyos vesekárosodás. Diabetes és a gyomor-bélhuzam kóros elváltozásai.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3×1 tabletta 6—8 napon át evés közben, vagy közvetlenül evés után. — Urológiai megbetegedések akut gyulladása esetén az átlagos adag felnőtteknek naponta 3×1 tabletta 6—8 napon át, krónikus gyulladás esetén naponta 1—2 tabletta 4—6 héten át.

Mellékhatások: Szórványosan nemkívánatos mellékhatások (étvágytalanság, hányinger, hányás) előfordulhatnak. Ezek a tünetek elkerülhetők a napi adag több részletben történő, vagy enyhén csökkentett adagolásával, illetőleg kevés tej egyidejű fogyasztásával. Néha bőrtünetekben megnyilvánuló túlérzékenység tapasztalható, amely az adagolás beszüntetésére megszűnik.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 6,50 Ft, 200 tabl. 50,— Ft.

NITROMINT E.Gy.T. XVI.

tabl. **0,5 mg** és **1 mg**

Összetétel: 1 tabl. 0,5 mg, ill. 1 mg nitroglycer.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, angiospasmus.

Adagolás: Szükség szerint 1—2 db 0,5 mg-os vagy 1 db 1 mg-os tablettát nyelv alá helyezni.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 50 tabl. 0,5 mg 5,40 Ft,
50 tabl. 1 mg 5,60 Ft.

NITROPENTON E.Gy.T. XVI.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 10 mg pentaerythritylum tetranitranitric.-ot tartalmaz.

Javallatok: Stenocardia, angina pectorisos roham megelőzése, coronaria-sclerosis.

Adagolás: Naponta 2—4 tabl., súlyosabb esetekben 4—6 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 11,— Ft, 500 tabl. 86,10 Ft.

NODICID E.Gy.T.
kenőcs XLII.

Összetétel: 1 tubus 0,002 g adrenalinum, 0,025 g azulenum., 0,15 g tetracain. hydrochlor., 0,225 g chloramphenicol., 0,30 g camphor., 1,5 g bismuth. subgall.-ot tartalmaz 15 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Nodi haemorrhoid., pruritus ani, ekzema perianalis.

Adagolás: Külsőleg. Babnyi mennyiséggel az anust naponta többször bekenjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. — 15 g orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 tubus (15 g) 8,40 Ft.

NODITRAN Ch.
végbélkúp XLII.

Összetétel: 1 kúp 0,04 mg aetherol. millefolii, 0,3 mg menthol., 8 mg camphor., 30 mg procain. hydrochlor., 40 mg *dl*-ephedr. hydrochlor. és 40 mg furazolidonumot tartalmaz.

Javallatok: Nodi haemorrhoidales.

Adagolás: Naponta 1—2 kúp.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. — 10 kúp orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 10 kúp 15,70 Ft.

NORADRENALIN K.Gy.
inj. 1 mg XV.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg *l*-noradrenalin., 1 mg chlorbutanol.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban.

Javallatok: Posttraumás, postoperativ, anaphylaxiás shock, különböző eredetű collapsusok, vérnyomásesés narkózis közben és egyéb eredetű (infectiós, toxikus) peripheriás keringési elégtelenségek, amelyekben az értónus emelése szükséges. — Localanaestheticumok hatásának megnyújtása, különösen adrenalin-érzékeny egyéneken. — Localisan vérzéscsillapításra és a nyálkahártya duzzanatának megszüntetésére.

Adagolás: Peripheriás keringési elégtelenség általában ½—1 ampulla i. musc. Tartós hatás elérésére a készítmény infúzióban is adható, melynek sebessége a hatóanyagra számítva 0,1—0,3/testsúlykg/perc. Tehát pl. fiziológiás konyhasóval vagy Ringer-oldattal történő 100-szoros hígításban 0,5—1,5 ml hígított oldat/perc/50 testsúlykg. — Egyszeri injekció hatása kb. 20—40 percig tart; amennyiben a keringés ezután romlanék, a fenti adag 2—5-ször megismételhető. — Localanaestheticumok hatásának tartósítására az ampulla tartalmát 20—50-szeresére hígítva alkalmazzuk (0,002—0,005% koncentrációban). — Külsőleges használatra (vérzéscsillapítás, nyálkahártya gyulladásának csökkentése) az eredeti oldat 10—50-szeres hígítását alkalmazzuk.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 5×1 ml 10,— Ft, 25×1 ml 45,— Ft.

NOSCAPIN A. V.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,05 g noscapin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Köhögéscsillapítás, bronchoscopiás és bronchographiás vizsgálatok elvégzése előtt a köhögési reflex átmeneti kiiktatása.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 2×½—1 tabletta. *Gyermekeknek* 3 éven felül naponta 1—2×¼ tabletta. 10 éven felül naponta 1—2×½ tabletta. Bronchoscopia és bronchographia előtt 6 éven felül 1 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 10 tabl. 5,10 Ft, 200 tabl. 102,— Ft.

NO-SPA Ch. XII.

inj., tabl.

Összetétel: 1 amp (2 ml), 40 mg drotaverinum hydrochlor.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban,
1 tabl. 40 mg drotaverinum hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: A simaizomzat görcse által okozott működési zavarok és fájdalmak megszüntetése, illetve azok megelőzése.
Epe- és vesekőkólikával, cholecystopathiával kapcsolatos görcsök: cholelithiasis, cholecystitis, nephrolithiasis, pyelitis, cystitis, továbbá a műszeres vizsgáló eljárásokkal kapcsolatos simaizomgörcsök stb.
A gyomor-bélhuzam görcsös állapotai: Ulcus ventriculi és duodeni, cardia- és pylorus-spasmus, obstipatio spastica, colitis, proctitis, tenesmus. Hypertoniások akut vérnyomás-ingadozásai — a szokásos egyéb vérnyomáscsökkentőkkel együtt adagolva —, angina pectoris, coronaria-görcs, továbbá dysmenorrhoea, a terhes méh ingerlékenységének csökkentése, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, utófájások, fenyegető vetélés stb., valamint műtét utáni szélkólika esetében.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3×1—2 tabletta, illetve naponta 1—3×2—4 ml s. cut. vagy i. musc. — *Gyermekeknek* az életkornak megfelelően kevesebb az adag. — Heveny kőrohamok megszüntetésére 2—4 ml lassan, intravenásan befecskendezve sem okoz melléktüneteket. Peripheriás érszűkület esetén intraarterialisan is adható. — Fekélybetegeknek célszerű atropinnal vagy atropin hatású gyógyszerekkel együttesen adagolni.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 6,80 Ft, b. 50×2 ml amp. 68,— Ft;
b. 20 tabl. 5,60 Ft, b. 100 tabl. 28,— Ft.

NOVASCABIN E.Gy.T. XLIX.

emulzió

Összetétel: 1 üveg 0,75 g dimethyl. phtal., 21,25 g benzyl. benz.-ot tartalmaz 70 g emulzióban.

Javallat: Scabies.

Adagolás: Meleg fürdő után — az arc, a nyak és a hajas fejbőr kivételével — a testet bekenjük Novascabinnal. 30 perc múlva a bedörzsölést meg kell ismételni. 12—14 óra múlva fürdő és fehérneműváltás. (A készítményhez részletes használati utasítás van mellékelve.)

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 1 üveg (70 g) 13,50 Ft.

NOVIFORM-CINK B. XLV.

szemkenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,25 g bibrocatholum (= Bi_2O_3 30%), 0,25 g zinc. oxydat.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Blepharitis ulcerosa, ulcus corneae, fertőtlenítő, adstringáló, a secretiót csökkentő szemkenőcs.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5 g 3,10 Ft.

NOVOBARIUM E.Gy.T. LIII.

por, oralis és rectalis

Összetétel: 1 zacskó oralis (170 g porban) 147,73 g barium sulf.-ot, 1 zacskó (1000 g) 5,88-szoros anyagmennyiséget tartalmaz.
1 zacskó rectalis (1000 g porban) 0,088 g phenlaxi-

num, 800 g barium sulf., 28,56 g ac. tannic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Röntgenkontrasztanyag, a gyomor, a nyelőcső, a nyálkahártya-relief és a bél-tractus vizsgálatához.

Adagolás: A készítményhez mellékelt használati utasítás szerint.

Megjegyzés: Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a Pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 1 zacskó (170 g) oralis 8,70 Ft,
1 zacskó (1000 g) oralis 35,40 Ft,
1 zacskó (1000 g) rectalis 33,— Ft.

NOVOPAN A.
tabl. II.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g hexobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Alvászavar, elaltató és újraaltató szer.

Adagolás: Elaltatószerként: 1—2 tabl., újraaltatáshoz a hajnali órákban ½—1 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 10 tabl. 16,70 Ft, 250 tabl. 266,40 Ft.

NOVURIT Ch.
inj., kúp XXV.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 45 mg theophyllin., 100 mg mercamphamidum natr.-ot tartalmaz. 1 amp. (2 ml) kétszeres mennyiségű hatóanyagot tartalmaz.
1 kúp 0,5 g mercamphamidum natr., 0,2 g norcain.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Inj.:* Cardialis eredetű vizenyők, portalis keringészavar, cirrhosis hepatis, folyadékgyülem a savós üregekben, arthritis, arthrosis, nephrosis

(különösen a lueses eredetű), nephrosclerotikus vizenyő, thrombophlebitis chron., obesitas, cholecystitis.
Kúp: Főleg olyan esetekben, ahol Novurit inj. valamely okból nem adható, vagy enyhébb és egyenletesebb hatás kívánatos. Továbbá cardialisan elő nem készített esetekben és purinhúgyhajtók helyett, kezdődő vagy könnyebb card. decompensatio esetén.

Adagolás: Hetenként 1—2 inj. à 1—2 ml i. musc., i. ven. Első adag 0,5 ml. Szívelégtelenség esetén ajánlatos digitalis-előkezelés vagy sztrofantin egyidejű alkalmazása. A hatás fokozására ammóniumklorid-előkészítés (acidosisban ellenjav.!). Subcutan befecskendezés kerülendő! 3—5 naponként 1 kúp félórával a természetes székürítés után vagy hashajtó után másnap. Fentjáró beteg a kúp bevezetése után ½ órát feküdjön. Lobos aranyeres csomó, fissura ani esetén alkalmazása kerülendő.

Ellenjavallatok: Akut és krónikus glomerulonephritis, hasmenés, bélvérzés, nagyfokú elesettség.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 19,— Ft, b. 100×1 ml amp. 190,— Ft.
b. 10×2 ml amp. 30,20 Ft, b. 100×2 ml. amp. 302,— Ft.
b. 5 kúp 13,20 Ft.

NOXYRON K.Gy. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g glutethimidumot tartalmaz.

Javallatok: Különböző eredetű elalvás- és alvászavarok.

Adagolás: Negyed-félórával lefekvés előtt 1—2 tabl. Éjszakai felébredés esetén 1 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 8,40 Ft, 250 tabl. 151,60 Ft.

NUREDAL E.Gy.T. IV.
tabl. 25 mg

Összetétel: 1 tabl. 25 mg nialamidumot tartalmaz.

Javallat: Psychoneurotikus, reactiv és psychotikus depressiók, oligophrenia (pl. mongolismus), angina pectoris, fájdalom-syndroma, így carcinomás fájdalmak, idült rheumás bántalmak, neuritises és neuralgiás fájdalmak, radiculitis, trigeminus-neuralgia.

Ellenjavallat: Nyugtalan, agitált betegnél a mozgáskésztetés céltalan jellegét növeli, ilyen esetekben ajánlatos tranquillansokkal kombináltan alkalmazni. Anginás betegeknél óvatos adagolás célszerű, nehogy a gyógyszer által okozott motoros aktivitásnövekedés a keringés túlterheléséhez vezessen. Hepatitisen átesett egyéneknél contraindikált. Nem szabad alkalmazni olyan esetekben sem, amikor hepatocellularis károsodással kell számolni. Hosszan tartó Nuredal-kúra alatt a vérkép és a májfunkció rendszeres ellenőrzése szükséges. *Meliyraminnal kombinálva nem adható!* Egyéb szerekkel kombinálva óvatosság szükséges, mert azok hatását fokozhatja (pl. chlorothiaziddal együtt adva vérnyomáscsökkenést okozhat). Sajt és sajt jellegű termék, valamint alkohol fogyasztása a kúra alatt kerülendő!

Adagolás: Általában 75 mg egyszerre, vagy 3×25 mg naponta. Az adag 7—10 naponként emelhető, a kellő therapiás hatás elérése céljából — napi 12,5—25 mg-mal. Angina pectorisban napi 75—100 mg, a rohamok megelőzésére vagy kivédésére. Fájdalom-syndroma esetén a dosis 75—150 mg között ingadozik. Rheumás megbetegedésekben az átlagos napi adag 100 mg, neuritisben és neuralgiás fájdalmakban 75—150 mg naponta.

Mellékhatás: Nyugtalanság, látási zavar, szájszárazság, obstipatio.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon; körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (kórház stb.) javaslata alapján rendelhetik.

Csomagolás: 50 tabl. 20,50 Ft, 500 tabl. 186,— Ft.

NYSTATIN Ch. XLVI/XLVII.
drazsé 500 000 NE

Összetétel: 1 db drazsé 500 000 NE nystatin.-ot tartalmaz.

Javallat: A moniliasis minden formája. Elsősorban a gyomor-bélhuzamban előforduló *Candida albicans* elterjedése által okozott gombás fertőzés kezelése. A széles spektrumú oralis antibioticumokkal huzamos időn át folytatott kezelésben, a moniliás fertőzés ellen.

Adagolás: A gyomor-bélhuzam moniliás fertőzésének kezelésére javasolt felnőttadag általában naponta 3×1—2 drazsé 4—5 napon át. — Krónikus hüvelyi és végbéltáji moniliasis kezelésére — a bélhuzamból történő újrafertőzés elkerülése céljából — kisegítőszerként oralisan, naponta 3×1 drazsé.

Mellékhatások: A készítmény aránylag enyhe toxicitású és kevés mellékhatást okoz. Az átmenetileg ritkán észlelt nemkívánatos mellékhatások (hányinger, hányás, hasmenés) kifejezetten enyhék. A megismételt adagolás nem idéz elő változást a vér összetételében vagy a vérképző szervekben.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére *Candida albicans* által okozott gombás fertőzés esetén rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 20 drazsé 81,20 Ft, 200 drazsé 782,— Ft.

ÓLOM kaucsuktapasz B. XLIV.

Összetétel: Massa collempl. (Empl. diachylon 15%) 1,5—2,5 g 100 cm^2-enként.

Javallat: Furunculosis.

Adagolás: Külsőleg. A védőgéz eltávolítása után a megfelelő nagyságú levágott tapaszt a bőrfelületre ragasztjuk.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 7,2 cm×10 cm 1,60 Ft.

OPODELDOK B. XLIII.

Összetétel: 1 üveg (50 g) 3,5 g sapo stearin., 22 g spir. concentratiss., 1,25 g ammon. sol., 1,25 g camphor., 0,5 g aetherol. lavand.-t tartalmaz. (100 g) kétszeres hatóanyag-mennyiséget tartalmaz.

Javallat: Rheumás fájdalmak.

Adagolás: Külsőleg, bedörzsölésre.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 6,20 Ft, 1 üveg (100 g) 12,40 Ft.

OPTACID K.Gy. tabl. XXI.

Összetétel: 1 tabl. 0,164 g natr. bisulfuric. sicc., 0,8 g natr. phosph. acid. sicc.-ot tartalmaz.

Javallatok: Heterochylia, anaciditas, hyperaciditas, rendszertelen étkezés okozta panaszok, anacid diarrhoea, a gyomornedv-kiválasztás zavarain alapuló bőrbajok; ulcus ventriculi et duodeni.

Adagolás: Felnőtteknek szükség szerint naponta 3×1—2 tabletta, ½ pohár vízben oldva, étkezés alkalmával; gyermekeknek naponta ½—1 tabletta, ½ pohár vízben oldva, étkezés alkalmával.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 30 tabl. 12,90 Ft.

ORADIAN Ch. tabl. XXXV.

Összetétel: 1 tabl. 200 mg N_1-*p*-chlorbenzolsulfonyl-N_2-cyclohexylcarbamid.-ot tartalmaz.

Javallat: Felnőttkori diabetes mellitus.

Ellenjavallatok: Fiatalkori diabetes mellitus, acidosis anyagcserezavarok, praecoma és coma diabeticum, fertőzéses, lázas állapot, veseműködési elégtelenség, esetleges májkárosodás.

Adagolás: Az adagolás beállítása, illetve átállítása csak gyógyintézetben vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, állandó orvosi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett — egyénileg — végezhető el. A kezelés bevezetésében lökés alkalmazására általában nincs szükség. Insulinról történő átállításkor az insulin elhagyása csak fokozatos lehet. A bevezetés időszakában (5—6 napig) szükséges a napi (24 órás) vizeletcukor-ürítés mérése és néhányszor az éhgyomori vércukorvizsgálat elvégzése. A kezelés bevezetésének további időszakában (kb. 2 hónapig) 1—2 hetenként ellenőrzés szükséges. A bevezetési és az ezt követő gyógyszeres kezelési időszak alatt a beteg diétája és életmódja állandó legyen. Az Oradian tabletta napi fenntartó adagját egyénileg kell megállapítani. Ez leggyakrabban: reggelizés után 2 tabletta (0,4 g). Vannak esetek, amikor naponta reggel 2 tabletta és este 1 tabletta (ritkán 2 tabletta) bevétele szükséges. Az adag csökkentése vagy növelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzés mellett történhet. A diéta szigorú betartása elengedhetetlen. A kezelés alatti kedvező periódus esetén megkísérlendő a gyógyszer adagjának óvatos csökkentése. Műtét előtt a beteget insulinra kell beállítani. Szulfanilcarbamid-származékról lévén szó, a vérkép félévenként ellenőrizendő!

Megjegyzés: ✠ Rendelését utasítás szabályozza: l. 583. oldal.

Csomagolás: 20 tabl. 16,50 Ft. 200 tabl. 145,80 Ft.

OTERBEN Ch. tabl. XXXV.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g tolbutamidumot tartalmaz.

Javallat: Felnőttkori diabetes mellitus. — A hatékonyság függ az életkortól, a diabetes fennállásának idejétől, a beteg insulin-szükségletétől és alkati típusától. — Elsősorban tehát az erős testalkatú betegek reagálnak jól, akiknél a diabetes 40—45. életév után jelentkezett, s akiknek diabetese 5 évnél nem régebbi keletű és insulint 2 évnél hosszabb ideje nem használnak.

Ellenjavallatok: Fiatalkori diabetes mellitus, súlyos acidosisos anyagcsere-zavarok, praecoma és coma diabeticum, fertőzéses lázas állapot, súlyos vese-működési elégtelenség, májkárosodás esetén (annak ellenére, hogy a gyógyszer adagolására visszavezethető májfunkciós zavarokat eddig nem észleltek). — Műtét előtt a beteget insulinra kell visszaállítani!

Adagolás: Az adagolás beállítása gyógyintézetben vagy szakorvosi járóbeteg-rendelésen, átállítása csak gyógyintézetben, állandó orvosi (laboratóriumi) ellenőrzés mellett — egyénileg a terhelési próba alapján — végezhető el. Átállításkor az insulint nem szabad azonnal elhagyni.
Általános adagolási irányelv: 1. nap 6 tabletta,
2. nap 5 tabletta,
3. nap 4 tabletta,
a további napokon 1—4 tabletta. A fenntartó adag napi 1—2 tabletta. A gyógyszert elosztva, az étkezések után, kevés folyadékkal kell bevenni. Az adag csökkentése vagy növelése csak megfelelő laboratóriumi ellenőrzés mellett történhet. Szükség esetén insulinnal kombinálható. — A diéta szigorú betartása természetesen elengedhetetlen. A kezelés alatti kedvező periódus esetén megkísérelhető a diéta óvatos enyhítése.

Mellékhatások: Szórványosan nemkívánatos allergiás reakciók (urticaria, erythema, pruritus stb.) keletkezhetnek, amelyek antihistaminok hatására rendszerint elmúlnak. Nagyobb adagok alkalmazása során ugyancsak múló fejfájás, székrekedés, gyomorbélpanaszok jelentkezhetnek. Az adagolás beszüntetésének szüksége esetén insulin adagolásával folytatjuk a kezelést.

Megjegyzés: ✠ Rendelését utasítás szabályozza, l. 538. oldalon.

Csomagolás: 20 tabl. 16,50 Ft, 200 tabl. 145,80 Ft.

OTICUR B. VIII.
fülcsepp

Összetétel: 1 üveg (10 g) 0,5 g azoph., 0,5 g tetracain. hydrochlor., 0,9 g glycerin.-ot tartalmaz.

Javallat: A külső hallójárat fájdalmas megbetegedéseiben, tüneti kezelésre.

Adagolás: Külsőleg. Naponta 3-szor 5—10 csepp.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (10 g) 18,— Ft.

OXACILLIN Ch. XLVII.
inj., kapszula

Összetétel: 1 üveg inj. 0,25 g oxacillinum natr.-ot, 1 kapszula 0,25 g oxacillinum natr.-ot tartalmaz.

Javallat: *Resistens* Staphilococcus-fertőzés.

Ellenjavallat: Penicillin-túlérzékenység.

Adagolás: *Felnőtteknek:* Enyhe és középsúlyos fertőzésben az átlagos adag 4—6 óránként 2 kapszula (500 mg) étkezés előtt 1 órával, legalább 5 napon át. Súlyosabb fertőzésben a megadott átlagadagok kétszeresükre növelhetők, a klinikai reakciótól függően. — Súlyos esetekben, vagy ha az oralis bevétel nem lehetséges, kezdetben az injekciós kezelést részesítjük előnyben, 6 óránként 250—500 mg-ot mélyen i. musc. vagy lassan i. ven.
Gyermekeknek: Enyhe és középsúlyos fertőzésben a legkisebb napi adag testsúlykg-onként 50 mg, négy adagra elosztva, étkezés előtt 1 órával, legalább 5 napon át. Súlyosabb fertőzésben a megadott átlagadagok kétszeresükre növelhetők. 40 kg-on felüliek a felnőtt adagot kapják.

Megjegyzés: ✠ Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van forgalomban. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 50 kapszula 507,40 Ft.
6 üveg inj. + 6×5 ml oldószer 97,— Ft.

OXYCODON A. V.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg oxycodonum hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Epe- és vesegörcsök, gastrikus crisisek, angina pectoris, asthma cardiale, súlyos ízületi megbetegedések, daganatos betegségekkel járó heves fájdalmak, nehéz köhögési ingerek csillapítására (pl. tbc-ben), amikor más köhögéscsillapító szereket eredménytelenül alkalmaznak.

Adagolás: Felnőtteknek általában 1 tabletta adható, amelynek hatáserőssége 0,01 morphinnak felel meg. Az inger enyhítésére ½ tabletta elegendőnek bizonyult. Ajánlatos fiataloknak és gyenge alkatú személyeknek kezdetben ½ tablettát adni. Felnőtteknek — nagyon erős fájdalom és köhögési inger esetén, ha befecskendezés valamilyen okból nem jöhet szóba — az egyszeri adagot szükség esetén 1½ tablettára emelhetjük.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10 tabl. 10,20 Ft.

OXYTOCIN K.Gy. XXVI.
inj. 5 NE

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 5 NE oxytocin.-ot tartalmaz.

Javallatok: A szülés megindítására, primaer és secundaer fájásgyengeség esetében, valamint — óvatosan — a szülés tágulási és kitolási szakában is. Prophylactikusan és therapiásan a placentaris vérzésekben és atonia uteriben. Sectio caesarában a méh izomzatába. Gyermekágyban subinvolutióban és vérzés csillapítására. Abortus incompletusban és lázas vetélés esetében. Szövettani diagnosis után nőgyógyászati vérzésekben.

Ellenjavallatok: A magzat és a medence téraránytalanságai, harántfekvés, ferde fekvés, fenyegető méh-ruptura. Szűk medence.

Adagolás: Általában az i. musc. inj.-t részesítjük előnyben. Ha az i. musc. inj. hatástalan, vagy azonnali hatást akarunk elérni, i. ven. alkalmazzuk. Az i. ven. adagolás mindig lassú injiciálással történjen. I. musc. és i. ven. 0,2—0,5 ml. Sectio ceasareában 1 ml az uterus izomzatába. Nőgyógyászati indicatiók esetében 1—2 ml s. cut. vagy i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Az alkoholban tartott fecskendőt az oxytocin felszívása előtt steril deszt. vízzel alkoholmentesíteni kell. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 13,— Ft, 50×1 ml amp. 130,— Ft.

PANANGIN K.Gy. XIV.
drazsé, inj.

Összetétel: 1 drazsé 0,14 g magn. asparagin. anh. (Mg^{++} = 11,8 mg), 0,158 g kal. asparagin. anh. (K^{+} = 36,2 mg);
1 amp. (10ml) 0,4g magn. asparagin. anh. (Mg^{++} = = 33,7 mg), 0,452 g kal. asparagin. anh. (K^{+} = = 103,3 mg)-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris kezelésében adjuvansként, szív-infarctusban rhythmus-zavar esetén és utókezelésében, digitalis okozta rhythmus-zavar, digitalis-intoxicatio. Rhythmus-zavarok: tachyarrhythmia, ventricularis extrasystolia.

Ellenjavallatok: Akut és krónikus veseelégtelenség.

Adagolás: Naponta 3×2 drazsé, vagy 1—2×1—2 ampulla 50—100 fiziológiás konyhasó — vagy 5—10%-os glucose-oldattal felhígítva, lassan i. ven., vagy tartós cseppinfúzióban. — Prophylactikus és fenntartó adagja naponta 3×1 drazsé. — A Panangginnal együtt szükség esetén sztrofantin vagy digitalis-készítmény is adagolható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 50 drazsé 25,30 Ft, 500 drazsé 245,60 Ft. 5×10 ml amp. 12,90 Ft, 50×100 ml amp. 106,— Ft.

PANIVERIN Ch.
inj., tabl. XVI.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 17,6 mg acid. nicot., 64,2 mg drotaverinum hydrochlor. (No-Spa), 80 mg azophenum-ot,
1 tabl. 22 mg acid. nicotinic., 78 mg drotaverinum hydrochlor. (No-Spa)-ot tartalmaz.

Javallatok: Érgörcsökkel járó sclerotikus megbetegedések, mint encephalopathia arteriosclerotica, angiospasmus cerebri, endarteriitis oblit., coronariasclerosis, climax kapcsán fellépő érgörcsök, migraine stb.

Adagolás: Átlagos egyszeri adagja subcutan vagy intramuscularisan 1—2 ml, amely a nap folyamán még egyszer megismételhető. Gyors hatás elérésére 1 ml-t adunk *lassan* intravenásan, szükség esetén naponta kétszer. Endarteriitis és általában peripheriás érszűkületek esetében először 1 ml-t adunk *igen lassan* az arteria femoralisba, és ezt az adagot a kezelés folyamán fokozatosan emeljük 2 ml-ig. A tabl. napi adagja 1—3 tabl., melyet angiospasmus vagy migraine esetén éhgyomorra, egyébként étkezés után vetetünk be. Angiospastikus állapotokban, climaxban a tabl.-t kúraszerűen adagolhatjuk.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5×2 ml 13,20 Ft, 50×2 ml 94,90 Ft, 20 tabl. 10,30 Ft, 250 tabl. 99,— Ft.

PAPAVERINUM HIDROCHLORICUM Ch.
inj. 4%, tabl. 0,04 g XII.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 40 mg papaver. hydrochlor., 1 tabl. 0,04 g papaver. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Gyomorgörcs, pylorus-spasmus, cholelithiasis, spastikus obstipatio, dysenteria, asthma, angina pectoris, tabeses gastrikus crisis, csuklás.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 0,04—0,1—0,12 g per os vagy s. cut., sürgős esetben i. ven. Kisgyermekeknek naponta 3-szor 0,005—0,02, nagyobbaknak 0,02—0,05 g s. cut.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10× 1 ml amp. 11,— Ft, b. 100×1 ml amp. 110,— Ft,
b. 20 tabl. 5,60 Ft, b. 100 tabl. 28,— Ft.

PARKAN Ch.
tabl. XI.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg trihexyphenidylum hydrochlor.-t tartalmaz.

Javallatok: Parkinson-kór minden formája (postencephalitises, arteriosclerosisos és idiopathiás típusok). Haszmosnak bizonyult különböző más extrapyramidalis görcsös állapotok (torticollis spastica, torsiós dystonia stb.) befolyásolásában is.

Adagolás: A kezdeti adagot kb. 4—6 napon át fokozatosan növeljük az optimális adag eléréséig. A szokásos kezdeti adag az első napon $^1/_4$ tabletta, a második napon, ha a beteget más készítménnyel előzőleg nem kezelték, ½ tabletta, majd a következőkben minden nap ½ tablettával többet adagolhatunk, amíg elérjük a napi 3×½—4×½ tabletta (7,5—10 mg) összadagot. Postencephalitises betegek kezelésére napi 3×1 tabletta (15 mg) adagolása is szükségessé válhat. A napi háromszori adagolás lehetőleg a főétkezésekkel egyidőben történjék — bőséges folyadékfogyasztással, az esetleges szájszárazság kiküszöbölésére. Napi négyszeri adagolás esetén a negyedik adag bevétele este, lefekvéskor történjék. Ha a beteget előzőleg más készítménnyel kezelték, a másik készítmény adagolását fokozatosan csökkenteni kell, amíg a Parkan az előzően alkalmazott gyógyszer teljes adagja helyett adható, vagy amíg hatékony egyensúly nem jön létre a két készítmény között. Melléktünetként szájszáradást, homályos látást, szédülést, enyhe hányingert és idegességet észleltek. Magas vérnyomás, máj- vagy vese-rendellenességek esetén a Parkan alkalmazása

ellenjavallatot nem képez, ilyenkor azonban a betegek gondosabb ellenőrzésére van szükség.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 13,70 Ft.

PENICILLIN E.Gy.T. XLVII.
inj. 200 000 NE, 1 000 000 NE

Összetétel: 1 gumidugós üveg I. 200 000 NE, illetve 1 000 000 NE benzylpenicillin-kaliumot tartalmaz. 1 amp. II. 2 ml, ill. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallatok: Penicillin-indicatiók. 3 órán át biztosít kielégítő therapiás penicillin-szintet.

Adagolás: I. musc., i. ven.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás:
I. 1×200 000 NE + 1×2 ml amp. 8,80 Ft,
I. 50×200 000 NE + II. 50×2 ml amp. 416,80 Ft,
I. 1×1 000 000 NE + II. 1×5 ml amp. 40,— Ft,
I. 50×1 000 000 NE + II. 50×5 ml amp. 1941,30 Ft.

PENTILEN Ch. LXVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g *chinacrin.*-ot tartalmaz.

Javallatok: Malária, anthelminthicum (taeniák).

Adagolás: Felnőtteknek és 8 évnél idősebb gyermekeknek naponta 3 tabl., 4—8 évesnek 2 tabl., fiatalabbnak 1 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 15 tabl. 14,80 Ft.

PERCHLORAT-K E.Gy.T. XXXII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,4 g kal. perchlor., 0,075 g kal. brom.-ot tartalmaz.

Javallat: Hyperthyreosis.

Adagolás: A *kezdő adag* — az esettől függően — 1200—1600—2000 mg/die — napi 3—4—5 tabletta — 2—6 héten át; a *kúraadag* 600—1000 mg/die — *napi 1½—2½ tabletta* — között van és mintegy 3—4 hónapig tart. Általában az euthyreoid állapot elérésekor a kezdő adag $^2/_3$-a, a súlygyarapodás megindulásától a fele, további javulás esetén $^1/_3$-a adható;
a fenntartó adag napi 400—600 mg/die — *1—1½ tabletta naponta* — 1—1½ évig. A gyógyszerelés korábbi kihagyása esetén recidiva várható.
A napi adagot 3, ill. 2 részletben, étkezés után kell bevenni. Súlyos hyperthyreosisban *kombinált kezelés* is folytatható Perchlorat-K mellett, valamelyik hormonsynthesist gátló gyógyszerrel. Ilyenkor a két szert 3—5 napig a szokásos adagban adják, majd a Perchlorat-K-t 1000 mg/die — *napi 2½ tabletta* — a Metothyrint pedig 30 mg/die adagra — napi 3 tablettára — csökkentik.

Mellékhatás: Gyomorpanasz, allergiás bőrreakció, enyhe hőemelkedés, amely tünetek súlyossága nem haladja meg az anorganikus jódkészítmények okozta mellékhatások mértékét. Szórványosan vérképzőrendszeri károsodás (agranulocytosis, aplastikus anaemia) is előfordulhat, ezért eleinte hetenként, később ritkábban, a vérkép ellenőrizendő. — A beteget ki kell oktatni, hogy toxikus tünet (láz, garattünet) esetén a gyógyszer szedését hagyja abba és vérképellenőrzésre jelentkezzék. — Az esetleges thyreotoxikus krízis i. ven. jódbevitellel (Intrajod) megszüntethető.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 21,40 Ft, 250 tabl. 95,90 Ft.

PEREMIN Ch. XXXVIII.
inj., old., kenőcs

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg histamin. bihydrochl.-ot, 1 üveg oldat (5, ill. 100 ml) 0,025, ill. 0,5 g histamin. bihydrochl.-ot,
1 tubus kenőcs 37,5 mg histamin. bihydrochl., 150 mg camphora-t tartalmaz 15 g lemosható kenőcsben.

Javallatok: Izom- és ízületi rheumatismus, myalgia, izomtúlerőltetés, myogelosis, neuralgia, ischias, Raynaud-kór. Injekcióban gyomorfunkció vizsgálatára, allergiás bántalmak esetén desensibilizáló kezelésre.

Adagolás: *Oldat*ból iontoforézishez és kataforetikus fürdőhöz 1:1000—100 000 töménységű oldatban (5—50-szeres hígítás).
Kenőcs: a hozzá mellékelt dörzsvászonnal a bőrt egész felületesen könnyedén dörzsöljük úgy, hogy korpáddzon, a szaruréteg kissé lekopjon, de a coriumig lehatolni (vérző csík) nem szabad. Ezután egy tenyérnyi nagyságú felületre mogyorónyi kenőcsöt kézzel bedörzsölünk. Pár perc alatt enyhe égető érzés mellett egyenletesen csalánfoltossá válik a bőr, ami a kívánt hatást jelzi. *Inj.*: ½—1 amp. s. cut.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére az az inj. és kenőcs szabadon rendelhető. Az oldatot a szakrendelések biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 6,70 Ft, 50×1 ml amp. 36,70 Ft,
1 üveg (5 ml) 4,60 Ft, 1 üveg (100 ml) 30,90 Ft,
1 tubus (15 g) 6,80 Ft.

PERLEPSIN Ch.
tabl. III.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g α-methyl-α-phenyl-N-morpholinylmethylen-succinimid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Az epilepsia különböző típusai. Elsősorban a petit mal és temporalis rohamokkal, valamint

a petit mal és grand mal rohamok együttes előfordulásával jellemzett formáit és az ezzel járó egyéb klinikai tüneteket befolyásolja kedvezően.
Megfelelő adagolással igen gyakran és gyorsan biztosítja a teljes rohammentességet, továbbá a rohamokkal összefüggő klinikai tünetek és a kóros agyi elektromos tevékenységek rendeződését.
Egyéb antiepilepticumok részleges hatásossága esetén adjuvánsként is adható, mint ahogy a Perlepsin-adagolás is kiegészíthető egyéb antiepilepticumokkal.

Adagolás: Egyéni megítélést igényel. Az átlagos kezdeti adag felnőtteknek naponta 3-szor 1 tabletta. Amennyiben a gyógyszer adagolása mellett roham jelentkezik, akkor a napi adagot 3-szor 1½, illetve újabb roham esetén napi 3-szor 2 tablettára növeljük.
Intézeti kezelés esetén, különösen amikor a rohamok halmozódása miatt gyors eredményt kívánunk elérni, az adagolást napi 3-szor 2 tablettával kezdjük, majd a rohammentesség után az adagot lehetőleg csökkentjük.
Gyermekek adagja az életkornak és a testsúlynak megfelelően arányosan kevesebb.
A napi háromszori adagolás lehetőleg a főétkezésekkel egyidőben, az esetleges negyedik adag bevétele este, lefekvéskor történjék. A hatásosság szempontjából a rendszeres és folyamatos kezelés természetesen elengedhetetlen. Egyéb, közbeeső megbetegedések kezelésénél a Perlepsin adagolása nem mellőzhető.
Az adagolás megszüntetése 2 évi rohammentesség esetén, csak szakorvosi és EEG-vizsgálat együttes ellenőrzése mellett lehetséges.

Mellékhatások: Ritkán előforduló nemkívánatos mellékhatások (enyhe gyomorpanaszok, szédülés) az adag csökkentésével általában megszüntethetők. Ha azonban a melléktünetek az adag csökkentésével sem szűnnek meg, ajánlatos az adagolás megszakítása. Az egyéni túlérzékenység súlyosabb esetében (bőrtünetek, haematuria, agranulocytosis) a további adagolást azonnal beszüntetjük!
Hosszabb gyógykezelés és főleg nagyobb adagok

rendelése esetén a vizelet és vérkép rendszeres ellenőrzése feltétlenül szükséges.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 45,— Ft, 200 tabl. 434,— Ft.

PERNOVIN Ch. XXXVIII.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 25 mg phenindaminum bitart.-ot tartalmaz.

Javallatok: Allergiás jelenségek, mint akut és krónikus urticaria, allergiás rhinitis stb.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 6,80 Ft.

PERNOVIN Ch. XXXVIII/XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 1,0 g phenindaminum bitart.-ot tartalmaz 20 g lemosható kenőcsben.

Javallatok: Allergiás (foglalkozási) dermatosisok, urticaria, neuroderma, pruritus ani, pruritus vulvae stb.

Alkalmazás: A kenőccsel vékonyan bekenjük a kezelendő bőrfelületet, szükség esetén naponta kétszer. A kenőcs megismételt használata esetében az előzőleg felkent anyagot tiszta paraffinolajjal távolítjuk el; a kenőcsöt nagyobb felületen, hámfosztott felületen lehetőleg ne alkalmazzuk, valamint napfénynek kitett helyeken sem (photodynamiás hatás). Megszakítás nélkül két hétnél hosszabb ideig lehetőleg ne alkalmazzuk.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 13,70 Ft.

PERNOVINETTA Ch. XXXVIII.
drazsé
(régi neve: Pernovin drazsé gyermekeknek)

Összetétel: 1 drazsé 4 mg phenindaminum bitart.-ot tartalmaz.

Javallatok: Allergiás jelenségek, mint akut és krónikus urticaria, allergiás rhinitis stb.

Adagolás: Két éven aluli gyemeknek nem adjuk 2—4 éves gyermek átlagos adagja naponta 3-szor 4 mg (1 drazsé) 10 testsúlykg-onként (pl. 20 kg-os gyermek átlagos napi adagja 3-szor 2 gyermek drazsé).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 4,60 Ft, 100 drazsé 10,60 Ft.

PHENOLPHTHALEINUM A. XXIV.
tabl. 0,2 g és 0,5 g

Összetétel: 1 tabl. 0,2, ill. 0,5 g phenolphth.-ot tartalmaz.

Javallat: Hashajtás.

Adagolás: Felnőtteknek: este 1 tabl. (0,5 g).
Gyermekeknek: $^1/_4$—1 tabl. (0,2 g).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 tabl. 0,2 g 5,80 Ft, b. 100 tabl. 0,2 g 29,— Ft,
b. 10 tabl. 0,5 g 4,80 Ft, b. 100 tabl. 0,5 g 48,— Ft.

PHENYLBUTAZON K.Gy.
kenőcs XLVIII/XLIV.

Összetétel: 1 tubus 1 g phenylbutazont tartalmaz 20 g lemosható kenőcsben.

Javallatok: Különböző mechanikus és kémiai behatások okozta bőrgyulladások. Kis kiterjedésű I. és II. fokú égési sebek, napégés. Intravenás és intramuscularis injekciók beszúrási helyén keletkező bőr-

gyulladások, rovarcsípés. Inflammált nodus haemorrhoidalis. Felületes thrombophlebitis helyi kezelésében, ezen indikációs területen a készítmény nem az anticoagulans kezelés helyettesítésére, hanem kiegészítésére szolgál. Traumás lágyrészsérülések, duzzanatok, haematomák, izom- és inhúzódás, amputatiós csonkfájdalom. Rheumatoid arthritis és arthrosis, synovitis, tendinitis, tendovaginitis adjuvans kezelése.
A mély venák thrombophlebitisének kezelésére a készítmény nem alkalmas.

Adagolás: Naponta 2—3-szor az érintett bőrfelületet, dörzsölés nélkül, vékonyan bekenjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 g orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 9,— Ft.

PHLOGOSAM K.Gy. XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,6 g natr. disulfosalicylatosamar. anhydr.-ot tartalmaz 20 g lemosható alapanyagban.

Javallatok: Heveny dermatitis és ekzema, dermatitis solaris, dermatitis arteficialis (vegyszerektől, benzintől stb.), kisebb kiterjedésű I. és II. fokú égés, rovarcsípés. — Heveny, nem gennyes vagy gombás csecsemő- és gyermekkori bőrgyulladások. Intertrigo. — Felületes thrombophlebitis adjuvans kezelése.

Adagolás: A bőrelváltozás területét naponta 2—3-szor a kenőccsel vékonyan bekenjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 g orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 16,70 Ft.

PHTYSON K.Gy. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 100 mg isonicotinoylhydrazonum laevulinic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Gümőkór pulmonalis és extrapulmonalis folyamatai; különösen olyan esetekben, amikor egyéb gátlószerek hatására melléktünetek mutatkoznak (fejfájás, szédülés, purpura, zsibbadás, paraesthesiák, polyneuritis). Alkalmazása megkísérelhető egyéb tuberkulosztatikumokkal szemben rezisztensnek bizonyult esetekben és psychotikus betegeknél.

Adagolás: Naponta átlagosan 10 mg/testsúlykg, három részre osztva, étkezés után. — A Phtysont éppen úgy, mint az INH-t célszerű paraaminosalicylsavval (Tebaminal), esetleg Streptomycinnel kombinálva adagolni, a gyógyszerrezisztencia elhárítása érdekében. A kombinációra vonatkozó módszerek megegyeznek az INH kombinált kezelés ismert módszereivel. — Hosszas adagolás alatt célszerű a beteg vérképét és vizeletét időnként ellenőrizni.

Megjegyzés: ✠ Orvosi vényen Phtyson tabletta nem rendelhető.

Csomagolás: 200 tabl. 66,— Ft, 1000 tabl. 330,— Ft.

PIPERASCAT K.Gy. XLVIII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,3 g piperazinum adipinicumot tartalmaz.

Javallatok: Enterobiasis, ascariasis.

Ellenjavallatok: Súlyos szív-, máj- és vesezavarok.

Adagolás: Gyermekek napi adagja 6 éven alul annyi tabletta, ahány éves a gyermek, 6 éven felül a napi adag általában 3-szor 2 tabl. a gyermek fejlettségétől és erőbeni állapotától függően. — Felnőttek napi adagja naponta 3×2, legfeljebb 3×3 tabl. 7 napon át megszakítás nélkül, főétkezés után. A kúra szükség esetén 14 napos szünet után megismételhető.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 25 tabl. 13,20 Ft.

PIPOLPHEN E.Gy.T. XXXVIII.

drazsé, inj., végbélkúp

Összetétel: 1 drazsé 25 mg promethazin. hydrochlor.-ot,
1 amp. (2 ml) 50 mg promethazin. hydrochlor.-ot,
1 kúp (1,43 g) 25 mg promethazin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Allergiás tünetek és megbetegedések: urticaria, pruritus, prurigo, ekzema, gyógyszer okozta kiütés, szérumbetegség, Quincke-oedema, szénanátha, anaphylaxiás shock, migraine stb. Potenciált narkózis és mesterséges hibernáció.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Csecsemők súlyos exsudativ diathesises bőr- és nyálkahártyaelváltozásai, csecsemőkori ekzema; asthmás hörghurut, pseudocroup, urticaria, strophulus és az allergodermák minden fajtája; szérumbetegség.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2—6 drazsé vagy 1—3 kúp. Parenteralis adagolás csak sürgős esetekben (asthma-krízis) vagy potenciált narkózisban és mesterséges hibernáció céljaira indokolt. Potenciált narkózissal történő műtéti előkészítés céljára (felnőtteknek) a műtétet megelőző este 1—2 Pipolphen drazsét adunk valamely barbiturát-készítménnyel (pl. 0,10 Sevenal tabl.) együtt. A műtét reggelén 2½ órával a műtét előtt 50 mg Pipolphent, 50 mg Hibernalt és 100 mg Dolargant („cocktail-lytique") adunk együtt i. musc. (egy fecskendőbe felszíva). 1 órával később az adagot megismételjük.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig ¼, 1—6 éves korig ½, 7—14 éves korig 1 tabl. 3—4-szer naponta. Az injekciós készítmény adagja mindhárom korcsoportban általában 1—0,5 mg/kg/dosi i. musc., 3—5-ször naponta. Az intravenás adag ennek kb. egyharmada, leginkább mint a gyógyszeres hibernációra használt lytikus cocktail alkotórésze (Hibernallal és Dolargannal együtt). Más esetekben (pl. súlyos asthma, pseudocroup esetén) az egyszeri

parenteralis adag ennél több is lehet: 1, esetleg 2 mg/kg.

Mellékhatás: Aluszékonyság. Elhúzódó hosszas adása extrapyramidalis tüneteket okozhat („parkinsonoid"), ez azonban a gyermekkorban ritka.

Ellenjavallatok: Altató mellékhatása miatt foglalkozásukat űző gépkocsivezetőknek, gép mellett és magasban dolgozóknak Pipolphen nem adható. Kúra közben tilos a szeszes ital fogyasztása. Fájdalomcsillapítók, altatók stb. hatását a Pipolphen fokozza; azok Pipolphennel együtt csak csökkentett adagban adhatók.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 10 drazsé 6,50 Ft, 250 drazsé 109,50 Ft, 5×2 ml amp. 14,20 Ft, 100×2 ml amp. 239,30 Ft, 5 kúp 6,— Ft.

XX.

PLASMODEX B.

inj.

Összetétel: 1 gumisapkás amp. (250, ill. 500 ml) 2,125, ill. 4,25 g natr. chlor., dextran sol. 6% ad 250, ill. ad 500 ml-t tartalmaz.

Javallatok: A keringő vérmennyiség bármilyen eredetű csökkenése, shock állapota (vérzés, trauma, égés, fagyás, műtét alatti és utáni shock megelőzése), súlyos exsiccatióval járó megbetegedések.

Ellenjavallatok: Súlyos máj- és vese-laesio (kivéve, ha abszolút indicatio áll fenn).

Adagolás: A keringési állapot figyelembevételével a rendszeresített OVSZ-szerelékkel 60—120 csepp/perc sebességgel (sürgős esetben gyorsabban) transzfundáljuk. A beadott mennyiséget a beteg általános állapota, a haemoconcentratio és a vesztett vér mennyisége szabja meg. Transfusio előtt vércsoport-meghatározás végzendő (sürgős esetben a vércsoport-meghatározáshoz szükséges vért előzőleg kell levenni), mert Plasmodex adása után a vércsoport meghatározása zavart. Allergiás beteg a transfusio előtt 1—2 órával 1—2 ml-rel desensibi-

lizálandó. Ha csecsemőnek vagy gyermeknek adjuk, a cutan-próba előzőleg mindig elvégzendő (0,1 ml i. cut., ½ óra múlva leolvasandó). Pozitív reakció esetén a szert nem szabad adni.

Megjegyzés: Lejárati idő: 2 év. Adása után 4—5 napig a vörösvérsejt-süllyedés fokozott lehet. Más gyógyszer hozzákeverését a Plasmodex-transfusióhoz kerülni kell. — Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1×50 ml gumisapkás amp. 64,60 Ft, 1×500 ml gumisapkás amp. 115,90 Ft.

PLASTUBOL E.Gy.T. XLIV.

spray

Összetétel: 1 palack (160 g) 5,3 g methylmetacrylat-butylacrylat-butylmetacrylat copolymer, 0,4 g di-octylphthal., 34,3 g aether aceticus, 120 g monofluor-trichlormethan-difluordichlormethant tartalmaz.

Javallat: — zárt műtéti sebek fedése,
— váladékozó sipolyok, sebek környékén a bőr védelme,
— elsőfokú égési sérülések befedése,
— felületes hámhorzsolások, frissen behámosodott sebek védelme,
— nehezen köthető területek sebvédelme,
— nem nedvedző ekzemák, dermatitisek fedése (nem zsíros, felszívódó kenőcsök alkalmazása után is),
— az ép környezet védelme maró hatású ecsetelők alkalmazásakor,
— érzékeny bőr védelme irritáló anyagokkal szemben.

Ellenjavallat: Anaerob kórokozókkal fertőzött seb esetén, valamint mély, tasakos, bőven váladékozó sebeknél, III. fokú égési sérülések esetén, továbbá nyomásnak kitett testrészeken a Plastubol használata ellenjavallt.

Adagolás: A védőkupak leemelése után a szórófej lenyomásakor a szelepnyíláson keresztül a filmképző anyag a propellens eleggyel permet formájában távozik a palackból. A bevonandó felület minden részét egy-két másodpercig érje a permet. Az oldószer elpárolgása után (kb. 30") a testfelszínen száraz, átlátszó film képződik. Elegendő vastagságú filmet akkor kapunk, ha a permetezést 2—3, esetleg 4 ízben megismételjük. A palack tartalmának gazdaságos kihasználása érdekében a szelep nyílása a befedendő testfelszíntől 25—30 cm-re legyen. Az aerosol-palack működési elve a szódásüvegéhez hasonló, ezért megközelítőleg függőleges helyzetben ajánlatos tartani. Használat után a palackot a szórófejjel lefelé fordítva, a szórófejet mindaddig nyomjuk, amíg a szelepen át permet távozik. Így megelőzzük a szelep eldugulását. *A bőrfelületet a film felhelyezése előtt meg kell tisztítani és szárazra kell törölni.* A bevonat minden irányban 2—3 ujjnyival haladja meg a sebszéleket. Noha a 2—4 rétegben felhelyezett film rugalmassága kielégítő, előfordulhat, hogy nagyobb mechanikai behatásra megreped. Ha a filmen repedés keletkezett, a filmet (újabb rétegek felhelyezésével) kiegészítjük, „megfoltozzuk". Ha a sebszélek közül szivárgó vér, savó, ill. az égési sebfelszínen kilépő plasma a filmet felemeli, tanácsos a képződő hólyagot eltávolítani és a nyílást újabb réteg felvitelével zárni. A filmréteg etilacetáttal (aether aceticus) lemosható, vagy a film óvatos húzásával is eltávolítható.

A Plastubol nem tartalmaz chemotherapeuticumot, antibioticumot, desinficienst, ezért a film felhelyezése előtt — mint a hagyományos sebkötésnél — gondoskodni kell az aseptikus és antiseptikus sebellátásról!

Mellékhatás: A nyílt sebfelszínre permetezett Plastubol az oldószer párolgása és a propellens gáz alacsony forráspontja miatt mintegy 30"-ig tartó múló fájdalmat okoz.

Érzékeny bőrű egyéneken a felhelyezett film alatt és körül néha bőrpír alakulhat ki, melynek nincs jelentősége és kezelést nem igényel.

Megjegyzés: Nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhető be. — Lejárati idő: 1½ év.

Csomagolás: 1 palack 35,— Ft, 10×1 palack 350,— Ft.

POLYBÉ K.Gy. XXXI.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 10 mg thiamin. hydrochlor. (B_1-vit.), 2 mg riboflav. (B_2-vit.), 100 mg nicotinamid., 10 mg pyridox. hydrochlor. (B_6-vit.), 4 mg procain. hydrochlor., 120 mg azophen.-ot; 1 tabl. 5 mg thiamin. hydrochlor., 1 mg riboflav., 50 mg nicotinamid, 4 mg pyridox. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: A B-vitamin-csoportba tartozó valamenynyi hiánybetegség. Májgyulladás, thyreotoxicosis, cheilitis, stomatitis, máj- és vasrezisztens anaemia, Rtg-kater, terhességi hányás, chorea minor, Adie- és Sjögren-syndroma, neuralgia, neuritis, általános roborálás.

Adagolás: Oralisan napi 3-szor 1 tabl. étkezés után. Parenteralisan: 5—10 napig naponta vagy másodnaponként 1—1 amp. i. glut. (Intravenásan és s. cut. nem alkalmazható!)

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a B-vitamin-csoportba tartozó hiánybetegségek esetén rendelhető, a kórismének a dokumentációban való feltüntetésével. — Lejárati idő: inj. 2 év.

Csomagolás: b. 5×2 ml amp. 19,60 Ft,
20 tabl. 12,40 Ft.

POLYBROM A. III.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,70 g natr. brom., 0,10 g kal. brom., 0,20 g ammon. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Brómkúra, sedativum, epilepsia, neurasthenia, hysteria, a hányásközpont ingerlékenységének csökkentése, szív-neurosis, alkoholelvonó kúra.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1 tabl. étkezés után, vízben feloldva.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 30 tabl. 7,30 Ft.

POLYVITAPLEX 8 Ch. XXXI.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 1 μg cyanocobalamin., 1000 NE cholecalciferol., 3000 NE axerophth., 0,5 mg pyridox. hydrochlor., 0,5 mg riboflav., 5 mg thiamin. hydrochlor., 10 mg nicotinamid., 50 mg acid. ascorb., 50 mg calc. hypophosph.-ot tartalmaz.

Javallat: Hypovitaminosis.

Adagolás: 3-szor naponta 1 drazsé, gyermekeknek napi 1 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak vitaminhiányos állapot esetén rendelhető, a kórisme feltüntetésével. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — 25 drazsé vény nélkül is kiadható. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 25 drazsé 12,20 Ft,
500 drazsé 170,30 Ft.

POLYVITAPLEX 10 Ch. XXXI.
csokoládé

Összetétel: 1 pasztilla 500 NE ergocalciferol., 1000 NE axerophth., 0,5 μg cyanocobalamin., 0,1 mg acid. folic., 0,2 mg pyridox. hydrochlor., 0,5 mg thiamin. hydrochlor., 0,5 mg riboflav., 1 mg calc. pantothen., 5 mg nicotinamid., 20 mg acid. ascorb.-ot tartalmaz.

Javallat: Hypovitaminosis.

Adagolás: Gyermekeknek naponta 1, felnőtteknek naponta 1—3 darab.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 24 darab orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 24 db 12,20 Ft.

PREDNISOLON K.Gy. XXXIV. tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg prednisolon-ot tartalmaz.

Javallatok: Polyarthritis rheumatica acuta et chronica, periarthritis humero-scapularis, spondylarthritis ankylopoetica, febris rheumatica, carditis rheumatica. — Morbus Addisoni, akut mellékvesekéreg-elégtelenség, adrenogenitalis syndroma. — Asthma bronchiale, status asthmaticus, különféle akut és krónikus allergiás megbetegedések. (Gyógyszer-túlérzékenység, szérumbetegség, urticaria, szénanátha, vegyi anyagokkal szembeni túlérzékenység, Quincke-oedema stb.) — Hepatitis, coma hepaticum, hypoglykaemiás állapotok, lipoidnephrosis, agranulocytosis, leukaemiák különféle formái, Hodgkin-kór, purpura thrombocytopenica, anaemia haemolytica. — Lupus erythematodes disseminatus, pemphigus, periarteriitis nodosa, ekzema, pruritus, dermatitis exfoliativa, psoriasis. — Ophthalmia sympathica, conjunctivitisek allergiás alakjai, nem gennyes keratitis, iritis, iridocyclitis, uveitis, chorioiditis. — *Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét és kockázatát (kortikoszteroid-kezelés veszélyei)!*
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Febris rheumatica, chorea minor, asthmás hörghurut, nephrosis.

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi et duodeni. Diabetes mellitusban csak abszolút indikáció vagy feltételezett insulin-rezisztencia kivédésére adjuk. Fertőző betegségekben csak óvatosan, specifikus chemo-, ill. antibiotikus therapia mellett alkalmazható. Latens tbc-ben is csak tuberculostaticumokkal együtt. Substitutiós adagban, vagy rövid időtartamra nagyobb adagban is (pl. shock leküzdésére) antibiotikus védelem nélkül is adható.

Adagolás: Individuális. Akut állapotokban és bevezető adagként általában napi 20—30 mg-ot (4—6 tabletta) alkalmazunk. Krónikus és fenntartó adagja napi 5—10 mg (1—2 tabletta). A kezelést fokozatosan, egyre csökkenő adagokkal kell megszüntetni.
A készítmény huzamosabb időn át való szedése fokozott K-ürítést, Na-retentiót és oedemát okozhat. Ennek elkerülésére napi 1—2 g káliumsót (KCl, kal.-citrát) adagoljunk.
Gyermekadagok: 1—2 mg/kg/die, 4—6 adagra elosztva.

Mellékhatás: Csökkent ellenállás fertőzésekkel szemben, hypertonia, glycosuria, hypokalaemia, negatív N-mérleg (katabolismus), mellékvesekéreg-kimerülés, osteoporosis. — A megadottnál nagyobb adagokra is szükség lehet pl. nephrosisban, leukaemiában, de még egyes rheumás megbetegedésekben is. Hosszantartó kezeléskor a felsorolt mellékhatások kivédésére feltétlenül szükséges antibioticum és kálium együttes adása (utóbbiról l. a Chloruritnál), a katabolismus és az osteoporosis veszélyének csökkentésére esetleg egyidejű Nerobol (Neroboletta) adása, rendszeres vérnyomásmérés és vizeletvizsgálat, végül pedig a szer csökkenő adagokban történő elhagyása. Befejező — kúra utáni — ACTH-adás is mérlegelendő (bőrpróba!).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendelhetik, csakis vitalis indikációban: shock, status asthmaticus, agranulocytosis, morbus Addisoni, pemphigus stb., illetőleg olyan megbetegedés esetében, amelyben az egyéb rendelkezésre álló gyógymódok nem vezetnek megfelelő eredményre.
Körzeti, üzemi stb. orvosok szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott adagolásban és időpontig, de legfeljebb 4 héten belül történő gyógykezelés céljából. — Körzeti, üzemi stb. orvos saját elbírálása alapján legfeljebb 2 héten át alkalmazhatja. *Mozgásszervi betegségek* heveny és félheveny állapotában az előzőek szerint rendelhető, mozgásszervi betegségek idült esetében csak szakrendelés rendelheti, illetőleg szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető, a javaslatban meghatározott adagolásban és időpontig, de legfeljebb 6 héten belül történő gyógykezelés céljából. A vényen a kórismét minden esetben jelezni kell, továbbá a javaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézetet) és a javaslat keltét is fel kell tüntetni.

A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.
— Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 20 tabl. 50,— Ft; 100 tabl. 220,90 Ft.

PREDNISOLON K.Gy. XXXIV/XLIV.
kenőcs 5%

Összetétel: 1 tubus 0,025 g prednisolon.-ot tartalmaz 5 g lemosható kenőcsben.

Javallatok: Ekzema különféle formái, akut és krónikus dermatitisek, erythrodermia, exsudativ diathesis bőrtünetei, pruritus ani et vulvae.

Alkalmazás: Az érintett bőrfelületet naponta 2—3-szor a kenőccsel vékonyan bekenjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendelhetik, körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott időtartamú gyógykezelésre. A vényen fel kell tüntetni a javaslatot adó szakrendelést és a javaslat keltét. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus 5 g 48,40 Ft, 1 tubus 20 g 167,60 Ft.

PREDNISOLON J K.Gy. XXXIV/XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,025 g prednisolon., 0,15 g jodchloroxychinolin.-ot tartalmaz 5 g lemosható kenőcsben.

Javallat: Coccogen és mycogen ekzemák, dyshidrosis, bacterialisan felülfertőzött ekzemák, intertrigo, anogenitalis pruritus és ekzema, ulcus cruris és röntgenfekély, valamint olyan érzékeny bőrön fejlődött, felületes, körülírt fertőzések, amelyekre egyéb antibacterialis és antimycotikus kezelés hatástalannak bizonyult.

Alkalmazás: Naponta 1—3-szor vékony rétegben a bőrön elkenjük. (A fehérneműt színezi!)

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik a javaslatban meghatározott időtartamú gyógykezelésre. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 48,40 Ft.

PROCAINUM HYDROCHLORICUM K.Gy. VIII.
inj. 2%
(régi neve: Neotonocain sine tonogeno)

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 40 mg procain. hydrochlor.-ot,
1 amp. (5, ill. 10 ml) 2,5, ill. 5-szörös hatóanyagmennyiséget tartalmaz.

Javallat: Helyi érzéstelenítő.

Adagolás: A készítményhez csatolt használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 10×2 ml amp. 15,30 Ft, 100×2 ml amp. 113,30 Ft,
10×5 ml amp. 25,20 Ft, 100×5 ml amp. 193,50 Ft;
10×10 ml amp. 32,60 Ft, 100×10 ml amp. 257, — Ft.

PROCAINUM HYDROCHLORICUM K.Gy. VIII.
injekciós tabl. 0,125 g
(régi neve: Neotonocain sine tonogeno)

Összetétel: 1 tabl. 125 mg procain. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Helyi érzéstelenítő oldatok készítéséhez. 100 ml oldat elkészítéséhez szükséges mennyiségek:

0,25%-os 2 tabl., 0,5%-os 4 tabl., 1%-os 8 tabl., 2%-os 16 tabl.

Adagolás: A megfelelő mennyiségű tablettát neutrális, fiz. sóoldatban oldjuk és ha szükséges, sterilizáljuk. — Infiltratióra: 0,25%—0,50%, vezetéses érzéstelenítésre: 1%—2%-os oldat használandó.

Megjegyzés: ✠ Szakrendelések a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Csak injekciós és külsőlegesen használt oldat készítéséhez alkalmas.

Csomagolás: 10 tabl. 5,30 Ft, 100 tabl. 19,— Ft.

PROMPTCILLIN E.Gy.T. XLVII.
szuszpenziós inj. és forte inj.

Összetétel: 1 gumidugós üveg I. 100 000 NE benzylpenicillin-kal., 300 000 NE benzylpenicillin-procain.-ot,
1 amp. II. 2 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz.
Forte: 1 gumidugós üveg I. 200 000 NE benzylpenicillin-kal., 600 000 NE benzylpenicillin-procain.-ot, 1 amp. II. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallatok: Penicillin-indicatiók. 8—12 órán át biztosít kielégítő penicillin-szintet.

Adagolás: I. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: I. 1×400 000 NE + II. 1×2 ml 12,20 Ft, I. 50×400 000 NE + II. 50×2 ml 566,50 Ft, *forte* I. 1×800 000 NE + II. 1×5 ml 23,70 Ft, I. 50×800 000 NE + II. 50×5 ml 1098,— Ft.

PROPYLON E.Gy.T. XVII.
sublingualis tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g isoprenalin. hydrochl.-ot tartalmaz.

Javallatok: Asthma bronchiale kezelésében a rohamok leküzdése, ill. a rohamkészség csökkentése.

Adagolás: Kezdetben naponta 3-szor ½—1 tabl., majd csökkentve naponta egyszer ½ tabl. Gyermekeknek általában ¼ tabl. A tablettát szétharapás nélkül, a nyelv alá helyezve, lehetőleg nyelés nélkül oldódni hagyjuk.

Mellékhatás: Érzékenyebb betegen múló szívdobogást válthat ki.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 24,10 Ft.

PTIMAL E.Gy.T. III.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g trimethadionumot tartalmaz.

Javallatok: A „petit mal" kórformáinak kezelésére. A vérkép a kezelés alatt ellenőrizendő!

Adagolás: Naponta 3—4 drazsé.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 0,03—0,015 g/kg/die, 2—3 részre elosztva. Testfelületre számított adagja: 0,9—1,2 g/m²/die. Rendszeres vérképellenőrzés szükséges.
Mellékhatás: leukopenia.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 21,40 Ft.

PULSOTYL Ch. XV.
inj., cseppek

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 mg pholedrin. sulf.-ot tartalmaz 1 ml vizes oldatban,
1 üveg (25 ml) 0,5 g pholedrin. sulf.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypotonia, sebészeti és fertőző megbetegedéssel járó collapsus, agy-anaemia, peripheriás keringési zavarok, altatószer- és gázmérgezések, hypotoniás pulzusrendellenességek, rövid hatású pupillatágítás.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2—3-szor 15—20 csepp, szükség esetén naponta 2—5-ször 1 amp. s. cut. vagy i. musc.
Pupillatágításra izotóniás konyhasóoldattal 1 %-ra (azaz kétszeresére) hígított oldatból 1—2 cseppet.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 7,60 Ft, 50×1 ml amp. 56,— Ft;
b. 1 üveg (25 ml) 12,— Ft, b. 1 üveg (100 ml) 48,— Ft.

PYRAZINAMID Ch. XLVII.
tabl. 0,5 g

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g pyrazinamidumot tartalmaz.

Javallatok: Friss gümőkóros megbetegedések esetén Isoniciddel vagy Streptomycinnel kombinálva, különösen akkor, ha a beteg a Tebaminal—PAS szedését nem bírja. A krónikus tuberculosis minden formájában más, hatásos gátlószerrel együtt.

Adagolás: Átlagos napi adagja megközelítőleg testsúlykg-onként 35 mg, de ezt a mennyiséget nem lépheti túl. A nehezebb súlyú betegek napi adagja legfeljebb 2,5 g-ig emelhető. A kezelést kúraszerű adagolással nyomban a főétkezések után napi 2×1 tabletta (1 g) bevételével kezdjük, majd egy héten át az adagot fokozatosan napi 3—4×1 tablettáig (1,5—2 g) növeljük. Kombinált kezelés esetében a Pyrazinamid alkalmazása nem módosítja más antituberculoticumok szokásosan alkalmazott adagjait.

Megjegyzés: ✠ Orvosi vényen Pyrazinamid nem rendelhető. A járóbetegek Pyrazinamiddal történő kezelését az illetékes TBC-gondozó intézet végzi.

Csomagolás: 250 tabl. 368,90 Ft.

QUINOSEPTYL B. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g sulfamethoxypyridazin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Elsősorban *idült* húgyszervi fertőzések (cystitis, pyelitis, pyelonephritis stb.) elhúzódó kezelése és ezzel az endogen reinfectio megelőzése, mert kellő savó- és szöveti szint biztosítása mellett hatásos alakban ürül ki a vizeletben.
Idült légúti fertőzések (bronchitis és bronchiectasia) esetén az őszi—téli hónapokban hatásos chemoprophylaxist jelenthet. A húgyúti fertőzések, Meningococcus-fertőzések, bacterialis dysenteria (érzékeny kórokozó esetében prophylaxis és kezelés is) és erysipelas az egyéb rövid hatású szulfonamidokkal (Superseptyl, Salvoseptyl) sikeresen kezelhetők, ezért célszerűbb azok használata. Ezáltal arról is meggyőződhetünk, hogy a beteg szulfonamidokkal szemben nem túlérzékeny-e.

Ellenjavallt (általában minden szulfonamid-kezelés esetében): szulfonamid-túlérzékenységben, de Quinoseptyl esetében általában allergiás diathesisben is; veseelégtelenségben, oedemákban, ha a salakanyagok kiürítése gátolt; decompenzált szívbetegeknél, a compensatio helyreállítása előtt; májparenchyma súlyos károsodása esetén. — A szulfonamidok — így a Quinoseptyl is — meghűlésben, grippében stb. hatástalanok, ezért alkalmazásuk indokolatlan és ok nélküli kockázatvállalást jelent.

Adagolás: A fenti javallatokban az *első napi kezdő adag felnőtteknek* 2 tabletta (1 g), *majd a második naptól kezdve* napi 1 tabletta (0,5 g) étkezés után. Az első napi adagolás két részletben, lehetőleg 12 órás időközben történjen (reggel 1 tabletta, este 1 tabletta). — Gyermekgyógyászatban a Quinoseptylt ne alkalmazzuk!

Mellékhatás: *Bőr- vagy nyálkahártyatünetek jelentkezésekor az adagolást azonnal beszüntetjük!*

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető; *a vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.*

Csomagolás: 10 tabl. 14,50 Ft, 100 tabl. 132,40 Ft.

RADIPON B. XVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,58 mg emetin. hydrochlor., 2,1 mg phenobarbital., 2,9 mg codein., 7,6 mg ammon. chlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Bronchitis acuta et chronica.

Adagolás: 3 óránként 1 tabl., *gyermekeknek* ¼—½ tabl. Üres gyomorra ne adjuk!

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 tabl. 5,40 Ft.

RAUSEDYL K.Gy. IV/XVI.
inj. 1 mg és 2½ mg; tabl. 0,1 mg és 0,25 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg, ill. 2,5 mg reserpin., 100 mg dimethylacetamid, 10 mg alcohol benzylic.-t tartalmaz propilenglikol-tartalmú vizes oldatban.
1 tabl. 0,1, ill. 0,25 mg reserpin.-ot tartalmaz.

Javallat: Magas vérnyomás, fiatalkori centralis és labilis hypertoniák. Fixált hypertoniák jó- és rosszindulatú alakjai is jól reagálnak a legtöbb esetben.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Neuropathia, bizonyos tachycardiák, chorea minor.

Adagolás: *0,1 mg-os tabl.* járóbeteg kezelésére használatos. A túlzott sedativ hatás elkerülésére ajánlatos napközben alacsonyabb adagokat, napi 3-szor 1—2 tablettát és csak este magasabb egyszeri adagokat, pl. 3—4 tabl.-t alkalmazni. A *0,25 mg-os tabl.* fekvőbeteg kezelésére alkalmazható. Kezdő adagolás napi 3×1—2, esetleg napi 3×3 tabl. Kifejezett és kielégítő vérnyomáscsökkenés elérése esetében a napi adag fenntartó adagokra csökkentendő: napi 2—3-szor 1—2 0,1 mg-os tablettára. Középsúlyos és súlyos esetek kezelésére általában napi 2 mg-os oralis adagolás bizonyult elegendőnek. Szükség esetén ezt az adagot napi 5 mg-ra emelhetjük. Cerebralis arteriosclerosis esetében a

kezdő adagokat alacsonyabban (1 mg) szabjuk meg.
1 mg-os injekció adagolása: Hypertonia esetén a kezelést kis adagokkal kezdjük, pl. 0,3—0,5 mg naponta. Napi átlagos adag általában 1—2 amp. i. musc.
2,5 mg-os injekció adagolása: Súlyos psychosis és izgalmi állapotok kezelésére a napi adag az első napokban 5—10 mg. A kezdő adag 5 mg, amely szükség szerint 2,5—5 mg-mal kiegészíthető, i. musc., esetleg lassan i. ven. Tapasztalat szerint 2—3 amp. adagolása után az eredmény tabletta adagolásával is fenntartható. *Injekciós kezelések csak intézetben alkalmazhatók.*
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig: 0,05—0,03 mg/kg/die per os, 3—5 adagra elosztva, kisebb adagokkal kezdve és — szükség esetén — fokozatosan emelkedve. I. musc. ennek a fele.

Mellékhatás: Sedativ hatása bágyadtságot idézhet elő, ami az adagok csökkentésével kiküszöbölhető. Hasmenés csak kivételes esetekben fordul elő, és 3—5 napon belül elmarad. További mellékhatás: orrnyálkahártya-duzzadás, vagotonia.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 2 év, tabl. 3 év.

Csomagolás: 50×0,1 mg tabl. 15,90 Ft, 250×0,1 mg tabl. 64,60 Ft,
40×0,25 mg tabl. 27,90 Ft, 250×0,25 mg tabl. 124,60 Ft.
5×1 mg amp. 21,90 Ft, 25×1 mg amp. 93,60 Ft, 5×2,5 mg amp. 41,80 Ft, 25×2,5 mg amp. 177,50 Ft.

REDERGAM K.Gy. XVI.
inj., cseppek, subling. tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,3 mg dihydroergotoxin. aethansulfon.-ot tartalmaz.
1 üveg 10 mg dihydroergotoxin. aethansulfon.-ot tartalmaz 10 ml szeszes-vizes oldatban. (1 ml = kb. 30 csepp = 1 mg hatóanyaggal)
1 sublingualis tabl. 0,25 mg dihydroergotoxin. aethansulfon.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypertonia, sympathicotonia, migraine, coronaria-insufficientia, angina pectoris, peripheriás érbántalmak, Raynaud-kór, thrombangitis ob literans, claudicatio intermittens.

Adagolás: Naponta 1—3 amp. s. cut., vagy i. musc. Vérnyomáscsökkentő hatás vizsgálatára ½—1 amp. i. ven.

Cseppekből a kezelést 3×5 cseppel kezdjük, és az adagot napi 3×1 cseppel emeljük a kedvező hatás jelentkezéséig, de nem több, mint 3×20 cseppig. Az optimális és legjobban tűrt adaggal a kezelést 1—3 hónapig folytatjuk. A cseppek hatását injekció s. cut. vagy i. musc. adagolásával fokozhatjuk.

A sublingualis tablettákból első nap 1 tablettát adunk, majd a tabletták számát naponta eggyel emeljük 7—8 tablettáig, és ez az adagolás marad a hatás beállтáig. A tablettákat a nap folyamán egyenletesen adagoljuk, a nyelv alá helyezve, nyelés nélkül szétolvadni hagyjuk.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak olyan betegeknek rendelhető, akik essentialis hypertoniában vagy egyéb érrendszeri megbetegedésben szenvednek, és akiknél a szokásos és bevált gyógymódoknak megfelelő időn át történő alkalmazása, nem vezetett kellő eredményre. — Rendergam (inj., cseppek, subling. tabl.) közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: inj. 3 év, cseppek 1 év, subling. tabl.: 3 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 16,70 Ft, 50×1 ml amp. 152,20 Ft.
1 üveg (cseppek) 10 ml 73,20 Ft,
50 subling. tabl. 27,10 Ft, 250 subling. tabl. 97,90 Ft.

REDIMYL Ch. inj. XIII/LII.

Összetétel: 1 amp. (20 ml) 0,3 g β-dimethyl-glutarimidet tartalmaz.

Javallatok: Intravenás barbitál-narkózis megszüntetése barbitál és egyéb altatószer okozta mérgezések.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Új- és koraszülöttek asphyxiás rohama.

Adagolás: *Felületes,* intravenás barbitál-narkózis azonnali megszakítására és a következményes panaszok (szédülés, álmosság) megszüntetésére, pl. járóbeteg-rendelésen végzett kisebb beavatkozások (foghúzás, tályognyitás, repositio stb.) után, többnyire elegendő 25 ml i. ven. befecskendezése. Ez az adag néhány perc múlva megismételhető az optimális hatás eléréséig. *Közepesen* mély narkózis gyors megszüntetésére oly esetekben, ha a tiszta öntudatállapot visszatérését meg akarjuk gyorsítani: kezdetben 25 ml-t i. ven. befecskendezünk, majd néhány perc múlva még 10—20 ml-t adunk. Ez az adag megismételhető a kívánt hatás eléréséig.

Mély narkózis esetében, amikor túladagolás történt vagy ha barbitál-túlérzékenység áll fenn, a comatosus állapot időtartamának lényeges megrövidítésére: kezdetben 40—50 ml-t i. ven. befecskendezünk, és ezt az adagot a szükséghez képest megismételjük a kellő effektus eléréséig.

Könnyű mérgezés esetében, ha a beteg öntudatának gyors feltisztulását akarjuk elérni, 25—40 ml-t i. ven. befecskendezünk, és ezt az adagot 10 perc múlva megismételjük. Esetleg néhány óra múlva ismét adunk 15—25 ml-t.

Súlyos mérgezés esetében kezdetben 60—100 ml-t lassan i. ven. injiciálunk, és ezt az adagot 3—5 perc múlva megismételjük.

A továbbiakban a szükséghez mérten hasonló mennyiséget adunk 10—15 perc múlva. Ha a comatosus állapot újból mélyülne, akkor 1—3 óránként 25—40 ml-t fecskendezünk be i. ven.

Igen súlyos mérgezés esetében (teljes areflexia, fénymerev pupillák, légzészavar) az első adag 80—120 ml. Ezt a mennyiséget i. ven. lassan injiciáljuk, és kb. 5—10 perc múlva megismételjük, *a beteg állapotának figyelembevételével.* További 10 perc múlva 40—80 ml mennyiségben újabb adagot nyújthatunk, majd szükség szerint 3—4 óránként a befecskendezést megismételjük, a mellékhatások figyelembevételével!

Súlyos és igen súlyos mérgezetteknél a Redimyl inj. napi mennyisége megfelelő elosztásban 400—900 ml is lehet. A mérgezés lefolyása (3—5 nap) alatt összesen 2—4000 ml is adható. — A Redimyl

inj. alkalmazása nem teszi feleslegessé a mérgezett beteg egyéb kezelését, úm.: gyomormosás, hashajtás, cardialis támogatás, parenteralis folyadék- és electrolyt-bevitel stb.

Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig 2 mg/kg/dosi i. ven., 1—14 éves korig 1 mg/kg/dosi i. ven. Szükség esetén 20—30 percenként megismételhető, általában a túladagolás első jeléig (arcfintor, szemhéj-, ujjrángás, ill. fibrillatio).

Mellékhatás: Görcsroham.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 25×20 ml 128,— Ft, 1×100 ml 23,50 Ft.

RELAXIL-G E.Gy.T. XI.

inj.

Összetétel: 1 amp. (10 ml) 0,5 g guajacolglycerinaethert tartalmaz.

Javallatok: Abdominalis, anorectalis és végtagsebészetben adjuvánsként, narkózisban az izomtónus csökkentésére. Alkalmas spasmusok oldására discus-herniában, tetanus kezelésére és electroshock-therapiában az izomjelenségek kivédésére, továbbá apoplexia következményeként létrejött spastikus bénulásokkal, rheumás contracturákkal, bursitisekkel, spondylitisekkel együttjáró fokozott izomtónus csökkentésére, valamint anorectalis vizsgálatok megkönnyítésére.

Adagolás: I. ven és i. musc. (lehetőleg a glutaeusokba) injiciálható. Sebészetben a narkózis beállta után az első adag felnőtteknek 20 ml (2 ampulla) i. ven. Hatása 4—6 percen belül éri el a maximumot, és kb. 20—30 percig tart. Hosszabb műtét kapcsán — szükség szerint — többször is adható prolongáltan, frakcionálva (10—15 ml) 200 ml-ig. — A felsorolt egyéb indicatiós területeken naponta 1—2 amp. (10—20 ml) adható. Adipositas vagy súlyosabb izommerevség esetében egyszerre 4—6 amp. (40—60 ml) is injiciálható. Sebészeti alkalmazásakor — amennyiben a beteg spontán légzése

romlik — jól záró maszkon, esetleg lélegeztetőkészüléken keresztül, vagy még inkább intratrachealis intubatio útján, altatógépre kapcsolva, mesterségesen lélegeztetünk oxigénnel mindaddig, amíg a spontán légzés helyre nem áll.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10×10 ml 47,90 Ft, 50×10 ml 225,— Ft.

REPARON E.Gy.T. XLII.

kúp, kenőcs

Összetétel: 1 kúp (2,2 g) 0,66 milliárd Bact. coli steril, 7 mg phenol. liquefact.-ot tartalmaz.
1 tubus (25 g) 8,25 milliárd Bact. coli steril, 0,082 g phenol. liquefact.-ot tartalmaz, v/o emulziós kenőcsalapanyagban.

Javallatok: Aranyér és szövődményei: fájdalom, viszketés, gyulladás, pruritus ani et vulvae, rhagades et fissurae ani.

Adagolás: Ülőfürdő után napi 1—2 kúp. A végbél környékén bekenni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1½ év. (Szerobakteriológiai készítmény.)

Csomagolás: 10 kúp 16,70 Ft, 1 tubus (25 g) 15,20 Ft.

RESEPTYL-UREA Ch. XLVI.

sebhintőpor

Összetétel: 1 doboz (10 g) 3 g (4-chlorphenyl)-3,4-dichlor-benzolsulfonamid., 0,1 g carbamidum-ot tartalmaz 10 g sebhintőporban.

Javallatok: Fertőzésre gyanús vagy fertőzött sérülések, sebek, égési sérülés, felfekvés, renyhén gyógyuló, váladékozó fekélyek, feltárt gennyes folyamatok (panaritumok, sipolyok, tályogok stb.), a bőr pyogen fertőzése. Felületi gennyes folyamatok (furunculus, carbunculus, phlegmone stb.) feltárás utáni kezelése. — Bőrgyógyászati és kozmetikai

kisebb műtéti beavatkozásokban a fertőzés megelőzése vagy kisebb kiterjedésű fertőzésekben a gennykeltő baktériumok elpusztítása. — Csecsemő- és gyermekkori pyodermiák (staphylodermiák) helyi kezelése.

Alkalmazás: A szokásos módon elvégzett seb-toilette után az egész seb felületét naponta szükség szerint többször vékony rétegben behintjük. Kötőszöveti résekbe, tasakokba sebhintőporral behintett gézcsíkot vezetünk be. A seb feltisztulásának ideje kb. 2—3 nap. A sebhintőpor alkalmazásának átlagos időtartama 3—6 nap, de huzamosabb időn át is nyugodtan alkalmazható. Szulfanilamid-készítményekkel szembeni érzékenység esetében a sebhintőport csak előzetes scarificatióval végzett negatív rátevési próba után alkalmazzuk.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 g és 75 g vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 1 doboz (10 g) 5,60 Ft, b. 1 szóróüveg (75 g) 42,— Ft;
b. 1 doboz (500 g) 280,— Ft.

RETABOLIL K.Gy. XXXVII.
olajos inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 50 mg noradrostenolon. decanoic., 0,05 ml alcohol benzylic, 0,2 ml alcohol isopropylicus tartalmaz.

Javallatok: Minden olyan eset, amelyben erélyes és tartós anabolikus hatás szükséges, vagy az eddig ismert anabolikus készítmények hatástalannak bizonyultak. Így pl. diabeteses retinopathia, progressiv izom-dystrophia, infantilis progressiv spinalis atrophia (Werding—Hoffmann-syndroma), valamint mamma-carcinoma.

Adagolás: I. musc. kell alkalmazni. Az adagolás az indicatiótól függően individualis, általában diabeteses retinopathiában 3 hetenként 50 mg, mamma-tumorban ugyancsak 3 hetenként 50 mg, izomdystrophiákban: felnőtteknek 2—3 hónapon keresztül heti 2×50 mg, gyermekeknek hetenként 50 mg.

Ellenjavallatok: Prostata- és férfi emlő-carcinoma.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak szakrendelések rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) 2 hónapnál nem régibb keletű javaslata alapján rendelhetik. Ilyen esetben a vényen a javaslatot adó intézményt, szakrendelést és a javaslat keltét fel kell tüntetni. *Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.* — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1×1 ml 48,— Ft, 25×1 ml 1178,70 Ft.

RETANDROL K.Gy. XXXIV.
olajos inj. 25 mg és 250 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 25 mg testosteron. phenylprop., 0,1 ml alcohol. benzylic.-ot,
1 amp. (1 ml) 250 mg testosteron. phenylprop., 50 mg urethanum, 0,1 ml alcohol izopropylic., 0,25 ml alcohol benzylic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Férfi climax, ejaculatio praecox, férfi hypogonadismusa, impotentia, infantilismus, castratiós tünetek, Klinefelter-syndroma, férfiak ostitis deformansa, ill. Paget-kórja, prostata-hypertrophia, eunuchoidismus, acromegalia, hypophysaer cachexia, panhypopituitarismus, endometriosis, meno-metrorrhagia, inoperabilis metastatizáló és recidiváló női mamma-carcinoma.

Adagolás: A kórképtől függően a 25 mg-os inj.-ból hetenként 1 vagy 2 ampulla, esetleg kéthetenként 2 amp. i. musc.; a 250 mg-os inj.-ból havonta 1, esetleg kéthetenként 1 amp.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a 25 mg-os szabadon rendelhető; a 250 mg-ost a szakrendelések rendelhetik, ill. csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslata alapján rendelhető; a vényen a javaslatot adó szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) és a javaslat keltének feltüntetésével.
Emlőrákból kiindult áttételes csontrák esetében a megyei onkológus (Budapesten: Onkologiai Gondozók főorvosai) által kiállított vényen vagy az általuk engedélyezett, aláírásukkal, bélyegzőlenyo-

matukkal ellátott szakorvosi, körzeti stb. orvosi vényen mindkét készítmény térítésmentesen rendelhető. Minden más megbetegedés esetén térítés kötelesen, illetőleg csakis a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. sz. utasítás 6. §-ában említett esetekben rendelhető térítésmentesen. Aphrodisiacumként a társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők! *A 250 mg-osra a vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 3×1 ml amp. 25 mg 20,60 Ft, 25×1 ml amp. 25 mg 139,80 Ft;
b. 3×1 ml amp. 250 mg 121,90 Ft.

RETARDILLIN E.Gy.T. XLVII.
szuszpenziós inj. 400 000 NE, 1 000 000 NE

Összetétel: 1 gumidugós üveg I. 400 000 NE benzylpenicillin-procain.-ot, 1 amp. oldószer II. 2 ml inj. natr. chlor. isoton.-ot;
1 gumidugós üveg I. 1 000 000 NE benzylpenicillin-procain.-ot, 1 amp. oldószer II. 5 ml inj. natr. chlor. isoton.-ot tartalmaz.

Javallatok: Penicillin-indicatiók. 12—16 órán át kielégítő therapiás penicillin-szintet biztosít.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: I. 1×400 000 NE + II. 1×2 ml 12,— Ft,
I. 50×400 000 NE + II. 50×2 ml 525,— Ft,
I. 1×1 000 000 NE + 1×5 ml 25,80 Ft,
I. 50×1 000 000 NE + II. 50×5 ml 1194,— Ft.

RHEOPYRIN K.Gy. VI.
inj., drazsé

Összetétel: 1 amp. (5 ml) 0,75 g phenylbutazon. natr., 0,75 g amidazoph.-ot;
1 drazsé 0,125 g phenylbutazon., 0,125 g amidazophen.-ot tartalmaz.

Javallatok: Arthritis, monarthritis, polyarthritis rheumatica acuta, subacuta et chronica, lumbago, pericarditis rheumatica acuta, podagra, polyserositis rheumatica, spondylarthritis, lágyrészek rheumatismusa, neuralgia, polyneuritis acuta et chronica, neuralgia facialis, adnexitis, salpingitis, parametritis, iritis és iridocyclitis, papilloretinitis.

Ellenjavallatok: Rhythmus-zavarok, vitium cordis, myopathia cordis chronica, amidazophen-érzékenység, vese- és májmegbetegedések, gyomor- és nyombélfekély, oedema-készség, oedema fellépte, továbbá a vérképzőszervek megbetegedései (anaemia, leukopenia, thrombocytopenia). Görcskészség esetén parenteralisan tilos adni. Krónikus kezelés esetén a leukocyta-szám hetenként ellenőrizendő. A fehérvérsejtszám ellenőrzése nélkül protrahált kezelést nem szabad folytatni.

Adagolás: Rheuma kezelésére 1 amp. naponta vagy másodnaponként, fektetett betegnek i. glut., hosszú tűvel mélyen, mindenkor lassan, 1—2 perc alatt injiciálva. Nőgyógyászatban 4—5 naponként 1 amp., amíg a láz és a fájdalom meg nem szűnik. Drazséból 4—6 drazsé naponta. Csak orvosi ellenőrzés mellett adagolható. Hetenként a fehérvérsejtszám ellenőrizendő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 2 év.

Csomagolás: 5×5 ml amp. 38,20 Ft, 50×5 ml amp. 311,80 Ft,
b. 20 drazsé 20,90 Ft, b. 50 drazsé 52,30 Ft, b. 500 drazsé 523,— Ft.

RHEOSOLON K.Gy. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 2 mg prednisolon., 100 mg phenylbutazon.-ot tartalmaz.

Javallatok: Polyarthritis chronica; febris rheumatica (polyarthritis rheumatica acuta, carditis, polyserositis); spondylarthritis ankylopoetica; periarthritis (humeroscapularis stb.); bursitis; arthrosis (in stadio inflammationis). — *Rendelése előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét és kockázatát* (kortikoszteroid-kezelés veszélyei)!

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi et duodeni; vese- és májmegbetegedések; decompenzált vagy decompensatio határán levő szívbetegségek; diabetes mellitus. Oedema, oedema-készség és hypertonia esetében csak sószegény diéta mellett, állandó ellenőrzéssel alkalmazható.

Adagolás: Individuális. Első napon 4—6 tabletta, a további napokon 2—3 tabletta. (A kúra folyamán a vizelet, vérkép és májfunkció időnként ellenőrzendő.)

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendelhetik, csakis olyan megbetegedések esetében, amelyekben egyéb szabadon rendelhető, alkalmazható gyógymód nem vezet megfelelő eredményre. Körzeti, üzemi stb. orvosok szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott adagolásban és időpontig, de legfeljebb 4 héten belül történő gyógykezelés céljából. — Körzeti, üzemi stb. orvos saját elbírálása alapján legfeljebb 3 héten át alkalmazhatja. *Mozgásszervi betegségek* heveny és félheveny állapotában az előzőek szerint rendelhető, mozgásszervi betegségek idült esetében csak szakrendelés rendelheti, illetőleg szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető, a javaslatban meghatározott adagolásban és időpontig, de legfeljebb 6 héten belül történő gyógykezelés céljából.
A vényen a kórismét minden esetben jelezni kell, továbbá a javaslatot adó szakrendelést (fekvőbeteg-gyógyintézet) és a javaslat keltét is fel kell tüntetni.
A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.

Csomagolás: 20 tabl. 32,40 Ft, 100 tabl. 143,— Ft.

RIDOL K.Gy. XII.
inj., tabl., végbélkúp

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 80 mg dimethylamino-acetyl-phentiazid., 1,5 mg methylhomatrop. brom., 2 mg lidocain. hydrochlor., 20 mg codein. hydrochlor., 500 mg novamidazoph.-ot;

1 tabl. 80 mg dimethylamino-acetyl-phentiazid., 1,5 mg methylhomatrop. brom., 20 mg codein. hydrochlor., 50 mg novamidazoph.-ot;
1 kúp 160 mg dimethylamino-acetyl-phentiazid., 2,2 mg methylhomatr., brom., 20 mg codein. hydrochlor., 600 mg novamidazoph.-ot tartalmaz.

Javallatok: Vascularis fejfájás, gyomorgörcs, pylorusspasmus, nephrolithiasis, cholelithiasis, uretergörcs, hólyag-tenesmus, bél-tenesmus, spastikus obstipatio, dysenteriás fájdalmak, tabesesek abdominalis görcse, hyperemesis, dysmenorrhoeás panaszok esetén.

Adagolás: Heves, akut fájdalmak esetén 1, legfeljebb 2 ampulla i. musc. Fájdalom esetén adagonként 1, legfeljebb 2 tabl., 1, ill. 2 kúp, amely adagok naponta kétszer ismételhetők. A fehérvérsejtszám ellenőrzése huzamosabb adagolás esetén kívánatos.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×2 ml amp. 15,— Ft, 50×2 ml amp. 123,— Ft;
10 tabl. 13,30 Ft, 100 tabl. 133,— Ft;
10 kúp 26,20 Ft.

RIGEDAL K.Gy. XVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 10 mg isosorbit. dinitric.-ot tartalmaz.

Javallatok: Angina pectoris, stenocardia.

Ellenjavallat: Glaucoma.

Adagolás: A kezdő adag 5 mg (½ tabletta). Ezt az adagot 4—6 órás időközökben szükség esetén ismételni lehet. Az átlagos napi adag 15—20 mg (1½—2 tabletta). Az egyéni tűrőképesség és szükséglet figyelembevételével ezt az adagot fokozatosan emelni lehet a fejfájástünet jelentkezéséig. Antihypertensiv szerekkel együtt adva, a vérnyomást — különösen eleinte — gyakran kell ellenőrizni, mert a Rigedalnak is van mérsékelt vérnyomáscsökkentő hatása, ami más szerek hatását

potenciálhatja, és ilyenkor kellemetlen orthostatikus hypotonia keletkezhet. Az adag csökkentésével ez elkerülhető.

Mellékhatás: A betegek egy részénél átmeneti fejfájás jelentkezhet, amely az adag csökkentésekor megszűnik.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 14,80 Ft, 250 tabl. 64,40 Ft.

RIGENICID K.Gy. XLVII.
bélben oldódó drazsé, végbélkúp

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g aethionamid.-ot;
1 kúp 0,5 g aethionamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: A gümőkór pulmonalis és extrapulmonalis, egyéb gátlószerekkel szemben resistens esetei, valamint egyéb gátlószerekkel szemben fennálló intolerantia.

Adagolás: Drazséból felnőtteknek 0,75—1 g, azaz 3—4 db naponta; gyermekeknek 20—40 mg testsúlykilogrammonként. A végbélkúpból felnőtteknek 1—1 db, gyermekeknek ½—½ db reggel és este. — A tapasztalatok szerint célszerű a kezelést napi 1 drazséval, ill. 1 végbélkúppal elkezdeni, 5 nap után napi 2 drazsé, majd újabb 5 nap után napi 3 drazsé, ill. 2 kúpra emelni az adagot. Ennél magasabb adagot az esetek többségében a beteg a jelentkező gyomorpanaszok miatt nem tud szedni. A panaszok hiányában azonban az ideális napi adag 4 drazsé, ill. 2 kúp. A gyógyszerrel szemben viszonylag gyorsan bacteriologiai resistentia alakul ki, ezért mindenkor kombináltan kell adagolni, olyan más gátlószerrel együtt, amellyel szemben még bacteriologiai érzékenység feltételezhető.

Megjegyzés: ✠ Orvosi vényen Rigenicid nem rendelhető. A járóbetegnek Rigenicidde történő kezelését az illetékes TBC-gondozó intézet végzi.

Csomagolás: 50 drazsé 51,80 Ft;
10 kúp 26,— Ft.

RIGENICID K.Gy. XLVII.
infúziós oldat készítéséhez

Összetétel: 1 üveg 500 mg aethionamid.-ot tartalmaz (sósavas só alakjában);
pH-beállító oldat: 0,112 g natr. bicarb. pro infus., aqua dest. pro inj. ad 8 ml.

Javallatok: Gümőkór pulmonalis és extrapulmonalis folyamatai; egyéb gátlószerekkel szemben resistens esetek; egyéb gátlószerekkel, továbbá oralis és rectalis Rigenicid-adagolással szemben fennálló intolerantia.

Ellenjavallatok: Emésztőrendszer betegségei, ill. kóros állapota; gastritis, gyomor-bél fekély, gyomorresectio utáni leromlott állapot, colitis, colitis ulcerosa, májlaesio, cachexiás phtysisek, terhesség.
A korai rezisztencia fellépése miatt a Rigenicidet mindig más antituberculoticummal kell társítani, egyedüli alkalmazása ellenjavallt.
Ha a betegnek idegrendszeri vagy psychés zavarai voltak, a Rigenicid cycloserin-kombinációban az esetleg fellépő idegrendszeri tünetek miatt nem adagolható. Nem ajánlatos alkalmazása krónikus alkoholizmusban, epilepsiában, különösen INH- és cycloserin-kombinációban, mert neurotoxikus tünetek jelentkezhetnek.

Adagolás: Szokásos napi adagja 1 üveg, azaz 500 mg etionamid. Az infúziós oldatot célszerűen a következő módon lehet elkészíteni: 500 ml 5%-os steril glukózoldathoz vagy 500 ml steril fiziológiás konyhasóoldathoz hozzáadjuk a pH-beállító ampulla tartalmát, azaz 8 ml steril izotoniás natrium bicarbonat oldatot. Felrázás után ebből a keverékből 10 ml-t fecskendővel felszívunk és a gumisapkán át befecskendezzük a hatóanyagot tartalmazó üvegbe. A hatóanyag teljes feloldódása után a gumisapkás üvegből fecskendőbe szívjuk fel annak teljes tartalmát és hozzáadjuk a glukóz-, ill. konyhasóoldathoz.
Az ilyen módon elkészített 1 ezrelékes, kb. 4,5 pH-jú oldatot az elkészítés után közvetlenül, tartós cseppinfúzió formájában 2—3 óra alatt i. ven. infundáljuk a szokásos módon.

Az infúziót az egyénileg változó szükséglet szerint naponta tanácsos adni és az egyéni tűrőképesség figyelembevételével esetleg csökkenteni. Célszerű az infúzión kívül még legalább napi 1 tabl. Rigenicidet is adni. A kúra időtartamát esetenként célszerű meghatározni.
A készítmény oldott állapotban nem tárolható. PAS-natr. infúzió, thiosemikarbason és tiocarlidum kivételével a Rigenicid-infusio a tbc minden más kombinációs therapiájában alkalmazható antituberculoticummal, együttesen adagolható.
(A PAS lúgos kémhatása miatt az etionamidot oldatából kicsapja!)

Mellékhatások: Gastrointestinális panaszok; étvágytalanság, hányinger, hányás, gyomorfájdalom, bőrkiütések. Ritkán psychés zavarok, menstruációs zavarok, amelyek a gyógyszer elhagyása után normalizálódnak.

Megjegyzés: ✠ Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van forgalomban. Orvosi vényen nem rendelhető.

Csomagolás: 50×500 mg + 50×8 ml oldószer 375,— Ft.

RIGETAMIN K.Gy. sublingualis tabl. XVI.

Összetétel: 1 sublingualis tabl. 1 mg ergotamin tart.-ot tartalmaz.

Javallatok: Migraines roham megelőzése és kezelése. Vascularis típusú egyéb fejfájások, migrain-aequivalensek.

Ellenjavallatok: Peripheriás keringési zavarok, coronaria-megbetegedés, hypertonia, máj- és vesebetegség, graviditas, sepsis, súlyos arteriosclerosis, thrombophlebitis, pruritus.

Adagolás: A roham fenyegető jeleinek kezdetekor 1 tablettát nyelv alá téve oldódni hagyunk. Ez az adag szükség szerint megismételhető, de a napi összmennyiség ne haladja meg a 3 tablettát, az 1 havi összmennyiség pedig általában 12 tabletta lehet.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 12 tabletta 8,30 Ft.

RITOSEPT B. oldat XLVI.

Összetétel: 1 üveg (250 ml) 1,25 g hexachlorophen.-ot tartalmaz káliszappantartalmú vizes oldatban. 1 üveg (1000 ml) 4-szeres anyagmennyiségeket tartalmaz.

Javallatok: Sebészeti kézfertőtlenítésre.

Alkalmazás: A Ritosept-oldatot legcélszerűbb csepegtetőpalackból alkalmazni. Egy-egy alkalommal 5—10 ml-t öntünk a kézre. Az első lemosakodás előtt szappannal, kefével és folyó meleg vízzel mossuk a kezünket mintegy 2 percen keresztül. Első bemosakodáskor a Ritosept-oldat említett mennyiségével szintén 2 percig keféljük a kezet, majd folyó meleg vízzel mossuk le. Ezután újabb adag Ritosept-oldattal további 3 perces kézmosást végzünk. A második aznapi bemosakodáskor már csupán 3 percig tartó kézmosás szükséges 5—10 ml Ritosept-oldattal, kefe nélkül. A harmadik aznapi bemosakodásnál 2 perces kézmosás is elegendő a megadott mennyiségű oldattal. — Nyílt sebeket Ritosepttel kezelni nem ajánlatos.

Megjegyzés: Szakrendelések a biztosítottnak a szakrendelésen történő ellátásához nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 1 üveg (250 ml) 8,70 Ft, 1 üveg (1000 ml) 27,— Ft;
1 műanyag palack (1000 ml) 19,— Ft (+ 15,— Ft betét).

RUTASCORBIN K.Gy. tabl. XXXI.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g rutin., 0,05 g acid. ascorb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Haemorrhagiás diathesis, purpura thrombopenica, purpura medicamentosa, haematuria, nephritis, tüdővérzések, retinitis, glaucoma, a véredények fragilitasával kapcsolatos egyéb belső vérzések.

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 tabl. 12,30 Ft, b. 100 tabl. 61,50 Ft.

RUTIN Ch. XXXI.
drazsé 20 mg

Összetétel: 1 drazsé 0,02 g rutin.-ot tartalmaz.

Javallatok: A thrombopeniás és septikus purpura, vesevérzés, hajszálerek túlságos fehérjeáteresztése, savós gyulladás, fertőzés, máj- és vesebetegségek.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé. C-vitaminnal kombinálható.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 drazsé 12,90 Ft.

RUTOPHYLLIN A. XVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,02 g rutin., 0,03 g butobarbital., 0,1 g theophyllin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hypertonia, arteriosclerosis, angina pectoris, vasoregulans sedativum, apoplexia megelőzése és kezelése.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 20 tabl. 15,10 Ft, b. 500 tabl. 377,50 Ft.

SACERNO E.Gy.T. III.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,10 g mephenytoinumot tartalmaz.

Javallatok: Epilepsia (grand mal) barbiturátokkal vagy brómmal nem befolyásolható eseteiben.

Adagolás: Naponta 3-szor 1 tabl. Az átmenet más antiepilepticumokról fokozatosan történjék. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 10,30 Ft, 50 tabl. 22,80 Ft.

SALVADOR K.Gy. VI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 75 mg barbital., 80 mg coffein., 150 mg amidazoph., 150 mg phenacetin.-ot tartalmaz.

Javallat: Analgeticum.

Adagolás: Naponta 1—3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 10 tabl. 7,— Ft.

SALVOSEPTYL A. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g sulfathioureát tartalmaz.

Javallatok: Strepto-, staphylo-, pneumococcus-fertőzések, valamint a húgy- és epeutak coli-fertőzése, gyermekek pyuriája és fertőzéses enterocolitise.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek 0,1 g—0,15 g/kg/die, mely adagot négy egyenlő részre elosztva vetetjük be.
Csecsemőknek napi 0,25 g/kg, 1—2 évesnek 0,20 g/kg, 3—6 évesnek 0,20 g—0,15 g/kg-ot adunk étkezés után.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 24×0,50 g 11,75 Ft, 250×0,50 g 122,— Ft.

SANOTENSIN E.Gy.T. XVI.
tabl. 10 mg és 25 mg

Összetétel: 1 tabl. 10 mg, ill. 25 mg guanethidinum sulf.-ot tartalmaz.

Javallatok: Középsúlyos és súlyos hypertonia, beleértve a malignus lefolyású kórképeket is, továbbá hyperthyreosis.

Ellenjavallatok: Chromaffinoma okozta hypertonia, ez esetben ugyanis a guanethidin a keletkezett noradrenalin hatását még fokozza is. A parasympatholytikus tónus fokozódása miatt a gyomor- és bélrendszer betegsége esetén, valamint műtét előtt álló betegeknek nem adható.

Adagolás: Kezdő adagja napi 10 mg. Ezt az adagot 7—14 nap múltán, 1—2 hetes időközönként 10—10 mg-mal emeljük arra a mennyiségre, amely a kívánt vérnyomásszintet biztosítja. Ez a hatásos adag általában napi 50—75 mg között van, bár egyes esetekben már napi 5 mg is kellő hatású lehet, más esetekben pedig csak napi 400 mg alkalmazása biztosítja a kívánt alacsony tensio-értéket.
Hospitalizált betegnél az adag rövidebb időközönkénti emelése is megengedhető, de ilyenkor is figyelembe kell venni, hogy a Sanotensin hatása egy hétnél rövidebb időn belül általában nem jelentkezik.
Kizárólag intézeti kezelés esetén kezdő adagként napi 25 mg az adag, amit naponta 12,5 mg, ill. 25 mg-mal emelünk a vérnyomás kívánt mértékének eléréséig, ill. amíg a mellékhatások nem jelentkeznek. Más vérnyomáscsökkentő szerekkel, elsősorban thiazid-származékokkal (Chlorurit, Hypothiazid) kombinálva a Sanotensin adagja — a szükséghez képest — csökkenthető.
Az adagolás beállítása lehetőleg intézetben történjék, a Sanotensin további alkalmazása idejére pedig biztosítani kell az orvosi ellenőrzést.

Hyperthyreosis esetén — adjuvánsként — 25—50 mg-os napi adagok a peripheriás sympathikus túlsúlyra visszavezethető tüneteket jól csökkentik.

Mellékhatás: A készítmény különösen a reggeli felkeléskor okoz álló testhelyzetben jelentős vérnyomáscsökkenést, mely ájuláshoz is vezethet. Enyhébb esetekben ezt az orthostatikus tensio-csökkenést therapiásan is ki kell használni, vagyis a beteget nem szabad ágyban tartani. Súlyosabb orthostatikus hypotoniánál Trendelenburg-helyzet vagy noradrenalin-infusio alkalmazása javasolt.
Gyakran jelentkezik a szer alkalmazásakor diarrhoea, melyet az atropin jól szüntet. Az esetleges bradycardia rendszerint nem okoz különösebb kellemetlenséget. Előfordul továbbá ejaculatiós impotentia, mely mindig reversibilis.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szakorvosi rendelésen szabadon, egyéb esetben szakorvosi javaslat alapján rendelhető.

Csomagolás: 40×10 mg tabl. 17,80 Ft, 200×10 mg tabl 82,80 Ft.
20×25 mg tabl. 20,10 Ft, 200×25 mg tabl. 181,50 Ft.

SÁRGA VAZELIN B. XLIV.

Összetétel: 1 tubus 20 g vaselin. flav.-ot tartalmaz.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 2,60 Ft.

SCOPOLAMINUM HYDROBROMICUM
K.Gy. IV.
inj. 0,05%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg scop. hydrobrom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Parkinsonismus, tremor senilis, paralysis, delírium, narkózis bevezetése morfinnal.

Adagolás: Naponta 1—2-szer ½—1 amp.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml amp. 13,50 Ft, b. 50×1 ml amp. 67,50 Ft.

SCUTAMIL-C E.Gy.T. XI.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,15 g carisoprodol., 0,10 g paracetamol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalmas izom-spasmussal járó állapotokban: rheumatoid arthritis, spondylosis, periarthritis humeroscapularis, neuritis n. ischiadici, neuralgiák, lumbago, arthrosisok, bursitis, postfracturás állapotok ún. rheumatologiai szaka, tumor, distorsio, subluxatio és luxatio által kiváltott izom-spasmusok, algopathiás reflex-dystrophiák, psychogen rheumatismus, torticollis, Little-kór, tetania, aktív és passzív torna- és mozgásgyakorlatok megkönnyítése.

Adagolás: Átlagos napi adagja felnőtteknek és 6 évesnél idősebb gyermekeknek 3×1 drazsé, étkezés után. A drazsékat erősen keserű ízük miatt nem ajánlatos szétrágni.
Figyelmeztetés: Gyermekeknek 3 éves kor alatt nem adható. Járművezetők, veszélyes gépek mellett vagy épületen dolgozók nem szedhetik.
Ha folyamatos szedése 10 napon túl is szükséges, vagy ha 12 éven aluli gyermek szedi, ez csak orvosi ellenőrzéssel történhet. Az alkohol hatását potenciálja.

Mellékhatás: Nagyobb adagok alkalmazása esetén ritkán álmosság, bágyadtság, gyengeség léphet fel, amely a gyógyszer adagjainak csökkentésére, ill. elhagyására megszűnik.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 11,80 Ft, 200 drazsé 100,— Ft.

SECADOL K.Gy. XVI.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 1 mg ergotamin. tartar., 100 mg coffein.-ot tartalmaz.

Javallatok: Migraine, ill. migraine-aequivalensek, vascularis fejfájások.

Ellenjavallatok: Peripheriás érszűkülettel járó betegségek, angina pectoris, coronaria-sclerosis, máj- és veseelégtelenség, terhesség.

Adagolás: Individuális. Általában a migraine-es roham kezdetén 1 drazsét adunk. Ha a roham félórán belül nem szűnik, még egy drazsé adható, de a napi összmennyiség ne haladja meg a 3 drazsét, az 1 havi összmennyiség pedig általában 12 drazsé lehet.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 8,— Ft, 250 drazsé 100,— Ft.

SEDUXEN K.Gy. IV.
tabl., inj.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg diazepam.-ot,
1 amp. (2 ml) 10 mg diazepam., 4 mg lidocain, hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fokozott psychés feszültséggel járó kórképek, ingerlékenység, félelemérzés, szorongás, neurasthenia, vegetatív neurosis. Szerv-neurosisok (neurogen eredetű cardiovascularis, epigastrialis panaszok), gyomor- és bélfekély, angina pectoris, myocardialis infarctus adjuvans tüneti kezelése. Különféle szerv-localisatiójú climaxos panaszok, alvászavarok. Psychiatriai megbetegedések: kényszerneurosisok, phobiák, hysteroid reactiók, hangulatlabilitas, szorongásos neurosis. Epilepsia adjuvans kezelése.
Fokozott izom-tonussal és spasticitassal járó mozgásszervi megbetegedések.
Inj.: továbbá status epilepticus. Abortus imminens, fenyegető koraszülés, korai burokrepedés. Terhes-

ségi toxicosis: a terhesség 3. hónapja után. Placenta praevia. Szülés kitolási szaka. Delíriumok (tremens, toxicus, lázas stb.).

Ellenjavallat: Myasthenia gravis.

Adagolás: *Tabl.* Átlagos adagja gyermekeknek és legyengült, idős egyéneknek ambulans kúrában naponta 2—3-szor $^1/_4$—$^1/_2$ tabletta. Felnőtteknek naponta 3-szor $^1/_2$—1 tabletta a kezdő adag, amelyet az egyéni érzékenység és szükséglet figyelembevételével fokozatosan emelni vagy csökkenteni lehet. Alvászavar esetén lefekvés előtt 2—3 tabletta, vagy napközben alkalmazott 2-szer $^1/_2$—1 tabletta kiegészítéseként este 2—3 tabletta.

Mozgásszervi megbetegedésekben: felnőtteknek naponta 3-szor $^1/_2$—1—2 tabletta.

Fekvőbeteg-gyógyintézetben a tüneti kép súlyosságának megfelelően az átlagosnál nagyobb adagok is alkalmazhatók.

Inj.: Fokozott psychés feszültséggel, motoros izgalmi állapottal, paranoid hallucinatióval járó kórképekben az átlagos adag naponként 3×10 mg i. musc. szükség esetén 3—4 óránként 10 mg i. musc.

Status epilepticusban a kezdő adag felnőtteknek 10 mg i. ven., ezt az adagot szükség esetén 1 óra múlva meg lehet ismételni i. ven. vagy i. musc. A status epilepticus oldódásáig 3 óránként 10 mg adagolható i. musc. Delírium esetén 3—4 óránként 10 mg i. musc. Induláskor 10 mg i. ven. +10 mg i. musc. Fokozott izom-tonussal és spasticitassal járó kórképekben az átlagos napi adag 1—2-szer 10 mg i. musc. Fenyegető koraszülés, korai burokrepedés, abortus imminens esetén a kezdő adag 10 mg i. ven. + 10 mg i. musc. Szükség esetén ez az adag 1 óra múlva megismételhető. A fenntartó adag naponként 3—4-szer 10—20 mg i. musc. A tünetek javulásának megfelelően az adagot fokozatosan csökkenteni lehet.

A szülés kitolási szakában, annak megkönnyítésére, ill. megrövidítésére 2—3 ujjnyi tágasságú méhszáj mellett 20 mg adagolható i. musc.

Placenta praeviában, a terhesség 3. hónapja után fellépő terhességi toxicosisban: a kezdő adag 20 mg i. musc. Fenntartó adagként naponta 3—4-szer 10—20 mg i. musc.

Tetanus adjuvans kezelésére 8 óránként 10 mg i. ven. Gyermekek adagját valamennyi indicatós területen a testsúly, az életkor és az általános állapot figyelembevételével, esetenként kell meghatározni.

Idős, legyengült egyéneknek az átlagos adagok fele, kétharmada adagolható.

A kívánt akut hatás elérése után a kezelés per os folytatása célszerű.

A Seduxen inj. más injekcióval közös fecskendőbe a hatóanyag kicsapódásának lehetősége miatt nem szívható fel.

Mellékhatások: A kúra kezdetén esetleg fellépő fáradékonyság és álmosság az esetek többségében néhány nap alatt spontán megszűnik, az adag csökkentésével pedig minden esetben kiküszöbölhető. A Seduxent szedő betegek lehetőleg tartózkodjanak alkoholt tartalmazó italok fogyasztásától, mert a Seduxen — hasonlóan egyéb psychotrop gyógyszerekhez — alkoholfogyasztás esetén individuális, előre nem látható reakciókhoz vezethet.

Gépjárművet vezetőknél és magasban dolgozóknál Seduxen-adagolás, a rendkívül változó érzékenység figyelembevételével, egyéni indicatio és az adag körültekintő meghatározása esetén, óvatosan alkalmazható. A Seduxen tablettának a rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján teratogen hatása nincs, de a készítmény alkalmazása — más tranquillosedativumokhoz hasonlóan — a terhesség első harmadában mégsem ajánlatos.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — *Lejárati idő:* inj. 2 év.

Csomagolás: 20 tabl. 11,70 Ft, 200 tabl. 102,60 Ft; 5×2 ml amp. 22,— Ft, 50×2 ml amp. 214,10 Ft.

SEPTOSYL E.Gy.T. XLV.
szemkenőcs

Összetétel: 1 tubus 0,5 g sulfadimidinum.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Különböző baktériumok okozta heveny és idült kötőhártya-gyulladás, szaruhártya-beszűrődés és -fekély, blepharitis acuta, -angularis, -chronica, -ulcerosa, blepharoconjunctivitis, dacryocystitis, fertőzött szemhéj-ekzema, másodlagosan fertőzött trachoma.

Adagolás: Naponta 2—3-szor borsónyi kenőcsöt az alsó szemhéj mögé helyezünk, és a szemet becsukva, enyhe dörzsöléssel szétkenjük. Ha szemhéjra akarjuk alkalmazni a kenőcsöt, a szemhéj szélére helyezzük és ott vékonyan szétkenjük.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5 g tubus 5,30 Ft.

SERTAN Ch. III.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,250 g primidonumot tartalmaz.

Javallatok: Grand mal, focalis és psychomotoros epilepsia. Kevésbé alkalmas a petit mal rohamok kezelésére.

Adagolás: Individuális. Átlagos napi adagja 8 éves életkorig 0,125 g (½ tabl.), 8 évesnél idősebbeknek napi 0,25 g (1 tabl.). A napi adagot az egyéni optimális adag eléréséig (ez felnőttnél 0,75—1—1,5 g) 2—3 naponként 1 tablettával (gyermekeknél ½ tablettával) lehet emelni. — A therapiás adag maximuma napi 2 g. A Sertan adagolásának megszüntetésére, illetve más antiepilepticumra való áttérés csak fokozatosan történhet. — A Sertan szükség esetén hydantoin-készítményekkel és barbiturátokkal kombinálható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 62,20 Ft, 500 tabl. 582,60 Ft.

SEVENAL Ch.—A. II.
inj., tabl. 0,1 g és 0,3 g

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,165 g phenobarbital., 0,55 g urethan.-ot, 1 amp. (2 ml) 2-szeres anyagmennyiségeket tartalmaz.
1 tabl. 0,1, ill. 0,3 g phenobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Neurotikus, encephalitises, hypertoniás insomnia, elmebetegek dühöngése, delíriumok, morfinelvonás, paralysis agitans, chorea, epilepsia, eclampsia, tetanus, tetania, spastikus állapotok, hányás, hypertonia, migrain, asthma bronchiale, angina pectoris, singultus stb.
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Csecsemőkori excitatiós állapotok, görcsroham.

Adagolás: Hypnoticumként: 0,1—0,3 g, sedativumként: 0,05—0,1 g, antiepilepticumként: este 0,2 g, másnap 0,1 g. Injekcióból 1—2 ml szükség esetén naponta kétszer.
Gyermekadagok: 2—12 hónapos korig 0,01 g/kg/dosi i. musc., de maximum 0,10 g, 1—6 éves korig 0,01—0,005 g/kg/dosi i. musc., de maximum 0,15 g. 7—14 éves korig 0,005 g/kg/dosi i. musc., de maximum 0,20 g.
Az injekció megismétlésére, ha szükséges, csak 1—1½ óra múlva kerüljön sor. Intézetbe küldéskor az injekciók beadásának időpontja is közlendő! A csecsemőkori görcsroham leginkább láz által kiváltott ún. „lázas eclampsia", vagyis a szervezet általános, nem specifikus reakciója. Megszüntetésére a beadandó Sevenal mennyiségét ml-ben a 6-os szorzószám használatával meglehetősen egyszerűen ki lehet számítani az I. és II. csoportban. Pl.: 7 kg-os csecsemőnek 6-szor 7 = 0,42 ml, kereken 0,5 ml Sevenalt kell adni.
Hatástalanság esetén Hibernal (1—0,5 mg pro kg pro dosi i. musc.), magnesiumsulfat (0,15 g pro kg pro dosi i. m.), esetleg lumbálpunkció. — Intézet!

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. **11,20 Ft,** b. 50×1 ml amp. 112,— Ft,

b. 5×2 ml amp. 15,80 Ft, b. 50×2 ml amp. 158,— Ft;
b. 10 tabl. 0,1 g 2,80 Ft, b. 100 tabl. 0,1 g 28,— Ft,
b. 10 tabl. 0,3 g 5,40 Ft, b. 100 tabl. 0,3 g 54,— Ft.

SEVENALETTA A. tabl. II.

Összetétel: 1 tabl. 15 mg phenobarbital.-ot tartalmaz.

Javallatok: Asthma bronchiale, laryngospasmus, hypertonia, arteriosclerosis, stenocardia, singultus, migraine, epilepsia, pertussis. Nem altat, csak sedativ hatású.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 30 db orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 30 tabl. 3,48 Ft, b. 500 tabl. 58,— Ft.

SIREPAR K.Gy. inj. XXII.

Összetétel: 1 üveg 10 ml hepatis extr. hydrolys. fluid. aqu. (= 100 μg cyanocobalamin.), 0,045 phenol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Krónikus és subacut hepatitis, máj-cirrhosis, zsírmáj, a máj-parenchyma degeneratiója, toxikus és medicinalis májártalmak.

Adagolás: Intraglutealisan és venásan egyaránt alkalmazható. A kezelés elkezdése előtt a túlérzékenység megállapítására célszerű 0,1—0,2 ml-t mélyen muscularisan beadni. Amennyiben 30 percen belül nem jelentkezik allergiás reakció, a folyamatos kezelés elkezdhető. — Napi adagja 2—3 ml, lassan i. ven. Intraglutealisan hasonló adagok adhatók. Egy kúra során összadagja kb. 150—200 ml. Venás adásnál célszerű a készítményt fiziológiás konyhasóval vagy vérrel hígítani.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×10 ml gumisapkás üveg 44,20 Ft, 50×10 ml gumisapkás üveg 410,— Ft.

SOLVASTHMIN K.Gy. tabl. XVII.

Összetétel: 1 tabl. 100 mg theophyllin., 50 mg coffein., 10 mg *dl*-ephedr. hydrochlor., 0,12 mg *l*-hyoscyamin. sulf., 0,01 mg scop. hydrobrom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Status asthmaticus és a közelgő roham megelőzésére.

Adagolás: 4 óránként ½ tabletta vagy reggel és este 1—1 tabletta étkezés után.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 10 tabl. 6,40 Ft, 250 tabl. 132,60 Ft.

SOMBEN Ch. tabl. II.

Összetétel: 1 tabl. 0,5 g bromacetocarb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Ideges ingerlékenység, elalvási zavarok neurotikusok, szívbetegek érelmeszesedése eseteiben; climax, hyperthyreoidismus, pertussis, fülzúgás.

Adagolás: Mint sedativum: 3-szor ½—1 tabl. Mint hypnoticum: 1½—2 tabl. egyszerre, lefekvés előtt ½ órával meleg italban. 5 éves korig 2—3×$^1/_4$—$^1/_2$ tabl. 12 éves korig 2—3×½—1 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — 5 tabl. orvosi rendelvény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 20 tabl. 22,— Ft, b. 110,— Ft.

SPIRACTIN K.Gy. XIII.
inj. 1½% és 2½%

Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 15 mg, ill. 50 mg l-piperidinomethylcyclohexan-2-onum hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek asphyxiája. Inhalatiós és intravenás narkózis, morphin, barbiturát és egyéb altatók, szénmonoxyd-mérgezés és pneumonia következtében fellépő légzészavarok és légzésbénulás veszélye.

Adagolás: I. ven., i. musc. Intravenás alkalmazás esetén a hatás csaknem azonnal jelentkezik. A keringésre nincs befolyással, hibernációban is alkalmazható. Cseppinfúzióban elnyújtott hatás érhető el. Súlyos esetekben az intravenás alkalmazás indokolt. Felnőtt adagja 50—100 mg (1—2 ampulla 2½%-os inj.). Ez az adag szükség esetén $^1/_4$—½ óránként óvatosan megismételhető. — Újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek adagja 5—15 mg i. ven. (½—1 ampulla 1½%-os injekcióból). Szükség esetén ez az adag is $^1/_4$—½ óránként megismételhető.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml 1½% inj. 7,20 Ft,
b. 5×2 ml 2½% inj. 15,60 Ft.

STERALGIN Ch. XII.
inj.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,33 mg atrop. methylbrom., 22,8 mg codein. phosph., 40 mg papaver. hydrochlor., 300 mg amidazoph., 300 mg urethan.-ot tartalmaz.

Javallatok: Mindenfajta simaizomgörcs okozta fájdalom: epe-, vesekólika, dysmenorrhoea, migraine.

Adagolás: Szükség esetén 1 amp. i. musc. vagy s. cut.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 15,80 Ft, b. 50×1 ml amp 158,— Ft.

STEROGENOL E.Gy.T. XLVI.
oldat

Összetétel: 1 üveg 10 g cetylpyridinium brom.-ot tartalmaz 100 ml szeszes oldatban. 1 üveg (250, ill. 1000 ml) 2,5-, ill. 10-szeres anyagmennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Fertőtlenítésre: helyiségek, használati tárgyak, fehérnemű és ágynemű, kézfertőtlenítés, hüvelyöblítés, gombás fertőzések kezelésére, szennyezett bőrfelületek, sebkörnyék, műtéti terület tisztítása, égési sérülések kezelése stb. *Fémműszerek sterilezésére nem alkalmas.*

Adagolás: A csomagoláshoz mellékelt részletes használati utasítás szerint. Figyelmeztetés: csak *külsőleges* használatra és csak felhígítva használható! Lehetőleg melegvizes oldatot használjunk. Szappannal együtt ne alkalmazzuk! Ügyeljük, hogy ne jusson a szembe.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére bőrgyógyászati és nőgyógyászati szakrendelések szabadon rendelhetik. Gyermekszakrendelések körzeti gyermekorvosok pemphigoid, pyoderma esetében rendelhetik, a vényen a kórisme feltüntetésével. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak bőrgyógyászati, nőgyógyászati szakrendelés javaslatára rendelhetik, illetőleg csak abban az esetben, ha más — szabadon rendelhető — gyógyszer alkalmazása nem megfelelő.
A vényen a kórismét fel kell tüntetni. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg b. (100 ml) 27,70 Ft, 1 üveg (250 ml) 63,80 Ft, 1 üveg (1000 ml) 241,50 Ft.

STIGMOSAN Ch. IX.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,5 mg neostigmin. methylsulf.-ot,
1 tabl. 15 mg neostigmin. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Krónikus obstipatio, myasthenia gravis, bulbaris és pseudobulbaris bénulás, dystrophia

musc. progressiva, lateralsclerosis amyotroph., postpunctiós fejfájás, postoperativ gyomor-bél atonia, ureter-retentio, ureter-kövek, pyelographia, cholecystographia előkészítése, Menière-syndroma.

Adagolás: Naponta 1—2—3 amp. i. musc., s. cut., szükség esetében prompt hatás elérésére igen lassan i. ven., illetőleg naponta 3-szor 1 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 5×1 ml 14,30 Ft, 50×1 ml 87,90 Ft, 20 tabl. 19,40 Ft.

STREPTOMYCIN E.Gy.T. XLVII.
inj. 1 g

Összetétel: 1 gumisapkás amp. I. 1 g streptomyc. (streptomyc. sulf. alakjában), 1 amp. II. 5 ml aqu. dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallat: Abszolút indikációja a gümőkóros megbetegedések különböző formái. Nem gümőkóros megbetegedésekben a streptomycinnek abszolút javallata nincs; relatív indikációit a mindenkori érzékenységi vizsgálat eredménye határozza meg.

Ellenjavallat: Halláskárosodás és ilyenre utaló családi anamnesis; *localis* fülészeti alkalmazás minden esete!

Adagolás: *Felnőtteknek:* intramuscularisan a napi adag általában 0,5—1 g, maximálisan 2 g. Az egyszeri adag lehetőleg ne haladja meg a 0,5 g-ot. Az injekciókat célszerű mélyen az izomba adni és az injiciálás helyét váltogatni.
Intralumbalisan a napi adag összesen 25—50 mg, max. 1 mg testsúlykg-onként;
Gyermekeknek: Átlagos napi adagja 20 mg/testsúlykg, napi 2 részletben i. musc. adva; a napi adag ne haladja meg a 0,5 g-ot. Tbc-s gyermekek kezelésére max. 30—50 g összmennyiség használható!

Mellékhatás: Láz, bőr-eruptio, a VIII. agyideg bántalmazottságára utaló tünetek, úm. vertigo, tinnitus, hallási zavarok és süketség, továbbá paraesthesia az arcon, valamint renalis irritatio jelei. A bőr-reactio antihistaminokkal általában rendezhető. Huzamosabb adagolás esetén elsősorban a VIII. agyideg vestibularis plexusát károsítja, ezért időnként — a kezelés tartama alatt — calori- és audiometriás vizsgálat elvégzése javallt.
Fehérje, hámsejtek és cylinderek megjelenése a vizeletben vesekárosodásra utal. A vesekárosodás megelőzésére hasznosnak látszik az alkalizálás.
Nagy adagok folyamatos alkalmazása után kifejlődő resistentia egyéb antituberculoticum kombinált alkalmazásával késleltethető.
Figyelmeztetés: Koraszülötteknek és 2 éven aluliaknak csak különös óvatossággal adható — lehetőleg intézetben. 40 éven felüli korban az ototoxicitás súlyosabb. A hallásromlást fülzúgás előzheti meg; a másik figyelmeztető jel a felső hanghatár beszűkülése. Egyéb ototoxikus gyógyszerrel együtt adva alkalmazásánál különös körültekintés szükséges.
Vesekárosodottaknak, az elnyújtott kiválasztás miatt, ritkábban és kisebb adagokban célszerű adni. I. ven. nem adható! — Lehetőleg frissen készült oldatot kell használni; hűtőszekrényben 3 napig tartható el oldott állapotban.

Megjegyzés: ✠ Elsősorban gyógyintézetben történő kezelésre szolgál! Gyógyintézeten kívül történő kezelésre csak kivételesen szigorúan javallt esetben: a betegség tüneteinek, a beteg állapotának körültekintő, alapos megfontolásával rendelhető, ha az antibiogramm streptomycinre határozott érzékenységet mutat vagy ha egyéb chemotherapeuticum nem vezetett vagy előreláthatólag nem vezetne megfelelően eredményre.
Társadalombiztosítás terhére a vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani. A rendelés indokolását, a kórismét a vényen fel kell tüntetni! — Körzeti gyermekszakorvosi ellátásba tartozó gyermekek részére csak szakrendelés vagy körzeti gyermekszakorvos rendelheti. — Lejárati idő: 1½ év.

Csomagolás: I. 1×1 g + II. 1×5 ml amp. 30,20 Ft, I. 50×1 g + II. 50×5 ml amp. 1449,10 Ft.

K-STROPHANTOMUSC K.Gy. XIV.
inj. 0,25 mg

Összetétel: 1 ampulla (1 ml) 0,25 mg K-strophantosid., 10 mg lidocain. hydrochlor.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban.

Javallatok: A K-Strophantomusc általában minden olyan esetben alkalmazható, amelyben a keringés gyors javítására van szükség és intravenás K-Strophantosid injekció alkalmazására nincs lehetőség. Cardialis decompensatio, coronaria-sclerosis, súlyos fertőző betegségek során kialakuló keringési elégtelenség, műtét, szülés előkészítése szívbetegeken, fenyegető decompensatio. Akut esetekben (asthma cardiale, tüdő-oedema) azonnali hatás szüksége esetén az intravénásan adható K-Strophantosid injekció ajánlatos.

Adagolás: A K-Strophantomusc kizárólag musculárisan alkalmazható. Alsó adagként általában ½—1 ampullát adnak mélyen a farizomzatba; szükség esetén ez az adag 4-óránként megismételhető. A K-Strophantomusc-kúrát több napon, esetleg néhány héten át lehet folytatni. — Ha a beteg előzetesen digitalist kapott, tanácsos 1—2 napig várni a K-Strophantomusc alkalmazásával. Életveszély esetén kis adagot ilyen esetben is lehet adni, igen óvatosan.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 9,20 Ft, 50×1 ml amp. 66,40 Ft.

K-STROPHANTOSID K.Gy. XIV.
inj. 0,25 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,25 mg K-Strophantosid.-ot tartalmaz szeszes-vizes oldatban.

Javallatok: Cardialis decompensatio, coronaria-sclerosis, asthma cardiale, tüdő-oedema, paroxysmalis tachycardia, súlyos fertőző betegségek. Súlyos műtétek előtt. Általában minden olyan esetben, amikor a keringés gyors javítása szükséges.

Adagolás: Első adagként rendszerint gyors hatás elérésére 0,125—0,25 mg (½—1 amp.) K-Strophantosid adása ajánlatos, mindenkor lassan, i. ven. Szükség szerint ez az adag megismételhető. Második napon szükség esetén az adagot 2×0,25 mg-ra (2 amp.) lehet emelni. A K-Strophantosid-kúrát több napon, esetleg néhány héten át folytatjuk, az esetek súlyossága szerint. — Műtét előtt naponta 0,125—0,25 mg (½—1 amp.) adható néhány napon át, ugyancsak lassan, i. ven. — Csecsemőknek és kisgyermekeknek 0,05—0,1 mg (0,2—0,4 ml), nagyobb gyermekeknek 0,1—0,15 mg (0,4—0,6 ml) adható i. ven. naponta 1—2-szer.
Ha a beteg előzetesen digitalist kapott, 1—2 napig várni kell a K-Strophantosid injekció adásával. Életveszély esetén természetesen egész kis adagot, 0,1 mg-ot, azonnal is lehet adni, sőt szükség esetén ezt meg is lehet ismételni. Célszerű K-Strophantosid injekciót beadáskor a fecskendőbe visszahúzott vérrel vagy fiziológiás konyhasóoldattal hígítani.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×1 ml 9,20 Ft, 50×1 ml 66,40 Ft.

STRYCHNINUM NITRICUM Ch. VII.
inj. 0,1% és 0,2%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg, ill. 2 mg strychn. nitric.-ot tartalmaz.

Javallatok: Kimerültségi állapotokban, reconvalescentiában mint általános tonizáló szer. A mozgató beidegzés bénulása (Heine—Medin-kór), enuresis noct., analepticumként kábítószer-mérgezések esetén és fertőző betegségek következtében fenyegető collapsusban.

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 amp. Bénulások kezelésére fokozatosan emelkedő adagolásban.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10×1 ml 0,1% 9,70 Ft,
b. 10×1 ml 0,2 % 9,70 Ft.

STRYCHNOTONIN Ch. XXX.
inj., drazsé

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 50 mg natr. methylarson., 1 mg strychnin. hydrochlor.-ot,
1 drazsé 3 mg calc. methylarson., 0,5 mg strychn. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Neurasthenia, hysteria, chorea, tabes, traumás neurosis, gyomor-, bél-atonia, reconvalescentia, impotentia, sphincter-gyengeség, neuritis motorica, alcoholismus, depressiók, idős egyének pneumoniája, látásélesség fokozása.

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1 amp. s. cut. Naponta 3×1—2 drazsé.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10×1 ml amp. 8,50 Ft, 100×1 ml amp. 85,— Ft,
75 drazsé 5,— Ft.

SUDEOL B. XLIV.
old.

Összetétel: 1 üveg (50 g oldat) 1,5 g acid. salicyl., 2,5 g camphor., 10,0 g resorcin., 11,25 g urethan.-ot tartalmaz vizes oldatban.

Javallat: Kóros izzadás.

Adagolás: Külsőleg.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. 50 g orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 1 üveg (50 g) 15,— Ft.

SULFAGUANIDIN A. XLVII.
tabl. 0,5 g

Összetétel: 1 tabl. 0,50 g sulfaguanidinum.-ot tartalmaz.

Javallatok: Bacillaris dysenteria, enteritis, enterocolitis; typhus-, paratyphus-gazdák kezelésére, vastagbélműtéteket követő bélfertőzések meggátlására.

Adagolás: Csecsemők és gyermekek egész napi adagja 0,30—0,40 g testsúlykg-onként, 6 adagra osztva. Felnőtteknek 3—4-szer 4—8 tabl. 1—2 napon át megszakítás nélkül.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 5,60 Ft, b. 200 tabl. 112,— Ft.

SUPERSEPTYL Ch.—A. XLVII.
inj. 2 ml és 5 ml, tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 0,4 g, 1 amp. (5 ml) 1 g sulfadimidin. natr.-ot tartalmaz.
1 tabl. 0,5 g sulfadimidin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Strepto-, staphylo-, pneumo-, meningo- és gonococcus által okozott fertőzések, légúti fertőzések, a húgyutak coli-fertőzése, dysenteria, cholecystitis, sepsis stb. esetében egymagában, vagy szükségszerűen antibioticumokkal együtt adagolva.

Adagolás: *Inj.:* Átlagos adagja *felnőtteknek* naponta 5—10 ml, *kisgyermekeknek* 0,5—1,5 ml, *2—8 évesnek* 2 ml, *8—10 évesnek* 3—4 ml *kizárólag intravenásan, lassan* befecskendezve. Szükség esetén a fenti adagok még aznap megismételhetők. Egyéni túlérzékenység esetében a további adagolást azonnal beszüntetjük. — *Tabl.:* Átlagos adagja *felnőtteknek* 1—3 g (2—6 tabl.) pro dosi, 3—12 g (6—24 tabl.) pro die. Dysenteriában az első 3 napon át 3×2 tabl., a negyedik naptól 3×1 tabl. 24 tabl. elfogyasztása után szünetet tartunk. *Gyermekeknek* 0,1—0,5 g/kg a kezdő adag, majd határánként ennek negyedrészét adjuk két napon át étkezés után. Súlyos fertőzésben a láz megszűnése után még 2—3 napig adjuk.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×2 ml 13,10 Ft, b. 50×2 ml 131,— Ft,
b. 5×5 ml 22,70 Ft, b. 50×5 ml 227,— Ft,
b. 24 tabl. 13,50 Ft.

SUPRACHOL K.Gy. XXII.

drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g acid. dehydrochol.-ot tartalmaz.

Javallatok: A máj, epe és epeutak megbetegedései, (máj-cirrhosis, cholangitis, icterus simplex, cholecystitis, cholelithiasis, cholecystectomiák utáni panaszok). Mint diureticum-adjuvans cardialis oedemában, ascitesben. Az ideg- és elmegyógyászatban migraine, melancholia, depressio esetén.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 12,50 Ft.

SUPRASTIN E.Gy.T. XXXVIII.

inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,02 g chloropyramin. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 0,025 g chloropyramin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Allergiás kötőhártya-gyulladás, rhinitis vasomotorica, szénaláz, urticaria, Quincke-oedema, szérumbetegség, gyógyszer-exanthema, asthma bronchiale, allergiás bőrgyulladás, ekzema.

Adagolás: Naponta 3—4-szer 1, esetleg 2 tabletta étkezés közben vagy naponta 1—2 ampulla i. musc. Anaphylaxiás shockban, heveny és súlyos esetekben ajánlatos a kezelést óvatos i. ven. adagolással bevezetni, egyébként intramuscularisan végezni.
Gyermekadagok: 1—12 hónapos korig 2—3-szor naponta ¼ tabl., 1—6 éves korig 2—3-szor naponta ⅓ tabl., 7—14 éves korig 2—3-szor naponta ½ tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 15,40 Ft,
5×1 ml amp. 21,50 Ft, 50×1 ml amp. 181,60 Ft.

SYMPATHOMIM E.Gy.T. XV.

inj., csepp

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,06 g sympaetham. tart. neutrumot,
1 üveg (10 ml) 1 g sympaetham. tart. neutrumot tartalmaz 10 ml szeszes-vizes oldatban.
1 üveg (25 ml) 2,5-szeres hatóanyag-mennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Fertőzéses megbetegedések, elsősorban influenza, diphtheria, tb. pulm., pneumonia, reconvalescentia esetén a collapsus megelőzésére és kezelésére; műtétek előtt és után, cardiotonicumok hatásának támogatására.

Adagolás: Szükség esetén naponta 1—3-szor 1—2 amp. i. ven., i. musc. vagy s. cut. Naponta 3-szor 10—20 csepp. Infúziós oldathoz is hozzáadható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 16,50 Ft,
b. 1 üveg (10 ml) 18,40 Ft, b. 1 üveg (25 ml) 46,— Ft.

SYNAPLEG E.Gy.T. XVI.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg pempidinum tart.-ot tartalmaz.

Javallatok: Essentialis és malignus hypertensio mindazon esetei, ahol közepes vagy hosszabb hatású ganglion-bénítóra van szükség.

Adagolás: Az egyéni érzékenység figyelembevételével, betegenként kell a kezelést beállítani. A kezelést kis adagokkal kezdjük (8 óránként 2,5 mg-mal). A be-

állítás alatt a vérnyomást naponta többször mérjük a beteg álló helyzetében. Az adagokat az elért vérnyomáscsökkenéstől függően először az egyszeri adagok sűrítésével, később pedig az egyszeri adagnak 2,5 mg-mal történő emelésével növeljük. Klinikai tapasztalatok szerint a napi therapiás adag 10—80 mg között váltakozik 4—5-szöri elosztásban. — A Synapleg Rausedyllel, Chlorurittal és Hypothiaziddal együttesen is alkalmazható, de ebben az esetben az adagok megállapításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az említett vegyületek potenciálják a Synapleg hatását. — Mellékhatásként orthostatikus collapsus, székrekedés, gyomor- és bél-atonia jelentkezhet.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 7,80 Ft.

SYNCUMAR E.Gy.T. XVIII. tabl.

Összetétel: 1 tabletta 2 mg acenocoumarol.-ot tartalmaz.

Javallatok:

Megelőzésre:

a) rövid ideig tartó
nagyobb sebészeti beavatkozás és műtétes szülés után általában az 5—6. naptól kezdve.

b) hosszú ideig tartó
rheumás szívbetegségek (kivéve endocarditis lenta acut bacterialis endocarditis esetét), stenosis ost. ven. sin., súlyos és halmozott angina pectoris (thrombosis prophylaxisaképpen), myocardialis infarctus (coronaria-thrombosis) után, arteriás keringési zavar, idiopathiás familiaris thrombosis-hajlam, embolia-hajlam esetén. Ha a felsorolt szívelváltozások pitvari fibrillatióval társulnak, a prophylaxis különösen javallt.

Therápiás alkalmazásra:
thrombophlebitis, phlebothrombosis, arteriás thrombosis, emboliák esetén.

Ellenjavallatok: Haemorrhagiás diathesis, haematologiai rendszerbetegségek, veseelégtelenség, súlyos

májártalom, extrem hypertensio (200 Hgmm-en felül), endocarditis lenta, acut bacterialis endocarditis, lactatio, graviditas (abortus után — 8 nappal — és menstruatio alatt adható), gyomor- és bélrendszer fekélyei és rosszindulatú daganatai, tüdő és húgyutak rosszindulatú daganatai, retinopathiával járó diabetes, alkohol-abusus, táplálkozási zavarok, K- és C-vitamin-hiány, agy- és gerincvelő-műtét utáni állapot, cachexia és a laboratóriumi ellenőrzés lehetőségének, vagy a beteg együttműködésének hiánya.

Adagolás: A kezelés megindítása előtt a májfunkció és vizeletüledék vizsgálata, a prothrombin-aktivitás és a vércsoport meghatározása, valamint — ha idő van rá — a széklet Weber-vizsgálata szükséges. Az adagolás mindig *individuális*. A napi adagot lehetőleg egyszerre, azonos időben (pl. 14 órakor) kell bevenni. Első napi adagja 4—8 tabl. (8—16 mg). A továbbiakban a prothrombin-aktivitás mértékétől függően kell az adagot csökkenteni, míg el nem érjük az optimális 20—30% körüli prothrombin-aktivitást *Quick egyszakaszos módszerével, plazmahígításos eljárással értékelve.* Fenntartó adagja általában ½—3 tabl./die. A prothrombin-aktivitást 20% alá lehetőleg ne csökkentsük. Kórházban az optimális prothrombin-aktivitás eléréséig naponta, majd másodnaponta és végül, ha az nagyobb ingadozást nem mutat, hetenként végezzük a vizsgálatot. Vizeletüledék-vizsgálat kezdetben naponta, később hetenként egy-kétszer szükséges (microhaematuria!).
Hosszan tartó kezelés esetén, nagyobb ingadozás nélküli prothrombin-aktivitás *kórházi beállítása után, együttműködésre alkalmas járóbetegeken* általában elegendő a prothrombin-aktivitást havonta, a vizeletüledék vizsgálatát hetenként elvégezni. A betegeket fel kell világosítani, hogy a közbejött legenyhébb betegség (elsősorban hasmenés, láz), új gyógyszerek szedése vagy a régiek elhagyása a Syncumar-adagot módosíthatja, s így gondos laboratóriumi kontrollt igényel. A salicylatok és derivátumaik, purin-testek, higanyos diureticumok, phenothiazin származékok, nagymennyiségű alkohol, antibioticumok, sulfonamidok (tolbutamid is), phenylbutazon és diphenylhydantoin egyidejű alkal-

mazása valamivel kisebb, digitalis, strophantosid, barbiturat, griseofulvin, meprobamat és glutethimid adása kissé nagyobb Syncumar-adagot tesz szükségessé. Természetesen ezen szerek elhagyása fordított irányú Syncumar-dosis-változást igényel. Az előző kölcsönhatásokra más gyógyszerek adagolásakor is gondolni kell: pl. tolbutamiddal kezelt betegen hypoglykaemia, diphenylhidantoin-therapiánál intoxicatio lehetősége fordulhat elő a Syncumar alkalmazásakor.
Az ACTH- és cortison-készítmények általában antagonista tulajdonságot mutatnak az anticoagulansokkal, de mivel gyomor-, nyombélfekélyt aktiválhatnak, közvetett úton okozhatnak vérzést.

Mellékhatás: Kisfokú vérzés esetén általában elegendő az adagot átmenetileg csökkenteni vagy egy-két napon át kihagyni. Súlyosabb vérzés esetén, amely az előírt rendszabályok mellett (prothrombin-aktivitás és vizeletüledék rendszeres ellenőrzése) alig fordul elő, a kezelés beszüntetése, esetleg friss vér transfusiója és i. ven. K_1-vitamin adása szükséges.

Megjegyzés: ✠ Rendelése előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét (belső vérzések)! — Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.
A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.

Csomagolás: 50 tabl. 10,— Ft.

SYNTESTRIN K.Gy. XXXIV.
drazsé, olajos inj. 1 és 5 mg

Összetétel: 1 drazsé 1 mg diaethylstilboestrol. diprop.-ot,
1 amp. (1 ml) 1, ill. 5 mg diaethylstilboestrol. diprop., 0,1 ml alcohol benzylic., ol. pro injec. ad 1 ml tartalmaz.

Javallatok: A petefészek csökkent vagy hiányzó működéséből eredő genitalis megbetegedések (amenorrhoea, climaxos panaszok) és extragenitalis megbetegedések, bőr-, szem-, ízületi, idegbetegségek. Prostata-hypertrophia, prostata-rák, ulcus ventriculi et duodeni, penis-plasztikai műtétek (erectio-gátlás).

Adagolás: Általában naponta vagy másodnaponként 1 ampulla i. musc., ill. naponta 1—3 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 5 év.

Csomagolás: 20 drazsé 4,50 Ft, 100 drazsé 11,20 Ft,
b. 5×1 ml amp. 1 mg 8,40 Ft, b. 50×1 ml amp. 1 mg 84,— Ft,
5×1 ml amp. 5 mg 9,50 Ft, b. 50×1 ml amp. 5 mg 95,— Ft.

SZALICILSAVAS kaucsuktapasz 40% B. XLIV.

Összetétel: 40% acid. salicylic. tartalmú kaucsuktapasz 1,5—2,0 g 100 cm^2-enként.

Javallatok: Tylosis, clavus.

Adagolás: A védőgéz eltávolítása után megfelelő nagyságú darabot felragasztani.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 6 m×9 cm 1,50 Ft, 1 m×18 cm 19,40 Ft.

TANNOCARBON E.Gy.T. XL.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,12 g carbo activ., 0,12 g alb. tann.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hasmenés, mérgezés és fertőzéses gyomor- és bélbántalmak.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—3 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 50 tabl. 6,70 Ft.

TARDYL E.Gy.T. II.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,0075 g promethazin. hydrochlor., 0,125 g glutethimidum, 0,125 g amobarbital.-ot tartalmaz. (Az amobarbital bélben oldódó granulatumban.)

Javallatok: Elalvási zavarok, korai ébredés és átalvási panaszok, továbbá nyugtatásra.

Adagolás: *Elalvási zavarok* esetében 1—2 tabletta egy órával a lefekvés előtt. — *Korai ébredés és átalvási panaszoknál* lefekvés előtt 1—2 tabletta. — *Nyugtatásra fekvő betegnél* reggel és délben 1—1, lefekvés előtt 1—2 tabletta. — Tartós altatás céljára kezdő adagként két-, majd határánként 1—1 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 20 tabl. 19,70 Ft, 100 tabl. 76,50 Ft.

TAXIN E.Gy.T. XXIV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 10 mg phenlaxinumot-ot tartalmaz.

Javallat: Hashajtó.

Adagolás: ½—2 tabl. este, lefekvés előtt.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 10 tabl. 2,— Ft.

TEBAMINAL Ch. XLVII.
bélben oldódó drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,3 g acid. *p*-aminosal.-ot tartalmaz.

Javallatok: A tuberculosis minden — pulmonalis és extrapulmonalis — formája. Egyéb antituberculoticumokkal (Isonicid, Streptomycin) kombináltan adagolva, a resistentia kialakulásának idejét — az említett gyógyszerekkel szemben — lényegesen késleltetni.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek: naponta 30—40 drazsé (9—12 g) étkezés után. Amennyiben a beteg ennél többet (legalább napi 14 g-ot, kb. 50 drazsé) be tud venni, ez az antituberculotikus hatást lényegesen fokozza.
Gyermekek átlagos napi adagja: 6—9 éves korban 10—20 drazsé (3—6 g), 9—12 éves korban 20—30 drazsé (6—9 g). A legkedvezőbb therapiás hatás úgy érhető el, ha a beteg a napi adagot 3—4-szerre elosztva veszi be.
Egyéb antituberculoticummal együttesen adagolva is a teljes therapiás adagot kell alkalmazni.

Megjegyzés: Orvosi vényen bélben oldódó Tebaminal drazsé nem rendelhető. A járóbetegek Tebaminallal történő kezelését az illetékes TBC-gondozó intézet végzi. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 250 drazsé 47,— Ft.

TEBAMINAL-NATRIUM Ch. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,413 natr. *p*-aminosalic.-ot tartalmaz.

Javallatok: A tuberculosis minden — pulmonalis és extrapulmonalis — formája.

Adagolás: Ha a beteg állapota különleges elbírálást nem igényel, naponta és testúlykg-onként 0,2 g *p*-aminosalicylsavnak megfelelő mennyiséget kapjon, ami pl. egy 60 kg-os átlagsúlyú beteg esetében 40 tabl. Ajánlatos a napi adagot 3—4 órás időközökben egyenletes részekre elosztva bevetetni. Izonikotinsavhidrazid-készítménnyel, vagy streptomycinnel adagolva is teljes therapiás adagot kell alkalmazni a resistentia veszélye miatt.

Megjegyzések: Orvosi vényen Tebaminal-Natrium nem rendelhető. A járóbetegek Tebaminallal történő kezelését az illetékes TBC-gondozó intézet végzi. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 500 tabl. 93,80 Ft, 2500 tabl. 421,— Ft.

TEBAMINAL-NATRIUM Ch. XLVII.
intravénás infúziós oldat készítéséhez

Összetétel: 1 üveg 24 g natr. *p*-aminosalic.-ot tartalmaz.

Javallat: A tuberculosis minden — pulmonalis és extrapulmonalis — formája. Tuberculosis miatt végzett mellkassebészeti beavatkozások előtt és után. — Isonicid- vagy Streptomycin-resistentia, vagy amikor túlérzékenység miatt az említett gyógyszerek nagyobb mennyiségben nem alkalmazhatók, továbbá az oralisan adott Tebaminal-Natrium csökkent tűrőképessége.

Adagolás: Az infúziós oldat elkészítése szobahőmérsékleten, minden esetben steril, pyrogen-mentes injekcióhoz való desztillált vízzel történjék. 500 ml desztillált víz hozzáadásával 4,8%-os Tebaminal-Natrium infúziós oldatot kapunk. Az intravenás cseppinfúziós oldat átlagos adagja általában heti 3—5×500 ml. Jó tűrőképesség esetén az oldatot igen lassan a cubitalis venába infundáljuk olyan percenkénti cseppszámmal (kb. 35—40 csepp), hogy az 500 ml oldat infundálása legalább 4 órán át tartson. Az oldat beáramlásának egyenletességét — az infúzió egész tartama alatt — állandóan ellenőrizzük!
Az oldat elkészítésénél az aseptikus körülményekre szigorúan ügyelni kell. Jó tűrőképesség esetén a kész oldatot haladéktalanul fel kell használni.

Megjegyzések: Orvosi vényen nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 24 g por üvegben 55,80 Ft.

TENSATRIN K.Gy. XVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 mg protoveratrin A- és B-t tartalmaz.

Javallatok: Centralis és neurogen eredetű hypertonia, peripheriás érbántalmak, Raynaud-kór, thromboangiitis obliterans, claudicatio intermittens. Terhességi toxicosis, eclampsia és rohamszerű agyi tünetekkel járó vérnyomásemelkedés.

Ellenjavallatok: Súlyos arteriosclerosis, agyi és coronaria-sclerosis, agyvérzés és agy-thrombosis utáni állapot, súlyosabb vesekomplikációk, uraemiás tünetek. Digitalis vagy strophantin adásával együtt ugyanazon a napon nem adható. Ellenjavallt továbbá nagyobb fokú bradycardiában.

Adagolás: Egyéni. Beállítása inkább intézetben történjék. Ajánlható napi adag szükség szerint 4—6—8 tabletta kúraszerű adagolásban. A szer mindig étkezés után, esetleg néhány darab keksz fogyasztása után veendő be. 2 tabletta egyszerre is adható, de inkább a kora reggeli órákban és este, amikor a beteg otthon tartózkodik, vagy ágyban fekszik. Érzékeny gyomrú egyéneknél célszerű az adagolást időközönként, néhány napra szüneteltetni, majd fenntartó adagolással folytatni a kúrát.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 25 tabl. 6,30 Ft, 250 tabl. 24,30 Ft.

TETRACAIN B. VIII.
tabl. 100 mg

Összetétel: 1 tabl. 0,1 tetracain. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallat: Felületi érzéstelenítés.

Adagolás: *Orr-gége:* 1—2%-os vizes oldatból ecsetelésre vagy sprayben; legfeljebb 4, ill. 2 ml használható egyszerre. *Szemészet:* ¼—1%-os vizes oldat, 0,2%-os kenőcs. *Urológia:* 0,1—2%-os vizes oldat. Csak adrenalinnal együtt használható, ezért 100 ml oldathoz 10—15 csepp Tonogen-oldatot adunk. A kék színű tablettákból készült oldatot *befecskendezni nem szabad.* A készítményhez részletes használati utasítás van mellékelve.

Megjegyzés: ✠✠ Szakrendelések a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be.

Csomagolás: 10 tabl. 14,30 Ft.

TETRACOR Ch. XIII.
inj., cseppek

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g pentetrazol.-ot,
1 üveg (25, ill. 100 g) 2,5, ill. 10 g pentetrazol.-ot tartalmaz.

Javallatok: Collapsus, toxikus vérnyomásesés, hypotonia, narkózis szívszövődményei, digitáliszkúra alátámasztására, altatószermérgezés, fenyegető légzésbénulás, bronchopneumonia, schizophrenia és depressiók görcskezelése, nitritoid crisis.

Adagolás: Naponta 2—4-szer 10—20 csepp, 1 amp. s. cut., szükség esetén i. musc., i ven., lassan.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 9,10 Ft, b. 50×1 ml amp. 91,— Ft,
b. 1 üveg (25 g) 14,— Ft.

TETRACOR-EPHERIT Ch. XIII.
inj., csepp

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 100 mg pentetrazol., 15 mg *dl*-ephedr. hydrochlor.-ot,
1 üveg (10 g) 1 g pentetrazol., 0,15 g *dl*-ephedr. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Asthma bronchiale, emphysema, tüdő-tbc, altatószermérgezés, collapsus, műtéti shock, szív-block.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 2—4-szer 10—20 csepp vagy naponta 2—3-szor 1 amp. subcut.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (10 g) 8,60 Ft,
b. 5×1 ml amp. 9,10 Ft.

TETRACOR-NEOCOD Ch. XIII.
csepp

Összetétel: 1 üveg (10 ml) 1,0 g pentetrazol., 0,1 g hydrocod. bitart.-ot tartalmaz.

Javallatok: Bronchopneumonia, akut bronchitis, asthma bronchiale, pertussis, tracheobronchialis adenopathia, stenocardia, mellkasi műtétek utáni ingerköhögés, tbc.

Adagolás: Naponta 3-szor 10—20 csepp. Gyermekeknek naponta 2—3-szor 5 csepp.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 üveg (10 ml) 12,40 Ft.

TETRAN B Ch. XLVII.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 270 mg oxytetracyclin., 1,5 mg thiamin. hydrochlor., 2,5 mg riboflavin., 0,5 mg pyridoxin. hydrochlor., 25 mg nicotinamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Penicillin-resistens coccus-fertőzések, primaer atypusos (vírus-) pneumonia, pertussis, anthrax, actinomycosis, typhus exanthematicus, a húgyutak coli-fertőzése, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, brucellosis, tularaemia. — *Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségeit és kockázatát (resistens törzsek keletkezése, mycosis-veszély)!*

Adagolás: Felnőtteknek naponta 8 drazsé, 6 óránként adott egyenlő részletekben. Az adagolást általában a leláztalanodást követő 48 órán át is ajánlatos folytatni. Gyermekgyógyászati célra Tetrinfan port alkalmazunk. Egyébként a Tetran-B drazsé gyermekadagja napi 20—40 mg/kg.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha egyéb antibioticum alkalmazása nem járt megfelelő eredménnyel, illetőleg a kitenyésztett kórokozó határozott oxytetracyclin-érzékenységet mutat. *A vényt két példány-*

ban („másolat"-tal) kell kiállítani. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: b. 16 drazsé 70,40 Ft, b. 100 drazsé 440,— Ft.

TETRAN Ch. XLVII.
intravenás inj.

Összetétel: 1 üveg 250 mg oxytetracycl. hydrochlor., 110 mg acid. ascorb.-ot tartalmaz, +1 amp. oldószer 10 ml.

Javallatok: Minden olyan fertőzés, amelyben a kórokozó oxytetracyclinre érzékeny s magas vérszint elérése a cél. — *Belgyógyászatban:* Atypusos (vírus-) pneumonia, bronchitis, pleura-empyema, septikus állapot, cholangitis, cholecystitis, bacterialis endocarditis, enteritis, meningitis, thrombophlebitis, actinomycosis, ornithosis, leptospirosis, anthrax, rickettsiosis. — *Sebészetben:* Nyílt sebek és sebfertőzések, gáz-gangraena, abscessus, phlegmone, peritonitis, osteomyelitis, továbbá fertőzésmegelőzés műtét előtt és után. — *Gyermekgyógyászatban:* Pertussis, Pfeiffer-féle mirigyláz. — *Urológiában:* Pyelonephritis, cystitis, urethritis, prostatitis. — *Nőgyógyászatban:* Adnexitis paramethritis, mastitis, lázas abortus. — *Bőrgyógyászatban:* Penicillin-resistens törzs okozta gonorrhoea, furunculosis, erysipelas, dermatitis herpetiformis, impetigo. — *Orr-, fül-, gégegyógyászatban:* Otitis media acuta, mastoiditis, otogen meningitis, sinusitis, tonsillaris és retropharingealis tályog, pharingitis. *Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét és kockázatát (resistens törzsek keletkezése, mycosis-veszély)!*

Ellenjavallatok: Extrém nagy adagokban ellenjavallt súlyos máj-laesióban, graviditasban.

Adagolás: Felnőtteknek általában naponta 2 amp. (à 250 mg). Ez az adag súlyos esetekben (septikus állapot) fokozható. — Esetleges allergiás tünetek felléptekor antihistamint kell adni. — A feloldott hatóanyag közvetlenül a venába fecskendezhető. Az intravenás befecskendezés időtartama 1 perc. Amennyiben a betegnek valamilyen okból infúziós oldatot kell adni, úgy a Tetran intravenás inj. oldatát az infúziós oldathoz is elegyíthetjük. Alkalmazható a készítmény intramuscularisan, intrapleuralisan, intraperitonealisan is. Intramuscularis alkalmazás esetén felnőtteknek is a 100 g hatóanyagot tartalmazó Tetranetta (inj. gyermekeknek) elnevezésű készítményt adagoljuk megfelelő mennyiségben. Fájdalomra érzékeny betegeknél a 100 mg hatóanyagot a mellékelt oldószer helyett 5 ml 0,5—1%-os Lidocain oldatban oldjuk fel. — A porampullát hűvös helyen kell tárolni. A szobahőmérsékleten tartott kész oldatot fél órán belül, a hűtőszekrényben tárolt-tat pedig 24 órán belül használjuk fel.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha egyéb antibiotikum alkalmazása nem járt megfelelő eredménnyel, illetőleg a kitenyésztett kórokozó határozott oxytetracyclin-érzékenységet mutat. *A vényt 2 példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 3×250 mg és 3×10 ml oldószer 38,50 Ft; 25×250 mg és 25×10 ml oldószer 277,— Ft.

TETRAN Ch. XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus 50 mg oxytetracyclin. hydrochlor.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben. 1 tubus (15 g) háromszoros hatóanyag-mennyiséget tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Impetigo contagiosa, folliculitis barbae, coccogen ekzema és dyshidrosis, ecthyma, másodlagosan fertőzött ekzema, ulcus cruris, égés utáni pyodermiák.

Alkalmazás: A fertőzött terület megtisztítása, a pörkös felrakódások és a folyamatot borító hámfedél eltávolítása után gézlapos kötés, amely szükség szerint naponta 1—2-szer váltandó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 4,90 Ft, 1 tubus (15 g) 11,— Ft.

TETRAN Ch. sebhintőpor XLVI.

Összetétel: 1 szóródoboz 0,5 g oxytetracyclin., 0,5 g methyl-para-oxybenz., 9 g lactos.-ot tartalmaz 10 g sebhintőporban.

Javallat: Mindazon kórokozók által okozott elhatárolt sebfertőzések esetében, amely kórokozók ellen az oxytetracyclin az általános kezelésben is hatásos.

Alkalmazás: Külsőleg. (Naponta-kétnaponta végzett kezelés után a váladék rendszerint gyorsan sterillé válik.)

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Lejárati idő: 2 év

Csomagolás: 10 g 15,40 Ft, 75 g 89,— Ft.

TETRAN Ch. szemkenőcs XLV.

Összetétel: 1 tubus 50 mg oxytetracyclin. hydrochlor.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben.

Javallat: Trachoma, azonkívül follicularis conjunctivitis, fertőzéses eredetű conjunctivitis és blepharitis, pyoderma, ekzema impetiginosum, folliculitis palpebrarum.

Adagolás: Trachomában naponta 3—5-ször, egyéb esetekben naponta 1—3-szor felkenünk borsónyi kenőcsöt a kezelendő felületre.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 tubus (5 g) 5,80 Ft.

TETRAN-HYDROCORTISON Ch. kenőcs XLIV.

Összetétel: 1 tubus 50 mg hydrocortison. acet., 150 mg oxytetracyclin. hydrochlor.-ot tartalmaz 5 g vazelin típusú kenőcsben.

1 tubus (15 g) háromszoros mennyiségeket tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Irritált impetigo contagiosa, coccogen ekzema, folliculitis barbae, ecthyma, másodlagosan fertőzött ekzema, túlgranuláló ulcus cruris.

Alkalmazás: A fertőzött terület megtisztítása, a pörkös felrakódások és a folyamatot borító hámfedél eltávolítása után gézlapos kötés, mely szükség szerint naponta 1—2-szer váltandó.

Ellenjavallat: Minthogy a hydrocortison a sarjadzást gátolja, renyhén granuláló folyamatra hosszabb ideig nem alkalmazható.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosító terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelések (fekvőbeteggyógyintézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meghatározott időtartamú gyógykezelésre. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 tubus 5 g 23,— Ft, 1 tubus 15 g 59,— Ft.

TETRANETTA Ch. intravenás inj. XLVII.

(régi neve: Tetran intraven. inj. gyermekeknek)

Összetétel: 1 üveg 100 mg oxytetracycl. hydrochlor., 43 mg acid. ascorb.-ot tartalmaz + 1 amp. oldószer 5 ml.

Javallatok: Lásd Tetran intravenás inj.

Ellenjavallatok: Lásd Tetran intravenás inj.

Adagolás: Gyermekeknek általában naponta 1 amp. Ez az adag súlyos esetekben (septikus állapot) fokozható. — Csecsemőknek és kisgyermekeknek 3 éves korig napi 1 ampullánál többet ne adagoljunk. — Esetleges allergiás tünetek fellépteknek antihistamint adunk. (Továbbiakban lásd Tetran intravenás inj.-nál).

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha egyéb antibioticum

alkalmazása nem járt megfelelő eredménnyel, illetőleg a kitenyésztett kórokozó határozott oxytetracyclin-érzékenységre mutat. *A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 3×100 mg és 3×5 ml oldószer 27,70 Ft, 25×100 mg és 25×5 ml oldószer 200,— Ft.

TETRINFAN Ch. XLVII.
por

Összetétel: 20 g por 2 g oxytetracyclin., 0,012 g thiamin. hydrochlor., 0,02 g riboflav., 0,004 g pyridox. hydr., 0,2 g nicotinamid.-ot tartalmaz.

Javallatok: Penicillin-resistens coccus-fertőzések, primaer atypusos (vírus-) pneumonia, pertussis, scarlat, anthrax, actinomycosis, typhus exanthematicus. A húgyutak coli-fertőzése, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale, brucellosis, valamint tularaemia. — Ritkán hasmenés, hányinger, viszketés, stomatitis jelentkezhet *mellékt ünetként*, ezek a tünetek a gyógyszer elhagyásával megszűnnek. A gyógyszer iránt érzékeny betegeknek ajánlatos a készítményt hideg tejben elkeverve adni.— *Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét és kockázatát (resistens törzsek keletkezése, mycosis-veszély)!*

Adagolás: Naponta 4-szer, határás időközben, 10 testsúlykg-onként 1—2 adagolókanállal (0,5 g-os) folyadékban elkeverve. Az adagolást általában a láz megszűnését követő 48 órán át ajánlatos folytatni.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak 12 éven aluli gyermekek részére rendelhető abban az esetben, ha egyéb antibioticum alkalmazása nem járt megfelelő eredménnyel, illetőleg a kitenyésztett kórokozó határozott oxytetracyclin-érzékenységet mutat. *A vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 20 g-os doboz 36,60 Ft.

THYREOIDEA K.Gy. XXXII.
drazsé III. 0,125 g

Összetétel: 1 drazsé 0,125 g thyreoid. sicc.-ot tartalmaz.

Javallatok: Aplasia et hypoplasia gl. thyreoideae, cretinismus, myxoedema, gyermekkori fejlődési zavarok, nephrotikus oedemák, adipositas.

Adagolás: 0,125—0,5 g thyreoidea p. die, kis adaggal kezdve, fokozatosan emelkedve. Állandó orvosi ellenőrzés szükséges (hyperthyreoidismus!).

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 4 év.

Csomagolás: 50 drazsé 6,70 Ft, 500 drazsé 33,90 Ft.

TIMIDON E.Gy.T. XXVII.
hüvelytabletta, zselé

Összetétel: 1 tabl. 6 mg cetylpyridinium brom., 190 mg acid. tartaric.-ot,
1 tubus zselé 0,2 g cetylpyridinium brom., 0,1 g acid. lactic., 0,1 g chinin. hydrochlor., 0,6 g acid. boric.-ot tartalmaz 50 g lemosható kenőcsben.

Javallat: Anticoncipiens.

Megjegyzés: Külsőleg. — Társadalombiztosítás és közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 15 tabl. 4,50 Ft;
1 tubus csővel 15,90 Ft, cső nélkül 7,50 Ft.

TISERCIN E.Gy.T. IV.
drazsé, inj.

Összetétel: 1 drazsé 25 mg levomepromazinum.-ot, 1 amp. (1 ml) 25 mg levomepromazinum.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Psychiatriában:* Psychomotoros agitatio és excitatio, confusiós állapot, schizophrenia, delírium, neurosis kezelésére — a depressiós fázisokban is —, továbbá tartós altatás céljára, valamint adjuvánsként epilepsia, oligophrenia, psychopathia kezelésében;

neurológiában: anxiosus, depressiós állapotokban; analgesia céljából önmagában, vagy egyéb analgeticum potentiálására;
anaesthesiológiában praemedicatióként és az anaesthesia potenciálására.

Adagolás: Áltálában per os, szükség szerint, főleg krónikus esetekben parenterálisan. A kezelést kis adaggal kell kezdeni, mely az egyéni tűrőképesség figyelembevételével fokozatosan emelhető. A javulás beállta után a kúra alatti adagolást az egyénenként változó fenntartó adagig kell csökkenteni. A kezelés kezdeti szakában, vagy az adag emelésekor, a gyógyszer adását követő 1—2 órát — míg az esetleges hypotensiós érzékenység tisztázódik — töltse fekve a beteg.

Tisercin tabletta átlagos adagolása

Alkalmazási területe	Napi kezdő adag (drazsé)	Napi kúraadag (drazsé)	Napi fenntartó adag (drazsé)
Psychosis kezelése	1—2	6—10 12—16*	egyénileg állítandó be!
Neurosis kezelése	½—1	3—4	egyénileg állítandó be!
Analgesia	1—2	12—16*	egyénileg állítandó be!

* Ritkán alkalmazott adagok.

A napi adagot 2—4 részletben ajánlatos bevenni. Fokozatos emelkedés nélkül is adhatók a nagyobb adagok, ha erre szükség van és ha a néhány napos teljes ágynyugalom mellett a megfigyelést biztosítani lehet.
Anaesthesiologiai alkalmazásában az adagolásnál — az egyéni érzékenységen kívül — a Tisercinnel együtt adott egyéb gyógyszereket is figyelembe kell venni. Praemedicatióban műtét előtti este ½—1 drazsé, majd a beavatkozás előtt 1—2 drazsé (ill. 1—2 amp.) és az anaesthesia fenntartására 5—25 mg, cseppinfusióban.
A parenteralis alkalmazásra akkor kerül sor, ha a

per os adagolás nem valósítható meg. Napi adagja ilyenkor általában 3—4 ampulla, ágynyugalom biztosítása, valamint tensio- és pulzusellenőrzés mellett.
Az injekció alkalmazási módja: mélyen az izomba. I. ven. is alkalmazható, erősen hígítva cseppinfúzió formájában (50—100 mg Tisercin 250 ml physiologiás serumban vagy izotoniás glucosumoldatban).
Figyelmeztetés! Idősebbeknek csak a cardiovascularis állapot tisztázása után, tensio-ellenőrzés mellett adható! Hosszabb alkalmazás alatt a májfunctio és a vérkép rendszeres ellenőrzése szükséges. Tisercin szedésével egy időben a beteg alkoholt ne fogyasszon. Barbiturátokkal együtt csak kellő óvatossággal adható.

Mellékhatás: Hypotonia, orthostatikus hypotensio, aluszékonyság, tachycardia, szájszárazság. Extrapyramidalis jelenségek — a chlorpromazintól eltérően — csak nagyobb adagok hosszabb időn át való alkalmazása után jelentkeznek.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik, egyéb esetben szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhető. — Lejárati idő: inj. 2 év.

Csomagolás: 50 drazsé 27,10 Ft, 500 drazsé 271,— Ft; 5×1 ml amp. 11,10 Ft, 100×1 ml amp. 178,30 Ft.

TISERCINETTA E.Gy.T. IV.

drazsé

Összetétel: 1 drazsé 2 mg levopromazinum.-ot tartalmaz (2,7 mg levopromazinum hydrogenmaleinicum alakjában).

Javallatok: Psychiatriában és ideggyógyászatban főleg: depressio, neurosis, ingerlékenység, alvászavar, hangulati labilitas, környezetbe való beilleszkedési zavar, izgalmi és kimerüléses állapot gyógykezelése; belgyógyászati betegségekhez társuló ideges zavarok, vegetatív tünetek kezelése, főként: a hypertonia-betegség neurogén szaka, angina pectoris; tüdőgyógyászatban functionalis eredetű köhögés csillapítása, ulcus, cholecystopathia, neuralgia, arth-

rosisos fájdalom, pruritus, idős, agyi érelmeszesedésben szenvedők enyhe zavartsága, depressiója, alvászavarok kezelése, adjuválása.
Kisebb orvosi beavatkozások előkészítésekor is alkalmazható, potenciáló hatása miatt.

Adagolás: Egyéni; a kezdő adag általában felnőtteknek napi 1 drazsé, mely a következő napokban fokozatosan emelhető, a kívánt hatás eléréséig, átlagosan napi 3—5 drazséig. *Gyermekeknek* az átlagos napi adag 0,25 mg/kg.
A napi adagot 2—3 részletben (az esti adagot a nappalinál lehetőleg magasabbra szabva) célszerű bevenni, szétrágás nélkül, fél pohár vízzel, étkezés közben vagy után. Nagyobb levomepromazin-adagok szükségessége esetén a 25 mg hatóanyag tartalmú Tisercin drazsé alkalmazandó.

Mellékhatások: A fenti adagolás mellett ritkán előforduló somnolentia, szédülés, szájszárazság. Alacsony tensio vagy collapsus-hajlam esetén célszerű a beteget eleinte fektetni. (Az első napokban ugyanis a panaszok gyakoribbak, de fekvő helyzetben megszűnnek vagy nem is jelentkeznek.)
A Tisercinetta szedésével egyidőben a beteg alkoholt ne fogyasszon. Barbiturátokkal együtt csak kellő óvatossággal adható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 drazsé 7,80 Ft, 200 drazsé 41,70 Ft.

TOFAMID K.Gy. VI.

tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,23 g amidazoph., 0,25 g aciphenochin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fájdalom- és lázcsillapító.

Adagolás: Naponta 3—4-szer 1—2 tabl.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 10 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 20 tabl. 16,80 Ft, b. 100 tabl. 84,— Ft.

TOLAZOLIN E.Gy.T. XVI.

inj. 10 mg, tabl. 25 mg, oldat 10%

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,01 g tolazolin. hydrochlor.-ot, 1 tabl. (0,2 g) 0,025 g tolazolin. hydrochlor.-ot, 1 üveg (10 ml) 1 g tolazolin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Functionalis véredényzavarok:* angiospasmusok, mint acrocyanosis, digitus mort., Raynaud-kór, migrain, acroparaesthesiák a climacteriumban. *Organikus véredény-megbetegedések:* endarteritis, endangiitis obliterans, arteriosclerotikus keringési zavarok, kis véredények emboliái, cerebralis ischaemia (embolia). — *Helyi szövetkárosodások:* perniók, gangraenás arteriosclerosis és diabetes, ulceratiók, ulcus cruris, decubitus, krónikus körömágyi gyulladás, rosszul granulálódó sebek. Rhinitis atrophicans-Ozaena. — *Keringési zavarok a szemben:* a nervus opticus degeneratív elváltozásai, cystoid macula-oedema, az art. centralis oedemája, üvegtesti- és szaruhártya-homály, iritis, a szem felületi erosiói. — *Ízületi és rheumás megbetegedések:* krónikus ízületi és izom-rheumatismus, neuralgiák. Coxitis senilis.
A gyomorműködés vizsgálatához savképzőként.

Ellenjavallatok: Súlyosabb coronaria-megbetegedés, cardialis decompensatio, collapsus-hajlam, ulcus ventriculi, fennálló decompensatio, aktív tuberculotikus folyamatok.

Adagolás: Először kisebb adagokat alkalmazunk és a beteg érzékenysége és a megfelelő gyógyhatás figyelembevételével emeljük azokat. Szokásos kezdeti orális adagja 3-szor naponta ½ tabletta, ill. 3 csepp, majd fokozatosan emelkedve 3×2 tabl., ill. 10 cseppig. Injekciókból naponta 3—6 amp. s. cut., 1½—3 amp. i. musc. Szemészeti felhasználás esetén conjunctivalisan általában a 10%-os oldatból naponta 3×1—2 cseppet adagolunk.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 10×1 ml amp. 13,10 Ft, 50×1 ml amp. 43,80 Ft;
40 tabl. 11,20 Ft;
oldat 10 ml 9,70 Ft.

TONOGEN K.Gy. XV.
inj., oldat

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1 mg adrenalinumot, 1 üveg 5 mg adrenalinum, 50 mg acid. boric.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Inj.:* Collapsus és peripheriás keringési gyengeség, peripheriás keringési bénulás, szívbénulás, szívgyengeség, shock, vagotoniás és allergiás betegségek, a műtéti terület vértelenítése.
Old.: Orrkagylók duzzadása, orrvérzések, heveny nátha, orrmelléküreg-gyulladások, conjunctivitis, glaucoma, gyomorvérzés, hólyagvérzések kezelésére localisan, asthma bronchiale esetén inhalációban. Tüdővérzésben adni tilos!

Adagolás: Naponta 2—3-szor 0,3—0,5 ml s. cut., i. musc., 0,05—0,1 ml i. ven., végveszély esetén intracardialisan. Naponta 3-szor 2—20 csepp per os, ill. elporlasztva.

Megjegyzés: Inj. ✠✠, oldat ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 4 év, oldat 2 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 7,30 Ft, b. 50×1 ml amp. 73,— Ft;
b. üveg (5 ml) 2,40 Ft.

TRIASEPTYL B. XLVII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,04 g sulfamethoxypyridazin., 0,167 g sulfadimidin, 0,167 g sulfathiourea-t tartalmaz.

Javallatok: A sulfonamid-kezelés minden javallata. Strepto-, pneumo-, staphylo-, meningo- és gonococcus által okozott fertőzések, légúti fertőzések (bronchitis, bronchiectasia, bronchopneumonia stb.) a húgyutak coli-fertőzése (cystitis, pyelitis, pyelonephritis stb.), dysenteria, cholecystitis, sepsis stb. eseteiben egymagában vagy szükségszerűen antibioticumokkal együtt. — Megkísérelhető lymphogranuloma venereum, actinomycosis, oedema malignum esetében antibioticumokkal együtt adagolva.

Adagolás: Az adagolás kezdetén az első nap felnőtteknek legfeljebb 3×4 tabletta étkezés után, bőséges folyadékfogyasztással, majd a második naptól kezdve 6 óránként 2 tabletta. Ezt a kezelést legalább 2—3 napig, súlyos esetekben 4—6 napig folytatjuk.
Gyermekeknek első napi kezdő adag az életkornak és a testsúlynak megfelelően arányosan kevesebb, általában a felnőttadagok $^1/_4$—$^1/_2$—$^3/_4$ részét kapják. A második naptól kezdve 6 óránként az első napi egyszeri adagnak $^1/_4$ részét adjuk, legalább két napon át. Súlyos fertőzésben a láz megszűnése után is még 2—3 napig adagoljuk étkezés után, bőséges folyadékfogyasztással.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: b. 24 tabl. 13,50 Ft, 250 tabl. 122,30 Ft.

TRIOSPAN Ch. X.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 5 mg isopropamidum jodat., 15 mg phenobarbital., 60 mg drotaverinum hydrochlor. (No-Spa)-ot tartalmaz.

Javallatok: Elsősorban ulcus ventriculi és duodeni, ezenkívül krónikus gastritis és colitis, továbbá cholecystopathiával, esetleg cholecystitis-szel kapcsolatos görcsök stb.

Ellenjavallatok: Glaucoma és prostata-hypertrophia.

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek kúraszerűen, 3—6 héten át, naponta 3-szor 1 tabletta, amely adag a klinikai állapot javulásával arányosan a fenntartó adagra csökkenthető. Kúraszerű adagoláskor a hatékonyság és tűrőképesség figyelembevételével egyéni adagolásra törekedjünk.

Mellékhatások: Az anticholinergiás gyógyszerekre jellemző, ritkán előforduló mellékhatások egyáltalán nem vagy csak kismértékben (pl. szájszárazság) fordulhatnak elő.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 18,— Ft, 200 tabl. 180,— Ft.

TRISEDYL K.Gy. IV.
inj., tabl., cseppek

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 2,5 mg trifluperidol. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 0,5 mg trifluperidol. hydrochlor.-ot,
1 üveg (10 ml) 10 mg trifluperidol. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Motoros és psychés nyugtalansággal járó kórképek, a paranoid hallucinatio különböző formái, epileptiform psychosisok. Delírium tremens, lázas toxikus és infectiosus eredetű delírium, hebephrenia. A depressio delíriummal szövődött esetei. Indítékszegénységgel járó depressio. Más antiemeticummal nem befolyásolható hányinger.

Ellenjavallatok: A pyramis-pálya és az extrapyramidalis pályarendszer organikus megbetegedései, functio-zavarai.

Adagolás: A *parenteralis* alkalmazás elsősorban akkor indokolt, ha az oralis adagolás keresztülvihetetlen, és súlyosabb psychosisokban. Átlagos egyszeri adagja felnőtteknek ½—1 ampulla i. musc. Ezt az adagot szükség esetén intézeti kezelésben 24 órán belül 3—4-szer is meg lehet ismételni. *Oralisan* felnőtteknél 0,5 mg-os kezdő adag után az egyéni szükséglet és tűrőképesség figyelembevételével fokozatosan 1,5—2 mg-ig lehet emelni a napi adagot (intézeti körülmények között magasabb adagok is adhatók).
Gyermekeknek az életkor és testsúly figyelembevételével 5 éves korig általában a felnőttadag egynegyede, 5—15 éves korig a felnőttadag fele adagolható.

Mellékhatások: Parkinsonismus, izomgörcs, izomhypertonia léphet fel, elsősorban az átlagosnál nagyobb adagok alkalmazása kapcsán, ezek a tünetek az adag csökkentésére, vagy a kúra átmeneti abbahagyása után spontán megszűnnek, illetve antiparkinson-szerekkel megszüntethetők. A Trisedyl neurovegetatív jellegű mellékhatásokat nem okoz, az életfontosságú szervek functióit nem befolyásolja károsan. A Trysedil más neurolepticumokhoz hasonlóan potentiálja a központi idegrendszerre ható gyógyszerek effektusát, ezért *barbiturátokkal és opiatokkal egyidejű alkalmazása különös körültekintést igényel. Trisedyl-kezelés kizárólag orvosi ellenőrzés mellett történhet.*

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére idegszakrendelések, ideggondozók szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak idegszakrendelés (ideggondozó, fekvőbeteg-gyógyintézeti, elme-idegosztály) javaslatára rendelhetik. Lejárati idő: inj. és cseppek: 2 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. 13,70 Ft, 50×1 ml amp. 122,30 Ft;
50 tabl. 9,70 Ft, 250 tabl. 42,90 Ft;
1 üveg (10 ml) 15,— Ft.

TRIOXAZIN E.Gy.T. IV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,3 g trimetozin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Szorongás, túlfeszített idegállapot, psychés nyugtalanság, neurotikus vegetatív tünetek (hypertonia, climax), külvilági emotionalis tényezőkön alapuló izgalmi állapot (lámpaláz stb.).
Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Neuropathia.

Adagolás: Egyéni, a beteg állapotától és egyéni reagálóképességétől függ. Napi átlagos adagja felnőtteknek 0,60—1,80 g (2—6 tabl.), de ez az adag növelhető a kórformától függően napi 2,4—3,0 g-ig (8—10 tabl.). Gyermekeknek a kornak megfelelő csökkentett adag rendelhető.
Gyermekadagok: 2 hónapos kortól 14 éves korig 40—20 mg/kg/die, 3—5 adagra elosztva, vagy: 2—12 hónapos korig 3—5-ször ¼ tabl./die; 1—6 éves korig 3—5-ször ½ tabl./die; 7—14 éves korig 3—5-ször 1 tabl./die.
Mellékhatás: Álmosság, fáradtságérzés.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná.

Csomagolás: 20 tabl. 10,50 Ft, 200 tabl. 105,— Ft.

TROPARIN Ch. XII.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 40 mg papaver. sulf., 1,5 mg methylhomatrop. brom.-ot;
1 tabl. 40 mg papaver. hydrochlor., 1,5 mg methylhomatrop. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Pylorus-spasmus, ulcus ventr. et duod., kőkólikák, cholecystitis, hyperemesis gravidarum, angina pectoris, asthma bronchiale, enteritis, obstip. spast., dysmenorrhoea, szülés alatti méhszájgörcs, elhúzódó tágulás, túl erős fájások.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—3 tabl. vagy 1—2 amp. s. cut.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 4 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 8,— Ft,
b. 20 tabl. 5,70 Ft, b. 100 tabl. 28,50 Ft.

TROPARIN COMBINATUM Ch. XII.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 40 mg papaver. hydrochl., 20 mg phenobarbital., 2 mg methylhomatrop. brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Lásd Troparin tabl.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabl.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 4 tabl. orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: b. 20 tabl. 6,70 Ft, b. 100 tabl. 33,50 Ft.

TRYPSIMUSC K.Gy. LI.
inj.

Összetétel: 1 üveg (I) 25 mg trypsin.-ot, 1 amp. oldószer (II) 50 mg lidocain. hydrochlor., 25 mg prometazin. hydrochlor.-ot tartalmaz 5 ml propylenglycol-tartalmú vizes oldatban.

Javallatok: Krónikus tüdő-, hörgő- és mellhártyamegbetegedések, bronchiectasia, asthma bronchialéban a gennyes-nyákos váladékoldása. Dystorsiók, posttraumás haematomák, haemarthros, scleroderma, ulcus cruris, diabetes-gangraenák, decubitus, thrombophlebitis, phlebothrombosis. Arthritis, periarthritis, synovitis, bursitis. Gynaecologiai gyulladások. Szemészeti gyulladások (iritis, iridocyclitis, chorioretinitis).

Ellenjavallatok: Súlyos máj- és vesebetegségek. A véralvadás zavaraiban csak nagy óvatossággal adható.

Adagolás: Az I. jelzésű üveg hatóanyag-tartalmát a II. jelzésű oldószer teljes mennyiségével feloldva olyan oldatot kapunk, amelynek minden millilitere 5 mg trypsint (és 5 mg promethazint) tartalmaz. — Adagja: Heveny kórképekben naponta 2×2,5 ml (2×12,5 mg), majd az akut tünetek csökkenése után naponta 1×2,5 ml (12,5 mg). Tüdőbetegségekben naponta 1—2,5 ml 1 héten keresztül, majd másodnaponként 1—2,5 ml 2 héten keresztül. Amennyiben szükséges, e kúra 2—3 heti szünet után megismételhető.
Gyermekeknek 2 éves korig napi 0,2 ml-t (1 mg), nagyobb gyermekeknek 0,5 ml-t (2,5 mg) adunk. A Trypsimusc inj. mélyen és lassan adandó a farizomba. — A készítmény alkalmazását követő 6 órán belül az alkoholfogyasztás kerülendő. — Szobahőmérsékleten az oldott trypsin fokozatosan veszít aktivitásából, hűtőszekrényben 2—3 napig értékcsökkenés veszélye nélkül tárolható.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5 üveg (à 25 mg) + 5 oldószerampulla 44,50 Ft, 50 üveg (à 25 mg) + 50 oldószerampulla 439,40 Ft.

TRYPSIN K.Gy. LI.
helyi kezelésre

Összetétel: 1 üveg I. 25 mg trypsin.-ot, 1 oldószerampulla II. (5 ml) 5 ml natr. chlor. inj. 0,9%-ot tartalmaz.

Javallatok: A tüdő, a hörgők és a mellhártya idült gennyes megbetegedései (tüdőtályog, -gangraena, pneumonia chronica, bronchitis chronica suppurativa, bronchitis spastica, asthma bronchiale, bronchiectasia, emphysema, empyema thoracis), Bronchographia, bronchoscopia, légzésfunkciós vizsgálatok (spirometria, bronchospirometria) előkészítése. Tüdőműtétek előtt.

Ellenjavallatok: Tüdővérzés, gyomor-, nyombélfekély.

Alkalmazás: A tripszint, az oldószerampulla tartalmát feloldjuk, majd aerosol-készüléken keresztül 1—2 ml-t spray formájában inhaláltatunk — kb. 10 perc alatt — naponta 1—2 alkalommal. Bronchoscopiás és intrapleuralis alkalmazás esetén a tripszint 3—5 ml oldószerrel oldjuk fel, és befecskendezés után 15—30 másodpere elteltével az üvegből visszaszívjuk.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 5×25 mg I. és 5×5 ml oldószeramp. II. 44,50 Ft, 50×25 mg I. 50×5 ml oldószeramp. II. 439,40 Ft.

TRYPSIN K.Gy. XLIV/LI.
sebhintőpor 0,25%

Összetétel: 1 üveg 0,25 g trypsin., 0,5 g procain. hydrochlor., 0,6 g calc. acetic. anhydr.-ot tartalmaz.

Javallatok: Krónikus fekélyek és sebek feltisztítása.

Ellenjavallatok: Friss sebek, hámosodó sebek és vérzékeny sebfelületek.

Alkalmazás: Localis. Vékony rétegben történő behintés után a felületet száraz steril gézlappal borítjuk. Beszáradt necrotikus felületek esetén a fedő gézlapot steril élettani konyhasóoldattal nedvesítjük át (a kötést elegendő másodnaponként cserélni).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet)

javaslata alapján rendelhetik. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 1 szóróüveg (10 g) 37,30 Ft.

UREGYT E.Gy.T. XXV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 50 mg acid. etacrynic.-ot tartalmaz.

Javallatok: Különböző eredetű oedemás állapotok (cardialis, nephrogen, portalis, postthrombotikus stb.). Egyéb diureticummal szemben resistens oedemák esetében is eredményes. Diabetogen hatása feltehetően nincs.

Ellenjavallatok: Anuria. Terheseknek csak igen kivételes esetben, máj-cirrhosisban szenvedőknek óvatosan, metabolikus alkalosis esetén csak az ionháztartás rendezése után és ellenőrzés mellett adható.

Adagolás: A kezdő adag általában 50 mg/die, mely fokozatosan emelhető a szükséges — maximálisan 200 mg/die (4 tabletta) — mennyiségig. Hatása 8—10 óra alatt lezajlik, ezért célszerű az egész napi adagot reggel, közvetlenül étkezés után bevenni. Más diureticumokkal eredményesen kombinálható.

Mellékhatás: Az etacrinsav nagyfokú saluretikus activitása miatt hypochloraemiát, hypokalaemiát, hypovolaemiát és metabolikus alkalosist okozhat. Megfelelő (intermittáló) adagolással és substitutiós therapiával a fenti tünetek elkerülhetők vagy megszüntethetők. A folyamatban levő antihypertensiv therapiát potentiálhatja, ami orthostatikus collapsushoz vezethet.
Gastrointestinalis tüneteket is okozhat (dysphagia, nausea, vomitus, diarrhoea). Súlyos vagy nagy vízveszteséggel járó diarrhoea esetén a gyógyszer adagolást abba kell hagyni. Ajánlatos a serum-electrolytok gyakori ellenőrzése.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti-, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógy-

intézet) javaslatára rendelhetik, a javaslatban meg
határozott időtartamon belül történő gyógykezelés
céljából. A javaslatot adó szakrendelést (osztályt
és a javaslat keltét a vényen fel kell tüntetni

Csomagolás: 20 tabl. 15,20 Ft, 200 tabl. 127,60 Ft

VALERIANA composita B. III
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,02 g phenobarbital., 0,10
extr. valer. sicc.-ot tartalmaz.

Javallatok: A központi idegrendszer vegetatív zava
rai, vegetatív dystonia, vasoneurosisok, szívdobo
gás, hysteria, neurasthenia, félelmi érzések.

Adagolás: Nyugtatónak: naponta 3×1 drazsé, alta
tónak 2—4 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szaba
don rendelhető.

Csomagolás: 50 drazsé 10,50 Ft.

VASALGIN Ch. V
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,1 g acid. 5-allyl-5-(β-hydroxy
propyl)-barbitur.-ot tartalmaz.

Javallatok: Vasomotoros fejfájás, migraine, posttra
más fájdalmak, Raynaud-kór, illetve acrocyanosi

Ellenjavallatok: Súlyosabb máj- vagy vesebetegségel

Adagolás: Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-szo
1 tabletta kúraszerűen. Súlyosabb esetekben a kez
dő adag naponta 3-szor 2 tabletta. Ez az ada
6—8 nap után fokozatosan csökkenthető nap
3-szor 1 tablettára. Egy kúra általában 4—6 hétig
tart.
Szükség esetén a kúraszerű adagolás megismétel
hető. A javulás első jelei legkorábban 1—2 hét
után várhatók.

Mellékhatások: Többnyire még tartós alkalmazás után

sem mutatkoznak, de egyéni túlérzékenység esetén kisfokú szédülés, álmosságérzés előfordulhat.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 50 tabl. 21,30 Ft.

VAS-ARSOTONIN Ch. XIX.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 3 mg calc. methylarson., 30 mg ferr. red.-ot tartalmaz.

Javallatok: Különféle anaemiák, leukaemia, reconvalescentia, neurasthenia, chorea, tabes, Basedow-kór, neuralgia, psoriasis, lichen ruber, ekzema chron., roborálás.

Adagolás: Naponta 1—9 tabletta emelkedő adagolásban vagy hosszabb időn át 3×1—2 tabl. naponta: gyermekadagokat lásd Arsotoninnál.

Megjegyzés: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 100 tabl. 4,60 Ft.

VASOBROMAN K.Gy. XVI.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 0,25 g theobr. calc. salic., 0,04 g papaver. hydrochlor., 0,2 g bromvalerocarb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Essentialis és vasoneurotikus hypertonia, a climax hypertoniás és vasomotoros tünetei, angina pectoris, migraine, nephrosclerosis.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 tabletta.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 18,40 Ft, 100 tabl. 75,20 Ft.

VEGACILLIN B.
tabl. XLVII

Összetétel: 1 tabl. 200 000 NE phenoxymethylpenicillin.-ot tartalmaz.

Javallatok: *Streptococcus haemolyticus*, pneumococcus, gonococcus és egyéb penicillin-érzékeny (staphylo-) coccusok által okozott fertőzések.

Ellenjavallatok: Penicillin-allergia, penicillin-resistentia.

Adagolás: Tartós *megelőzés céljára* (rheumás-láz-rohamok megelőzésére, gyermekeknek általában — koruktól függően) napi 1—3 tabl. Streptococcus-fertőzés közvetlen veszélyének esetén, egész napra elosztva ennek kétszerese az adag. — Streptococcus-hordozás megszüntetésére 10 napon át napi 3—6 tabl.

Kezelésre: Minden olyan enyhe és középsúlyos fertőzés leküzdésére, melyet penicillin-érzékeny kórokozók idéznek elő. Közepes súlyosságú, *streptococcus haemolyticus* vagy egyéb érzékeny coccusok által okozott fertőzésekben a szokásos adag napi 3×1 vagy 4×1 tabl. Súlyosabb esetekben, pl. bacteriaemiában, parenteralis penicillin alkalmazása indokolt. Pneumococcus eredetű pneumoniában a kezdeti adag 2—3 tabl., majd ezt követően 12 óránként 2 tabl. — Akut gonorrhoeás fertőzéseken a bevált adagolás 4 óránként 1 tabl., összesen 5 vagy 6 alkalommal.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 12 tabl. 30,90 Ft, 250 tabl. 643,70 Ft.

VENOBARBITAL Ch.
inj. II.

Összetétel: 1 üveg (I.) 0,5 g natr. 5-aethyl-5-(1-methyl-propyl)-2-thiobarbitur.-ot tartalmaz. 1 amp. oldószer 10 ml aqua dest. pro inj.-t tartalmaz.

Javallatok: Rövid tartamú narkózisok, kisebb műtéti beavatkozások, diagnosztikai beavatkozások (oesophagoscopia, bronchoscopia) esetében bázis és kombinált inhalációs narkózis bevezetésére.

Ellenjavallatok: Ugyanazok, mint amelyek minden intravenás narkózisra vonatkoznak.

Adagolás: Kizárólag intravenásan történhet, a készítményhez mellékelt részletes használati utasítás szerint. *Intramuscularisan nem adható!*

Figyelmeztetés: A maximális összadag legfeljebb két gramm, ezt sohasem léphetjük túl. Ha ez a mennyiség — amellyel hosszabb műtétek is végezhetők — nem elegendő, akkor kombinált narkózisra kell áttérni.

A hatóanyagot közvetlenül felhasználás előtt kell feloldani. Azt az oldódás gyorsítása céljából melegíteni tilos. A Venobarbital injekcióhoz ajánlatos fémalkatrész nélküli üvegfecskendőt használni, mert az oldat huzamosabb idő alatt a fémalkatrészekkel reakcióba léphet, amit az oldat barnás elszíneződése, esetleg zavarosodás, vagy üledékképződés jelez. Az ilyen oldat nem használható fel.

Fémalkatrészes fecskendőben tartott injekciós oldat ½ órán túl, fémalkatrész nélküli üvegfecskendőben tartott injekciós oldat 6 órán túl nem használható. Friss oldat készítéséhez mindig másik steril fecskendőt kell használni.

Kizárólag frissen készített, legfeljebb halványsárga színű, teljesen tiszta oldat használható!

Megjegyzés: ✠ Szakrendelések és biztosítottak ellátására nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 10×0,5 g + 10×10 ml oldószer 70,— Ft.

VESTIN E.Gy.T.
drazsé XXV.

Összetétel: 1 drazsé 100 mg phenazopyridin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Húgyutak fertőzéses (nem gonorrhoeás) bántalmai, húgydezinficiens.

Adagolás: Naponta 3-szor 1—2 drazsé.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — 20 drazsé orvosi vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 20 drazsé 5,60 Ft,
250 drazsé 42,20 Ft.

VIDEX Ch. XXIV.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 10 mg 4,4'-diacetoxy-dyphenyl-pyridil-(2)-methan.-ot tartalmaz.

Javallatok: Habitualis obsipatio atoniás és dyskinesiás formái.

Adagolás: Felnőttek adagja általában esténként, lefekvéskor, 1—2 tabletta, amelyet megrágás nélkül, egészben kell lenyelni.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 4,40 Ft.

VINBLASTIN K.Gy. L.
inj. 5 mg

Összetétel: 1 üveg 5 mg vinblastin sulf.-ot, 1 amp. oldószer 5 ml natr. chlor. inj. 0,9%-ot tartalmaz.

Javallatok: Lymphogranulomatosis (Hodgkin-kór) generalizált alakja, lympho- és reticulosarcoma, továbbá egyéb chemotherapeuticumok és sugárkezelés iránt resistens krónikus myelosisok.

Ellenjavallatok: Leukopenia, bacterialis infectiók.

Adagolás: A szárazampulla tartalmát az oldószerampullában levő 5 ml fiziológiás konyhasóban kell feloldani, majd a frissen készített oldatot intravenásan vagy i. ven. cseppinfúzióban alkalmazni. Az adag beállítása a beteg szükségletének és a fehérvérsejtszám változásának figyelembevételével, individualisan történjék.
A Vinblastin adagolására kétféle sémát lehet ajánlani:

1. A kezdő 0,025—0,1 mg/kg dózis után, naponta kontrollált fehérvérsejtszám mellett, amennyiben a bevezető adag után a fehérvérsejtszám nem esik 2—3000 alá, az első injekciót követően egy hét múlva adható a második adag 0,15 mg/kg mennyiségben, legalább 4000-es fehérvérsejtszám mellett. A továbbiakban, ha onkolyticus, ill. leukopeniás hatás nem mutatkozik, az egyszeri adag 0,2 mg/kg-ra is emelhető. Az egyes injekciók között 7 nap szünetet kell tartani és a fehérvérsejtszámot gondosan ellenőrizni kell. Ha a megfelelő hatást elértük, úgy — ugyancsak a fehérvérsejtszám ellenőrzése mellett — 7—14 naponként 0,15 mg/kg fenntartó dózist lehet adni a teljes tünetmentességig.
2. Hatásosnak mutatkozott az az adagolási mód is, amelyben a 0,025—0,1 mg/testsúlykg kezdő adag után, naponta kontrollált fehérvérsejtszám mellett, naponta adják a Vinblastint 2,5—5 mg-os dózisban, fokozatosan emelkedő adagolással. A hatásos adagot ilyen adagolással 2—3 nap alatt érik el (5 mg-nál nagyobb egyszeri adag a naponkénti alkalmazás esetében nem adható). Ezután a kezelés — az átmeneti jellegű és általában spontán megszűnő leukopeniás szak elmúltával — csökkentett fenntartó adaggal folytatható. A Vinblastin-kezelés megismételhető. Mindkét adagolási mód során ajánlatos a fehérvérkép naponkénti ellenőrzése. Leukopenia (3000 fehérvérsejtszám alatt) esetén célszerű a kezelést szünetelteni és prophylacticusan antibioticumot adni.

Mellékhatások: Agranulocytosis, leukopenia, alopecia, hányinger, hányás, subicterus, hasmenés, albuminuria, stomatitis, urticaria, paraesthesiák, az ínreflexek kiesése, fejfájás, orrvérzés, anorexia, depressio. A szer kihagyására valamennyi mellékhatás megszűnik; tartós károsodást általában nem okoz.

Megjegyzés: ✠✠ A készítmény kizárólag gyógyintézetben alkalmazható. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 25×5 mg + 25×5 ml oldószer 1731,—Ft.

VIOMYCIN E.Gy.T. XLVII.
inj. 1 g

Összetétel: 1 porampulla 1 g viomycinum-ot (viomycin. sulf. alakjában) tartalmaz.

Javallatok: A legkülönbözőbb pulmonalis és extrapulmonalis tbc-s kórformák kezelése, ha az elsőrendű gátlószerekkel szemben resistentia, túlérzékenység, ill. toxikus reactiók állnak fenn. Ahol az STM, INH vagy ezek combinatiói még hatékonyak, indokolt elsősorban ezeket adni.

Adagolás: Általában egyéb gátlószerrel kombinálva intermittáló vagy folyamatos kezelés formájában alkalmazzák.
Intermittáló kezelés esetén hetenként 2-szer 2 g Viomycint kap a beteg, amelyet két részre osztva 12 órás időközökben adunk i. musc., vagy hetenként 3-szor 1 g-ot, a közbeeső napokon pedig egyéb gátlószert. Az egy kúrában adagolt összmennyiség lehetőleg ne haladja meg az 50—60 g-ot.
A folyamatos kezelés esetén a Viomycin napi mennyisége maximálisan 1 g lehet, s a kezelés 1 hónapnál tovább nem folytatható.
Adagolás gyermekeknek: 30—50 mg/testsúlykg, hetenként 2—3-szor.
Mindkét adagolási forma esetén rendszeres laboratóriumi vizsgálat szükséges. (Otologiai vizsgálat havonta, hetenként egyszer vizeletvizsgálat, rest-nitrogén meghatározása, serumelektrolyt, valamint májfunctiós vizsgálat.)
I. musc. injekció formájában adható. Per os és localisan rosszul szívódik fel, i. ven. pedig az esetleges toxikus reakciók fellépése miatt nem ajánlatos adni. Egyes szerzők lassú i. ven. cseppinfusióban történő adagolást tartják megfelelőnek, az egyenletes serum-concentratio biztosítására.
I. musc. használatra 5 ml aqua dest. pro inj.-ban oldható. A Viomycin-oldat szobahőn 1 hétig tárolható, ajánlatos azonban hűtőszekrényben tartani.

Mellékhatások: Jelentkezésük nagymértékben az adagolástól függ. Gondosan megválasztott adagolás esetén a toxikus reactiók ritkán és enyhe formában fordulnak elő. A leggyakoribbak: vesekárosodás (albuminuriával, cylindruriával), különösen olyan esetekben, amelyekben a vese megelőzően is beteg volt. Ilyen esetekben a kezelést alacsony adagokkal kell végezni és toxikus jelekre fokozottan kell ügyelni.
Vestibularis és cochlearis károsodás (egyensúly- és hallászavarokkal), allergiás reactiók, bőr-eruptio, az electrolyt-háztartás zavara. A serum-electrolyt zavar kálium-chlorid oralis adásával megszüntethető. Bőr-eruptio esetén antihistamint kell adni. Ha nincs javulás, a Viomycin-kezelést be kell szüntetni.

Megjegyzések: ✠ Csak fekvőbeteg-gyógyintézet részére van forgalomban. Orvosi vényen nem rendelhető. — Lejárati idő: 1½ év.

Csomagolás: 50 porampulla + 50 amp. aqua dest. pro inj. 5 ml 314,— Ft.

VITAMIN A E.Gy.T.—B. XXXI.
drazsé 3000 NE, olajos inj. 100 000 NE, olaj 150 000 NE

Összetétel: 1 drazsé 3000 NE axerophth.-ot,
1 amp. (1 ml) 100 000 NE axerophth.-ot,
1 üveg 150 000 NE axerophth.-ot tartalmaz 5 ml olajos oldatban.

Javallatok: A-vitamin-hiány.

Adagolás: Felnőtteknek naponta 2—3×3—4 drazsé. 1 amp. i. musc. vagy 20—30 csepp olaj; gyermekeknek napi 10—20 csepp; csecsemőknek napi 5—10 csepp.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére A-vitaminhiány okozta betegségek esetén rendelhető, a kórisme feltüntetésével. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 50 drazsé 9,40 Ft,
b. 5×1 ml amp. 32,— Ft,
1×5 ml olaj 9,50 Ft.

VITAMIN A E.Gy.T. XXXI.

kapszula 50 000 NE

Összetétel: 1 kapszula 50 000 NE axerophth.-ot tartalmaz.

Javallatok: A-hypo-, ill. avitaminosis, farkasvaksággal vagy keratomaliciával vagy anélkül. Légúti fertőzések megelőzésére, ill. ilyen megbetegedésekben a specifikus therapia adjuválására. A gastrointestinalis tractus súlyosabb hámkárosodással járó folyamatai, pl. colitis ulcerosa. Vesekő recidiválásának prophylaxisa. Praemenstrualis zavarok, kraurosis vulvae, pruritus vulvae et ani. Ozaena, rhinitis atrophica, rhinopharingitis sicca. Belsőfül eredetű nagyothallás és fülzúgás. Photophobia, hordeolosis és a cornea, conjuctiva praexerosisa, ulcus corneae és trophikus szarufolyamatok, retinitis pigmentosa. Lichen ruber planus és egyéb lichenes kórformák, acne miliaris, ichthyosis, pityriasis rubra pilaris, haj- és körömtöredezés.

Adagolás: Szokásos adagja napi 1—2 kapszula, étkezés közben vagy után. Súlyosabb esetekben 3×1—2 kapszula/die, szükség esetén A-vitamin-injekciókkal kiegészítve.
Praemenstrualis zavarokban a menstruatio várható időpontját megelőző 2 héten át kell A-vitamint adagolni, átlagban 2×1 kapszulát naponta. Nagyothallás, ozaena és lichenes kórformák esetén nagyobb dosisok hosszan tartó adása tanácsos.

Mellékhatások: Nagy adagok hosszan tartó adása után A-hypervitaminosis alakulhat ki, melynek bevezető tünete az ajkak feltűnő szárazsága. Megszüntetéséhez az adagok csökkentése rendszerint elegendő.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére A-vitaminhiány okozta betegségek esetén rendelhető, a kórisme feltüntetésével. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 20 kapszula 29,20 Ft.

VITAMIN A + D_2 E.Gy.T.—B. XXXI.

drazsé, olajos inj. és *forte* olajos inj., olaj

Összetétel: 1 *drazsé* 5000 NE axerophth. (10 mg axerophth. conc.) 15 000 NE ergocalciferol.-ot,
1 *amp.* (1 ml): 25 000 NE axerophth. (25 mg axerophth. conc. oleos. alakjában), 300 000 NE ergocalciferol.-ot,
1 *amp.* (1 ml) *forte:* 50 000 NE axerophth. (50 mg axerophth. conc. oleos. alakjában), 600 000 NE ergocalciferol.-ot,
1 *üveg olaj* (5 ml) 150 000 NE axerophth. (150 mg axerophth conc. oleos. alakjában), 200 000 NE ergocalciferol.-ot tartalmaz. — 1 üveg 10 ml, 2-szeres mennyiséget tartalmaz.

Javallatok: Rachitis, növekedési zavarok, tetania, osteomalacia, exsudativ diathesis, callus-képzés, lactatio, D_2-vitamin prophylaxisra a téli hónapokban csecsemőknek 2 hónapos kortól 2 évig.

Adagolás: Prophylaxis, ill. therapia: csecsemőknek, ill. kisgyermekeknek naponta 2—4 drazsé. Olaj: naponta 3—10 csepp kúraszerűen. Az olajos oldat, megdermedés esetén, a kéz melegével is cseppfolyósítható. — 2—6 havonként 1 amp. i. musc.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetők. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: 50 drazsé 10,20 Ft,
1×1 ml amp. 5,80 Ft, 10×1 ml amp. 48,40 Ft, 10×1 ml amp. forte 114,50 Ft, 1×1 ml amp. forte 13,10 Ft,
1 üveg (5 ml) olaj 11,— Ft, 1 üveg (10 ml) olaj 19,70 Ft.

VITAMIN B_1 Ch. XXXI.

inj. 10 mg és 50 mg, tabl. 5 mg és 10 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 10, ill. 50 mg thiamin. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 5, ill. 10 mg thiamin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Különböző eredetű neuritisek, polyneuritis, neuralgiák, diphtheriás hűdések, ischias, herpes

zoster, beri-beri, myelosis funicularis, poliomyelitis, sclerosis multiplex, migraine, gyomor-, bél-atonia, ulcus-étrend, étvágytalanság, terhességi hányás, diabetes, spasmophilia, éhezési oedema, nephritis, köszvény, hyper- és hypothyreosis, climax, valamint hosszas antibioticum- vagy szulfonamid-kezelés esetében.

Adagolás: Felnőtteknek 1—3-szor 1—2 tabl. (à 5 mg), ill. naponta 1—3-szor 1 tabl. (à 10 mg). Gyermekeknek az életkornak megfelelően 1—2 naponként 1 tabl. Felnőtteknek naponta vagy másodnaponként 1 amp. s. cut. vagy i. musc. Intravenásan ne alkalmazzuk!

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére csak B_1-vitamin-hiány okozta betegség esetén rendelhető, illetőleg olyan esetben, ha a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető gyógyszer — megfelelően nem biztosítaná. A vényen a kórismét fel kell tüntetni. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 5×1 amp. 10 mg 7,25 Ft, b. 100×1 amp. 10 mg 145,— Ft,
b. 5×1 amp. 50 mg 20,05 Ft, b. 100×1 amp. 50 mg 401,— Ft.
20 tabl. 5 mg 6,— Ft, 100 tabl. 5 mg 20,90 Ft, 20 tabl. 10 mg 12,— Ft, 100 tabl. 10 mg 41,80 Ft.

VITAMIN B_6 E.Gy.T. XXXI.
inj. 50 mg, tabl. 0,02 g

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 50 mg pyridox. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 0,02 g pyridox. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hányáscsillapítás: hyperemesis gravidarum, röntgenkater, csecsemőkori hányások megelőzésére. Neuromuscularis betegségekben más B-vitaminokkal kombinálva.

Adagolás: Naponta 1—2 amp. i. musc. vagy i. ven. Naponta 3×1—2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak a kórismének a dokumentációban történő feltüntetésével rendelhető.

Csomagolás: 6×2 ml amp. 44,10 Ft, 20 tabl. 32,10 Ft.

VITAMIN B_{12} K.Gy. XXXI/XIX.
inj. 20 μg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 μg cyanocobalamin.-ot tartalmaz.

Javallat: Anaemia perniciosa, más macrocytás anaemiák, máj-cirrhosis, rtg-kater, agranulocytosis, ólommérgezéses toxikus neuritisek, roborálás.

Adagolás: Individualisan alkalmazandó. A reticulocyta-crisis és a vérsejtszám-emelkedés jelzi a therapia eredményességét. Hetenként 1—2-szer 20 mikrogramm az optimális adag a remissio beálltáig. Neurológiai tünetekkel párosuló esetekben heti 1—2-szer 40 mikrogramm. Huzamos kezelésre (fenntartó adagok) havonta 1—2-szer 20—40 mikrogramm s. cut. vagy i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 3×1 ml amp. 5,60 Ft, 25×1 ml amp. 39,— Ft.

VITAMIN B_{12} K.Gy. XXXI/XIX.
inj. 300 μg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 300 μg cyanocobalamin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Anaemia perniciosa súlyos idegrendszeri elváltozásokkal (myelosis funicularis). Trigeminus- és egyéb neuralgiák, alkoholos, diabeteses neuritis, herpes zoster, izom-atrophiás és -dystrophiás kórképek, neutrop vírusbetegségek, osteoarthritis és osteoporosis esetén a kísérőtünetek enyhítésére.

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1—2 amp. i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a kórisme feltüntetésével rendelhető; *a vényt két példányban („másolat"-ial) kell kiállítani.* Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 3×1 amp. 32,80 Ft, 25×1 ml amp. 267,40 Ft.

zoster, beri-beri, myelosis funicularis, poliomyelitis, sclerosis multiplex, migraine, gyomor-, bél-atonia, ulcus-étrend, étvágytalanság, terhességi hányás, diabetes, spasmophilia, éhezési oedema, nephritis, köszvény, hyper- és hypothyreosis, climax, valamint hosszas antibioticum- vagy szulfonamid-kezelés esetében.

Adagolás: Felnőtteknek 1—3-szor 1—2 tabl. (à 5 mg), ill. naponta 1—3-szor 1 tabl. (à 10 mg). Gyermekeknek az életkornak megfelelően 1—2 naponként 1 tabl. Felnőtteknek naponta vagy másodnaponként 1 amp. s. cut. vagy i. musc. Intravenásan ne alkalmazzuk!

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére csak B_1-vitamin-hiány okozta betegség esetén rendelhető, illetőleg olyan esetben, ha a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető gyógyszer — megfelelően nem biztosítaná. A vényen a kórismét fel kell tüntetni. — Lejárati idő: 3 év.

Csomagolás: b. 5×1 amp. 10 mg 7,25 Ft, b. 100×1 amp. 10 mg 145,— Ft,
b. 5×1 amp. 50 mg 20,05 Ft, b. 100×1 amp. 50 mg 401,— Ft.
20 tabl. 5 mg 6,— Ft, 100 tabl. 5 mg 20,90 Ft,
20 tabl. 10 mg 12,— Ft, 100 tabl. 10 mg 41,80 Ft.

VITAMIN B_6 E.Gy.T. XXXI.
inj. 50 mg, tabl. 0,02 g

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 50 mg pyridox. hydrochlor.-ot,
1 tabl. 0,02 g pyridox. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Hányáscsillapítás: hyperemesis gravidarum, röntgenkater, csecsemőkori hányások megelőzésére. Neuromuscularis betegségekben más B-vitaminokkal kombinálva.

Adagolás: Naponta 1—2 amp. i. musc. vagy i. ven. Naponta 3×1—2 tabl.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére csak a kórismének a dokumentációban történő feltüntetésével rendelhető.

Csomagolás: 6×2 ml amp. 44,10 Ft, 20 tabl. 32,10 Ft.

VITAMIN B_{12} K.Gy. XXXI/XIX.
inj. 20 μg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 20 μg cyanocobalamin.-ot tartalmaz.

Javallat: Anaemia perniciosa, más macrocytás anaemiák, máj-cirrhosis, rtg-kater, agranulocytosis, ólommérgezéses toxikus neuritisek, roborálás.

Adagolás: Individualisan alkalmazandó. A reticulocyta-crisis és a vérsejtszám-emelkedés jelzi a therapia eredményességét. Hetenként 1—2-szer 20 mikrogramm az optimális adag a remissio beálltáig. Neurológiai tünetekkel párosuló esetekben heti 1—2-szer 40 mikrogramm. Huzamos kezelésre (fenntartó adagok) havonta 1—2-szer 20—40 mikrogramm s. cut. vagy i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 3×1 ml amp. 5,60 Ft, 25×1 ml amp. 39,— Ft.

VITAMIN B_{12} K.Gy. XXXI/XIX.
inj. 300 μg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 300 μg cyanocobalamin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Anaemia perniciosa súlyos idegrendszeri elváltozásokkal (myelosis funicularis). Trigeminus- és egyéb neuralgiák, alkoholos, diabeteses neuritis, herpes zoster, izom-atrophiás és -dystrophiás kórképek, neutrop vírusbetegségek, osteoarthritis és osteoporosis esetén a kísérőtünetek enyhítésére.

Adagolás: Naponta vagy másodnaponként 1—2 amp. i. musc.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére a kórisme feltüntetésével rendelhető; *a vényt két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 3×1 amp. 32,80 Ft, 25×1 ml amp. 267,40 Ft.

VITAMIN B_{12} XXXI/XIX.
inj. 1000 μg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 1000 μg cyanocobalamin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Trigeminus- és egyéb neuralgiák, alkoholos és diabetes neuritis, herpes zoster, izom-atrophiás és -dystrophiás kórképek, neutrop vírusbetegségek, osteoarthritis és osteoporosis esetén a kísérő tünetek enyhítésére. — *Rendelés előtt mérlegelni kell a nemkívánatos következmények lehetőségét és kockázatát (alkalmazása a haemopoesisre igen erős ingert jelenthet)!*

Adagolás: Hetenként 2—3×1 ampulla i. musc. 1—2 héten át, majd az adagolást heti egy ampullára csökkentjük.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szakrendelések rendelhetik, abban az esetben, ha a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. *A vényt minden esetben a kórisme feltüntetésével két példányban („másolat"-tal) kell kiállítani.* — Társadalombiztosítás terhére haemopoeticumként nem rendelhető. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 3×1 ml amp. 102,30 Ft, 50×1 ml amp. 1695,— Ft.

VITAMIN C E.Gy.T. XXXI.
inj. 10%, drazsé 100 mg

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 0,1 g acid. ascorb.-ot,
1 amp. (2, ill. 5 ml) 2-, ill. 5-szörös mennyiséget tartalmaz.
1 drazsé 0,1 g acid. ascorb.-ot tartalmaz.

Javallatok: Fertőző megbetegedések, scorbut, graviditas, belső vérzések, ulcus-diéta, fog- és csontcaries, parandentosis, tavaszi fáradtság, haematuria, haemoptoe, haemophylia, haemorrhagiás diathesis, Möller—Barlow-kór, metrorrhagia, ulcus ventr., colitis, dysenteria, dyphtheria, pneumonia, tbc, hepatitis, arzenobenzol-intolerantia, csecsemők és kisgyermekek ellenállásának fokozása fertőzésekben, koraszülöttek és mesterségesen táplált csecsemők erősítése.

Adagolás: Inj.: Naponta 1—5 ml s. cut., i. musc., i. ven., gyermekeknek arányosan kevesebbet. Drazsé: Csecsemőknek napi $^1/_4$—$^1/_2$, gyermekeknek napi $^1/_2$—1, felnőtteknek napi 1—3 drazsé (achylia esetén sol. pepsinivel).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére a drazsé szabadon, az inj. a kórismének a vényen történő feltüntetésével rendelhető. — Lejárati idő: inj. 2 év.

Csomagolás: b. 5×1 ml amp. 8,75 Ft, b. 100×1 ml amp. 175,— Ft,
b. 5× 2 ml amp. 13,90 Ft, b. 100×2 ml amp. 278,— Ft,
b. 3×5 ml amp. 18,— Ft,
b. 20 drazsé 5,90 Ft, b. 100 drazsé 29,50 Ft.

VITAMIN D_3 Ch. XXXI.
olajos inj. 400 000 NE, drazsé 3000 és 50 000 NE, olaj 400 000 NE

Összetétel: 1 amp. (1 ml) 400 000 NE cholecalciferol., oleum pro inj. ad 1 ml-t,
1 drazsé 3000, ill. 50 000 NE cholecalciferol.-ot,
1 üveg olaj 400 000 NE cholecalciferol.-ot tartalmaz 10 ml olajos oldatban.

Javallatok: Rachitis megelőzése és gyógyítása. Spasmophilia, rachitogen tetania, osteomalacia, osteoporosis, felszívódási zavarok, exsudativ diathesis. Csonttörések esetén a callus-képzés fokozása, fogképződés elősegítése. Graviditas, lactatio, valamint ozaena, ekzema chronica, psoriasis, scleroderma, acne vulgaris, tbc. luposa cutis és a bőr-tbc, egyéb alakjainak, tbc-s lymphomának stb. kezelése.

Ellenjavallatok: Hypercalcaemiával járó megbetegedések.

Adagolás:
1. **Megelőző alkalmazás:**
A folyamatos megelőzés fiziológiásabb, mint az ún.

lökés-prophylaxis, ezért feltétlenül előnyben részesítendő.

Az *érett csecsemők* napi szükséglete átlag 500—1000 NE, *koraszülötteké* pedig 1000—1500 NE. Ennek megfelelően az átlagos adag 3 naponként 3 csepp olaj vagy 1 drazsé (à 3000 NE). A megelőző alkalmazást általában a születés utáni 2. hét végén kezdjük el. *Kisgyermekkorban és ifjúkorban* is, a növekedés befejeztéig a napi szükséglet kb. 400 NE, vagyis hetenként 1-szer 3 csepp olaj vagy 1 drazsé (à 3000 NE). A folyamatos megelőzést a nyári hónapokban — orvosi utasításra — csökkentett adagokkal folytatjuk.

Ha szükség esetén *lökésmegelőzést alkalmazunk*, akkor a *csecsemő* 2—3 hetes korában 200 000 NE (5 mg)-ot lehetőleg per os egy kávéskanál tejben adunk. A lökésmegelőzés parenterális módját ritkán alkalmazzuk, mert az intramuscularisan adott nagy adag D_3-vitamin rosszabbul és lassabban szívódik fel. Érett csecsemőnek az első D_3-vitaminadag adása után kb. 2 hónap múlva, majd általában 3 havonként 400 000 NE (10 mg)-ot adunk. (A csecsemő első évi összmennyisége tehát kb. 35 mg.)

Koraszülöttek — lökésmegelőzés esetén — általában már a második hét végén 200 000 NE (5 mg)-ot kapnak; ezt az adagot 6—8 hetenként megismételjük. (A koraszülött első évi összmennyisége tehát 40—45 mg.)

Terhes anyák D_3-vitamin-szükséglete az utolsó terhességi hónapokban általában napi 1000 NE, vagyis hetenként 2-szer 1 drazsé (à 3000 NE), illetve 2-szer 3 csepp olaj, vagy kb. 6—7 hetenként 1 db 50 000 NE-t tartalmazó drazsé.

2. **Gyógyító alkalmazás:** Egyéni megítélést igényel. Per os folyamatos adagolás mellett a napi adag 10 000—20 000 NE is lehet.

Összesen kb. 400 000 NE-t adunk. Lökés-therapia esetén az egyszeri adag általában 7,5—10 mg (300 000—400 000 NE). A fenti adagokat szükség esetén 1 hónap múlva megismételjük.

A feltüntetett adagok csupán átlagadagok, amelyek esetenként módosulhatnak a D_3-vitamin szükségletet befolyásoló tényezők (infectio, erősebb növekedés, calcium-szegény étrend, phytin-gazdag étrend stb.) A D_3-vitamin-szükséglet ugyanis egyénenként különböző.

A túladagolás veszélye nemcsak a lökés-therapiában, hanem a folyamatos adagolás esetében is fennáll.

Mellékhatások: A megadott adagok túllépésekor, általában pedig akkor, ha a havonként adott D_3-vitamin összmennyisége meghaladja az 1 millió egységet, túladagolás, illetve D-hypervitaminosis veszélye fenyeget. Tünetei: étvágytalanság, súlyállás, hányás, székszorulás vagy hasmenés, gyengeség, fáradékonyság, sápadtság, fejfájás, izomernyedtség, proteinuria, súlyos veseműködési zavarok.

A rachitis gyógyítása — a vér és vizelet calciumtartalmának ellenőrzése, csont-röntgenfelvétel stb. miatt — lehetőleg intézetben történjék. Hosszabban tartó hasmenés esetén, valamint a zsírfelszívódás zavaraiban (pl. coeliakia) csak injekciós kezeléstől várható eredmény.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: drazsé 5 év, inj. és olaj 3 év.

Csomagolás: 1×1 ml à 400 000 NE (10 mg) ampulla 7,50 Ft; 10×1 ml à 400 000 NE (10 mg) ampulla 63,60 Ft;
20 db à 3000 NE (0,075 mg) drazsé 3,15 Ft;
200 db à 3 000 NE (0,075 mg) drazsé 15,50 Ft;
20 db à 50 000 NE (1,25 mg) drazsé 10,20 Ft;
100 db à 50 000 NE (1,25 mg) drazsé 39,90 Ft;
1×10 ml á 400 000 NE (10 mg) olaj 9,40 Ft.

VITAMIN E K.Gy. XXXI.

drazsé 10 mg, olajos inj. 30 mg

Összetétel: 1 drazsé 10 mg tocoph. acet.-ot,
1 amp. (1 ml) 30 mg tocoph. acet., 0,1 ml alcohol benzylic.-t tartalmaz.

Javallatok: Sterilitas, habitualis abortus, abortus imminens, terhesség és lactatio alatt a fokozott E-vitamin-szükséglet kiegészítésére, oligo- és amenorrhoea, hyperplasia uteri. Endarteritis obliterans, lo-

calis keringési és trophiás zavarokon alapuló végtag-megbetegedések.

Adagolás: Hetenként 2—3×1—10 drazsé vagy hetenként 2—3 amp. i. musc. Habitualis abortus esetén Glanducorpinnal kombinálható. Súlyos esetekben napi 150—180 mg i. musc.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére szakrendelések a kórisme feltüntetésével rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok abortus imminens esetében a kórisme feltüntetésével, egyéb esetben csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. — Lejárati idő: 5 év.

Csomagolás: 50 drazsé 42,80 Ft,
5×1 ml amp. 22,— Ft, 50×1 ml amp. 163,90 Ft.

VITAMIN K Ch. XXXI.
inj. 10 mg, tabl. 10 mg

Összetétel: 1 száraz amp. I. 10 mg menachin. natr. bisulf.-ot,
1 amp. oldószer II. (2 ml) 14 mg natr. chlor., aqua dest pro inj. ad 2 ml-t tartalmaz.
1 tabl. 10 mg menachin. natr. bisful.-ot tartalmaz.

Javallatok: Occlusiós icterus, műtéti elő- és utókezelés cholaemiában, epesipoly, colitis ulcerosa, dysenteria, steatorrhoea, sprue, coeliakia, újszülöttek vérzékenysége, sárgaság, szalicilmérgezések, purpura, thrombopenia, szérumbetegség, urticaria, haemoptoe.

Adagolás: *Tabl.:* felnőtteknek naponta 1—3 tabl.; csecsemőkorban: 2×½ tabl., 1—3 éves korban: 3×½ tabl., 3—9 éves korban: 2—3×1 tabl., 12—15 éves korban 3×1½ tabl. — étkezés után vízben feloldva. *Inj.:* Felnőtteknek 10—30 mg (1—3 amp.), csecsemőknek és gyermekeknek 5—20 mg (½—2 amp.), *kizárólag intramuscularisan.*

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 1 év, tabl. 2 év.

Csomagolás: 5×1 ml amp. I. + 5×2 ml amp. II. 32,10 Ft;
20 tabl. 3,50 Ft, 100 tabl. 9,10 Ft.

XANTHOMYCIN E.Gy.T. XLVII.
drazsé

Összetétel: 1 drazsé 0,25 g chlortetracyclin. hydrochlor.-ot tartalmaz.

Javallatok: Penicillin-refrakter coccus-fertőzések, subacut bacterialis endocarditis, amennyiben penicillin-, streptomycin-resistentia, ill. -intolerantia áll fenn, peritonitis, meningitis, osteomyelitis, brucellosis, Q-láz, kiütéses typhus, primaer atypikus vírus-pneumonia, anthrax, actinomycosis, amoeba hepatitis. A húgy- és epeutak *B. coli és Enterococcus* okozta fertőzései. (Nem hatásos Proteus- és Pyocyaneus-fertőzésekben.) Fülészetben: otitis media és mastoiditis.

Adagolás: *Felnőtteknek* a minimális napi adag 1 g (4 drazsé) 4 részre elosztva. A kórkép súlyosságától, illetve a kórokozó érzékenységétől függően napi 2—4 g-ot is lehet adni. *Gyermekeknek* testsúlykg-onként 10—20 mg a napi adag, ugyancsak 4 részre elosztva. A Xanthomycin therapiás alkalmazása során gyakran megváltozik a bél baktériumflórája. Így vitaminhiányt okozhat, amit pótolni kell (B-komplexszel). A beteg szervezetében gombák is elszaporodhatnak (moniliasis). — Gyakran előfordul hányás, hányinger, hasi fájdalom és hasmenés, igen súlyos Staphylococcus-enteritis fejlődhet ki. Ezekben az esetekben a kezelést abba kell hagyni.

Megjegyzés: ✠✠ Csak fekvőbeteg-gyógyintézetek részére van forgalomban. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 200 drazsé 880,— Ft.

YOHISTRIN masc. Ch. XXVIII.
drazsé, szuszpenziós inj.

Összetétel: 1 drazsé 1 mg calc. methylarson., 3 mg yohimbin. hydrochlor., 0,5 mg strychn. hydrochlor., 5 mg methyltestosteronumot,
1 amp. (1 ml) 20 mg natr. methylarson., 5 mg yohimbin. hydrochlor., 0,5 mg strychn. hydrochlor., 5 mg testosteron. microcryst., 20 mg cetyl-trimethyl-ammonium brom.-ot tartalmaz.

Javallatok: Sexualis neurasthenia, spermatorrhoea, ejaculatio praecox, depressiós állapotok, kimerültség, asthenia, frigiditas, csökkent libido.

Adagolás: A kúrát másodnaponként i. musc. adott 1 ml injekcióval kezdjük, 5—10 befecskendezés után drazsékkal folytatjuk (napi 3-szor 1—2 drazsé), majd újabb 5—10 injekcióval fejezzük be.

Megjegyzések: ✠✠ Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha az adott esetben a beteg gyógykezelését más — szabadon rendelhető — gyógyszer megfelelően nem biztosítaná. — Közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

Csomagolás: 50 drazsé 17,50 Ft;
5×1 ml amp. 9,10 Ft.

ZENON B. XLIV.
kenőcs

Összetétel: 1 tubus (20 g) 0,64 g o-oxychinolin. sulfosalic., 4,96 g zinc. oxyd., 1,6 g ol. jecor., 0,2 g bals. peruv.-ot tartalmaz vazelin típusú kenőcsben.

Javallatok: Sebek kezelésére, ekzema, dermatitis.

Alkalmazás: Külsőleg mint kenőcs.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 tubus (20 g) 6,70 Ft.

ZINKPROT-INSULIN K.Gy. XXXV.
szuszpenziós inj. 400 NE

Összetétel: 1 gumisapkás üveg 400 NE insulin. cryst., 0,8 mg zinc. chlor., 4 mg protamin. sulf.-ot tartalmaz 10 ml vizes szuszpenzióban (1 ml = 40 NE inzulin, cinkinzulinprotaminát alakjában).

Javallat: Diabetes mellitus súlyos, enyhe és juvenilis formái.

Adagolás: Az injekció subcutan adagolandó, a beteg tolerantiájának megfelelő individualisan meghatározott mennyiségben.

Megjegyzés: ✠ Csak az insulin rendelésére vonatkozó egészségügyi miniszteri rendeletben foglaltak szerint rendelhető (l. 583. old.) — Lejárati idő: 1½ év.

Csomagolás: 1×10 ml 39,60 Ft.

ZITOSTOP E.Gy.T. L.
tabl.

Összetétel: 1 tabl. 100 mg 1,2,5,6-tetramethansulfonyl-D-mannitolum-ot tartalmaz.

Javallat: A tumoros betegek sebészeti és sugaras kezelésének kiegészítése, valamint — a klinikai tapasztalatok alapján — sebészi és sugaras kezelésre nem alkalmas esetekben, emlő-, tüdő-, ovarium-, gyomor-, rectum-, sigma-, urologiai neoplasmás eredetű folyamatok kezelése. Megkísérelhető chronikus lymphoid és myeloid leukaemia, lymphosarcoma, reticulosarcoma és lymphogranulomatosis esetében is. *A sebészeti és sugaras kezelést nem teszi feleslegessé.*

Ellenjavallat: Haemorrhagias diathesis, leukopenia. Előzőleg alkalmazott sugaras vagy cytostatikus kezelés után fokozott óvatosság ajánlatos.

Adagolás: Adagolása egyéni: a kezelési periódus összdosisa relatív, tág határok között változik. A napi adag általában 3×1 tabl. (50—60 kg-os testsúly esetén). Ennél az adagolásnál kell maradni — a vérkép alakulásától függően — a therapiás hatás bekövetkeztéig. A kezelés egyes periódusainak időtartama általában 30 nap, az összmennyiség 2—3 periódus alatt 180—270 tabletta. Az egyes periódusok között 3—4 hét szünet tartandó.

Mellékhatások: *Vérképzőszervi, ritkábban más szervi károsodások fordulhatnak elő, ezért a kezelés mindenkor csak megfelelő vérkép-, esetleg csontvelőkép-kontroll mellett végezhető.*
A *teljes* vérképet ajánlatos hetenként ellenőrizni. Átmeneti, nem jelentős vérképkárosító hatás esetén a szer adagolásának szüneteltetése és megfelelő kezelés (transfusio, prednisolon stb.) után a therapia kisebb adagok alkalmazásával tovább folytatható. Különösen fontos a thrombocyta-szám ellenőrzése. Ha a thrombocyta-szám 100 000 vagy az



alá csökken, a kezelést a thrombocyta-szám rendezéséig fel kell függeszteni. A kezelés befejezése után a vérképet 4—6 hétig ajánlatos ellenőrizni, mert késői haematologiai károsodások is előfordulhatnak.

Megjegyzés: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 20 tabl. 15,10 Ft, 200 tabl. 139,90 Ft.

TÖRZSKÖNYVEZETT SZEROBAKTERIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK

A szerobakteriológiai készítmények a fertőző betegségek megelőzését, gyógyítását vagy felismerését szolgálják. A Magyar Gyógyszerkönyv antigén hatásúakra és antitest hatásúakra osztja ezeket a készítményeket.

Immunológiai értelemben *antigén*eknek azokat az anyagokat nevezzük, amelyek az élő szervezetbe a tápcsatorna megkerülésével (parenteralisan) bejuttatva, fajlagos (specifikus) ellenanyagok (antitestek) képződését váltják ki, és a keletkező antitestekkel a szervezeten kívül (in vitro) is reagálnak. Bár az immunitás a szó szoros értelmében védettséget jelent, ma az orvosi gyakorlat az immunizálás kifejezését sokkal tágabb értelemben használja és olyan esetekre is alkalmazza, amikor az ellenanyagok termelődését nem baktériumok vagy vírusok, toxinok, hanem egyéb sejtes elemek (pl. idegen csoportú vörösvérsejtek) vagy nagy molekulájú, testidegen szerves vegyületek (pl. fehérjék, poliszaharidák stb.) váltják ki. Az *antitest*ek a keletkezésüket kiváltó antigéntől, az alkalmazott vizsgálati módszertől, illetve az in vitro tapasztalható hatásuktól függően baktericid, vírusközömbösítő, antitoxikus, precipitáló, komplementkötő, opszonizáló stb. hatású ellenanyagokra oszthatók. Az antitesteket immunglobulinoknak is nevezik, mert a vérsavó globulin-frakciójában (főként a γ- és a β-globulin-frakcióban) mutathatók ki; lényegileg az antigén hatására specifikusan módosult szérumfehérjék. Az emberi immunglobulinokat IgG, IgA, IgM, IgD, IgE és IgU osztályokba soroljuk. Az antigén hatású oltóanyagok csoportjába azok a készítmények tartoznak, amelyek a szervezetben ellenanyag-termelést váltanak ki, vagy a vérsavó ellenanyagainak in vitro kimutatására szolgálnak, míg az antitest hatású készítmények

csoportjába különböző ellenanyagokat tartalmazó szérumok sorolandók.

Magyarországon a Human Oltóanyagtermelő és Kutató Intézet infúziós kezelésre szolgáló oldatokat és diagnosztikai portáptalajokat is forgalomba hoz.

I. Antigén hatású készítmények

Az antigén hatású készítmények vagy élő, gyengített, illetve elölt mikroorganizmusokat tartalmaznak, vagy pedig azok kivonatanyagainak, illetve anyagcseretermékeinek felhasználásával készülnek. E csoporton belül a védő oltóanyagok a szervezet *aktív immunizálására* szolgálnak, arra serkentik a szervezetet, hogy aktívan, saját maga teremtse meg az egyes kórokozó mikroorganizmusokkal szemben az aktív védettséget biztosító, specifikus immunitást. A védőoltások hatására az aktív immunitás aránylag lassan, 1—2—3 hét alatt fejlődik ki, de hosszú ideig megmarad, és mint *megelőző eljárás*, eredményének tartóssága folytán a fertőző betegségek elleni küzdelem egyik leghatékonyabb fegyvere (pl. diphtheria, typhus, himlő stb.). Az aktív immunizálás eredménye az oltottak individuális reakciókészségétől, az oltóanyag milyenségétől és alkalmazásmódjától függ. Az antigének hatékonysága jelentősen növelhető, a védettség eléréséhez szükséges oltások száma csökkenthető, ha a felszívódás lassúbbá tételére az illető antigéneket alumíniumtartalmú csapadékhoz kötik.

Hosszabb lefolyású, lassan gyógyuló megbetegedések egyes eseteiben (pl. Staphylococcus-, Gonococcus-fertőzések, trychophytiasis stb.) az aktív immunizálás gyógyítás céljából is alkalmazható: a kórokozók elölt tenyészeteiből készült vakcinák emelkedő adagjainak parenteralis bevitelére a gyógyulás sok esetben hamarabb következik be.

a) *Összetétel*

Az antigén hatású oltóanyagok hatóanyag-tartalmuk, illetve készítési módjuk alapján az alábbi főcsoportokba oszthatók:

1. *Az élő, gyengített mikroorganizmusokat tartalmazó oltóanyagok* közül emberi fertőzések megelőzésére a him-

lonyikot és a BCG-vakcinát alkalmazzák kiterjedten. Az ezekben a készítményekben levő mikroorganizmusok a szervezetben elszaporodnak és enyhe fertőzést hozva létre, a makroorganizmust sokkal intenzívebb ellenanyag-termelésre serkentik, mintha ugyanezek az antigének elölt állapotban kerültek volna alkalmazásra.

2. *Az elölt mikroorganizmusokat tartalmazó oltóanyagok* száma lényegesen nagyobb. Egy részük bakteriális fertőzések megelőzésére és kezelésére szolgál. A baktériumokat a biológiai tulajdonságaiknak legjobban megfelelő folyékony vagy szilárd táptalajokon elszaporítják, majd az élettani konyhasó-oldatban szuszpendált mikroorganizmusokat kémiai eljárással (fenollal, formalinnal stb.) vagy fizikai módszerrel (rendszerint hővel) elölik, azután a szuszpenziót a táptalajszennyezéstől ismételt centrifugálással és mosással szabadítjuk meg. A bakteriális vakcinák hatóértékét a ml-enkénti csíraszámmal fejezik ki, immunogén hatásukat állatkísérletben ellenőrzik. A vírusvakcinák előállítása és ellenőrzése lényegileg hasonló módon történik.

3. *A baktériumkivonatok nem-specifikus kezelés* céljára, a kórokozóra való tekintet nélkül a szervezet természetes gyógyerejének fokozására is alkalmazhatók. A Neurolysin (*Staphylococcus aureus* és *B. prodigiosum* autolizátuma) és a *Polysan* (apatogén vakcinák lizátuma) a szervezet aktiválására, áthangolására szolgálnak. Hasonló célra alkalmazható a sejtfal-polysaccharidákat tartalmazó Mannozym is.

4. A *toxinok* a toxintermelő baktériumok (C. *diphtheriae*, Cl. *tetani* stb.) levestenyészeteinek baktériummentes szűrletei. Az előállításukra szolgáló táptalajok — a szérum-anaphylaxia veszélyének megelőzése érdekében — állati fehérjét még nyomokban sem tartalmazhatnak. A Diftéria- és a Tetanusz-toxinok hatóértékét a tengerimalacon, illetve egéren mért legkisebb halálos adaggal (DLM = *dosis letalis minima*), a vörheny-toxinét pedig bőregységben (BE) fejezik ki. A kellőképpen hígított toxinok az antitoxikus immunitás bőrpróbával történő megállapítására is alkalmazhatók (pl. Dick-toxin): intracutan injiciálva, fogékony egyéneken a befecskendezés helyén bőrpír jelentkezik.

5. A *toxoidokat* úgy nyerik, hogy a toxinokat formalin és hő együttes hatásával méregtelenítik. A toxoidok immunizálóképessége a tökéletes méregtelenítés után is változatlan. Hatóértéküket az antitoxinnal kapott kö-

tődési reakciók alapján flokkulációs egységekkel (Limes flocculans, Lf) vagy kötődési egységekkel (KE) fejezik ki. Az immunogén hatást állatkísérletekben ellenőrzik. A toxoidok specifikus hatóanyaga a táptalajszennyezéstől és a kísérő baktériumfehérjéktől kémiai kezeléssel (pl. triklórecetsavas eljárással!) elkülöníthető, az ily módon tisztított és koncentrált toxoidok alkalmazása esetén a védőoltásokat sokkal ritkábban követik oltási reakciók. A toxoidok rendszerint adszorbeált formában kerülnek forgalomba.

6. A *kombinált oltóanyagok* két vagy több antigént tartalmaznak. Védőhatásuk legalább olyan mértékű, mintha a szóban forgó antigéneket külön-külön alkalmaznánk, így használatuk által, az oltások száma jelentékenyen csökkenthető.

7. Az *antigén hatású diagnosztikumok* a fertőzések in vivo, illetve in vitro módszerekkel történő kimutatására szolgálnak. A Tuberkulin és a Trichosan megfelelő mikroorganizmusok levestenyészeteinek besűrített szűrlete. Kellő hígításban ezeket a készítményeket rendszerint allergiás bőrpróbák végzésére használják, bizonyos esetekben azonban gyógyítás céljára is alkalmazhatók.

A *diagnosztikus baktériumszuszpenziók* emberi vérsavók agglutinintiterének meghatározására, Gruber—Widal-reakció végzésére szolgálnak.

A *lues-antigének* forgalombahozataluk előtt specificitás és érzékenység szempontjából alaposan kivizsgált specifikus lipid antigéneket tartalmazó oldatok, ill. szuszpenziók.

b) *Alkalmazásmód*

1. *Ellenjavallatok.* A megelőzés céljából alkalmazott oltóanyagokkal csak teljesen egészséges egyéneket oltsunk. Nem szabad védőoltásban részesíteni lázas vagy súlyos betegségben (pl. tüdőgyulladásban, mellhártyagyulladásban, vesegyulladásban), heveny fertőző betegségben, kiterjedt gennyes vagy egyéb bőrbetegségben, súlyos keringési elégtelenségben, kiterjedt vizenyővel járó vesebetegségben szenvedőket, továbbá erősen lerontott állapotban levő egyéneket. Terheseket a hastyphus és a tetanus elleni aktív oltások alól mentesíteni kell. Az Eü. Min. rendelete szerint az orvos akkor is köteles a védőoltás alkalmazása előtt mérlegelni, hogy az

oltandó egyén egészségi állapota az oltást megengedi-e, ha az oltásra kötelezett, illetőleg gondviselője ez irányú kérelmet nem ad elő. Ha viszont valakinek a védőoltása közvetlen megbetegedési veszély elhárítása céljából szükséges (pl. tetanus-fertőzésre gyanús sérültnél), az orvos az érdekelt, illetőleg gondviselője beleegyezésével a mentesítő körülmények ellenére is alkalmazhat védőoltást.

A *gyógyítás* céljára szolgáló oltóanyagok (pl. Autovakcina, Opsodermin, Opsogon, Polymycin stb.) alkalmazása előtt feltétlenül tisztázandó, hogy a kezelendő megbetegedéshez nem társul-e olyan kórkép vagy állapot (pl. keringési elégtelenség, súlyos leromlottság stb.), amelyet az esetleges oltási reakciók súlyosbíthatnak, illetve károsan befolyásolhatnak.

2. Az *oltások kivitelezése.* Az Eü. Min. rendelete szerint az oltó orvos köteles gondoskodni arról, hogy mind az oltóanyag, mind az oltásnál használt eszközök kifogástalan állapotban legyenek. Az oltóanyaggal kapcsolatban elkövetett hibákért (fertőződés, elcserélés stb.) elsősorban az oltó orvos a felelős.

Az oltásokat csak frissen kifőzött fecskendőkkel és tűkkel (himlőoltásnál Pirquet-lándzsával vagy oltógerellyel) szabad végezni. Csapadékos oltóanyaggal történő tömeges oltásokhoz 5 ml-esnél nagyobb fecskendőt ne használjunk. A diagnosztikus bőrpróbák végzésekor (Dick-toxin, Tuberkulin stb.) az oltást tuberkulinfecskendővel (vagy annak hiányában 1/10 ml-es beosztású 1,0 ml-es Record-fecskendővel!) kell végezni. A kifőzött fecskendők összerakásához ugyancsak kifőzött vagy lángon sterilezett csipeszt kell használni, mert a dugattyú szárának kézzel való megfogása fertőzést okozhat. A steril tűket szintén steril csipesszel kell a fecskendőre helyezni.

A tűket minden oltás után váltani kell. Az újrafertőtlenítés 20 perces forralással történjék, lehetőleg 1,5%-os szódaoldatban. Elhúzódó, tömeges oltások esetén időnként a fecskendőket újra kell sterilezni.

Az ampullák vagy üvegek felrázása után az ampulla nyakát lereszeljük, illetve az üveget elzáró gumidugót vagy gumilapot lejódozzuk, majd átszúrjuk, és az oltóanyagot a fecskendőbe felszívjuk. Csapadékos oltóanyagok esetében azután az oltást haladéktalanul el kell végezni, nehogy az oltóanyag csapadékos része leülepedjék.

Az oltásra kerülők bőrét az oltás helyén benzinnel

vagy alkohollal le kell mosni. Élő kórokozóval (himlő, BCG) történt oltás után az oltás helyét fertőtlenítőszerrel érinteni nem szabad.

A diagnosztikus bőrpróbák céljára szolgáló készítményeket *intracutan*, a többi antigén hatású oltóanyagot általában *subcutan* alkalmazzuk. *Izomba* adandó a Difteria-Tetanus-Pertussis kombinált oltóanyag. Csapadékos oltóanyagok bőr alá fecskendezésekor a felületes oltást különös gonddal kerüljük!

Intravenásan a nem csapadékos oltóanyagok is csak bizonyos, különleges esetekben (l. Opsogon, Pyrago) alkalmazhatók.

3. *Adagolás.* A *megelőzésre* használatos oltóanyagok, különösen a toxoidok esetében, igen nagy jelentősége van az oltások közötti időköznek. Az első oltás után rendszerint csak ún. potenciális immunitás (alapimmunitás) jön létre, és a szervezet csak a második oltás után termel nagyobb mennyiségben ellenanyagokat, ha a két oltás között 4—6 hetes szünetet tartunk. Alapimmunitással rendelkezők esetében viszont már egyetlen oltás hatására is jelentékeny ellenanyag-termelés indul meg (emlékeztető oltás).

A *gyógyításra* alkalmazott vakcinák (pl. Autovakcina, Opsodermin, Polymycin) esetében az eredmény szintén nagymértékben függ a kezelés módjától. Ezeket a készítményeket mindig individuálisan kell alkalmazni: alacsonyan megválasztott kezdeti adag után a beteg állandó észlelése mellett fokozatosan emeljük az adagokat mindaddig, míg a kívánt hatást el nem értük. A kezelést, az eredmény tartósabbá tételére, célszerű még ezután is egy ideig folytatni. Fontos az oltások közötti időköz megfelelő megválasztása is. Sorozatos oltások esetén újabb oltást addig ne adjunk, míg az előző oltást követő reakció teljesen le nem zajlott.

4. *A védőoltások mellékhatásai.* A *védőoltásokat* követő kisebb vagy nagyobb reakciók gyakoriságát több, részben az oltottakkal, részben pedig az oltóanyaggal összefüggő tényező befolyásolja. Általában minél idősebbek az oltottak, annál gyakoribbak a mellékhatások. Szerepe van az *individuális* érzékenységnek is, mert mindennapos tapasztalat, hogy ugyanaz az oltóanyag, ugyanolyan módon alkalmazva, az oltottak egy részénél semmilyen reakciót nem vált ki, másoknál pedig megfigyelhetők mellékhatások. Az oltási szövődmények gyakorisága és az oltási technika között is szoros az összefüggés: csapadékos oltóanyag felületes oltása esetében sokkal gyakrabban jelentkezik „steril tályog", mint akkor, ha az oltóanyagot izomba fecskendezzük. Maguknak az antigéneknek reaktivitása is különböző: a bakteriális antigént tartalmazó oltóanyagok alkalmazását gyakrabban követik oltási reakciók, mint a csak toxoidot tartalmazók alkalmazását.

Mivel a védőoltásokat követő első reakciók rendszerint már néhány óra múlva jelentkeznek, célszerű az oltásokat az esti órákban végezni, hogy az esetleges reakciók éjszakára, az ágynyugalom idejére essenek, mert ilyenkor a tünetek enyhébb alakban jelentkeznek. Kívánatos, hogy az oltottak az oltást követő napon az erősebb testi munkától tartózkodjanak.

A *localis reakciók* az oltás helyén észlelhető pír, duzzanat, fájdalom, esetleg a regionális nyirokcsomók duzzanata alakjában jelentkeznek. A helyi tünetek egy-két napig tartanak, a panaszok borogatással enyhíthetők. Csapadékos oltóanyagok alkalmazása után néhány héttel egyes esetekben steril tályogok is megfigyelhetők, különösen akkor, ha az oltás a felületen történt. Ezek a steril tályogok rendszerint spontán felszívódnak. Ritkán a védőoltásokat *általános reakció* is követi, láz, főfájás, rosszullét, hányás alakjában; ezek a jelenségek tüneti kezeléssel jól befolyásolhatók.

Mind a helyi, mind az általános reakciók gyakorisága lényegesen csökkenthető, ha az oltások ellenjavallatait figyelembe vesszük és ha helyes oltási technikát alkalmazunk.

A *gyógyításra* alkalmazott oltóanyagokat helyi reakció, gócreakció és általános reakció kísérheti. A mérsékelt reakciók ilyen esetekben rendszerint a megbetegedés gyors javulását segítik elő, az adagokat azonban feltétlenül úgy kell megválasztani, hogy az erősebb helyi és általános tünetek elkerülhetők legyenek; sorozatos oltás esetén csak akkor emeljük az adagot, ha az előző oltási dosis nem idézett elő erős reakciót. Ellenkező esetben az előzően adott adagot ismételjük.

5. *Eltarthatóság.* Az antigén hatású készítmények a hőhatással szemben igen érzékenyek, ezért általában 2—10 °C közötti hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandók. Különösen érzékenyek a diagnosztikus bőrpróba céljára szolgáló toxin-hígítások (pl. a Dick-toxin) és a himlőnyirok. Ezeket a készítményeket kézhezvéte-

lük után lehetőleg azonnal használjuk fel, addig is 0—5 °C közötti hőmérsékleten tartandók.

Az antigén hatású szerobakteriológiai készítmények felhasználhatósága lejárati időhöz kötött. A Magyar Gyógyszerkönyv szerint a lejárati idő általában a *készítéstől* számítandó, a készítmények dozírozása és gyakran többhónapos ellenőrző vizsgálata csak azután történik meg, ezért az antigén hatású készítmények annyival rövidebb lejárati idővel kerülnek forgalomba, mint amennyi időt a kiszerelés és az ellenőrző vizsgálatok igénybe vesznek. A hatósági célra szolgáló oltóanyagok kétéves lejárata csak megfelelő tárolás esetében érvényes.

II. Antitest hatású készítmények

Az ellenanyag hatású oltóanyagok egy-egy kórokozó antigénjei ellen ható specifikus ellenanyagokat tartalmaznak. Mivel a szervezetbe juttatva *passzív immunitást* hoznak létre, passzív hatású oltóanyagoknak is nevezhetők. A vérsavók *elsősorban gyógyítás*ra alkalmasak, egyes esetekben megelőzésre vagy diagnózis-megállapítás céljából is használhatók.

a) *Összetétel*

Az ellenanyag hatású oltóanyagokat hatóanyaguk, illetve készítési módjuk szerint az alábbi csoportokra oszthatjuk:

1. *A natív antitoxikus szérumok*at úgy nyerik, hogy egészséges állatokat (lovakat, szarvasmarhákat, juhokat) a megfelelő antigén (diphtheria, tetanus stb. -toxoid, majd -toxin) emelkedő adagjaival immunizálnak. Ha az állatok vérsavójában az antitoxikus ellenanyag megfelelő koncentrációban mutatható ki, vért vesznek tőlük. A vér megalvadása után nyert vérsavót 0,5% fenollal konzerválják. Mivel a natív szérumok a labilis fehérjék kiválása folytán zavarossá válhatnak és az első időben hatóértékük is gyorsabban csökken, legalább hathónapi tárolás után kerülnek szűrésre, majd töltésre. Az antitoxikus szérumok ml-enkénti hatóértékét állatkísérletben határozzák meg és nemzetközi egységekben fejezik ki.

2. A *koncentrált és tisztított antitoxikus szérumok*at a natív szérumokból biokémiai módszerekkel állítják elő. Az antitoxint tartalmazó fehérjefrakciót proteolitikus kezelés után ammóniumszulfát jelenlétében hővel kezelik; ilyen körülmények között az inaktív fehérjék kicsapódnak. Szűrés után az oldatból az antitoxin-tartalmú fehérjéket az ammóniumszulfát-koncentráció további emelésével különítik el az albuminoktól, az így nyert csapadékot préselés után dializálják, majd az oldatot izotóniássá teszik. Az így koncentrált és tisztított szérumokat 0,25% fenollal és 0,005% mertioláttal konzerválják.

3. Az *antibakteriális natív szérumok*at az antitoxikus szérumokhoz hasonló módon nyerik. A lovakat, sertéseket elölt vagy élő baktériumok emelkedő adagjaival immunizálják (lépfene, sertésorbánc elleni vérsavó). A baktérium elleni vérsavók hatása a szervezetbe jutott mikroorganizmusok elpusztítására irányul, értékmeghatározásuk állatkísérletben történik.

4. A *diagnosztikus állati savók* előállítása során az állatokat gondosan kivizsgált antigenicitású baktériumtörzsek élő vagy elölt szuszpenziójával vagy szérumfrakcióval, illetőleg szérummal vagy vörösvértestekkel oltják.

5. A *vércsoport-meghatározó szérumokat* (Serotyp, Anti-D) úgy állítják elő, hogy magas agglutinin-titerű, esetleg immunizált egyének vérsavóját a mellékagglutininek eltávolítása után 0,01% mertioláttal konzerválják, majd kapillárisokba vagy átszúrható gumidugós üvegcsékbe osztják el és folyékonyan vagy liofilizett állapotban hozzák forgalomba.

b) *Alkalmazásmód*

1. *Adagolás*. Az állati szérumokat csak előzetes túlérzékenységi próba után szabad alkalmazni. A *megelőzésre* alkalmazott szérumok védőhatásukat azonnal kifejtik, de rendszerint csak 2—3 hetes passzív immunitást biztosítanak. Mivel a védőhatás alacsonyabb értékű szérumokkal is elérhető, a szérum-anaphylaxia megelőzése érdekében *prophylactikus* célra lehetőleg *ne lósavót*, hanem szarvasmarha- vagy juhsavót alkalmazzunk.

Ha *gyógykezelésre* alkalmazunk szérumokat, annál

jobb eredményre számíthatunk, minél korábbi szakban kezdjük meg a savó injiciálását. A szérumadagok megválasztásánál figyelembe kell venni az eset súlyosságát, a beteg életkorát, testsúlyát, általános állapotát és a járvány jellegét.

2. *Az oltások kivitele.* A *megelőzésre* alkalmazott szérumokat rendszerint bőr alá oltjuk. *Gyógykezelés* esetén viszont az izomba történő adás ajánlatos. Az intravenás széruminjekciónak nagy előnye a gyors felszívódás, hátránya a szérum-shock fokozott veszélye. Az intravenás szérumkezelést ezért lehetőleg csak súlyos esetekben, kórházban végezzük, ilyenkor a testhőmérsékletre melegített szérumot lassan injiciáljuk intravenásan. Egyidejűleg ajánlatos bizonyos szérummennyiséget izomba vagy bőr alá is fecskendezni, mivel az érbe adott ellenanyagok gyorsabban ürülnek ki.

A vörhenyszérum *diagnosztikus* bőrpróba céljára intracutan is alkalmazható (Schulz—Charlton-reakció). A diagnosztikus szérumok in vitro kerülnek felhasználásra.

3. *Szérumbetegség.* A szérumok paranterális alkalmazását követő oltási reakciók megjelenési időpontjuk és klinikai képük alapján két csoportra oszthatók:

A szűkebb értelemben vett *szérumbetegség* rendszerint a szérum adását követő *6—10. napok* között jelenik meg. Az oltás helyén pfr észlelhető, amelyet — néha keringési elégtelenség vagy ízületi fájdalmak kíséretében — az egész testre kiterjedő viszkető kiütés (urticaria), oedema követ. A szérumbetegség e típusának időtartama 2—3 nap. Ha a tünetek a szérum adását követően *1—6 nap* között jelentkeznek, gyorsított reakcióról beszélünk. A szérumbetegség tünetei kalcium- és antihisztamin-készítmények adásával és prokainnal enyhíthetők. A szérumbetegség gyakorisága és az alkalmazott szérum mennyisége és milyensége között határozott összefüggés állapítható meg. Azonos fehérjetartalom mellett a magasabb hatóértékű szérumok és különösen a koncentrált és tisztított szérumok adását ritkábban követi szérumbetegség, mint az alacsonyabb hatóértékű natív szérumokét.

Szérum-shockról akkor beszélünk, ha a szérumadás után *azonnal* vagy legfeljebb 24 órán belül jelentkeznek a tünetek: légszomj, keringési gyengeség, sápadtság, verítékezés, esetleg gyorsan kialakuló helyi vizenyő alakjában. Ilyen azonnali reakciók rendszerint olyan

egyéneken észlelhetők, akik életük folyamán korábban ugyanannak az állatfajnak a szérumával kaptak oltást *(szérum-anaphylaxia)*. Igen ritkán, különösen allergiás betegségekben szenvedő egyéneknél, az azonnali tünetek akkor is jelentkezhetnek, ha az illetők a szóban forgó állatfaj savójával korábban még sohasem kaptak oltást *(primaer szérum-shock)*. A tünetek légző- és vasomotor-központ-izgatókkal (pl. koffein), sympatikus végkészülékeket izgatókkal (adrenalin, efedrin stb.) rendszerint jól befolyásolhatók, és a kezdetben igen súlyos állapot — ritka kivételektől eltekintve — gyorsan javul.

A szérum-anaphylaxia veszélyének felismerésére *túlérzékenységi próba* végzendő: az alkalmazandó szérum kis mennyiségét (kb. 0,1 ml-t) élettani konyhasó-oldattal 10-szeresre hígítjuk, és a hígításból 0,2 ml-t injiciálunk intracutan. Ha az oltás után 1—2 órán belül a befecskendezés helyén duzzanat és bőrpír látható, az érzékenységi próba pozitív. Ilyenkor a szérum teljes adagjának alkalmazása előtt a szervezetet desensibilizálni kell. A *desensibilizálást* általában a következő módon végezzük: a szervezet hozzászoktatása céljából 0,2, 0,5, majd 1,0 ml-t injiciálunk óránként intracutan. Ha a túlérzékenységi próba pozitív volt, a szérumot még desensibilizálás után se adjuk intravenásan, *csak* izomba.

A szérum-anaphylaxia megelőzésére ajánlatos, ha a megelőző oltásokat nem lósavóval, hanem szarvasmarha- vagy juhsavóval végezzük. Ebben az esetben a gyógyító szérum adása során szérum-anaphylaxia veszélyétől — más állatfaj savójáról lévén szó — nem kell tartani.

4. A *szérumok eltarthatósága.* 2—10 °C közötti tárolás esetén az antitoxikus szérumok három évig, az antibakteriális és az agglutináló szérumok két évig tarthatók el az utolsó szűréstől, illetve értékméréstől számítva. Mivel megfelelő tárolás esetén is 5—6% az antitoxikus szérumok évenkénti értékcsökkenése, az ilyen szérumoknak forgalomba hozatalukkor legalább 20% antitoxin-többlettel kell rendelkezniök. A liofilezett szérumok lejárati ideje: 2—5 év.

AGGLUTINÁLÓ savók Human liofilezett

Shigella flexneri polivalens agglutináló savó
Shigella dysenteriae 2. (Schmitz) agglutináló savó
Shigella dysenteriae 1. (Shiga—Kruse) agglutináló savó
Shigella sonnei agglutináló savó (I., II. fázis)
Vibrio comma (cholerae) agglutináló savó
Salmonella paratyphi „A" agglutináló savó „H", a
Salmonella paratyphi „B" agglutináló savó „H", b
Salmonella typhi „H" agglutináló savó, d
Salmonella typhi „O" agglutináló savó, 9, 12
Salmonella typhi „Vi" agglutináló savó

Összetétel: Homológ baktériumtörzsek tenyészetével immunizált nyulak specifikus agglutinint tartalmazó, liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: a homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok során kitenyésztett baktériumok identifikálására, lemezagglutináció céljára.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 ampulla, ampullánként 1 ml savó 41,90 Ft.

ANTI-D (anti-Rh_0) savó Human

Összetétel: A mellékagglutininektől kimerítéssel megszabadított, Rh-agglutinint tartalmazó steril emberi vérsavó, azonos mennyiségű 25%-os emberi szérumalbumin-oldattal keverve. Hatóérték: agglutinációs titer: 1:32. Konzerválószer: ml-enként 0,01% mertiolát és 1 mg klóramfenikol.

Alkalmazás: Az Rh-faktor okozta vérátömlesztési és szülészeti szövődmények megelőzése céljából feltétlenül szükséges minden vérátömlesztés előtt (különösen, ha nő a vért kapó), valamint minden terhesnél a vér Rh-típusának meghatározása. A klinikai gyakorlatban a gyors tárgylemez-módszert (kapillárisban elosztott savók), a laboratóriumi gyakorlatban a nedveskamra-módszert (1 ml-es elosztás) használjuk.

Megjegyzés: ✠ Szakrendelések a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 1 év. 0—5 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 kapilláris 4,10 Ft, 5×1 kapilláris 11,10 Ft,
1×1 ml 14,20 Ft, 5×1 ml 59,60 Ft.

ANTISTREPTOKINASE STANDARD Human

Összetétel: 50% glicerin és 50% konyhasó oldat elegyével hígított 1%-os human gamma-globulin oldat. Hatóanyagtartalom: ml-enként 100 ASK egység.

Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-titerének meghatározására összehasonlító standard oldatként. Az ASK I. és ASK II. reagensekkel együtt használandó a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. — 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5,0 ml 20,70 Ft.

0-ANTISTREPTOLYSIN KONTROL GAMMA-GLOBULIN OLDAT Human

Összetétel: Steril emberi gamma-globulin oldat, amelynek 0-antistreptolysin-tartalma ml-enként 10 nemzetközi egység. Konzerválószer: 66% glicerin.

Alkalmazás: A vérsavó 0-antistreptolysin-titerének laboratóriumi meghatározására, használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5 ml 10,20 Ft.

ASK I. (STREPTOKINASE + FIBRINOGEN) reagens Human liofilezett

Összetétel: Streptococcus folyékony táptalajon nyert tenyészetéből előállított streptokinase és marhavérből származó fibrinogén megfelelő arányú, liofilezéssel tartósított keveréke.

Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-titerének meghatározására. Az ASK II. reagenssel együtt használandó a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 19,70 Ft, 5×10 ml 91,— Ft.

ASK II. (PLASMINOGEN + TROMBIN) reagens Human liofilezett

Összetétel: Emberi plazmából kivont plasminogen és szarvasmarha-thrombin megfelelő arányú, liofilezéssel tartósított keveréke.

Alkalmazás: A vérsavó antistreptokinase-titerének meghatározására. Az ASK I. reagenssel együtt használandó a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 18,70 Ft, 5×10 ml 85,50 Ft.

AUTOVAKCINA Human egyedi oltóanyag (Az egészségügyi miniszter 167/1956/Eü. K. 20/Eü. M. sz. utasítása alapján)

Összetétel: Sterilen beküldött váladékból kitenyésztett baktériumtörzsek ml-enként 500 millió elölt csírát tartalmazó szuszpenziója. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: Krónikus és recidiváló, gennykeltők által okozott gyulladásos folyamat esetén immunizálás, infekt allergiás betegség esetén deszenzibilizálás céljára.

Adagolás: Használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére a kórisme feltüntetésével szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 50×0,5 ml-es ampulla 159,— Ft.

BAVIG Human szarvasmarhában termelt antivaccinia gamma-globulin

Összetétele: Vaccinia-vírussal oltott növendék szarvasmarhák szérumából készült 10%-os steril gammaglobulin oldat. A készítmény tisztasági foka legalább 90%. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Himlős betegeknek, továbbá himlő elleni védőoltás után előforduló szövődmények (pl. encephalitis postvaccinalis) esetén gyógyítás céljából.

Adagolás: Testsúlykg-onként 1 ml-t adunk izomba, szükség esetén 2—3 napon belül megismételjük.

Megjegyzések: ✠ Csak hatósági oltások céljára, kizárólag az Eü. M. rendelkezése szerint. Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 5 ml-es ampullában 162,70 Ft.

COOMBS- (anti-human-globulin) szérum Human

Összetétel: A Coombs-vérsavó nyulak vagy lovak emberi szérumfehérjéket precipitáló immunsavója, melyet abszorpciós eljárással az emberi vörösvérsejtre irányuló heterohaemagglutininjeitől meg-

tisztítottunk, így a savó csak precipitineket tartalmaz, de a nem szenzibilizált emberi vörösvérsejteket nem agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: A Coombs-savó inkomplett ellenanyagok vörösvérsejtekhez való kötődésének, vagy a vörösvérsejtek szenzibilizált voltának kimutatására (direkt reakció), vagy feltételezhetően inkomplett ellenanyagtartalmú savók vizsgálatára (indirekt reakció) használható, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 0—5 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ml 11,90 Ft.

DIAGNOSZTIKUMOK Human (baktériumszuszpenziók)

Brucella abortus Bang diagnosztikum
Bien—Sonntag-féle kiütéses tífusz diagnosztikum (Weil—Felix-reakcióhoz)
Salmonella paratyphi (S. paratyphi „A") diagnosztikum
Salmonella Schottmülleri (S. paratyphi „B") diagnosztikum
Salmonella typhi „H" diagnosztikum
Salmonella typhi „O" diagnosztikum

Összetétel: Antigéntulajdonság szempontjából pontosan identifikált baktériumtörzsek jó agglutinabilitású szuszpenziója. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: Hastífusz, paratífusz, kiütéses tífusz, illetve brucellózis gyanúja esetén a vérsavó agglutinintiterének megállapítására (Gruber—Widal-reakció), a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 10,60 Ft.

DICK-toxin Human

Összetétel: Tisztított és izotóniás foszfátos pufferoldattal hígított vörhenytoxin (eritrogén toxin). 0,1 ml-enként két bőradagot tartalmaz.

Alkalmazás: Bőrpróba céljára. A vörhenyre fogékony személyen legalább 10 mm átmérőjű reakciót ad, a vörhenyen átesetteken a reakció nem jelentkezik.

Adagolás: 0,1 ml i. cut.

Megjegyzések: ✠ Lejárati idő: 6 hónap. 2—5 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2,5 ml 14,60 Ft.

DIFTÉRIA elleni juhvérsavó Human natív, 3000 IE

Összetétel: Diftériatoxoiddal és -toxinnal immunizált juhok natív, steril vérsavója. Hatóérték: ml-enként legalább 200 IE. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására.

Adagolás: L. Diftéria elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×15 ml 80,40 Ft.

DIFTÉRIA elleni lóvérsavó Human tisztított és koncentrált, 10 000 IE és 20 000 IE

Összetétel: Tisztított diftéria-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: ml-enként legalább 1000, ill. 2000 IE. Konzerválószer: 0,25% fenol és 0,005% mertiolát.

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására.

Adagolás: Enyhe esetekben 5000—10 000 IE, középsúlyos esetekben 100 000—200 000 IE. 2 év alattiak

a fenti adagok felét, 2—15 évesek $^2/_3$—$^3/_4$ részét kapják.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 10 000 IE 113,— Ft, 1×10 ml 20 000 IE 226,— Ft.

DIFTÉRIA elleni lóvérsavó Human tisztított és koncentrált, liofilezett, 10 000 IE és 20 000 IE

Összetétel: Tisztított diftéria-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként legalább 1000 IE, ill. 200 IE. Konzerválószer: 0,25% fenol és 0,005% mertiolát.

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására.

Adagolás: L. Diftéria elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 10 000 IE és 1 ampullában 10 ml oldószer 137,— Ft,
1 ampulla liofilezett szérum 20 000 IE és 1 ampullában 10 ml oldószer 265,— Ft.

DIFTÉRIA elleni marhavérsavó Human tisztított, 3000 IE

Összetétel: Tisztított diftéria-szarvasmarha-vérsavó koncentrált immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 0,25% fenol és 0,005% mertiolát.

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására.

Adagolás: L. Diftéria elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 243,— Ft.

DIFTÉRIA elleni marhavérsavó Human tisztított, liofilezett 3000 IE

Összetétel: Tisztított diftéria-szarvasmarha-vérsavó koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 0,25% fenol és 0,005% mertiolát.

Alkalmazás: Diftéria gyógyítására.

Adagolás: L. Diftéria elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 10 ml oldószer 256,— Ft.

DIFTÉRIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ Human adszorbeált kombinált oltóanyag

Összetétel: Ml-enként: diftéria-toxoid 30 Lf
tetanusz-toxoid 10 kötési egység
elölt Bordetella pertussis baktérium 30 milliárd (8 nemzetközi védőegység).
Adszorbens: alumíniumfoszfát-gél.
Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Diftéria, tetanusz és pertusszisz egyidejű megelőzésére.

Adagolás: Alapimmunizálás céljából 4—6 heti időközökben 3×0,5 ml-t fecskendezünk izomba; emlékeztető oltás céljára 0,5 ml-t.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×0,5 ml 5,15 Ft, 10×0,5 ml 34,90 Ft, 50×0,5 ml 167,— Ft.

DIFTÉRIA-PERTUSSZISZ-TETANUSZ Human
adszorbeált kombinált oltóanyag, 6 évesek újraoltásához

Összetétel: Ml-enként: diftéria-toxoid 30 Lf
tetanusz-toxoid 5 kötési egység
elölt Bordetella pertussis baktérium 22,5 milliárd
Adszorbens: alumíniumfoszfát-gél.
Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: 5—6 éves korú gyermekek emlékeztető oltására.

Adagolás: 1×0,5 ml izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2,5 ml 7,40 Ft és 1×5,0 ml 11,20 Ft. Csak hatósági oltások céljára.

DIFTÉRIA-TETANUSZ Human
adszorbeált, kombinált oltóanyag

Összetétel: Ml-enként: diftéria-toxoid 5 Lf
tetanusz-toxoid 5 kötési egység.
Adszorbens: alumíniumhidroxid-gél.
Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Diftéria és tetanusz egyidejű megelőzésére. Csak alapimmunitással rendelkező egyének olthatók.

Adagolás: 1×0,5 ml izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5,0 ml 5,20 Ft.

EMBERI IMMUNGLOBULINOKAT PRECIPITÁLÓ MONOSPECIFIKUS IMMUNSZÉRUMOK Human
liofilezett

Összetétel: Emberi immunglobulinokkal és frakciókkal hiperimmunizált állatokból nyert, különlegesen abszorbeált, liofilezéssel tartósított immunszérumok. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következők:

anti-human IgG lószérum
anti-human IgG juhszérum
anti-human IgG kecskeszérum
anti-human IgG nyúlszérum
anti-human IgM lószérum
anti-human IgM nyúlszérum
anti-human IgA lószérum
anti-human IgA kecskeszérum
anti-human IgA juhszérum
anti-human IgG, IgM, IgA lószérum

Az immunglobulin-fragmentek ellen termelt immunszérumok a következők:

anti-human kappa lószérum
anti-human lambda lószérum
anti-human IgG-Fc juhszérum
anti-human IgG-Fd kecskeszérum
anti-human IgG-Fc nyúlszérum
anti-human IgG-Fd nyúlszérum
anti-human IgG-Fdb nyúlszérum

Alkalmazás: A fenti immunszérumok a human immunglobulinok, valamint a megfelelő könnyű és nehéz peptidláncok immunkémiai vizsgálatára szolgálnak. Az immunglobulinok elleni szérumok alkalmasak kvantitatív meghatározásra is. A beteg szérumát normál kontrollszérummal párhuzamosan vizsgáljuk a fenti immunszérumokkal a Scheidegger-, vagy Backhausz-féle mikromódszerrel. Egyes monospecifikus precipitáló savóknál bizonyos esetekben előfordul, hogy második precipitációs csík is megjelenik, ez azonban, teljesen más elhelyezkedése miatt, a meghatározást nem zavarja.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem

rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható.
Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

EMBERI SZÉRUMFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLÓ POLISPECIFIKUS LÓSZÉRUMOK Human liofilezett

Összetétel: Emberi szérumfehérjékkel hiperimmunizált lovak liofilezéssel tartósított immunszéruma. Segítségével 25 különböző emberi szérumfehérjét lehet megkülönböztetni. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani).

Alkalmazás: Egyes szérumkomponensek pl.: lipoproteinek, haptoglobin, coeruloplazmin stb. azonosítására és vizsgálatára immunkémiai módszerekkel.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható.
Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

EMBERI SZÉRUMFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLÓ IgG-VEL ABSZORBEÁLT IMMUNSZÉRUM Human liofilezett

Összetétel: IgG-vel abszorbeált, liofilezéssel tartósított anti-human lósavó. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.)

Alkalmazás: Immunelektroforézises vizsgálatokhoz Scheidegger- vagy Backhausz-féle mikromódszerrel.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható.
(Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.)

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

EMBERI SZÉRUMFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLÓ MONOSPECIFIKUS IMMUNSZÉRUMOK Human liofilezett

Összetétel: Emberi szérumfehérjékkel hiperimmunizált különböző állatokból nyert, különlegesen abszorbeált, liofilezéssel tartósított immunszérumok. (1 ampulla tartalmát 1 ampulla deszt. vízben kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következők:

anti-human alpha 2M lószérum
anti-human beta lipoprotein nyúlszérum
anti-human transferrin nyúlszérum
anti-human beta lipoprotein lószérum
anti-human transferrin kecskeszérum
anti-human fibrinogen nyúlszérum
anti-human haptoglobin nyúlszérum
anti-human coeruloplazmin nyúlszérum
anti-human albumin nyúlszérum

Alkalmazás: Különböző szérumkomponensek immunelektroforézises és immundiffúziós vizsgálatára és azonosítására, valamint kvantitatív meghatározására. A beteg szérumát normál kontroll szérummal párhuzamosan vizsgáljuk a fenti immunszérumokkal Scheidegger- vagy Backhausz-féle mikromódszer szerint. Egyes monospecifikus precipitáló savóknál bizonyos esetekben előfordul, hogy második precipitációs csík is megjelenik, ez azonban teljesen más elhelyezkedése miatt, a meghatározást nem zavarja.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

EMBERI SZÉRUMFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLÓ POLISPECIFIKUS LÓSZÉRUMOK Human
liofilezett

Összetétel: Emberi szérumfehérjékkel hiperimmunizált lovak liofilezéssel tartósított immunszéruma. Segítségével 25 különböző emberi szérumfehérjét lehet megkülönböztetni. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.)

Alkalmazás: Emberi szérumok rutinszerű immunelektroforézises vizsgálatára és egyes szérumkomponensek, pl.: lipoproteinek, haptoglobin, coeruloplazmin stb. azonosítására és vizsgálatára immunkémiai módszerekkel.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

ESCHERICHIA COLI agglutináló savó
Human
liofilezett, 2×1 ampulla

Összetétel: *Escherichia coli* O 55: B5, ill. O 111: B7 törzsek tenyészetével immunizált nyulak liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: A homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok során kitenyésztett baktériumok identifikálására, lemezagglutináció céljára.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. — Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 2×1 ampulla, ampullánként 1 ml liofilezett savó 79,70 Ft.

ESCHERICHIA COLI agglutináló savó
Human
liofilezett, 4×1 ampulla

Összetétel: *Escherichia coli* O 26: B6, O 55: B5, O 86: B7, O 111: B4 törzsek tenyészetével immunizált nyulak liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: A homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok során kitenyésztett baktériumok identifikálására, lemezagglutináció céljára.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. — Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 4×1 ampulla, ampullánként 1 ml liofilezett savó 151, —Ft.

ESCHERICHIA COLI agglutináló savó
Human
liofilezett, polivalens

Összetétel: *Escherichia coli* O 26: B6, O 55: B5, O 86: B7, O 111: B4 törzsek tenyészetével immunizált nyulak liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: a homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Bélfertőzések vagy szűrővizsgálatok során kitenyésztett baktériumok identifikálására, lemezagglutináció céljára.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. — Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1×1 ampulla, ampullánként 1 ml liofilezett savó 41,90 Ft.

GAMMA-GLOBULIN Human
human

Összetétel: A human gamma-globulin emberi vér plazmájából alkohollal, hidegben történő frakcionálás útján előállított gamma-globulin 10%-os steril oldata. Konzerválószer: 0,01% mertiolát. A human gamma-globulin azokat a hatásos ellenanyagokat tartalmazza erősen koncentrált és tisztított alakban, amelyek a felnőttek vérsavójában találhatók. A készítmény tisztasági foka: legalább 90%. A hepatitisz megelőzésére „H"-jelű gamma-globulin kerül forgalomba.

Alkalmazás: *Megelőzés céljából:* Elsősorban a kanyaró és a hepatitis epidemica megelőzésére alkalmazható. Szérum-hepatitisz megelőzésére nem használható. Rubeola-fertőzésnek kitett terhesek a terhesség első három hónapjában szintén eredményesen védhetők vele. A poliomyelitis megelőzésére csak akkor alkalmazható, ha a gamma-globulint a fertőzés előtt adjuk.
Gyógyítás céljából: Mumps-betegek orchitisének megelőzésére, enkefalitiszük kezelésére, vörheny toxikus tüneteinek kezelésére és a szövődmények megelőzésére, fertőző betegségek lábadozó szakában célszerű gamma-globulin adása. A gammaglobulinémia esetén a készítmény adása feltétlenül indokolt.

Adagolás: Hepatitis epidemicában szenvedő betegek környezetében élőknek a gamma-globulint életkorra való tekintet nélkül testsúlykg-onként 0,03 ml adagolásban kell alkalmazni. A 25 kg testsúlyon aluli gyermekeknek 0,5 ml összmennyiséget kell adni. Morbilli megelőzésére a lappangás első napján testsúlykg-onként 0,2, az 5. napon 0,3, a 8. napon 0,4 ml adandó. 2 éven aluli csecsemőknél az adag a biztos védelem érdekében 20—25%-kal növelhető. Gyermekbénulásban szenvedő beteg környezetében olyan kisgyermekek védelmére, akik gyermekbénulás elleni aktív védőoltásban koruknál fogva, vagy egyéb okból kifolyólag nem részesülhettek, a lappangási idő első három napján a gamma-globulint testsúlykg-onként 0,2 ml adagolásban kell adni. Rubeolában szenvedő beteg környezetében élő

olyan nőnek a védelme céljából, aki terhességének első három hónapjában van, a lappangási idő első három napján testsúlykg-onként 0,2 ml gamma-globulin adandó. Egyéb megbetegedések megelőzésére testsúlykg-onként 0,2—0,3 ml alkalmazandó; 0,5 ml-nél többet ne adjunk testsúlykg-onként. A gamma-globulint izomba fecskendezzük be. Az intravénás alkalmazás ellenjavallt. A gamma-globulin passzív védelmet biztosító hatása 2—3 hétig tart. Ha a fertőzés veszélye továbbra is fennáll, az adagolás megismételhető.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 10×1 ml 278,20 Ft, 50×1 ml 1391,— Ft, 1×2 ml 51,40 Ft, 1×3 ml 73,70 Ft.

GAMMA LATEX REAGENS Human

Összetétel: Albuminnal stabilizált 0,25%-os latexszuszpenzióhoz adszorbeált emberi gamma-globulin. Rheumatoid-faktort tartalmazó inaktivált vérsavó 1 : 20-as hígításban 2 percen belül agglutinálja a latex-reagenst. Konzerválószer: 0,1% nátriumazid.

Alkalmazás: A rheumatoid-faktor kimutatására, a használati utasítás szerint. A vizsgálandó vérsavók hígítására célszerű a Human Intézet által forgalomba hozott „Borátos tompító-oldat latex-reagenshez" elnevezésű készítmény alkalmazása.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2 ml 9,— Ft.

BORÁTOS TOMPÍTÓ-OLDAT LATEX-REAGENSHEZ Human

Összetétel: 0,1 molos $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$, 1% konyhasót tartalmazó (pH = 8,2) steril pufferoldat. Konzerválószer: 0,1% nátriumazid.

Alkalmazás: Gamma-latex-reagenssel végzett tárgylemez-agglutinációkhoz hígító oldatként.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 80 ml üvegenként 20,60 Ft.

GÁZÖDÉMA elleni lóvérsavó Human
tetravalens

Összetétel: A *Clostridium welchii (Cl. perfringens), Clostridium septicum (Vibrion septique), Clostridium novyi (Cl. oedematiens)* és a *Clostridium histolyticum* törzsek elölt tenyészetével, illetőleg méregtelenített toxinjával immunizált lovak natív, steril vérsavója. Hatóérték: ml-enként legalább 150 IE welchii-, 100 IE septicum-, 80 IE novyi- és 20 IE histolyticum-antitoxint tartalmaz. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: *Megelőzés céljára:* Tetanusz-szérum mellett gázödéma-szérumot is tanácsos befecskendezni olyan erősen roncsolt sérülésekben, amelyekben a seb földdel, trágyával vagy ruhacafattal érintkezett, azonkívül üszkös appendicitisben is.
Gyógyítás céljára: A szérumot a lehető legkorábban, már a kezdeti tünetek jelentkezésekor, alkalmazni kell.

Adagolás: *Megelőzés céljára:* Közvetlenül a sérülés után 10—20 ml intravenásan vagy izomba, esetleg a fertőzött góc közelébe.
Gyógyítás céljára: Lehetőleg intézetben 150—200 ml izomba, vagy megfelelő deszenzibilizálás után 100 ml intravenásan, a maradék a góc környékébe. Az első nagy adag után 6—8 óránként 40—60 ml részint intravenásan, részint izomba. Különösen nagy adagok szükségesek, ha fertőzést okozó sérülést súlyos vérveszteség kísérte, vagy ha a tünetek a törzsön, vagy a fejen jelentkeznek.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×20 ml 32,80 Ft.

GÁZÖDÉMA elleni lóvérsavó Human
tetravalens, liofilezett

Összetétel: A *Clostridium welchii (Cl. perfringens), Clostridium septicum (Vibrion septique), Clostridium novyi (Cl. oedematiens)* és a *Clostridium histolyticum* törzsek elölt tenyészetével, illetőleg méregtelenített toxinjával immunizált lovak natív, liofilezéssel tartósított steril vérsavója. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként legalább 150 IE welchii-, 100 IE septicum-, 80 IE novyi- és 20 IE histolyticum-antitoxin. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: L. Gázödéma elleni lóvérsavó.

Adagolás: L. Gázödéma elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 10 ml oldószer 28,10 Ft.

HAEMOLYSIN Human
juhvörösvérsejt-oldó nyúlvérsavó

Összetétel: Juhvörösvérsejtekkel immunizált nyulak steril vérsavója. Hatóérték: hemolitikus titer legalább 1 : 1500. Konzerválószer: 0,005% mertiolát és 0,25% fenol.

Alkalmazás: Komplementkötési reakció végzéséhez, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2 ml 20,— Ft és 1×10 ml 72,90 Ft.

HAVIG Human
human antivaccinia immunglobulin

Összetétel: Himlő ellen oltott egészséges felnőttek szérumából készült, 10%-os, steril gamma-globulin

oldat. A készítmény tisztasági foka legalább 90%. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Túlkorosak himlőoltási szövődményeinek megelőzésére, fertőzés veszélyének kitett személyek passzív védésére, valamint himlő- vagy himlőoltási szövődmények gyógyítására.

Adagolás: *Megelőzés céljából:* testsúlykg-onként 200 NE. *Gyógyítás céljából:* testsúlykg-onként 2 × 250 NE 4 órás időközzel. Izomba fecskendezzük.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. Csak hatósági oltások céljára, kizárólag az Eü. M. rendelkezése szerint. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1000 NE-t tartalmazó ampullákban 2—3,5 ml-es letöltésben.
Ármegállapítás alatt.

HIMLŐ-vakcina Human liofilezett

Összetétel: „Budapest"-vaccinia-vírustörzzsel oltott egészséges borjak aszeptikusan összegyűjtött, vírustartalmú himlőhólyagjainak kaparéka. A pusztulák homogenizátumából részleges tisztítással elkülönített virionokat 5%-os pepton-oldatban szuszpendálva liofilezéssel tartósítják. Felhasználás előtt a liofilezett vakcinát a hozzá mellékelt 40%-os glicerinben kell reszuszpendálni. A reszuszpendált vakcinában a víruskoncentráció legalább 10^8, a kísérő apatogén mikroorganizmusok száma legfeljebb 500 ml lehet.

Alkalmazás: Himlő elleni újraoltásra.

Adagolás: A használati utasításban megadott módon.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 10 °C alatti hőmérsékleten, lehetőleg a jégszekrény fagyasztóterében kell tárolni. Reszuszpendálás napján fel kell használni!

Csomagolás: 20, 25, 30 és 50 adagos elosztásban, hozzácsomagolt 40%-os glicerines oldószerrel. Csak hatósági oltások céljára!

HIMLŐ-vakcina Human primovakcinációra

Összetétel: „Elstree" (Lister) vaccinia vírustörzzsel oltott egészséges borjak aszeptikusan összegyűjtött, vírustartalmú himlőhólyagjainak kaparéka, amelyet streptomycint és glicerint tartalmazó foszfátos tompítóoldatban homogenizáltak. Az oltóanyag ml-enként legfeljebb 500 apatogén mikroorganizmust tartalmazhat. Hatásfok: pockszám-érték legalább 10^7.

Alkalmazás: Gyerekek első himlő elleni védőoltására.

Adagolás: A használati utasításban megadott módon a jobb felkar külső oldalán.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 hónap. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 × 5 adagos 4,45 Ft, 1 × 10 adagos 5,90 Ft, 1 × 20 adagos 9,85 Ft elosztásban.

HIMLŐ-vakcina Human revakcinációra

Összetétel: „Budapest" vaccinia vírustörzzsel oltott egészséges borja aszeptikusan összegyűjtött, vírustartalmú himlőhólyagjainak kaparéka, amelyet streptomycint és glicerint tartalmazó foszfátos tompítóoldatban homogenizáltak. Az oltóanyag ml-enként legfeljebb 500 apatogén mikroorganizmust tartalmazhat. Hatásfok: pockszám érték legalább 10^7.

Alkalmazás: Gyerekek és felnőttek himlő elleni újraoltására.

Adagolás: A használati utasításban megadott módon a bal felkar külső oldalán.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 hónap. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 × 5 adagos 4,45 Ft, 1 × 10 adagos 5,90 Ft, 1 × 20 adagos 9,85 Ft elosztásban.

ÁLLATI IMMUNGLOBULINOKAT PRECIPITÁLÓ IMMUNSZÉRUMOK Human liofilezett

Összetétel: Állati immunglobulinokat hiperimmunizált állatok abszorbeálatlan, vagy specifikusan abszorbeált, liofilezéssel tartósított szérumai. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.)

Forgalomba kerülnek a következők:

anti-ló	IgG kecskeszérum
anti-ló	IgG nyúlszérum
anti-ló	IgT kecskeszérum
anti-ló	IgT nyúlszérum
anti-ló	IgM kecskeszérum
anti-ló	IgM nyúlszérum
anti-ló	Ig (G, T, M) nyúlszérum
anti-ló	$F(ab)_2$ nyúlszérum
anti-marha	IgG nyúlszérum
anti-marha	Ig (G, M) nyúlszérum
anti-egér	IgG nyúlszérum (több IgG alosztályt precipitál)

Alkalmazás: A fenti immunszérumok az immunglobulinok, valamint a megfelelő nehéz, illetve könnyű peptidláncok immunkémiai vizsgálatára szolgálnak. A monospecifikus immunszérumok alkalmasak a komponensek kvantitatív meghatározására is.

Alkalmazás módja: immunelektroforézises vizsgálatoknál Scheidegger- vagy Backhausz-féle mikromódszert alkalmazunk.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

ÁLLATI SZÉRUMFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLÓ MONOSPECIFIKUS IMMUNSZÉRUMOK Human liofilezett

Összetétel: Állati szérumfehérjékkel hiperimmunizált különböző állatokból nyert, különlegesen abszorbeált, liofilezéssel tartósított immunszérumok. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következők:

anti-ló	alpha2M nyúlszérum
anti-marha	alpha2M sertésszérum

Alkalmazás: Különböző szérumkomponensek immunkémiai vizsgálatára és azonosítására, valamint kvantitatív meghatározására szolgálnak. Immunelektroforézises vizsgálatoknál Scheidegger- vagy Backhausz-féle mikromódszert alkalmazunk.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

ÁLLATI SZÉRUMFEHÉRJÉKET PRECIPITÁLÓ POLISPECIFIKUS IMMUNSZÉRUMOK Human liofilezett

Összetétel: Különböző állatok teljes szérumával hiperimmunizált állatok liofilezéssel tartósított immunszérumai. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következők:

anti-nyúl lószérum
anti-ló kecskeszérum
anti-egér sertésszérum
anti-egér nyúlszérum
anti-patkány nyúlszérum
anti-tengerimalac nyúlszérum
anti-marha nyúlszérum
anti-juh nyúlszérum
anti-kecske nyúlszérum

anti-sertés nyúlszérum
anti-kutya nyúlszérum
anti-rhesus nyúlszérum

Alkalmazás: Immunelektroforézises vizsgálatokhoz, Scheidegger- vagy Backhausz-féle mikromódszerrel.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

IMMUNELEKTROFORÉZISES TISZTÍTOTT PORAGAR Human

Összetétel: Szálas agar-agarból mosással és szárítással előállított tisztított agarpor.

Alkalmazás: Immunelektroforézises és diffúziós vizsgálatokhoz.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Gyakorlatilag korlátlan ideig eltartható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: Porüvegekben vagy műanyag zacskókban szükség szerint. Ármegállapítás alatt.

KARDIOLIPIN-antigén Human Kolmer-reakcióhoz

Összetétel: Marhaszívből készült kardiolipin, tojásból előállított lecitin és koleszterin alkoholos oldata.

Alkalmazás: A Kolmer-komplementkötési lues-reakció kivitelezéséhez, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5 ml 141,50 Ft.

KARDIOLIPIN-antigén Human Csapadékos VDRL lemez-reakcióhoz

Összetétel: Marhaszívből készült kardiolipin, tojásból előállított lecitin és koleszterin alkoholos oldata.

Alkalmazás: A lues szerológiai diagnózisát szolgáló csapadékos lemezreakció kivitelezéséhez, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5 ml 141,50 Ft.

KOLERA-vakcina Human liofilezett

Összetétel: Vibrio comma cholerae Inaba és Ogawa törzsek liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt 1 ml oldószerben szuszpendálva 1 ampulla vakcina 8 milliárd vibriót tartalmaz. Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Kolera megelőzésére.

Adagolás: A kolerában szenvedő, illetve arra gyanús beteg környezetének vagy rövid időn belül veszélyeztetett kiutazóknak védőoltását 5—7 napos időközzel végezzük 3-szori oltással úgy, hogy 14 évesnél idősebbeknek az első alkalommal 0,5 ml-t, a második és harmadik oltás alkalmával 1—1 ml-t fecskendezünk be.
A foglalkozásuk következtében veszélyeztetettek, valamint környezetük, a tartósabb védettség elérése érdekében, 3—4 hetes időközben 2 oltást kapnak.
A vakcina adagja 14 éves kor felett 2×1 ml, 6—14 éves kor között 2×0,5 ml, 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére 2×0,25 ml.
Az oltóanyagot bőr alá kell fecskendezni. Fél év múlva emlékeztető oltást kell adni: 14 éves kor felett 1 ml, kisebb gyermekeknek arányosan kisebb adag oltóanyaggal.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető.

Lejárati idő: 5 év.
2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 db ampullában liofilezett vakcina, 1×1 ml oldószer ampullában 20,60 Ft.

KOMPLEMENT Human
liofilezett

Összetétel: Tengerimalacok liofilezéssel tartósított friss vérsavója.

Alkalmazás: Komplementkötési próba céljára szolgál, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 10×1 ml 153,— Ft.

LACTOBACT Human
liofilezett

Összetétel: *Lactobacillus acidophilus, L. helveticus, L. casei* és Kefirtenyészetek antibiotikummal szemben ellenállóvá tett, majd tejben liofilezett élő tenyészete. A készítmény ml-enként 4—20 millió élő mikroorganizmust tartalmaz.

Alkalmazás: Széles spektrumú antibiotikumok által okozott károsodások és mellékhatások megelőzése és kezelése. Alkalmazását az antibiotikumkezeléssel egyidőben kell megkezdeni és az antibiotikumkezelés befejezése után még két-három napig kell folytatni.

Adagolás: Az ampulla tartalmát 1 ml, a palackét pedig 250 ml langyos (kb. 37 °C) tejben, teában vagy vízben feloldjuk és azt hasonló italhoz keverve, a beteggel elfogyasztatjuk. Megelőző kezelés esetén csecsemőknek, gyermekeknek az ampullából vagy a palackból naponta 3—4-szer 1—2 ml-t, felnőtteknek 3—4 ml-t adunk. Fennálló antibiotikumártalom esetén naponta 4-szer 5—8 ml-t fogyasztatunk el. A kezelést az antibiotikum

okozta ártalom javulása után még 3—4 napig folytatni kell. (Csak per os alkalmazható.)

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 10×1 ml 47,80 Ft, 1×250 ml 137,— Ft.

LÉPFENE elleni lóvérsavó Human

Összetétel: Lépfene-bacillusok tenyészetével immunizált lovak natív, steril vérsavója. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: *Megelőzés céljából:* Olyan egyének oltandók, akik lépfenével fertőzött állatokkal, vagy azok tetemével foglalkoznak, különösen, ha a fertőzött anyaggal való foglalkozás közben megsérültek, vagy már előzetesen nyílt sebük volt.
Gyógyítás céljából: A szérum pustula maligna, anthrax intestinalis és anthraxos pneumonia eseteiben alkalmazandó.

Adagolás: *Megelőzés céljából:* 20 ml.
Gyógyítás céljából: Enyhe esetben 20—30 ml izomba, részben bőr alá. Súlyos esetben esetleg 2—3-szor naponta 50 ml részben izomba, részben intravenásan, másnap ismét 20—30 ml. A kezelést intézetben célszerű végezni.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére gyógyítás céljára szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás 1×20 ml 28,60 Ft.

LISTERIA agglutináló savó Human
liofilezett, polivalens

Összetétel: *Listeria monocytogenes* I, II, III, IV típusú törzsekkel immunizált nyulak specifikus agglutinint tartalmazó liofilezéssel tartósított vérsavója. Hatásfok: a homológ törzseket tárgylemezen 3 percen belül agglutinálja. Konzerválószer: 0,01% merfiolát.

Alkalmazás: Listeria monocytogenes különböző típusú törzseinek szerológiai identifikálására, lemezagglutináció céljára.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 ml 41,90 Ft.

MANNOZYM Human
(0,1%-os Zymosan-szuszpenzió)

Összetétel: A készítmény ml-enként 1 mg Saccharomyces cerevisiae poliszacharidát tartalmaz izotóniás nátriumklorid-oldatban szuszpendálva, tartósítószer nélkül. A hatóanyag vízben nem oldódó, glukóz és főleg mannóz molekulákból felépülő poliszacharida (glukomannan).

Alkalmazás: A készítmény minden olyan esetben alkalmazható, amelyben a szervezet nem fajlagos védekezőképességét fokozni kívánjuk. Klinikailag kedvező eredmények érhetők el terhességi hyperemesis, késői terhességi toxaemia, pruritus vulvae és rheumatoid arthritis kezelése terén. A sugárkezeléssel együttesen alkalmazott Mannozym-kezelés a röntgencsömör kialakulását az esetek igen jelentős számában meggátolja.

Adagolás: Felnőtteknek 1 ml-es adagokban izomba fecskendezzük. Az intravenás beadás kerülendő! Az injekciókat 6—12 napon át naponta vagy másodnaponként ismételhetjük. Szükség esetén a kezelést újra kezdjük. A készítmény befecskendezése fájdalmas reakciót, káros mellékhatást nem okoz, ismételt használata sem idéz elő anaphylaxiás reakciót. Használat előtt erősen fel kell rázni.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 C° hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 ml 3,10 Ft, 3×1 ml 7,75 Ft, 10×1 ml 19,20 Ft, 50×1 ml 86,90 Ft.

MEINICKE-antigén Human
(M.K.R. II.)

Összetétel: Borjúszívpor alkoholos kivonata 1,3% tolubalzsam-tartalommal.

Alkalmazás: A Meinicke-féle feltisztulási lues-reakció kivitelezéséhez, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. Szobahőn tartandó.

Csomagolás: 1×50 ml 31,90 Ft.

NEUROLYSIN Human
„I", „II", „III" vakcina

Összetétel: *Bacterium prodigiosum* és staphylococcus-törzsek tenyészeteinek steril autolizátuma. A tömény oldat ml-enként 1000 millió staphylococcusnak és 500 millió B. prodigiosumnak megfelelő feltárt baktériumot tartalmaz. A koncentrált oldatból az alábbi hígítások készülnek:

Neurolysin „I"	1. erősség	(1 : 10-es hígítás)
	2. erősség	(1 : 5-ös hígítás)
Neurolysin „II"	3. erősség	(1 : 4-es hígítás)
	4. erősség	(1 : 3-as hígítás)
Neurolysin „III"	5. erősség	(1 : 2-es hígítás)
	6. erősség	(hígítatlan)

Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: Neuralgiák, neuritisek, herpes zoster. Heveny idegrendszeri gyulladások esetén kontraindikált.

Adagolás: Ha az „I" sorozat után már teljes eredményt értünk el, még a „II" sorozatot is adjuk, ha csak a „II" sorozat volt eredményes, úgy a „III"-at is adni kell. 1 ampulla 1 ml vakcinát tartalmaz. Az oldószert csak bőr alá szabad fecskendezni.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 6×1 ml „I" 13,80 Ft, 6×1 ml „II" 15,40 Ft, 10×1 ml „III" 26,30 Ft.

liofilezett

Összetétel: Kezeletlen állatok szérumának liofilezéssel tartósított keveréke. (1 ampulla tartalmát 1 ml deszt. vízben kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következő szérumok:

egérszérum,
patkányszérum,
nyúlszérum,
kutyaszérum,
marhaszérum,
juhszérum,
sertésszérum,
lószérum.

Alkalmazás: Immunelektroforézises és kvantitatív immundiffúziós vizsgálatokhoz kontrollreagensként. Anaphylaxiás kísérletekhez alkalmazzák heterológ szérumként.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

OPSODERMIN Human
„A", „B", „C" és „forte" staphylococcus-vakcina

Összetétel: A Magyarországon leggyakrabban előforduló fágtípusú staphylococcus aureus haem. törzsek elölt szuszpenziója.
Opsodermin „A" 50, 100, 250, 500, 1000 és 2000 millió csírát tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákban.
Opsodermin „B" 500 millió csírát tartalmazó 10-es sorozat 1 ml-es ampullákban.
Opsodermin „C" 1000 millió csírát tartalmazó 10-es sorozat 1 ml-es ampullákban.
Opsodermin „forte" 100, 200, 500, 800, 1000, 1200,

Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Staphylococcus okozta fertőzések: furunkulus, tályog, pyodermia, phlegmone, acne, paronychia, hydradenitis, sycosis.

Adagolás: Emelkedő adagban („A" sorozattal kezdve) 3—4 naponként bőr alá vagy izomba. Kívánatos az oltásokat a fertőzés lezajlása után is folytatni, mert ezáltal tartós gyógyulás érhető el.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1½ év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 6×1 ml „A" 16,30 Ft, 10×1 ml „B" 25,— Ft, 10×1 ml „C" 27,40 Ft, 10×1 ml „forte" 36,50 Ft.

OPSOGON Human
Gonococcus-vakcina

Összetétel: *Neisseria gonorrhoea* törzsek elölt szuszpenziója. 1 ml vakcina 1000 millió baktériumot tartalmaz. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: *Gyógyítás céljából:* makacs, idült gonorrhoea és szövődményei (gonarthritis, prostatitis, epididymitis, adnexitis, endometritis) kezelésére.
Diagnózis céljából: latens gonorrhoea felismerésére.

Adagolás: *Gyógyítás céljából:* két-három naponként 10—25 milliótól kezdődően 1000, makacs esetekben 2000 millió baktériumig emelkedő adagokat adunk izomba, esetleg intravenásan. 39 °C-ot meghaladó lázas reakció esetén a következő oltás az adag emelése nélkül, kb. 5 nap szünet után adandó.
Diagnózis céljából: 50 millió baktériumot fecskendezünk izomba. Pozitív esetben a befecskendezés helyén az oltás után bő váladék képződik, amelyben a kórokozó kimutatható.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 23,20 Ft.

NORMÁL ÁLLATI-SZÉRUM REAGENSEK

Human
liofilezett

Összetétel: Kezeletlen állatok szérumának liofilezéssel tartósított keveréke. (1 ampulla tartalmát 1 ml desztv. vízben kell oldani.) Forgalomba kerülnek a következő szérumok:

egérszérum,
patkányszérum,
nyúlszérum,
kutyaszérum,
marhaszérum,
juhszérum,
sertésszérum,
lószérum.

Alkalmazás: Immunelektroforézises és kvantitatív immundiffúziós vizsgálatokhoz kontrollreagensként. Anaphylaxiás kísérletekhez alkalmazzák heterológ szérumként.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. Feloldás után csak lefagyasztva (—15 °C) tárolható. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum 50,— Ft.

OPSODERMIN Human

„A", „B", „C" és „forte" staphylococcus-vakcina

Összetétel: A Magyarországon leggyakrabban előforduló fágtípusú staphylococcus aureus haem. törzsek elölt szuszpenziója.
Opsodermin „A" 50, 100, 250, 500, 1000 és 2000 millió csírát tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákban.
Opsodermin „B" 500 millió csírát tartalmazó 10-es sorozat 1 ml-es ampullákban.
Opsodermin „C" 1000 millió csírát tartalmazó 10-es sorozat 1 ml-es ampullákban.
Opsodermin „forte" 100, 200, 500, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 millió csírát tartalmazó 10-es sorozat 1 ml-es ampullákban.
Konzerválószer: 0,01% mertiolát.

Alkalmazás: Staphylococcus okozta fertőzések: furunkulus, tályog, pyodermia, phlegmone, acne, paronychia, hydradenitis, sycosis.

Adagolás: Emelkedő adagban („A" sorozattal kezdve) 3—4 naponként bőr alá vagy izomba. Kívánatos az oltásokat a fertőzés lezajlása után is folytatni, mert ezáltal tartós gyógyulás érhető el.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1½ év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 6×1 ml „A" 16,30 Ft, 10×1 ml „B" 25,— Ft, 10×1 ml „C" 27,40 Ft, 10×1 ml „forte" 36,50 Ft.

OPSOGON Human

Gonococcus-vakcina

Összetétel: *Neisseria gonorrhoea* törzsek elölt szuszpenziója. 1 ml vakcina 1000 millió baktériumot tartalmaz. Konzerválószer: 0,5% fenol.

Alkalmazás: *Gyógyítás céljából:* makacs, idült gonorrhoea és szövődményei (gonarthritis, prostatitis, epididymitis, adnexitis, endometritis) kezelésére.
Diagnózis céljából: latens gonorrhoea felismerésére.

Adagolás: *Gyógyítás céljából:* két-három naponként 10—25 milliótól kezdődően 1000, makacs esetekben 2000 millió baktériumig emelkedő adagokat adunk izomba, esetleg intravenásan. 39 °C-ot meghaladó lázas reakció esetén a következő oltás az adag emelése nélkül, kb. 5 nap szünet után adandó.
Diagnózis céljából: 50 millió baktériumot fecskendezünk izomba. Pozitív esetben a befecskendezés helyén az oltás után bő váladék képződik, amelyben a kórokozó kimutatható.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 23,20 Ft.

OZAENA-vakcina Human
tisztított, adszorbeált

Összetétel: A készítmény ml-enként 5 milliárd *Klebsiella ozaenae* baktériumnak megfelelő tokanyagot és 250 millió feltárt baktériumot tartalmaz. Adszorbens: alumíniumhidroxid. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Ozaena kezelésére.

Adagolás: Havonta 1 ml-t kell mélyen bőr alá vagy izomba fecskendezni 3—5 hónapon keresztül.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 ml 8,10 Ft.

AKTÍV PAPAIN Human
liofilezett

Összetétel: Foszfát tompítóoldatban *l*-ciszteint és *l*-cisztint tartalmazó, liofilezéssel tartósított aktív papain. Konzerválószert nem tartalmaz.

Alkalmazás: A liofilezett aktív papain inkomplett haemagglutininek kimutatására szolgál, a használati utasítás szerint.

1. Klinikai laboratóriumokban: autoimmun haemolytikus anaemia gyanúja esetében a Coombs-próba kiegészítésére végzett vizsgálathoz enzimmel kezelt vörösvérsejtekhez.

2. Vércsoport-szerológiai laboratóriumokban:

a) a transzfúzió előtti kompatibilitási vizsgálatok alkalmával, a recipiens savójával és a donor vörösvérsejtjeivel végzendő reakcióhoz,

b) Rh-faktor meghatározására,

c) ritka vércsoport-meghatározó savókkal történő vizsgálathoz,

d) újszülöttek haemolytikus betegségének gyanúja esetén, szabad anti-D ellenanyag kimutatására, az újszülött és az anya savójában.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1 ampullában 1 ml liofilezett anyag 23,30 Ft.

PARATÍFUSZ A-vakcina Human
liofilezett

Összetétel: *Salmonella paratyphi.* A törzs liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt oldószerben szuszpendált készítmény ml-enként 500 millió baktériumot tartalmaz. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Paratífusz. A fertőzés megelőzésére.

Adagolás: Kellő védettség eléréséhez 3 oltás szükséges. Az első oltás alkalmával 0,5 ml, a második és harmadik oltáskor 1—1 ml vakcinát fecskendezünk a felkar külső oldalán, mélyen a bőr alá vagy izomba. 6—12 éves gyermekek a teljes adag felét, 6 éven aluli gyermekek a teljes adag negyedét kapják. Az oltásokat 3—4 hetes időközökben végezzük. A védettség tartama kb. 1 év. Ez idő eltelte után emlékeztető oltást kell adni 1 ml oltóanyaggal.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 3×1 ampulla liofilezett anyag és 3×1 ml oldószer 49,— Ft, 1×1 ampulla liofilezett anyag és 1×10 ml oldószer gumidugós üvegben 18,20 Ft.

PARATÍFUSZ B-vakcina Human
liofilezett

Összetétel: *Salmonella Schottmülleri (S. paratyphi B)* törzs liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt oldószerben szuszpendált készítmény ml-enként 500 millió baktériumot tartalmaz. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Paratífusz B fertőzés megelőzésére.

Adagolás: A kellő védettség eléréséhez 3 oltás szükséges. Az első oltás alkalmával 0,5 ml, a második

és harmadik oltáskor 1—1 ml vakcinát fecskendezünk a felkar külső oldalán mélyen a bőr alá vagy izomba. 6—12 éves gyermekek a teljes adag felét, 6 éven aluli gyermekek a teljes adag negyedét kapják. Az oltásokat 3—4 hetes időközökben végezzük. A védettség tartama kb. 1 év. Ez idő elteltével után emlékeztető oltást kell adni 1 ml oltóanyaggal.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 3×1 ampulla liofilezett anyag és 3×1 ml oldószer 49,— Ft, 1×1 ampulla liofilezett anyag és 1×5 ml oldószer 17,30 Ft, 1×1 ampulla liofilezett anyag és 1×10 ml oldószer 18,20 Ft.

PEPTONOK Human

Tripkazin: tripszines lebontású kazein-pepton.

Lactacid: savas lebontású kazeinpepton.

Cellamin: élesztőpepton.

Alkalmazás: Különféle bakteriológiai táptalajok készítésére szolgáló alapanyagok.

Csomagolás: 1,5 és 20 kg-os tételekben. 1 kg tripkazin 317,90 Ft, 1 kg lactacid 317,90 Ft és 1 kg cellamin 829,50 Ft. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

PERTUSSZISZ-vakcina Human

Összetétel: *Bordetella pertussis* törzsek szemiszintetikus táptalajon nyert tenyészeteinek elölt szuszpenziója. A vakcina ml-enként 30 milliárd baktériumot és legalább 8 nemzetközi védőegységet tartalmaz. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Szamárköhögés megelőzésére.

Adagolás: Alapimmunizálás céljából a vakcina adagja 3×1 ml. Az oltásokat 4 hetes időközökben végezzük. Az oltóanyagot izomba kell fecskendezni. Emlékeztető oltás céljából 0,5—1,0 ml adható.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem

rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×3 ml 18,20 Ft, 1×5 ml 20,50 Ft.

PERTUSSZISZ-vakcina Human adszorbeált

Összetétel: *Bordetella pertussis* törzsek szemiszintetikus táptalajon nyert tenyészetének elölt szuszpenziója. A vakcina ml-enként 30 milliárd baktériumot és legalább 8 nemzetközi védőegységet tartalmaz.
Adszorbens: alumíniumfoszfát.
Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Szamárköhögés megelőzésére.

Adagolás: Alapimmunizálás céljából a vakcina adagja 3×0,5 ml. Az oltásokat 4 hetes időközökben végezzük. Az oltóanyagot csak izomba szabad fecskendezni. Emlékeztető oltás céljából 0,5 ml adható.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 3×0,5 ml 35,50 Ft.

PERTUSSIS ELLENI HUMAN HIPERIMMUN GAMMA-GLOBULIN Human

Összetétel: Pertusszisz-vakcinával hiperimmunizált egyének plazmáinak keverékéből nyert gammaglobulin 10%-os oldata. A készítmény tisztasági foka legalább 90%. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Pertussis megelőzésére és gyógyítására szolgál.
Megelőzés céljára: elsősorban pertusszisz-védőoltásban nem részesült olyan csecsemőknél javasolt, akik kontakt fertőzésnek voltak kitéve. A lappangási idő minél korábbi szakaszában kapja a csecsemő az oltást, annál biztosabb az eredmény.

Gyógyítás céljára: pertussis-megbetegedés esetén csökkenti a lázat, valamint a köhögési rohamok számát és a toxikus tüneteket. A készítmény antibiotikumkezeléssel egyidejűleg alkalmazható.

Adagolás: *Megelőzés céljára:* testsúlykg-onként 0,3 ml (összesen legalább 2,0 ml) egy alkalommal. *Gyógyítás céljára:* testsúlykg-onként 0,3 ml (összesen legalább 2,0 ml). Ha szükséges, ez a mennyiség 24—48 órás időközben egy vagy két alkalommal megismételhető. A készítményt izomba fecskendezzük.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 2 ml-es ampullában 526,— Ft és 3 ml-es ampullában 789,— Ft.

C-POLISACCHARIDA Human
liofilezett

Összetétel: *Diplococcus pneumoniae*-ból kivont liofilezéssel tartósított C-polisaccharida. Hatásfok: ampullánként 10 mg C-polisaccharida.

Alkalmazás: C-reaktív protein kimutatására passzív hemagglutinációs módszerrel, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2 ml 17,00 Ft.

POLYMYCIN Human
vakcina

Összetétel: Különböző sarjadzó, fonalas és tömlős gombatenyészetekből készült elölt polivalens gomba-vakcina. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Strand mycosis, erosio interdigitalis, gombás dyshydrosis, ekzema mycoticum.

Adagolás: A vakcinát csak intracutan szabad oltani. A kezdő adag megállapítására intracutan allergiás próbát kell végezni, majd a használati utasítás szerint 6—7 naponként a vakcina emelkedő menynyiségeit befecskendezni.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1,5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5 ml 33,30 Ft.

POLYSAN Human
inj.

Összetétel: Apatogén sarcinák tenyészeteinek lizozim enzimmel készített sterilizátuma. A készítmény ml-enként 2000 millió baktériumnak megfelelő kivonatanyagot tartalmaz. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Minden olyan betegségben alkalmazható, amelyben a szervezet védekezőképességét fokozni akarjuk. Fertőző betegségek (kanyaró, vörheny, tífusz stb.) kezdeti és szubakut szakaszában a fajlagos kezelés mellett a szervezet védekezőerejének támogatására, különböző gyulladásos és lázas megbetegedések (bronchopneumonia, angina, furunkulózis, otitis, ízületi gyulladás stb.) nem fajlagos, ún. áthangoló kezelésére.

Adagolás: 2 ml a gluteális izomzatba, esetleg bőr alá, 1—2 napos időközönként.

Megjegyzések: Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2 ml 3,35 Ft, 3×2 ml 8,70 Ft, 10×2 ml 28,30 Ft, 100×2 ml 255,— Ft.

PORTÁPTALAJOK Human

Összetétel: A portáptalajok porított és szárított állapotban ugyanazokat az alkatrészeket tartalmazzák, mint a bakteriológiai diagnosztikában használatos folyékony vagy félig szilárd táptalajok.

Alkalmazás: Bakteriológiai diagnosztika céljára.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Porított állapotban a portáptalajok gyakorlatilag korlátlan ideig eltarthatók. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhetők be.

Csomagolás: 1, 2, 5 és 10 liternek megfelelő adagolásban kerülnek forgalomba.

Agar-táptalaj	60,10 Ft literenkénti ár
Bouillon-táptalaj	51,30 Ft literenkénti ár
Löffler-szérumtáptalaj	107,— Ft literenkénti ár
Brillantzöld-agar	70,50 Ft literenkénti ár
Endo-agar	66,40 Ft literenkénti ár
Bismutszulfit agar	104,— Ft literenkénti ár
Desoxicholat-citrat-agar	113,— Ft literenkénti ár
Eosin-methylenkék	73,30 Ft literenkénti ár
Russel-agar	69,60 Ft literenkénti ár
Christensen-agar	73,90 Ft literenkénti ár
Dextroses-agar	Ármegállapítás alatt

PYRAGO Human
„0,05", „I", „II" vakcina

Összetétel: *Escherichia coli*, enterococcus, élesztőgomba és *Bacterium acidi lactici* törzsek elölt szuszpenziója.
Pyrago 0,05: 50 millió elölt baktériumot tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákban.
Pyrago I.: 50, 50, 50, 75, 100, 150 millió elölt baktériumot tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákban.
Pyrago II.: 200, 250, 300, 350, 400, 500 millió elölt baktériumot tartalmazó 6-os sorozat 1 ml-es ampullákban.
Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Lázkeltő készítmény. Idült gonorrhoeás szövődmények (prostatitis, epididymitis, salpyngitis) metalueses megbetegedések, tabes dorsalis, paralysis progressiva, továbbá adnexitis, chorea minor, rheuma, idült arthritisek esetén.

Adagolás: 3—4 naponként a tűrőképességtől függően intravenásan, emelkedő adagolásban. Ajánlatos a kezelést a „0,05" jelzésű ampullával kezdeni és első alkalommal 0,2, a második oltásra pedig 0,4 ml-t befecskendezni.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1,5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 6×1 ml „0,05" 33,30 Ft, 6×1 ml „I" 35,90 Ft, 6×1 ml „II" 43,30 Ft.

RESISTEST „A" Human
korongsorozat

Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapírkorong az alábbi hatóanyagokat tartalmazza:
Penicillin 3 IE (fehér) 70,—Ft (egyedi csom. ár)
Oxacillin 10 gamma (fehér, vonalas) 71,20 Ft (egyedi csom. ár)
Methicillin 20 gamma (fehér, kockás) 76,— Ft (egyedi csom. ár)
Chloramphenicol (Chlorocid) 30 gamma (piros) 70,— Ft (egyedi csom. ár)
Oleandomycin 30 gamma (olajzöld, o-val jelz.) 71,20 Ft (egyedi csom. ár)
Streptomycin 30 gamma (kék) 71,20 Ft (egyedi csom. ár)
Tetracyclin 30 gamma (lila) 97,30 Ft (egyedi csom. ár)
Neomycin 100 gamma (barna) 72,— Ft (egyedi csom. ár)
Polymyxin B 15 gamma (zöld) 271,20 Ft (egyedi csom. ár)
Erythromycin 10 gamma (terrakotta) 99,30 Ft (egyedi csom. ár)
Superseptyl 400 gamma (fekete) 74,— Ft (egyedi csom. ár)
Nitrofurantoin (Furadantin) 300 gamma (sötétzöld) 71,90 Ft (egyedi csom. ár)

Alkalmazás: Baktériumok antibioticum-érzékenységének, ill. -rezisztenciájának meghatározására.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 12×1 fiola 50—50 koronggal, sorozatban 97,30 Ft, 6×1 fiola 50 koronggal, egyedi csomagolásban.

RESISTEST „B" Human
korongsorozat

Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapírkorong az alábbi hatóanyagokat tartalmazza:
Chlortetracyclin (Aureomycin, Xanthomycin) 30 gamma (sárga) 71,20 Ft (egyedi csom. ár)
Oxytetracyclin (Terramycin, Tetran) 30 gamma (rózsa) 70,50 Ft (egyedi csom. ár)
Vancomycin 50 gamma (rózsa, kockás) 226,— Ft (egyedi csom. ár)
Kanamycin 30 gamma (sötétkék) 80,10 Ft (egyedi csom. ár)
Spiramycin 30 gamma (rózsa, pontozott) 72,60 Ft (egyedi csom. ár)
Novobiocin 30 gamma (rózsa, vonalas) 114,40 Ft (egyedi csom. ár)

Alkalmazás: Baktériumok antibioticumérzékenységének, ill. -rezisztenciájának meghatározására.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 6×1 fiola, 50—50 koronggal, sorozatban 44,40 Ft, 6×1 fiola 50 koronggal, egyedi csomagolásban.

RESISTEST Human
egyedi csomagolású korongok

Összetétel: 7 mm átmérőjű szűrőpapírkorong az alábbi hatóanyagokat tartalmazza:
Nalidix-sav (Nevigramon 30 gamma (kék, kockás) 71,20 Ft (ár)
Ampicillin (Semicillin) 20 gamma (fehér, keresztes) 72,60 Ft (ár)
Paromomycin 50 gamma (zöld, vonalas) 82,20 Ft (ár)
Colistin (Colimycin) 20 gamma (zöld, pontozott) 97,90 Ft (ár)
Lincomycin 10 gamma (rózsa, keresztes) 72,60 Ft (ár)
Pristinamycin (Pyostacin) 10 gamma (zöld, keresztes) 120,50 Ft (ár)

Nystatin 100 IE (sárga, pontozott) 72,60 Ft (ár)
Cephalosporin 10 gamma (kék, keresztes) 82,20 Ft
Carbenicillin 50 gamma (barna, hullámvonal) 95,10 Ft
Gentamicin 20 gamma (barna, keresztes) 355,— Ft

Alkalmazás: Baktériumok antibioticum-érzékenységének, ill. -rezisztenciájának meghatározására.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 6×1 fiola, 50—50 koronggal.

SCARLAPHYLAX Human
adszorbeált oltóanyag

Összetétel: Vörheny (eritrogén) toxin.
I. ampulla 1500 Bőregység (BE)
II. ampulla 6000 Bőregység
III. ampulla 15 000 Bőregység ml-enként.
Adszorbens: alumíniumhidroxid-gél.
Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Vörheny megelőzésére.

Adagolás: 2 heti időközönként 3×1,0 ml mélyen bőr alá.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 3×1 ml 9,50 Ft, 3×5,0 ml 26,70 Ft.

SEROTYP Human
vércsoport-meghatározó emberi vérsavó

Összetétel: A, B, illetve 0 vércsoportba tartozó egyének steril, magas titerű vérsavója. Hatóérték: A és B csoportbeli savók agglutinációs titere legalább 1 : 64, a 0 csoportbeli savóké legalább 1 : 32. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát és 0,05%-os kloramfenikol.

Alkalmazás: Az AB0-rendszer vércsoportjainak meghatározására, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Szakrendelések a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 6 hónap. 0—5 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 3×5 kapilláris 30,50 Ft, 3×10 kapilláris 46,— Ft, 3×25 kapilláris 95,50 Ft.
Az „A" savó festés nélküli, a „B" savó barna jelzéssel ellátott, és a „0" savó kék jelzéssel ellátott kapillárisokban kerül forgalomba.

SEROTYP Human
liofilezett, vércsoport-meghatározó emberi vérsavó

Összetétel: A, B, illetve 0 vércsoportba tartozó egyének liofilezéssel tartósított, steril, magas titerű vérsavója. Hatóérték: az A és B csoportbeli savók agglutinációs titere legalább 1 : 64, a 0 csoportbeli savóké legalább 1 : 32. Konzerválószer: 2%-os bórsav.

Alkalmazás: Az AB0-rendszer vércsoportjainak meghatározására, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Szakrendelések a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 5 év. 0—5 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 3×1 ampullában 1 ml liofilezett savó 35,— Ft.

SERTÉSORBÁNC elleni lóvérsavó Human

Összetétel: Sertésorbánc A és B törzsek élő tenyészeteivel immunizált lovak nativ, steril vérsavója. Hatóérték: 40 E/ml. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Gyógyítás céljára, sertésorbánc-fertőzések kezelésére.

Adagolás: 10—20 ml bőr alá vagy izomba; kiegészítő kezelésként penicillin ajánlatos.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 18,50 Ft.

SERTÉSORBÁNC elleni sertésvérsavó Human

Összetétel: Sertésorbánc A és B törzsek élő tenyészeteivel immunizált sertések nativ, steril vérsavója. Hatóérték: 40 E/ml. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: L. Sertésorbánc elleni lóvérsavó.

Adagolás: L. Sertésorbánc elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×10 ml 18,50 Ft.

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-ANTITOXIN STANDARD Human
anti-haemolysin

Összetétel: Staphylococcus alpha-antitoxint tartalmazó nativ juhvérsavó glicerines konyhasóval készült hígítása, ml-enként 20 IE alpha-antitoxint tartalmaz. Konzerválószer: 66%-os glicerin.

Alkalmazás: Staphylococcus alpha-antitoxin-titer laboratóriumi meghatározására, összehasonlító standard szérumként, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5 ml 36,40 Ft.

STAPHYLOCOCCUS ALPHA-TOXIN Human
liofilezett

Összetétel: Staphylococcus-törzsből folyékony tápta-

lajon nyert, liofilezéssel tartósított alpha-toxin. Ampullánként 4 Lh-t (Limes haemolysans) tartalmaz. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,1%-os mertiolát.

Alkalmazás: A vérsavó staphylococcus alpha-antitoxin-titerének laboratóriumi meghatározására, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. Közvetlenül a Human Intézettől szerezhető be.

Csomagolás: 1×1 ampulla liofilezett anyag 21,40 Ft.

STIMALBUMIN Human

Összetétel: Magas tisztasági fokú emberi szérumalbumin 17%-os oldata. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát és 1 mg/ml kloramfenikol.

Alkalmazás: Az anti-D savóval végzett vércsoport-meghatározás kontrolljául szolgál, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 10×1 ml gumidugós üvegben 28,50 Ft.

O-STREPTOLYSIN Human liofilezett

Összetétel: Streptococcus-törzsből folyékony táptalajon nyert, liofilezéssel tartósított O-streptolysin. Ampullánként legalább 10 kötési egységet tartalmaz.

Alkalmazás: A vérsavó O-antistreptolysin-titerének laboratóriumi meghatározására, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 10× 1 ampulla liofilezett anyag 185,— Ft.

TETANUSZ elleni juhvérsavó Human nativ, 1500 IE

Összetétel: Tetanusz-toxoiddal és -toxinnal immunizált juhok nativ, steril vérsavója. Hatóérték: ml-enként legalább 125 IE. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Megelőzés céljára.

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×12 ml 82,30 Ft.

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human tisztított, 1500 IE

Összetétel: Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: ml-enként legalább 600 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Megelőzés céljára.

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. Sebészeti szakrendelések biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×2,5 ml 8,30 Ft.

TETANUSZ elleni juhvérsavó Human liofilezett, nativ, 1500 IE

Összetétel: Tetanusz-toxoiddal és -toxinnal immunizált juhok liofilezéssel tartósított, nativ vérsavója. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után

ml-enként legalább 125 IE. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: Megelőzés céljára.

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 12 ml oldószer 96,20 Ft.

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human liofilezett, tisztított, 1500 IE

Összetétel: Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként legalább 600 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Megelőzés céljára.

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Sebészeti szakrendelések biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. ✠

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 2,5 ml oldószer 11,90 Ft.

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human liofilezett, tisztított 20 000 IE

Összetétel: Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként

2000 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Gyógyítás céljára tetanusz-megbetegedés esetén.

Adagolás: L. tetanusz elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 10 ml oldószer 106,— Ft.

TETANUSZ elleni lóvérsavó Human tisztított és koncentrált, 20 000 IE

Összetétel: Tisztított tetanusz-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: ml-enként legalább 1700 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Gyógyítás céljára tetanusz-megbetegedés esetén.

Adagolás: Napi 100 000 IE izomba, ezt az adagot 3—4 naponként kell adni, majd az adagot fokozatosan csökkenteni kell. Igen súlyos esetben a napi adag $^1/_4$—½ részét intravénásan adjuk, a többit izomba. Recidiva esetén ½ adag izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×12 ml 76,70 Ft.

TETANUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó Human tisztított, 1500 IE

Összetétel: Tisztított tetanusz-szarvasmarhavérsavó koncentrált immunglobulinjainak steril oldata.

Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Megelőzés céljára.

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×5 ml 45,80 Ft.

TETANUSZ elleni szarvasmarha-vérsavó Human liofilezett, tisztított, 1500 IE

Összetétel: Tisztított tetanusz-szarvasmarhavérsavó koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként legalább 300 IE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Megelőzés céljára.

Adagolás: 1500 IE bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 5 ml oldószer 62,70 Ft.

TETANUSZ-toxoid Human adszorbeált oltóanyag

Összetétel: Tisztított, koncentrált tetanusz-toxoid: ml-enként legalább 12,5 kötési egység.
Adszorbens: alumíniumfoszfát-gél.
Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás és adagolás: A védőoltások végrehajtására vonatkozó utasítás alapján.

Tetanusz ellen oltani kell az olyan személyt, aki tetanusz fertőzésre gyanús sérülést szenvedett. A védőoltást a sérültet ellátó orvos köteles elvégezni. Az olyan sérültek esetében, akik 1941. január 1. napja után születtek, 1 ml tetanusz-toxoidot kell a sérülés ellátásával egyidejűleg beadni.

Az 1941. január 1. napja előtt születettek esetében:

a) ha tetanusz-védőoltást (alapimmunizálásokon kívül legalább egy emlékeztető oltást is) kaptak és azt igazolni is tudják, 1 ml tetanusz-toxoidot kell befecskendezni. Azoknál a sérülteknél, akik az emlékeztető oltást hat héten belül kapták meg, mellőzhető az újabb tetanusz-toxoid oltás;

b) ha oltatlanok, vagy oltásaikat igazolni nem tudják, 1500 IE gyógysavót és 1 ml tetanusz-toxoidot kell beadni és a sérültet figyelmezteni kell arra, hogy 1—1 ml tetanusz-toxoid beadása szükséges még a sérülést követő 1. és 3. hónap, illetőleg 1 év múlva;

c) ha a seb súlyosan roncsolt, shock, vérzés, sugárártalom, bennmaradt és földdel szennyezett idegentest esete áll fenn, az 1941. január 1. napjától született sérült esetében, illetőleg az *a)* pontban felsoroltaknál is kell 1500 IE gyógysavót befecskendezni.

Különösen veszélyeztetett esetben a sérülés után két héttel is kell adni 1 ml tetanusz-toxoidot.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére a sérült személy részére szabadon, minden esetben térítésmentesen rendelhető. Sebészeti szakrendelések biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 ml 3,45 Ft, 1×10 ml 13,70 Ft, 50×1 ml 107,— Ft.

TÍFUSZ-vakcina Human
liofilezett

Összetétel: *Salmonella typhi* törzsek liofilezéssel tartósított, elölt szuszpenziója. A mellékelt oldószerben szuszpendált készítmény ml-enként 1000 millió baktériumot tartalmaz. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Hastífusz megelőzésére.

Adagolás: Kellő védettség elérésére 1 oltás elegendő. A vakcina adagja felnőttek részére 0,5 ml, 12 évesnél fiatalabb gyermekek részére 0,25 ml. Az oltóanyagot bőr alá kell fecskendezni. A védettség tartama legalább 3 év. Ezen idő eltelte után újabb oltást kell adni 0,5 ml oltóanyaggal.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett vakcina és 1 ml oldószer, 31,—Ft 1 ampulla liofilezett vakcina és 5 ml oldószer. 37,70 Ft

TÍFUSZ—TETANUSZ Human
liofilezett kombinált oltóanyag

Összetétel: Csatolt oldószerében szuszpendálva ml-enként 1 milliárd elölt *Salmonella typhi*-baktériumot és 12,5 kötési egység tetanusz-toxoidot tartalmaz. Konzerválószer: 0,01%-os mertiolát.

Alkalmazás: Hastífusz és tetanusz megelőzésére.

Adagolás: *Megelőzésre:* (hastífusszal és tetanusszal szemben) 4—6 hetes időközönként 2×0,5 ml bőr alá vagy izomba.
Megelőzésre: (hastífuszos környezetében élő, vagy fertőzésnek kitett személyek esetében) 1×0,5 ml; 12 évnél fiatalabb gyermekek 1×0,25 ml-t kapnak bőr alá vagy izomba.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett oltóanyag és 1 gumidugós üvegben 5 ml oldószer. Csak hatósági oltás céljára.

TRICHOSAN Human
vakcina

Összetétel: Trichophytiasis profunda és superficialis esetekből kitenyésztett, különböző trichophyton-törzsek szemiszintetikus táptalajon nyert tenyészetének szűrlete. A tömény vakcina hígítás nélkül készül. Az ötös sorozat a tömény vakcina 1 : 50, 1 : 30, 1 : 10, 1 : 5 és 1 : 1 hígításait tartalmazza. Konzerválószer: 0,5%-os fenol.

Alkalmazás: *Diagnózis céljára:* trichophytiasis superficialis és profunda felismerésére.
Gyógyítás céljára: trichophytiasis kezelésére.

Adagolás: *Diagnózis céljára:* az 1 : 50-es hígításból 0,1 ml intracutan. Pozitív esetekben 24 óra múlva bőrpír.
Gyógyítás céljára: az 1 : 50-es hígítástól kezdődően 3—4 naponként intracutan vagy bőr alá, emelkedő adagban a tömény vakcináig.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 1,5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó. ✠

Csomagolás: 5×1 ml sorozat 34,20 Ft, 1×1 ml tömény 12,20 Ft, 1×5 ml tömény 32,30 Ft.

TUBERKULIN Human
albumózmentes

Összetétel: Human és bovin típusú gümőbaktériumok szintetikus folyékony táptalajon nyert tenyészetének glicerintartalmú, steril szűrlete. Konzerválószer: 0,02%-os chinosol.

Alkalmazás: *Diagnózis céljára:* Pirquet-féle cutanpróba, Mantoux-féle intracutan-próba, és subcutanpróba.

Adagolás: „Hígító oldat"-tal hígítva, használati utasítás szerint.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×1 ml 8,85 Ft.

HÍGÍTÓ-OLDAT TUBERKULINHOZ Human

Összetétel: 0,2866% $Na_2B_4O_7 \cdot 10\ H_2O$ p. a., 1,054% H_3BO_3 crist. pss., 0,2632% NaCl p. a. tartalmú (pH 7,4) steril, izotóniás pufferoldat. Konzerválószer: 0,3%-os fenol.

Alkalmazás: Mantoux-próba végzésére szolgáló tuberkulin-hígítások elkészítésére.

Megjegyzés: Lejárati idő: 5 év.

Csomagolás: 1×4,5 ml 6,90 Ft, 1×9 ml 7,45 Ft.

TISZTÍTOTT TUBERKULIN (TT) Human liofilezett

Összetétel: Human és bovin típusú gümőbaktériumok tenyészetének szűredékből tisztítási eljárással nyert készítmény. 5 TE/0,1 ml erősségben kerül forgalomba.

Alkalmazás: A Mantoux-féle intracutan-próba kivitelezésére szolgál.

Adagolás: 0,1 ml intracutan.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 100 TE + 2 ml oldószer = 5 TE/0,1 ml 12,40 Ft, 500 TE + 10 ml oldószer = 5 TE/0,1 ml 20,40 Ft.

TUBERKULIN-tapasz Human tisztított

Összetétel: Tapaszonként 0,25 mg tisztított tuberkulin.

Alkalmazás: Epicutan tuberkulin-próba kivitelezésére szolgál.

Adagolás: Vizsgálatonként 1 tapasz.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. Szobahőmérsékleten, száraz helyen tartandó.

Csomagolás: 5×1 tapasz 10,30 Ft, 20×1 tapasz 34,20 Ft.

VÖRHENY elleni lóvérsavó Human tisztított, 5000 SAE

Összetétel: Tisztított vörheny-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: legalább 800 SAE ml-enként. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: *Megelőzés céljára:* vörhenyfertőzésnek kitett, fogékony egyének oltására, különösen gyermekközösségekben és kórházi osztályokon.
Gyógyítás céljára: lehetőleg a vörheny korai szakában, különösen toxikus esetben.
Diagnózis céljára: vörhenygyanús beteg bőrkiütésének területén intracutan oltásra (Schultz—Charlton-reakció).

Adagolás: *Megelőzés céljából:* 3000—5000 SAE izomba.
Gyógyítás céljából: az eset súlyosságától függően 8000—10 000 SAE izomba. Igen súlyos esetekben (ha aluszékonyság, cianózis észlelhető): 12 000—15 000 SAE.
Diagnózis céljából: 0,2—0,5 ml intracutan.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére a kórisme megállapítására és gyógyítás céljára szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 3 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1×6,5 ml 155,— Ft.

VÖRHENY elleni lóvérsavó Human
liofilezett, tisztított, 5000 SAE

Összetétel: Tisztított vörheny-lóvérsavó koncentrált immunglobulinjainak liofilezéssel tartósított, steril oldata. Fehérjetartalom legfeljebb 12%. Hatóérték: a mellékelt oldószerben való oldás után ml-enként legalább 800 SAE. Konzerválószer: 0,25%-os fenol és 0,005%-os mertiolát.

Alkalmazás: Vörheny megelőzésére és gyógyítására.

Adagolás: L. vörheny elleni lóvérsavó.

Megjegyzések: ✠ Társadalombiztosítás terhére a kórisme megállapítására és gyógyítás céljára szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. 2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.

Csomagolás: 1 ampulla liofilezett szérum és 1 ampullában 6,5 ml oldószer 155,— Ft.

TÖRZSKÖNYVEZETT GYÓGYTÁPSZEREK

Társadalombiztosítás terhére a 3180/89—2/1951. Eü. M. sz. utasítás szerint rendelhetők. (l. 573. oldal.)

Adapta, Lactorizan, Maltiron az 1 éven aluliak részére minden esetben térítésmentesen rendelhető.

ADAPTA E.Gy.T.
műíró jellegű tejporkészítmény

Összetétel: 65% tejporkeverék (16,7% zsírtartalommal), 30% lebontott keményítő (legfeljebb 40% maltózban kifejezett redukálócukor-tartalommal), 5% cukor, 0,15% betain. hydrochlor, 0,0025% vitamin B_2, 0,10% vitamin C. (Kalóriaértéke: 430 Kal/100 g. — Fehérje 20,6%, zsír 10,7%, szénhidrát 60,4%.)

Javallatok: Csecsemőknek hozzátáplálásra, anyatejhiány kiegészítésére. Idült táplálkozási zavarok, atrophia, lieztártalom, exzudativ diathesis esetében.

Adagolás: Egy erősen tetézett evőkanál (kb. 25 g) Adaptát száraz ivópohárba hintünk. 1½ dl meleg vízzel teljesen simára elkeverjük, ezután kis edénybe öntjük és lassú tűzön, folytonos keverés közben, egyszeri teljes forrásig felforraljuk, majd a táplálékot szopósüvegben forralt vízzel 1½ dl-re kiegészítjük. Az így elkészített Adapta kalóriaértéke az anyatejnek felel meg, vagyis dl-enként 70 kalória. Utólagos savanyítás nem szükséges. Állandó táplálásra nem alkalmas.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 250 g 15,80 Ft, 2000 g 90,40 Ft.

CAPHOSEIN E.Gy.T.
Kalcium- és foszfordús tejfehérje-készítmény

Összetétel: 60% édes (oltós) kazein, 30% savkazein, 4% trinátriumfoszfát, nátriumhidrokarbonát legfeljebb 6%. (Kalóriaértéke 340 Kal/100 g. — Fehérje 81%, zsír 1,5%, szénhidrát 1,9%).

Javallatok: Alimentaris eredetű, lázzal nem járó dyspepsiák.

Adagolás: Anyatejjel táplált csecsemők részére (súlyállás és exsudativ pseudodyspepsia esetén) 1 kávéskanál (5 g) Caphoseint ½ dl hideg teában vagy vízben elkeverünk, felfőzzük, majd saccharinnal édesítjük. A testhőmérsékletű 10%-os oldatból 2—3 kávéskanálnyit fogyasztatunk minden szoptatás előtt. Mesterségesen táplált csecsemők részére (dyspepsia) a fenti előírás szerint készült oldatból az előírt táplálék minden decijében 3—4 kávéskanálnyit adunk.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 100 g 6,40 Ft.

DEXMALTAN E.Gy.T.
maltóz-dextrin tápcukorkészítmény

Összetétel: 100% lebontott keményítő (legfeljebb 32% maltózban kifejtett redukálócukor-tartalommal). (Kalóriaértéke: 400 Kal/100 g. — Szénhidrát 97,5%.)

Javallatok: Egészséges, de különösen dyspepsiára hajlamos csecsemők standard tejhígításainak és gyógytáplálékoknak szénhidrát-forrásképpen. Állandó táplálásra nem alkalmas.

Adagolás: Testsúlykg-onként feles vagy kétharmados tejhez 1 kávéskanálnyi Dexmaltant adunk. Részletes használati utasítás a csomagolásban.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 300 g 14,60 Ft, 2000 g 75,20 Ft.

LACTORIZAN E.Gy.T.
zsíros tejport, lebontott keményítőt és rizsnyákot tartalmazó készítmény

Összetétel: 50% zsíros tejpor (26% zsírtartalommal), 36% lebontott keményítő (legfeljebb 40% maltózban kifejezett redukálócukor-tartalommal), 14% Oriza, 0,10% vitamin C, 0,025% vitamin B_1, 0,0025% B_2. (Kalóriaértéke: 450 Kal/100 g. — Fehérje 14,7%, szénhidrát 64,2%.)

Javallatok: Anyatej hiánya esetén újszülöttkortól kezdve a megfelelő tejhígítások elkészítésére.

Adagolás: *2 hónapos csecsemőkorig:* 1½ dl vízhez késsel lesimított 2 evőkanál Lactorizant vegyünk. (Ez feles tejnek felel meg.)
2—7 hónapos csecsemőknél: 2 dl vízhez késsel lesimított 3 evőkanál Lactorizant vegyünk (ez kétharmados tejnek felel meg).
7 hónapos és ennél idősebb csecsemőknek: 2 dl vízhez késsel lesimított 3½ evőkanál Lactorizant használjunk (ez háromnegyedes tejnek felel meg).

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 300 g 19,80 Ft, 3500 g 169,— Ft.

MALTIRON E.Gy.T.
írót pótló szénhidrátos készítmény

Összetétel: 40% tejporkeverék (11,2% zsírtartalommal), 35% lebontott keményítő (legfeljebb 40% maltózban kifejezett redukálócukor-tartalommal), 25% Oriza, 0,10% vitamin C, 0,01% vitamin A, 0,0025% vitamin B_1, 0,0025% vitamin B_2. (Kalóriaértéke: 400 Kal/100 g. — Fehérje 15,8%, zsír 4,5%, szénhidrát 71,1%.)

Javallatok: Dyspepsia, dysenteria, enteritisek és exsudativ diathesis bél-manifestatiói esetén mint hasmenést csökkentő gyógytáplálék.

Adagolás: 1 dl táplálék elkészítéséhez 2 lesimított evőkanál Maltiront főzünk fel 1 dl vízben. A Maltiront a lemért víz egy kis mennyiségében előzőleg

simára elkeverjük, majd a többi vizet hozzáöntjük, felforraljuk és azután teljesen hidegre hűtjük. A lehűlés után a táplálékot 1 kávéskanálnyi citromlével vagy 5%-os ételecettel megsavanyítjuk oly módon, hogy a citromlevet vagy az ételecetet a lehűtött táplálékba fokozatosan, erőteljes keverés-sel belekeverjük.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 300 g 18,20 Ft, 3500 g 166,80 Ft.

ORIZA E.Gy.T.

szárított rizsnyákkészítmény

Összetétel: 50% rizsnyák (szárított), 50% tengerikeményítő, 0,005% vitamin B_1, 0,005% vitamin B_2. (Kalóriaértéke: 390 Kal/100 g. — Fehérje 4,5%, zsír 0,3%, szénhidrát 89,5%.)

Javallatok: Egészséges csecsemők tejhígító rizsnyákoldatának elkészítéséhez, hasmenéssel járó táplálkozási zavarok esetén.

Adagolás: Gyógytáplálékul, ún. sűrű nyák elkészítéséhez 2 evőkanál (10 g) Orizát főzünk fel ½ dl vízben, és ezt a 10%-os nyákoldatot édesítjük szacharinnal vagy Dexmaltannal. Tejhígításhoz 1 evőkanálnyi (5 g) Orizát 1 dl vízben forralással feloldunk, és feles tejhígítás esetén ugyanannyi, kétharmados hígítás esetén pedig 2 rész tejjel elegyítjük.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 220 g 6,50 Ft, 4500 g 80,— Ft.

PREDAPTA E.Gy.T.

műíró jellegű tejporkészítmény, csak koraszülöttek részére

Összetétel: 70,0% sovány tejpor, 27,0% lebontott keményítő (legfeljebb 40% maltózban kifejezett redukálócukor-tartalommal), 27,0% cukor, 0,14% sósavas betain, 0,05% vitamin C, 0,0025% vitamin B_1, 0,0025% vitamin B_2. (Kalóriaértéke: 390 Kal/100 g. — Fehérje 26,5%, zsír 1%, szénhidrát 61,8%.)

Javallatok: Koraszülöttek zsírban szegényebb fehérjével való lökés kezelésére. Állandó táplálásra nem alkalmas.

Adagolás: A szükséges mennyiséget 2 lesimított evőkanál (= kb. 20 g) száraz ivópohárba hintjük, és kb. 3-szoros mennyiségű meleg vízzel teljesen simára keverjük. Ezután kis edénybe öntjük, és lassú tűzön, folytonos keverés közben, egyszeri forrásig felforraljuk, majd a táplálékot a szopóüvegben forralt vízzel 100-ra kiegészítjük. Az így elkészített Predapta tápértéke az anyatejnek felel meg, vagyis dl-enként kb. 70 kalória. Cukor, tej hozzáadása, valamint utólagos savanyítás nem szükséges.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére történő rendelését rendelet szabályozza. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 200 g 13,80 Ft, 2000 g 72,90 Ft.

TÁPSZEREK
DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK

(Társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők)

RIZOMALTAN E.Gy.T.
rizsnyákos tápcukor

Összetétel: 66,6% dextrin-maltos., 33,3% szárított rizsnyák.

Adagolás: 1 dl tejkeverékhez 1 lesimított evőkanál Rizomaltan.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év.

Csomagolás: 300 g 16,10 Ft.

ZAMAKO KÉK E.Gy.T.
csecsemők részére

Összetétel: 63,30% gabonaliszt, 16,40% cukor, 18,10% malátakivonat, 1,31% tejpor, 0,80% rizskávékaramell (B-vitamin-komplex), 0,09% ammon. carb.

Adagolás: 3 hónapos csecsemőnek 8 evőkanál tehéntej, 4 evőkanál víz, 1 tetézett kávéskanál Zamako; 4—5 hónapos csecsemőnek 2 dl kétharmados tej, 2 kávéskanál Zamako; 6—9 hónapos csecsemőnek 2 dl kétharmados tej, 2 gyengén púpozott kávéskanál Zamako.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 330 g 11,— Ft, 3500 g 74,60 Ft.

ZAMAKO SÁRGA E.Gy.T.
foszforos tápszer

Összetétel: 58,60% gabonaliszt, 20,60% cukor, 16,80% malátakivonat, 1,25% tejpor, 1,50% rizskávékaramell (B-vitamin-komplex), 1,25% natr. phosph.

Adagolás: 2 dl tejhez gyermekeknek 2 kávéskanálnyi, felnőtteknek 2—3 kávéskanálnyi Zamako.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 300 g 11,— Ft, 3500 g 74,60 Ft.

TÖRZSKÖNYVEZETT REAGENSEK (BIOGAL)

Reagensek a társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők. A Nylander-reagens cukorbeteg vizeletének a beteg lakásán történő vizsgálatához kivételesen a beteg nevére társadalombiztosítási vényűrlapon rendelhető

DIAZO-I-REAGENS (Ehrlich) Ph. Hg. VI.
(Vérvizsgálathoz. Amin kimutatására)

Összetétel (előirat): 0,5 g acid. p-aminobenzolsulfonic., 5 g acid. hydrochlor. conc., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 19,20 Ft, 250 ml 23,— Ft, 500 ml 27,80 Ft, 1000 ml 42,90 Ft.

DIAZO-II-REAGENS (Ehrlich) Ph. Hg. VI.
(Vérvizsgálathoz)

Összetétel (előirat): 0,5 g natr. nitros., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 18,20 Ft, 250 ml 20,40 Ft, 500 ml 26,40 Ft 1000 ml 32,90 Ft.

EBNER-I-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Mycobact. tubercul. felismerésére. Ziehl — Neelsen-festés)

Összetétel (előirat): 50 ml sol. natr. chlor. aqu. satur., 50 ml aqu. dest., 2 ml acid. hydrochlor. conc.

Csomagolás: 100 ml 18,60 Ft, 250 ml 22,30 Ft, 500 ml 29,90 Ft, 1000 ml 39,70 Ft.

EBNER-II-OLDAT
(Mycobact. tubercul. felismerésére. Ziehl — Neelsen-festés)

Összetétel (előirat): 0,5 g natr. chlor., 5 g acid. hidrochlor. dil., 15,5 g aqu. dest., 80 g spir. concentratiss.

Csomagolás: 100 ml 25,90 Ft, 250 ml 40,— Ft, 500 ml 65,30 Ft, 1000 ml 110,50 Ft.

ECETSAVAS METILÉNKÉK-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Corynebact. diphtheriae felismerésére. Neisser-festéshez)

Összetétel (előirat): 0,1 g methylen. coerul., 2 ml spir. concentratiss., 5 ml acid. conc., aqu. dest. 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 19,— Ft, 250 ml 22,90 Ft, 500 ml 31,10 Ft, 1000 ml 42,50 Ft.

EHRLICH-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Urobilinogen kimutatásához)

Összetétel (előirat): 2 g p-dimethylaminobenzaldehyd., acid. hydrochlor (20%) ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 22,50 Ft, 250 ml 30,50 Ft, 500 ml 44,20 Ft, 1000 ml 71,20 Ft.

FEHLING-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Cukorkimutatáshoz)

Összetétel (előirat): 6,93 g cupr. sulf. cryst., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 18,90 Ft, 250 ml 22,30 Ft, 500 ml 30,10 Ft, 1000 ml 40,— Ft.

FEHLING-II-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Cukorkimutatáshoz)

Összetétel (előirat): 34,6 g kal. natr. tart., 10 g natr. hydroxyd., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 23,— Ft, 250 ml 31,— Ft, 500 ml 44,— Ft, 1000 ml 69,70 Ft.

FUKSZIN-ALAPOLDAT (telített szeszes) Ph. Hg. VI.
(Baktériumvizsgálathoz, festékoldat)

Összetétel (előirat): sol. fuchsin. basic. spir. (96 v/v%) satur.

Csomagolás: 50 ml 22,90 Ft, 100 ml 28,20 Ft, 250 ml 45,60 Ft, 500 ml 69,90 Ft, 1000 ml 134,— Ft.

GENCIÁNAIBOLYA-ALAPOLDAT (telített szeszes) Ph. Hg. VI.
(Baktériumvizsgálathoz, festékoldat)

Összetétel (előirat): sol. methylrosanilin. chlor. spir. (96 v/v%) satur.

Csomagolás: 50 ml 26,90 Ft, 100 ml 35,60 Ft, 250 ml 64,— Ft, 500 ml 112,90 Ft, 1000 ml 153,— Ft.

GIEMSA-OLDAT (Metilénkék-azureozin-oldat) Ph. Hg. VI.
(Vérképvizsgálathoz. Romanovszky—Giemsa-festés)

Összetétel (előirat): 0,3 g azur-II-eosin, 0,08 g azur-II, 25 g glycerin, 25 g alc. methyl.

Csomagolás: 50 ml 22,30 Ft, 100 ml 27,10 Ft, 250 ml 43,40 Ft, 500 ml 71,90 Ft, 1000 ml 123,80 Ft.

GYÉMÁNTFUKSZIN-OLDAT 0,02%-os Ph. Hg. VI.
(Vérvizsgálathoz)

Összetétel (előirat): 0,02 g fuchsin-basic., aqua dest. ad. 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 18,50 Ft, 250 ml 21,— Ft, 500 ml 27,— Ft, 1000 ml 34,10 Ft.

HAYEM-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Vörösvérsejtek számlálásához)

Összetétel (előirat): 2,5 g natr. sulf. cryst., 0,5 g natr. chlor., 0,25 g hydrarg. bichlor. corros., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 18,90 Ft, 250 ml 22,30 Ft, 500 ml 30,10 Ft, 1000 ml 40,30 Ft.

KARBOLOS FUKSZIN-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Mycobact. tubercul. felismerésére. Ziehl—Neelsen-festéshez)

Összetétel (előirat): 5 ml sol. fuchsin. basic. spir. (96 v/v%) satur., 50 ml sol. phenol. (5%-os).

Csomagolás: 50 ml 19,— Ft, 100 ml 21,10 Ft, 250 ml 27,70 Ft, 500 ml 40,70 Ft, 1000 ml 61,80 Ft.

KARBOLOS GENCIÁNAIBOLYA-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Baktériumvizsgálathoz. Gram-festéshez)

Összetétel (előirat): 5 ml sol. methylrosanilin. chlor. spir. (96 v/v%) satur., 50 ml sol. phenol. (5%).

Csomagolás: 50 ml 21,90 Ft, 100 ml 29,20 Ft, 250 ml 45,30 Ft, 500 ml 71,40 Ft, 1000 ml 122,60 Ft.

KÁLIUMHIDROXID-OLDAT 20% Ph. Hg. VI.

Összetétel (előirat): 20 g kal. hydroxyd., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 20,40 Ft, 250 ml 24,50 Ft, 500 ml 31,10 Ft, 1000 ml 44,10 Ft.

KRISTÁLYIBOLYA-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Corynebact. diphtheriae felismerésére. Neisser-festéshez)

Összetétel (előirat): 0,333 g hexamethylpararosanilin. hydrochlor., 3,33 ml spir. concentratiss. aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 19,30 Ft, 250 ml 23,70 Ft, 500 ml 32,90 Ft, 1000 ml 46,30 Ft.

KRIZOIDIN-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Corynebact. diphtheriae felimerésére. Neisser-festéshez)

Összetétel (előirat): 0,667 g chrysoidin, aqu. dest. 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 24,40 Ft, 250 ml 35,60 Ft, 500 ml 56,70 Ft, 1000 ml 93,60 Ft.

LÖFFLER-FÉLE METILÉNKÉK-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Baktériumvizsgálathoz szükséges festékoldat)

Összetétel (előirat): 12 ml sol. methylen. coerul. spir. (96 v/v%) satur., 40 ml sol. kal. hydroxyd. (0,01%) aquosum.

Csomagolás: 50 ml 18,90 Ft, 100 ml 21,— Ft, 250 ml 27,10 Ft, 500 ml 40,— Ft, 1000 ml 60,10 Ft.

LUGOL-OLDAT (0,33% jóddal) Ph. Hg. VI.
(Baktériumvizsgálathoz szükséges festékoldat. Gram-festéshez)

Összetétel (előirat): 0,333 g jod., 0,666 g kal. jod., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 18,60 Ft, 250 ml 22,30 Ft, 500 ml 26,60 Ft, 1000 ml 35,60 Ft.

MANSON-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Wright-féle csíraszám-meghatározáshoz)

Összetétel (előirat): 5 g natr. bor., 2 g methylen. coerul., aqu. dest. 100 ml.

Csomagolás: 50 ml 18,50 Ft, 100 ml 19,60 Ft, 250 ml 24,40 Ft, 500 ml 34,10 Ft, 1000 ml 48,20 Ft.

MAY—GRÜNWALD-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Metilénkék—eozin-oldat, vérvizsgálathoz)

Összetétel (előirat): 0,125 g methylen. coerul. eozin. alc. methyl. ad 50 ml.

Csomagolás: 50 ml 18,63 Ft, 100 ml 20,30 Ft, 250 ml 24,90 Ft, 500 ml 36,20 Ft, 1000 ml 52,50 Ft.

METILÉNKÉK-OLDAT (telített szeszes) Ph. Hg. VI.
(Baktériumvizsgálathoz használatos festékoldat)

Összetétel (előirat): sol. methylen. coerul. spir. (96 v/v%) satur.

Csomagolás: 50 ml 22,90 Ft, 100 ml 28,80 Ft, 250 ml 46,80 Ft, 500 ml 79,— Ft, 1000 ml 138,40 Ft.

NÁTRIUMKLORID—CINKSZULFÁT-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Nátriumklorid—cinkszulfátos kálium-jodid-oldat készítéséhez. Hagedorn—Jensen-vizsgálathoz)

Összetétel (előirat): 25 g natr. chlor., 5 g zinc. sulf., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 23,70 Ft, 250 ml 31,40 Ft, 500 ml 43,40 Ft, 1000 ml 66,40 Ft.

n NÁTRONLÚG MÉRŐOLDAT (1 mólos) Ph. Hg. VI.

Összetétel (előirat): sol. natr. hydroxyd. n.

Csomagolás: 250 ml 20,40 Ft, 500 ml 26,40 Ft, 1000 ml 32,90 Ft.

0,1 n NÁTRONLÚG MÉRŐOLDAT (1/10 mólos) Ph. Hg. VI.

Összetétel (előirat): sol. natr. hydroxyd. 0,1 n.

Csomagolás: 250 ml 19,70 Ft, 500 ml 24,90 Ft, 1000 ml 30,10 Ft.

NONNE—APPELT-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Liquor-vizsgálathoz. Fehérjekimutatáshoz)

Összetétel (előirat): sol. ammon. sulf. aqu. satur.

Csomagolás: 100 ml 25,10 Ft, 250 ml 38,60 Ft, 500 ml 60,80 Ft, 1000 ml 101,90 Ft.

NYLANDER-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Cukorkimutatáshoz)

Összetétel (előirat): 4 g kal. natr. tart., 10 g natr. hydroxyd., 2 g bism. subnitr., aqu. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 21,60 Ft, 250 ml 30,10 Ft, 500 ml 42,20 Ft, 1000 ml 61,10 Ft.

PÁNDY-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Liquor-vizsgálathoz. Fehérjekimutatáshoz)

Összetétel (előirat): sol. phenol. aqu. satur.

Csomagolás: 100 ml 18,60 Ft, 250 ml 22,30 Ft, 500 ml 26,60 Ft, 1000 ml 36,20 Ft.

n SÓSAV MÉRŐOLDAT (1 mólos) Ph. Hg. VI.

Összetétel (előirat): 1 ml oldat 36,465 mg HCl-t tartalmaz.

Csomagolás: 250 ml 22,90 Ft, 500 ml 26,60 Ft, 1000 ml 32,90 Ft.

0,1 n SÓSAV MÉRŐOLDAT (1/10 mólos) (0,01‰ szublimát-tartalommal)

Összetétel (előirat): 250 ml sol. acid. hydrochl. 0,1 n, 2,5 mg hydrarg. bichlor. corros.

Megjegyzés: Olyan eljárásokban, amelyekben a higanynyomok jelenléte is zavaró, nem használható.

Csomagolás: 250 ml 20,50 Ft, 500 ml 25,10 Ft, 1000 ml 30,10 Ft.

SÓSAVAS ALKOHOL Ph. Hg. VI.
(Mycobact. tubercul. felismerésére. Ziehl—Neelsen-festéshez)

Összetétel (előirat): 3 ml acid. hydrochl. concentratiss., spir. concentratiss. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 27,— Ft, 250 ml 46,70 Ft, 500 ml 70,40 Ft, 1000 ml 121,20 Ft.

20%-os SZULFOSZALICILSAV-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Vizeletvizsgálathoz. Fehérjekimutatáshoz)

Összetétel (előirat): 20 g acid. sulfosalic., aqu. dest. 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 26,40 Ft, 250 ml 37,50 Ft, 500 ml 60,40 Ft, 1000 ml 101,— Ft.

TÖPFER-OLDAT Ph. Hg. VI.

Összetétel (előirat): 0,125 g p-dimethylaminoazobenzol, 1 g phenolphth., spir. conc., ad 50 ml.

Csomagolás: 50 ml 23,20 Ft, 250 ml 48,60 Ft, 500 ml 82,90 Ft, 1000 ml 110,40 Ft.

TÜRK-OLDAT Ph. Hg. VI.
(Vérvizsgálathoz. Fehérvérsejtek számlálásához)

Összetétel (előirat): 1 g acid. acet. conc., 1 ml sol. methylrosanilin. chlor. aqu. 1%, aq. dest. ad 100 ml.

Csomagolás: 100 ml 18,50 Ft, 250 ml 21,20 Ft, 500 ml 27,80 Ft, 1000 ml 35,60 Ft.

ACIDIGEN Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 4,5 g NH_4Cl-, 3,5 g NaCl- és 0,50 g KCl-tartalmú steril, pirogénmentes, izotóniás elektrolitoldat.

Alkalmazás: Metabolikus alkalózisban.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 22,70 Ft.

ALKALIGEN Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 13 g $NaHCO_3$-tartalmú steril, pirogénmentes, izotóniás elektrolitoldat.

Alkalmazás: Metabolikus acidózisban, illetve minden olyan esetben, amikor a Standard bicarbonat értéke 18 mEq/l alá, vagy amikor a bázisfelesleg 5 mEq/l alá csökken.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 25,— Ft.

FRUCTOSOL 5 Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 50 g *d*-fruktóz-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Célzott elektrolit-therapiában alapoldatként alkalmazható; folyadék- és kalóriaszükséglet kielégítésére, különösen olyan esetekben, amelyekben az endogén inzulin képzés zavart.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat. 26,20 Ft.

FRUCTOSOL 10 Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 100 g *d*-fruktóz-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Célzott elektrolit-therapiában alapoldatként alkalmazható; folyadék- és kalóriaszükséglet kielégítésére, különösen olyan esetekben, ahol az endogen inzulin képzés zavart.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat. 36,40 Ft.

FRUCTOSOL 10-E Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 100 g *d*-fruktóz- és 50 g etilalkohol-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Célzott elektrolit-therapiában alapoldatként alkalmazható; folyadék- és kalóriaszükséglet kielégítésére, különösen olyan esetekben, ahol az endogen inzulin képzés zavart. Alkoholtartalmánál fogva nyugtató és enyhe fájdalomcsillapító hatású.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat: 36,80 Ft.

25%-os HUMAN ALBUMIN Human

Összetétel: Egészséges emberek plazmájából alkoholos eljárással előállított fehérjefrakció 25%-os, sószegény oldata, mely 0,02 mol nátriumkaprillátot tartalmaz. Fehérjetartalmának legalább 95%-a albumin. Tartósítószert nem tartalmaz.

Alkalmazás: Adagolása akkor javallt, ha a keringő vérmennyiség bármely oknál fogva csökkent. A 25%-os Human albumin-oldat hasznos pótszer, ha teljes vér vagy vérplazma nem áll rendelkezésre.
Sebészetben: Shockos állapotok kezelésére és megelőzésére, továbbá sulyos vérveszteségeknél (égés, sérülés).
Belgyógyászatban: Albuminhiányban, oedemákban, a fehérje- és az elektrolitháztartás együttes zavaraiban (oedema, ascites stb.).
Nőgyógyászatban: A terhesség folyamán kialakult elektroliteltolódások és a fokozott érpermeabilitás miatt a dehidratáló hatású 25%-os human albumin előnyös, praeeclampsiás állapotokban.
Gyermekgyógyászatban: Koraszülöttek felneveléséhez, atrophiában, fehérjehiányban jól alkalmazható.

Ellenjavallatok: Mivel a human albumin intravenás alkalmazása a vérnyomást és a plazmatérfogatot növeli, különös óvatossággal kell eljárni, dekompenzált vitiumok, hypertonia, nyelőcső-visszértágulat, haemorrhagiás diathesis, anuria stb. esetén.

Adagolás: A beadandó mennyiséget a beteg általános állapota, a haemo-koncentráció és az elvesztett vér mennyisége szabja meg. A 25%-os oldat átlagos adagja sebészeti esetekben testsúlykg-onként 1 ml 1 óra alatt. Maximális adagja 2 ml/kg óránként. A beadás sebessége maximálisan 2 ml percenként. A hypertoniás albuminoldatot tehát nagyon lassan kell adni, mert a keringő vérmennyiség igen gyorsan nőhet és az albumin vízmegkötő képessége miatt ily módon a keringést túlterhelhetjük.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: 2 év. 2—10 °C hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. A palackok kinyitása után a készítményt azonnal fel kell használni.

Csomagolás: 100 ml-es palackokban 333,— Ft.

ISODEX Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 50 g dextróztartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Célzott elektrolit-therapiában alapoldatként alkalmazható; súlyos hypertoniás dehydratio (hypernatraemia) eseteiben, az infúziós therapia bevezetésére.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 24,10 Ft.

ISORINGER Human
infúziós oldat

Összetétel: Literenként 7,95 g NaCl-, 0,52 g KCl-, 0,28 g $CaCl_2$ és 0,10 g $MgCl_2$-tartalmú steril, pirogénmentes, izotóniás elektrolitoldat.

Alkalmazás: Folyadékpótlásra csak nagyfokú hyponatraemia eseteiben alkalmazható. Folyadékpótlásra rutinszerűen nem javallt.

Adagolás: Szokásos alkalmazása intravenásan, cseppinfúzióban a használati utasítás szerint. Kivételesen subcutan is bevihető.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat, 22,70 Ft.

LACTODEX Human
infúziós oldat

Összetétel: Literenként 2,0 g NaCl-, 0,3 g KCl-, 0,11 g $CaCl_2$-, 50 ml molos nátriumlaktát- és 50 g dextróztartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Metabolikus acidózisban.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — A sav-bázis státus ellenőrzéséről az infúziós therapia folyamán gondoskodni kell. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 25,10 Ft.

LIOTRIS Human
liofilezett infúzió

Összetétel: Oldószerében (deszt. víz) feloldva 0,3 mol tris (hidroximetil) aminometánt tartalmaz. Az így nyert készítmény steril, pirogénmentes.

Alkalmazás: Felnőtt- és gyermekkorban resuscitatiót, traumát, shockot, égést, pancreatitist, peritonitist, eclampsiát, áramütést, diabetest stb. kísérő metabolikus acidózisban; akut respiratorikus acidózisban megfelelő beavatkozások kiegészítőjeként; extracorporalis keringés módszerével végzett sebészi beavatkozásoknál a haemodilutiós perfúziós folyadék alkotórészeként.
Újszülötteknél szülés után magzati asphyxiát, aspiratiós syndromát, dystress syndromát kísérő acidózisban; icterus gravis neonatorum esetén a vércsere kapcsán kialakuló acidózis korrigálására.

Adagolás: Kizárólag nagy vénába, lassú cseppszámmal adható, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 5 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban 400 ml oldat készítéséhez szükséges pulvis 30,— Ft és 500 ml-es palackban 400 ml oldószer, 100 ml-es palackban 100 ml oldat készítéséhez szükséges pulvis és 100 ml-es palackban 100 ml oldószer — ármegállapítás alatt, 5×5 ml oldat készítéséhez szükséges pulvis és 5×5 ml oldószer — ármegállapítás alatt.

MANNISOL A Human
infúziós oldat

Összetétel: Literenként 100 g *d*-mannit-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Postoperativ állapotokban a diuresis elősegítésére.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 25,— Ft.

MANNISOL B Human infúziós oldat

Összetétel: 100 ml-enként 20 g *d*-mannit-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Anuria megelőzésére műtét utáni állapotokban, veseműtétek után és idült uremia speciális eseteiben.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény szobahőmérsékleten, száraz helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 40,— Ft.

5%-os PLAZMAPROTEIN Human

Összetétel: Egészséges emberek plazmájából alkoholos kicsapással készített fehérjefrakció 5%-os sószegény oldata, mely 3% dextrozét és 0,332% nátriumkaprillátot tartalmaz. Fehérjetartalmának legalább 80%-a albumin. Tartósítószert nem tartalmaz.

Alkalmazás: Adagolása akkor javallt, ha a keringő vérmennyiség bármilyen oknál fogva csökkent, ha a vérzés, trauma, égés, fagyás, vagy műtét shockos állapotot váltott ki, vagy ha nagyfokú véreresteség áll fenn. Hasznos pótszer, ha teljes vér vagy vérplazma nem áll rendelkezésre és sürgős esetben transzfúzió szükséges, vagy ha van ugyan vér, de rendkívüli körülmények miatt véresoport-meghatározásra nincs mód. A készítmény különböző (pl. vese eredetű) hyperalbuminaemia kezelésére is eredményesen használható.

Ellenjavallat: Különös óvatossággal kell eljárni dekompenzált vitiumok, hypertonia, nyelőcső-visszértágulat, haemorrhagiás diathesis, anuria stb. esetén.

Adagolás: A beadandó mennyiséget a beteg általános állapota, a haemo-koncentráció és az elvesztett vér mennyisége szabja meg. Égési és fagyási shockban a sérült testfelület nagysága, illetőleg a haemo-koncentráció az irányadó. Akut hypalbuminaemia esetében cseppinfúzió, vagy ha keringési viszonyok és a sürgősség megengedhetővé, illetőleg szükségessé teszik, sugárban végzett infúzió formájában.
Krónikus hypalbuminaemia (nephrosis, máj-cirrhosis) esetében naponta 100—200 ml 5%-os oldatot adunk mindaddig, amíg a szérum albuminszintje nem normalizálódik. Koraszülöttek hypalbuminaemiája esetén, vagy ennek megelőzése céljából, hetenként 2—3 ízben 20—40 ml oldat ajánlatos.

Megjegyzések: Szakrendelések a biztosítottak részére nem a társadalombiztosítás terhére, hanem a pro ambulantia szerekre meghatározott módon szerezhetik be. — Lejárati idő: 2 év.
2—10 °C hőmérsékleten, száraz, sötét helyen tartandó.
A palackok kinyitása után a készítményt azonnal fel kell használni.

Csomagolás: 100 ml-es palackban 116,90,
300 ml-es palackban 287,20 Ft.

RINDEX 5 Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 4,0 g NaCl-, 0,26 g KCl-, 0,14 g $CaCl_2$-, 0,05 g $MgCl_2$- és 50 g dextróz-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Parenteralis folyadék—elektrolit-therapia bevezetésére alkalmas oldat.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 24,80 Ft.

RINDEX 10 Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 4,0 g NaCl-, 0,26 g KCl-, 0,14 g $CaCl_2$-, 0,05 g $MgCl_2$ és 100 g dextróz-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Parenteralis folyadék—elektrolit-therapia bevezetésére alkalmas oldat, 10% dextróz tartalmánál fogva a napi kalóriaszükséglet részbeni fedezésére alkalmas.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 29,50 Ft.

RINGER 5 Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 7,95 g NaCl-, 0,52 g KCl-, 0,28 g $CaCl_2$-, 0,10 g $MgCl_2$- és 50 g dextróz-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Folyadékpótlásra csak nagyfokú hyponatraemia eseteiben alkalmazható. Folyadékpótlásra rutinszerűen nem javallt.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 28,90 Ft.

SALETANOL Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 4,5 g NaCl-, 50 g dextróz és 50 g etilalkohol-tartalmú steril, pirogénmentes oldat.

Alkalmazás: Folyadékpótlásra általánosan alkalmas, különösen akkor, ha kalóriabevitel is szükséges; alkoholtartalmánál fogva nyugtató és enyhe fájdalomcsillapító hatású.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 30,— Ft.

SALSOL A Human infúziós oldat

Összetétel: Literenként 9 g NaCl-tartalmú steril, pirogénmentes, izotóniás elektrolit oldat.

Alkalmazás: Infúziós folyadék-therapia bevezetésénél sóhiányos exsiccosisban alkalmazható a hyponatraemia fokának ismeretében; az elektrolit-therapiában alapoldatként használható.

Adagolás: Kizárólag intravenásan, cseppinfúzióban, a használati utasítás szerint.

Megjegyzések: Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető. — Lejárati idő: 1 év. A készítmény száraz, hűvös helyen tartandó.

Csomagolás: 500 ml-es palackban kb. 400 ml oldat 14,90 Ft.

MAGYAR TERMÉSZETES KESERŰ- ÉS GYÓGYVIZEK

APENTA
FERENC JÓZSEF
HUNYADI JÁNOS
IGMÁNDI
MIRA, MIRA BABY

Javallatok: Egyszeri erélyes hashajtás, habitualis székrekedés, bélhurutok, a végbél és az alhasi szervek olyan megbetegedései, amelyekben a székelés fájdalmas, továbbá amikor a hasprés működtetése tilos.

Mellékjavallatok: Hasüri pangások, cardiovascularis tünetcsoport, ólom-, bárium-, bizmut-, analin-, fenol- stb. mérgezések.

Adagolás: Egyszeri hashajtóként 200—300 g hidegen, hosszabb időn át — a könnyű széklet biztosítására — egyénileg megállapított kisebb adagok (napi 2—3 evőkanál, esetleg fél borospohár), hidegen vagy langyosan. Bélhurutok kezelését 100—200 g mennyiségű felmelegített vízzel végezzük. A keserűvíz mindig *éhgyomorra* fogyasztandó.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhetők.

Csomagolás: Apenta 0,7 l .....3,— Ft
Ferenc József 0,7 l .....3,— Ft
Hunyadi János 0,7 l .....3,— Ft
Igmándi 0,7 l .....3,30 Ft
Mira keserű 0,7 l .....3,— Ft
Mira „baby" 1 l .....3,60 Ft
0,7 l .....3,— Ft

MIRA GLAUBERSÓS GYÓGYVÍZ

Javallatok: Hepatitis, icterus, cholecystitis, cholangitis, hyperaciditas, gyomor- és vékonybélfekély kiújulásának megelőzése, heveny és idült gyomorhurut. Bélhurutok. Hasüregi pangások, diabetes.

Adagolás: Heveny hurutok kezelésére néhány napon át, hosszabb betegségek kezelésére 4—5 héten át naponta kétszer 200—300 g étkezés előtt, felmelegített állapotban. A kúra szünetekkel többször megismételhető.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 l üveg 3,60 Ft, 0,7 l üveg 3,— Ft.

JODAQUA JÓDOS VÍZ
9,5 mg% jódtartalommal

Javallatok: Normo- és hypofunctiós golyva, valamint golyvamegelőzés.

Mellékjavallatok: Hypertonia, arteriosclerosis, scrofulosis, a lues késői manifestatiói; gyógyulási hajlamot nem mutató idült gyulladások, menses-zavarok, climaxos panaszok, ólommérgezés. Napi adag: amennyiben a pajzsmirigy állapota megengedi, 1—3 evőkanál. Ivókúra közben rendszeres orvosi ellenőrzésre van szükség.

Adagolás: Normofunctiós golyva kezelésére felnőtteknek és gyermekeknek naponta 2 kávéskanál, hypofunctiós golyva kezelésére, valamint megelőzés céljára gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt naponta 1 kávéskanál. A víz 50—100 g közönséges vízzel hígítandó.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 0,35 l üveg 1,80 Ft.

SALVUS ALKALIKUS GYÓGYVÍZ
1000 g-ban 18 g $NaHCO_2$ és 9 g NaCl

Javallatok: Heveny és idült gyomorhurut, hyperaciditas, continualis hypersecretio, a légutak heveny és idült hurutjai.

Mellékjavallatok: A húgyutak hurutjai, a vesemedence húgysavas szedimentumképződésének megelőzése.

Adagolás: Javallatokhoz: Gyomorhurut kezelésére naponta 1—2 ízben étkezés előtt 100 g felmelegítve és ugyanannyi vízzel hígítva. Idült esetben a kúra időtartama 4—6 hét. Hyperaciditas kezelésében étkezés után a gyomoremésztés egész ideje alatt 30—60 percenként 1—2 korty, esetleg 50 g felmelegítve, continualis hypersecretio esetében — a panaszok súlyossága szerint — egész napon át 1—2 óránként ugyanannyi. A légutak hurutjának kezelésére naponta 3—6 ízben 100 g víz rendelendő, felmelegített állapotban, ugyanannyi vízzel, de még inkább tejjel hígítva. Idült esetekben a kúra tartama 4—6 hét. Használható porlasztókészülékben inhaláció alakjában is.

Mellékjavallatoknál: Naponta több ízben 50—100 g evés előtt, felmelegített állapotban.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető.

Csomagolás: 1 l üveg 4,20 Ft, 0,7 l üveg 3,50 Ft.

KÖTSZEREK

Társadalombiztosítás alapján igényjogosultak kezeléséhez az orvosi rendelőben felhasználásra kerülő kötszereket, ragtapaszokat a *„pro ambulantia"* szerekre meghatározott módon kell beszerezni. Egyéb esetben — az IDEAL PÓLYA kivételével — *szabadon rendelhetők.* Az IDEAL PÓLYA gyógyászati segédeszköznek számít — olyan helységben lakók részére, ahol rendelőintézet van, csak szakrendelések, egyebütt lakók részére a körzeti orvosok is rendelhetik vényűrlapon, *indokolással.* Kiszolgáltatásához jogosítás nem szükséges.

Vatta, sebészeti, steril	25 g	1,90 Ft
	50 g	3,30 Ft
	100 g	6,30 Ft
	250 g	14,90 Ft
Vatta, szemészeti	100 g	8,10 Ft
	250 g	20,10 Ft
	1000 g	78,90 Ft
Vatta, nem steril	100 g	5,80 Ft
	250 g	14,30 Ft
	1000 g	55,60 Ft
Kevert vatta	100 g	4,60 Ft
	250 g	11,90 Ft
	1000 g	46,30 Ft
Vatta, háztartási	100 g	3,80 Ft
	250 g	8,30 Ft
	1000 g	32,70 Ft

Papírvatta	100 g	2,30 Ft
	250 g	4,90 Ft
	1000 g	18,90 Ft
Steril géz	¼ m	1,80 Ft
	½ m	2,90 Ft
	1 m	5,10 Ft
Steril géz, vágott, 100 db-os	6×6 cm	3,70 Ft
	10×10 cm	6,— Ft
Jodoform-géz	¼ m	3,80 Ft
	½ m	6,30 Ft
	1 m	11,90 Ft
Mullpólya, steril, 5 m	6 cm	2,10 Ft
	10 cm	3,20 Ft
	15 cm	4,70 Ft
Mullpólya, nem steril, 5 m	6 cm	1,90 Ft
	10 cm	3,— Ft
	15 cm	4,40 Ft
Mullpólya, nem steril, 5 m, csomagolatlan	6 cm	1,80 Ft
	10 cm	3,— Ft
	15 cm	4,50 Ft
Mullpólya, szegett, 5 m	1 cm	1,20 Ft
	2 cm	1,70 Ft
	3 cm	2,10 Ft
	6 cm	2,80 Ft
	10 cm	4,20 Ft
	15 cm	6,— Ft
Gipszpólya, 5 m	6 cm	3,40 Ft
	10 cm	4,80 Ft
	15 cm	6,90 Ft
Gyorskötöző pólya, steril 5 m	5 cm	2,— Ft
	8 cm	2,90 Ft
	10 cm	3,50 Ft

Rugalmas (Ideál) pólya 5 m	8 cm	11,70 Ft
Kalikó-pólya, 5 m	6 cm	2,90 Ft
	10 cm	4,70 Ft
	15 cm	7,— Ft
Sebkötözőcsomag		6,50 Ft
Szülészeti egységcsomag		26,70 Ft

RAGTAPASZOK (Chinoplast)

1 m×2 cm	2,60 Ft	Gyorstapasz	
1 m×3 cm	3,50 Ft	10 cm×4 cm	1,60 Ft
1 m×4 cm	3,80 Ft	10 cm×6 cm	2,20 Ft
1 m×5 cm	5,— Ft		
5 m×2 cm	8,40 Ft	Tyúkszemtapasz	
5 m×2,5 cm	11,40 Ft	9 cm×6 cm	1,60 Ft
5 m×5 cm	19,90 Ft		

HÉVÍZI RÁDIUMOS GYÓGYISZAPKOMPRESSZ

1. számú kompressz:	Hátra, vállra, felsőkarra, mellre	72,90 Ft
2. számú kompressz:	Derékra vagy végtagra (térdre, karra)	68,95 Ft
3. számú kompressz:	Csizma (lábfejre, bokára)	88,54 Ft
4. számú kompressz:	Kézfejre, csuklóra	68,95 Ft
5. számú kompressz:	Hasra (női)	56,17 Ft
Hévízi gyógyiszap	5 kg	45,56 Ft

Társadalombiztosítás terhére szakorvosi rendelőintézetek és a Szakorvosi Szolgálat Mozgó belgyógyász-, ideggyógyász-, nőgyógyász-, orthopaed-, reuma-, sebész szakorvosai, valamint a felülvizsgáló és ellenőrző főorvosok rendelhetik vényűrlapon, a gyógyszerekre megállapított módon. Előzetes társadalombiztosítási jogosítás nélkül bármelyik gyógyszertárból beszerezhető. Hévízi rádiumos gyógyiszapkompressz és hévízi iszap közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

MÉRGEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÉS THERAPIÁS ELJÁRÁSOK

I. A SEGÉLYNYÚJTÁS ÉS GYÓGYÍTÁS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

a) *A mérgező anyag további behatásának megakadályozása.* Pl. a mérgezettnek a világítógázzal szennyezett helyiségből való azonnali eltávolítása, vagy ha ez nem lehetséges, ajtók, ablakok kinyitása és a gázömlés megszüntetése, mérgező anyaggal szennyezett ruházat levetése stb.

b) *A szervezetbe (gyomor-bél) vagy a testfelületre jutott, de onnan még fel nem szívódott méreg eltávolítása, kémiai vagy fizikai úton való ártalmatlanná tétele.* Pl. gyomormosás, hashajtás, antidotum, adszorpciós therapia *(carbo activatus)*, a bőrről való letörlés, lemosás, hatástalanítás.

c) *A már felszívódott méreg hatástalanítása.* Pl. egyes fémvegyületek esetén *Dicaptol, nátr. tioszulfát inj.* stb.

d) *A mérgező anyag által okozott funkciózavarok megszüntetése* (légzés, keringés fenntartása stb.).

e) *A méreg eliminálásának meggyorsítása.* Pl. a vizeletkiválasztás fokozása.

f) *Az életfolyamatok fenntartása* (folyadék-, táplálékszükséglet biztosítása).

g) *A szövődmények elhárítása vagy azok gyógyítása* (pneumonia, decubitus stb.).

h) *Gondos ápolás és felügyelet.*

A sorrend — az a) pontot kivéve — esetenként változhat, a mérgezett állapotának és a körülményeknek megfelelően. Így, ha a legfontosabb vitális funkciók, mint a légzés vagy a keringés veszélyben vannak (d) pont), úgy az a) pont után azonnal ezek elhárításához fogunk, s csak ezután a b) és c) stb. pontokban foglalt feladatokhoz.

II. ÁLTALÁNOS THERAPIÁS ELJÁRÁSOK

1. Per os mérgezés esetén

a) *Nem maró mérgek esetében:* Gyomormosás vagy hánytatás. Szükség esetén, pl. darabos, a gyomormosó csövet eldugaszoló gyomortartalomnál előbb hánytatás, utána gyomormosás. Csak hánytatás a gyomormosást csak kivételes esetekben pótolja. Ezután 3—4 dl 8—10%-os *magn. sulfuricum* vagy *natr. sulfuricum* oldatában, esetleg keserűvízben 1—2 evőkanál *carbo activatust* (carbo med.) szuszpendálunk, és azt a mérgezettel megitatjuk, illetve a szondán át a gyomrába öntjük. A gyorsabb hatás elérése végett beöntést is adhatunk.

Ha valamilyen okból sem hánytatást, sem gyomormosást nem végezhetünk, úgy legalább valamilyen vegyi vagy fizikai antidotumot *(carbo activ.)* és *hashajtót* adunk.

b) *Maró mérgek esetében* (lúgok, savak): *Nem hánytatunk!* A gyomormosás a súlyosabb esetekben kockázatos és nagy jártasságot igényel. Carbo activatust sem adunk, valamint hashajtó sem szükséges. Mivel a tisztán maró mérgek — mint a sósav, kénsav, salétromsav stb., valamint a káli- és nátronlúg, szóda, hamuzsír stb. — annál mérgezőbbek, minél töményebb állapotban vannak a szervezetben, így már pusztán hígítással is — pl. *sok víz itatásával* — nagy részben hatástalaníthatók. Még tökéletesebben járunk el, ha a vizet savmérgezés esetén enyhén lúgosítjuk, lúgmérgezésnél savanyítjuk. Legjobb, ha tejet itatunk, különösen ha abba 1—2 tojásfehérjét is belekeverünk, mivel nemcsak hígít, hanem zsír- és fehérjetartalmánál fogva vegyileg is köti a lúgot vagy savat, ezenkívül bevonó tulajdonságával védi a felmart szöveteket is. Használható mint antidotum a növényi olaj és a tojásfehérje vagy az egész tojás is. Ha tej nincs *azonnal* kéznél, úgy először a mindig rendelkezésre álló vizet használjuk. A marószermérgezett rendszerint kihányja a szervezetébe bejuttatott antidotumot, s ez igen kedvező, mert a többször ismétlődő hányás és az ismételt antidotum adása (kb. 1—2 liter) tökéletesebbé teszi a hígítást, a hatástalanítást és a gyomormosást is pótolja. A marószermérgezések nagy fájdalommal járnak és így shockot okoz-

nak, ezért az erélyes fájdalomcsillapítás (1—2 cg *morfin*) feltétlenül szükséges.

A hánytatás indicatiói: 1. Ha gyomormosó készülékünk nincs; *2.* ha contraindikált a gyomormosás; *3.* ha a gyomortartalom darabos és a szondát eltömeszeli; *4.* ha a gyomormosás valamilyen okból kivihetetlen, pl. ellenállás, delírium.

A hánytatás legfontosabb contraindicatiói: 1. Eszméletlenség, coma; *2.* collapsus; *3.* trismus, görcsök; *4.* maró mérgek; *5.* haematemesis, haemoptoe; *6.* tüdővizenyő; *7.* egyéb, mint: előrehaladott terhesség, magas életkor, nagyfokú hypertonia, cachexia, legyengülés, decompenzált szívbajok, koszorúér-megbetegedés, aneurysma.

A gyomormosás legfontosabb contraindicatiói: 1. Aorta-aneurysma; *2.* a nyelőcső varicositasa (cirrhosis hep.); *3.* gyomorvérzés; *4.* súlyos marómérgezés; *5.* tüdő- és gégevizenyő; *6.* nyelőcsőszűkület; *7.* a légző- és érmozgató központ fenyegető bénulása.

Gyomormosás: ismert műszabály szerint mindaddig, amíg a mosóvíz teljesen tisztán ürül ki. Átlagosan 5—10 liter vízzel.

Hánytatás. Egyszerű, ún. házi eljárások: 1. a garat izgatása, csiklandozása ujjal vagy tollal; *2.* langyos víz itatása és garatinger; *3.* langyos szappanos, olajos zsíros víz itatása és garatinger; *4.* kb. 5%-os langyos konyhasós víz itatása és garatinger. *Tilos* kalomel-, szublimátmérgezésnél, viszont ezüstnitrát-mérgezésben nemcsak hánytató, hanem antidotum is. A folyadék mennyisége 3—5 dl, többször megismételhető szükség szerint.

Gyógyszeres hánytatás: 1%-os *cuprum sulfuricum*-oldat evőkanalanként, 2—3 percenként, míg a hányás bekövetkezik, legfeljebb 100 g oldat! *Tilos alkalmazni gyulladás vagy a gyomornyálkahártya felmaródása esetén.* Gyorsan és biztosan hat az *apomorfin* 0,01—0,02 g (1—2 cg) mennyiségben subcutan. Apomorfinos hánytatás után a mérgezett ½—1 óráig megfigyelendő, mert a hányást néha shock, collapsus követheti.

2. Inhalációs mérgezés (mérges gázok, gőzök)

1. A mérgezettet a szennyezett légkörből azonnal eltávolítjuk, a terepen gázálarcot adunk rá. Ha ez nem lehetséges, úgy a helyiség ablakát, ajtaját kinyitjuk a levegő kicserélése végett. *2.* A gázzal telítődött ruházatot levetjük és a mérgezettet meleg takarókkal betakarjuk, melegítjük, óvjuk a fázástól. Esetleg egy csésze meleg teát, kávét itatunk vele. *3.* Teljes nyugalmat rendelünk el. *4.* Szükség esetén, ha nem contraindikált (savas, maró, fojtó gázok), mesterséges lélegeztetést végzünk.

Savas, maró, fojtó gázok, gőzök esetében: a fentieken kívül a szemet lehetőleg langyos, tiszta vagy 2—3%-os nátriumbikarbonátos vízzel kimossuk, ammóniákgőzök esetében tiszta vízzel, utána esetleg 2%-os prokain-(cocainum novum) oldat 2—3 cseppjével a fájdalmat megszüntetjük. A szájüreget, garatot, esetleg orrjáratot hasonlóan tiszta vízzel vagy 2—3%-os szódabikarbonátos oldattal öblítjük ki. A kínzó köhögést, sternumtáji fájdalmakat, opressiós panaszokat 2—3 cg *etilmorfinnal, kodeinnal* vagy 1 cg *morfinnal* szüntethetjük meg. Enyhébb panaszok esetén 2—3 cg *kodein* és 0,3 g *Amidazofen* vagy 1 tabletta *Barbamid* is elegendő. A felső légutak izgalmát enyhíti a konyhasós vagy 2%-os nátriumbikarbonátos oldat inhalációja. Súlyosabb mérgezés esetén számítanunk kell a felső vagy alsó légutak komolyabb ártalmára (pl. bronchitis, pneumonia, tüdővizenyő), s ezért 24—48 óráig a mérgezettet szigorú nyugalomban megfigyelés alatt kell tartanunk. Prophylactikus célból *penicillint* is adhatunk.

A toxikus tüdővizenyő megelőzésében, kifejlődésében, gyógyításában követendő eljárásokat lásd alább.

3. Toxikus tüdővizenyő

Megelőzése: Teljes nyugalom, teljes mozgási tilalom. A nyugalmat 2—3 cg *etilmorfinnal* vagy 1 cg *morfinnal* biztosítjuk. A legtöbb esetben *barbiturát* adása is elegendő. A beteget a fázástól, didergéstől óvjuk meleg takarókkal, melegítéssel, mérsékelt mennyiségű meleg, kevés alkoholt tartalmazó italokkal. Prophylactikusan

adunk két ízben 10 ml *Calc. gluconicum, Calcimusc.* injekciót i. musc., valamint 20—40 ml 40%-os vagy 20%-os *dextrózt* i. ven. Ha 24 órán belül semmi gyanús tünet nem jelentkezik (szapora légzés, dyspnoe, enyhe cyanosis), úgy a nyugalom biztosítását kivéve minden beavatkozást elhagyunk, de a beteget még legalább 24 óráig szigorú megfigyelés alatt tartjuk.

Kezdődő tüdővizenyő kezelése: Kalcium-injekciót nem adunk, vagy legfeljebb egyszer 10 ml-t. Ha a mérgezett vérnyomása nem alacsony, nincs collapsusban, és arca és látható nyálkahártyái kékes-lividen cyanotikusak, úgy 200—300 ml vért bocsátunk le óvatosan, utána 30—50 ml 20—40%-os *dextrózt*, majd ¼ mg *sztrofantint* adunk i. ven. és *oxigén*-belélegeztetést alkalmazunk. A szükségesnek megfelelően a vérlebocsátást egyszer, a dextróz-injekciót kétszer, a sztrofantin adását és az oxigén-belélegeztetést többször megismételhetjük.

A kifejlődött toxikus tüdővizenyő kezelése. A kezdődő, a fenyegető, valamint a kifejlődött toxikus tüdővizenyő therapiájának elve: *1.* A teljes nyugalom, s ezáltal a minimális oxigénszükséglet megteremtése; *2.* ennek az oxigénszükségletnek a biztosítása; *3.* a szív munkájának megkönnyítése, amelyet a kisvérkörbeli pangás, a vér viszkozitása, besűrűsödése stb. terhel; *4.* a szív munkaképességének fokozása.

Kifejlődött toxikus tüdővizenyőnél kalcium-injekciót nem adunk, hanem — ha a vérnyomás nem alacsony, az arc és a látható nyálkahártyák kékes-lividen cyanotikusak (kék cyanosis), a venák teltek — először vérlebocsátást végzünk (250—500 ml), majd 40—50 ml 20—40%-os *dextrózt* adunk i. ven. ¼ mg sztrofantinnal együtt. Ezután hosszabb időn át (½—2 óra) oxigén-belélegeztetést alkalmazunk. Ha szükséges, a dextróz-injekciókat megismételjük, a vérlebocsátást csak kivételesen és csak kisebb mértékben. A lebocsátott vér összmennyisége a testúlyhoz viszonyítva ne haladja meg a 400—600 ml-t. A sztrofantint ellenben 6—8 óránként ismételjük meg és szükség szerint az oxigén-belélegeztetést is. Mesterséges lélegeztetés és adrenalin alkalmazása tilos! Abban az esetben, ha a mérgezett arca sápadt vagy szürkés színű (szürke cyanosis), vérnyomása alacsony, apathiás, lélegzése lihegő: a vérlebocsátás tilos, műhiba! Ilyenkor csak excitansokat, oxigén-, esetleg *carbogen-* (95% O_2 + 5% CO_2) inhalációt alkalmazunk. A nyugalom és a melegen tartás biztosítása fokozottan kötelező. Prophylactikusan *penicillin* mindig adható.

4. A testfelületre, bőrre, ruházatra jutott mérgező anyag esetén követendő eljárások

A mérgező anyaggal szennyezett felső- és alsóruhát vagy lábbelit azonnal levetjük, s a bőrről az anyagot eltávolítjuk. A levetett ruhát csak mosás, tisztítás, méregtelenítés után szabad ismét felvenni.

A testfelületre, bőrre került mérgező anyagot, ha az maró méreg volt, úgy — ha kéznél van — ronggyal vagy más alkalmas anyaggal felitatjuk, utána a bőrfelületet sok vízzel lemossuk, de ha azonnal kéznél van, legjobb itt is a tej. Ezután olajjal, zsírral bekenjük és bekötjük. Nem maró méreg esetében, ha az vízben oldható, akkor sok vízzel; zsírban lipoidokban oldhatókat pedig felitatás után oldószerrel, pl. alkohollal (den. szesz is jó), benzinnel stb. mossuk le. A lemosáskor bőséges oldószert használjunk, mert kevés oldószer inkább árt, mint használ. Kivételt csak néhány anyag képez, mint pl. az oltott mész, amelyet olajjal távolítunk el.

5. Tennivalók szembe jutott mérgező anyag esetében

Folyékony halmazállapotú marómérgeknél bőséges vízzel mossuk ki a szemet, utána 2—4%-os *prokain*-oldatot, majd 1—2 csepp *parafinum liquidumot* cseppentünk be. Szilárd halmazállapotú marómérgeknél előbb érzéstelenítünk, majd a szilárd részecskéket olajos tupferrel, csipesszel eltávolítjuk, utána a szemet kimossuk és paraffinolajat cseppentünk be. Maró hatású vagy ingerlő gőzök, gázok esetében tiszta vízzel, savas természetűeknél esetleg 2%-os *nátriumhidrokarbonátos oldattal* mossuk ki a szemet. Utána a fájdalmat 2%-os *prokain*-oldattal szüntetjük.

Egyéb anyagoknál vízzel való bőséges mosás. Pár anyagnál különleges beavatkozás szükséges, pl. *mész, mésznitrogén, foszfor* stb. Ezeket l. a megfelelő címszók alatt.

6. Tennivalók parenterálisan bejutott mérgező anyag esetében

a) *Subcutan inj.:* Ha a végtagon történt és még nem szívódott fel, úgy az inj. felett a végtagot leszorítjuk, az inj. helyét sebészileg feltárjuk, kivéreztetjük és a leszorítást szakaszosan megszüntetjük. Már azzal is sokat segítünk, ha a felszívódást késleltetjük, úm. leszorítással, hűtés jégzacskóval vagy klóretiles fagyasztással. Adrenalinos (erősen hígított!) körülfecskendezés is használható, viszont oxidáló stb. „ellenszerekkel" való infiltrationak — egyes eseteket kivéve — nincs nagy gyakorlati értéke.

b) *Intramuscularis inj.:* Vizes oldatok gyorsan szívódnak fel, s így a mélyre ható sebészi feltárásnak nincs sok értelme, a felszívódást késleltető eljárásokat viszont megkísérelhetjük. Olajos oldatok, szuszpenziók esetében, ha komoly méregmennyiségről van szó, a sebészeti feltárás szóbajöhet, előzőleg azonban vastagabb tűvel kíséreljük meg az oldat kiszívását.

c) *Intravenás inj.:* Közvetlen az injekció után, amikor még a méreg nagy része a keringő vérben van, kiadós vérlebocsátással jelentős méregmennyiséget távolíthatunk el.

7. Tennivalók a testüregbe, testnyílásokba, sebekre jutott mérgező anyagok esetében

a) *Végbél* (tabletták, suppositoriumok, csőre): A tablettákat, suppositoriumokat először ujjal igyekszünk eltávolítani, azután a végbelet kimossuk bőséges meleg vízzel. Ha az ujjal való eltávolítás nem sikerül, úgy csak meleg vízzel mossuk ki. Csőre útján bejutott méreg esetén carbo activatust tartalmazó vízzel (1 evőkanál 1 l vízre) mossuk ki a végbelet.

b) *Vagina:* Az eljárás ua. mint a végbélnél.

c) *Húgyhólyag:* Puha katétert vezetünk be, s azon át mossuk ki jól a hólyagot.

d) *Testüregek, tályogüreg:* Feltárással vagy vastag tűvel való kiszívás, kiürítés után az üreget fiziológiás konyhasó-oldattal vagy vegyi ellenszerrel öblítjük ki.

e) *Sebek, sebfelület:* Letörlés, vízsugárral való lemosás, lekaparás késfokkal, spatulával, szükség esetén kikaparás éles kanállal. Végső esetben kimetszés. Mustárgázzal szennyezett seb esetén a lehetőség szerint mindig kimetszés.

f) *Nyálkahártyák:* Letöriés, lemosás (esetleg vegyi ellenszerrel), felitatás (tupfolás), hideg alkalmazása adrenalinos ecsetelés.

8. Fémsókkal — arzénnel történt mérgezések

Kén-, illetve szulfhidril-therapia. Néhány fémvegyülettel történt mérgezéskor a dimerkaptopropanol- *(Dicaptol)* kezelés eredményesnek látszik. Legmegbízhatóbb hatása azonban arzénmérgezés esetében van, és tulajdonképpen e célra állították elő. Higanyvegyületeknél is használható, arzénhidrogénnél hatása vitás. Urán- és rézvegyületek esetében hatástalan, tallium-, kadmium-, kobalt-, vanádium-, ezüst-, arany-, bizmutvegyületeknél vitás, esetleg káros, míg ólom-, vas- és szelénvegyületeknél a toxicitást fokozza s ezért contraindikált. Használatát l. a használati utasításban. Univerzálisan is jól hathat a *natr. thiosulf.* (contraindicatiója nincs) 10%-os oldatából 10—20 ml iv., az első napokban 2—3-szor is megismételve, majd fokozatosan csökkentve.

9. Methaemoglobinaemia (haemiglobinaemia)

1%-os *metilénkék* oldatából (esetleg 20%-os dextrózban oldva) 5—10 ml-t adunk lassan, i. ven. Jobb többször 5—5 ml-t adni, mint egyszerre 10—20 ml-t. Minél súlyosabb az eset, annál lassabban injiciáljunk. Szükség esetén 20—30 ml-t is adhatunk részletekben. Igen támogatja a metilénkéktherapiát a *C-vitamin* is (50—100 mg), melyet többször ismételünk, sőt egyedül a C-vitamin is hatásos lehet. Ezután *alkalizáló* therapiát kezdünk. Bő folyadékfelvétel mellett per os *natr. hidrokarbonátot* adunk, míg a vizelet lúgos kémhatású lesz. Adhatunk 4%-os natr. bicarb.-oldatból 20—30 ml-t, többször naponta. A magisztrálisan felírt és gyógyszertárban készült nátr. hidrokarbonát-oldat injekció céljára *nem használható!* Helyette 10—12%-os *natr. lac-*

ticum oldatából 50 ml iv. Oxigén-belélegeztetés a mérgezett légszomját csökkenti. Szénsav-belélegeztetés szükségtelen, dinitrolmérgezésben contraindikált! Anuria esetén az anuriánál szokásos eljárások. Savanyú és alkoholos italok tilosak. A legsúlyosabb esetekben párhuzamosan végzett transfusio és vérlebocsátás.

10. Haemolysis

Bő folyadékfelvétel, párhuzamosan végzett transfusio és vérlebocsátás. Anuriánál a szokásos eljárások.

11. Májvédelem

Bőséges folyadékfelvétel és *dextróz* per os vagy iv., és *inzulin* többször, kis adagokban (5—10 egység). Megfelelő diéta. K-, továbbá C-, B-vitamin. Esetenként *mellékvesekéregkivonat és Cholinchlorid.*

12. Görcsös állapotok

Ismert méreg által okozott görcsös állapotok megszüntetését l. a megfelelő címszók alatt. Ismeretlen méreg esetében a morfintól és barbituráktól tartózkodjunk! Ilyenkor csak arra ügyeljünk, hogy a görcsrohamok alatt a mérgezettet sérülés ne érhesse.

13. Légzésbénulás

Légzőcentrum- (centralis) bénuláskor mesterséges lélegeztetés, s közben *Lobelin, Spiractin* i. ven. vagy i. musc. A Lobelin s. cut. csaknem hatástalan. Továbbá *szénsav* + *oxigén* belélegeztetés. *Tetracor* i. ven. és i. musc. Peripheriás eredetű légzésbénulásban csak a kitartóan végzett mesterséges lélegeztetéstől várhatunk eredményt. Vastüdő.

14. Glottis-oedema

A maró gázok, maró anyagok okozta gégevizenyőnél 2—3%-os *prokainos spray*-t alkalmazunk, melybe 1—2 csepp *adrenalint* is teszünk. Ezenkívül *kalcium inj.*, jégtömlő a nyakra, oxigénbelélegeztetés és fájdalomcsillapítás. *Algopyrin* i. ven. vagy 2—3 cg *etilmorfin* inj.-val. Szükség esetén tracheotomia.

15. Glottis-görcs

Spasmolyticumok (pl. papaverin i. ven.) és amennyiben azt maró gőzök okozták, *prokainos spray* (adrenalin nélkül) fájdalomcsillapításul.
Szükség esetén tracheotomia.

16. Bronchus-görcsök, amennyiben azt maró gázok okozták

Spasmolyticumok, mint glottis-görcsnél fájdalomcsillapítás, inhaláció finoman porlasztott *prokain*-oldattal.

17. Shock

Maró mérgezésekben fordul elő. Therapia: morfin és a többi szokásos eljárás.

18. Collapsus

A szokásos collapsus-kezelés, de adrenalint csak abban az esetben adunk, ha nem contraindikált!

19. Szívgyengeség

Mérgezésekben mindig *sztrofantin* i. ven. Periculum in mora!

20. Cholinesterase-bénítók

2. számú melléklet a 31.955/1968. Eü. M. szám alatt megjelent irányelvekhez (Eü. K. 13/1968).

Szervesfoszfát-mérgezések esetében szükséges elsősegélynyújtás, illetve ellátás.

II. Elsősegélynyújtás, ellátás

1. *Munkatársi elsősegélynyújtás. Szemellátás:* bőséges és tartós vizes kiöblítés. *Bőrellátás:* alapos szappanos vizes, esetleg mosószódás vagy Trisós vizes lemosás. A körömaljakat, hajlatokat, bőrredőket, hajas, szőrös területeket alaposan meg kell tisztítani. A szennyezett ruházatot el kell távolítani és alatta a bőrt meg kell tisztítani. Tömény szerekkel történt szennyezés esetén védőkesztyű használata szükséges, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, az elsősegélynyújtás után szappannal alaposan kezet kell mosni. *Eljárás szervesfoszfát tartalmú növényvédőszer belégzésekor:* friss levegőre vitel és ott lefektetés. *Eljárás szervesfoszfát tartalmú növényvédőszer lenyelésekor:* ha a mérgezett nyelni tud, 3—6 dl víz, szódabikarbónás vagy aktivált szenes víz itatása. Ha szükséges, garatingerlés a hányás kiváltására. A hánytatás legalább két-háromszori megismétlése szükséges. Befejezésül aktivált szenes (egy pohár vízhez 1—2 evőkanál orvosi szénpor, jól elkeverve) és sós hashajtót tartalmazó víz (keserűvíz) itatása. Hasmenéskor hashajtót adni nem szükséges. Nehézlégzéskor tartós mesterséges lélegeztetés.

Megjegyzés: az életmentő Atropin és Toxogonin injekciós kezelés mielőbbi megkezdésére a mérgezettet kísérővel azonnal orvoshoz vagy kórházba szállíttatjuk. A szállítás lehetőleg fekve és kíméletesen történjék.

2. *Elsősegélynyújtás középfokú képesítésű egészségügyi dolgozók (körzeti ápolónő, mentő szakápoló stb.)* részéről. Az egészségügyi dolgozó első feladata ellenőrizni, hogy a munkatársi elsősegélynél leírt teendők megtörténtek-e. Szükség esetén, tehát ha hiányosságot észlel, az elmulasztott eljárásokat pótolni kell. *Szájon át* történt mérgezésnél el kell végezni a gyomor kimosását híg szódabikarbónás oldattal, gyomormosás után carbo activatussal kevert keserűvizet vagy 10%-os natr. sulfuricum (Glauber-só) oldatot töltünk a gyomorba. Kellő eszköz és feltétel hiányában gyomormosás helyett hánytatást kell végezni. Tilos a ricinusolaj, tej és szeszesital adása! *Szemellátás:* amennyiben a beteg szemébe szervesfoszfát került és emiatt a szem vizes kiöblítése után is szempanaszok állnak fenn, mindkét szembe 2—2 csepp 1%-os atropint kell csepegtetni. Amennyiben szemcsepp nem áll rendelkezésre, szükségmegoldásként az Atropin-ampullából nyert 0,1%-os oldatból lehet mindkét szembe 4—4 cseppet alkalmazni.

Általános mérgezésre utaló tünetek, tehát izzadás, nyálfolyás, hányás, hasmenés, izomrángás (szemhéjon, arcizmokban), esetleg szűk pupillák észlelésekor a középfokú képesítésű egészségügyi dolgozó 4 mg, tehát 4 ml 0,1%-os Atropin injekciót fecskendez be a farizomzatba. Amennyiben oxigén rendelkezésre áll, ezt lélegeztet be a beteggel, különösen abban az esetben, hogyha az légszomjjal küzd. A középkáder köteles a mérgezett mellett maradni addig, amíg szakképzett mentőápoló vagy orvos nem érkezik a helyszínre. Amennyiben a kiérkező mentőápoló nem szakképzett és orvos nincs a helyszínen, akkor a gyógyintézetig kell elkísérnie a beteget. A szállítás ideje alatt, amennyiben ez hosszabb ideig tartana, és a tünetek újra jelentkeznének, az Atropin befecskendezést útközben is meg kell ismételnie. Ugyanezt kell cselekedni akkor is, ha az első Atropin injekció után egy óra múlva sem javulnak a tünetek. Amennyiben orvos nem kísérte a beteget, a középfokú képesítésű egészségügyi dolgozó köteles a kórházi ügyeletes orvost tájékoztatni arról, hogy milyen beavatkozások történtek a mérgezettel, továbbá pontosan leírni, hogy milyen gyógyszerelésben részesült. Légzési zavarok esetén úgy a mentőápoló, mint az egyéb középfokú képesítésű egészségügyi dolgozó az oxigén-belélegeztetés mellett szájból orrba történő mesterséges lélegeztetést alkalmaz.

Megjegyzés: amennyiben a mérgezett cyanotikus, szapora a pulzusa, Atropin injekciót nem szabad adni.

3. *Elsősegélynyújtás a körzeti és üzemi orvos részéről, orvosi segélynyújtás.* A mérgezettet először vizsgáló orvosnak meg kell győződnie arról, hogy az előzőleg végzett elsősegélynyújtás során elvégezték-e mindazokat a beavatkozásokat, amelyeket az előző bekezdésekben felsoroltunk. Amennyiben a szemellátásra, a bőr megtisztítására stb. előírtak maradéktalanul nem történtek

meg, ezeket pótolni kell. Tájékozódni kell a tünetek értékelése szempontjából arról, hogy a beteg eddig milyen gyógyszert kapott, milyen adagban, időpontban. Leglényegesebb a kellő atropinizáció állandó biztosítása. *Szájon át* történt mérgezésnél — ha még nem történt meg megfelelően — az orvosnak az előző pontban leírt módon el kell végeznie a gyomormosást.

Az orvos a rendelkezésre álló Toxogonin injekcióból általában másfél-két óránként 1 ml (0,25 gt-) fecskendezzen be intravenásan a mérgezettnek. Ezen szer alkalmazása mellett is köteles ismételni az Atropin adagolását, hogy a beteg pupillája mindig tág legyen.

A mérgezett beteget lehetőleg orvos kísérje be a gyógyintézetbe, mert a szállítás alatt is szükség lehet ismételt gyógyszer-befecskendezésre, mesterséges lélegeztetésre, görcsroham esetén i. musc. Sevenal vagy egyéb barbiturát adására. Kifejlődött tüdővizenyő esetén mesterséges lélegeztetés tilos!

III. EGYES, A GYAKORLATBAN ELŐFORDULÓ MÉRGEZÉSEK ESETÉBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Acetaldehid. L. alkoholelvonó szerek.

Acetanilid. L. antifebrin.

Acid. acetilsalicyl. (Istopirin, Kalmopyrin) stb. L. ált. eljár. 1. pont a)
Ezenkívül alkalizálás.
Súlyos esetekben infúziók, *szirofantin*. Továbbiakban tüneti.

Adamsit. Szemtüneteknél vízzel vagy 2—3%-os nátriumbikarbonátos oldattal való öblítés. Orr-, garatöblítés, fentiekkel. Tüsszentések ellen klórmészszagoltatás. A szubjektív panaszok ellen jól hat az *alkohol, kloroform ca 40,0 éter 15,0 és liqu. amm.* 0,5 keverék pár cseppjének belélegzése. Hasonlóan jól hathat 1—2 pohárka pálinka. A fájdalmakat jól enyhíti 0,30—0,50 *g amidazofen* v. *Barbamid*. Köhögés ellen *kodein* v. 0,03 g *etilmorfin*, igen erős fájdalmaknál, nyugtalanságnál 0,01 g *morfin*.

Adrenalin. Vízszintes fektetés, teljes nyugalom, 2—3 csepp *amilnitrit* belélegeztetése vagy más értágítók, mint *nitroglicerin* stb. Tüdővizenyőnél vérlebocsátás, *sztrofantin*, hipertoniás *dextróz 50 ml i. ven. Oxigéninhaláció*.

Aether. *Per os* mérgezésnél l. ált. eljár. 1. pont a). Eszméletlenségnél *analepticumok*. Légzésbénulásnál l. általános eljárás 13. pont.

Aktedron. *Per os* mérgezésnél l. ált. eljár. 1a) *Barbiturátok* per os v. injekció alakjában.

Alkohol. I. fok (izgalmi állapot); II. fok (bénulási szak) orvosi kezelésre nem szorul, legfeljebb 1—2 csésze feketekávét vagy 0,20 g koffeint adunk. A III. fokban — a komatosus szakban — esetleg gyomormosás, utána *koffein injekciók* a leghatásosabbak. Légzőközpont-izgatók. Szükség esetén Sympathomim, légzésbénulásnál mesterséges lélegeztetés. Igen hatásos az *ammónia* szagoltatása. Plethorásoknál jó tenzió mellett vérlebocsátás. Tüdővizenyő jelentkezésekor érvágás, sztrofantin, O_2-inhaláció.

Alkoholelvonó szerek (Antaethyl, Antabus, Tetraetiltiuramdiszulfid). Tulajdonképpen acetaldehid-mérgezés. Friss levegő, *koffein, Tetracor, Sympathomim, Pulsotyl*, szükség esetén *Lobelin, Spiractin, oxigén, szénsav* belélegeztetése, mesterséges lélegeztetés. Alkoholos, ecetes, savanyú ital tilos!

Altatószerek. Per os mérgezésnél l. ált eljár. 1. pont a). Beöntés, utána *Prostigmin inj.* Melléktünetek jelentkezésekor ½ *mg atropin*. Szükség szerint inkább mérsékelt, de többszöri adagokban *koffein, Tetracor, sztrichnin inj., Redimyl inj.* i. ven. Ha a légzésben zavarok lépnének fel, *Lobelin, Spiractin* i. ven. vagy i. musc. és oxigén-, szénsav-belélegeztetés. Súlyosabb mérgezésben *sztrofantin*. Vérnyomássüllyedés esetén Sympathomim inj. Adrenalint kerüljük! Infúziók! *Penicillin* prophylactikusan.

Alumen. L. timsó.

Amidazophen. L. ált. elj. 1. pont a) és tünetei.

Amilnitrit. *Per os* mérgezésnél l. ált. elj. 1. pont a). Methaemoglobinaemiánál l. ált. elj. 9. pont.
Ezenkívül vérnyomást emelők, mint *Sympathomim, Pulsotyl* inj.

Ammonia. *Per os* mérg.-nél l. marómérgek, lúgok v. l. pont b). *Belégzés esetében.* Szemtüneteknél a szemet híg bórsavas v. tiszta vízzel mossuk ki, majd 1—2 csepp 2—4%-os *prokain*-oldatot, utána pedig paraffinolajat cseppentünk be. Fájdalmak, köhögés ellen 2—3 cg *etilmorfin* vagy 1 cg *morfin* inj. Szükség esetén O_2-belélegeztetés. Szájüreg, orr öblögetése híg bórsavas v. tiszta vízzel. Glottis-görcs, bronchus-görcs, tüdővizenyő esetén l. egyéb ált. eljár. 14., 15., 16. pont. Továbbiakban tüneti.

Anilin. *Per os* l. ált. eljár. 1. pont a). Alkohol, tej, olaj, zsír és savanyú ital tilos! Anilinnal szennyezett ruházatot, lábbelit azonnal levetni! A bőrre került anilint szesszel (den. szesz is jó) mossuk le. Methaemoglobinaemia kezelését l. ált. eljár. 9. pont. O_2-belélegeztetés. Szükség esetén mesterséges belélegeztetés, légzőközpontizgatók. Továbbiakban tüneti (collapsus stb.).

Antifebrin. L. ált. eljár. 1. pont a). Methaemoglobinaemia esetében l. egyéb ált. eljár. 9. pont.

Antimon-vegyületek. L. ált. eljár. 1. pont a). Ezenkívül ½—1 g acid. tannicum-oldatban vagy magn. oxydatum. Nátr. tioszulfát inj. vagy *Dicaptol.* Továbbiakban tüneti.

Antipyrin. L. ált. eljár. 1 pont a) és tüneti.

Anyarozs. L. ergotin.

Argentum nitricum. Gyomormosás konyhasós vízzel, utána hashajtó 1 kávéskanál konyhasóval és *carbo activatus. Nátr. tioszulfát* inj.

Arzén. L. ált. eljár. 1. pont a) és 8. pont. *Dicaptol!* vagy *nátr. tioszulfát.* Infúziók! *Dextróz* i. ven. Környéki érszűkítők. B_1 *vitamin.*

Arzénhidrogén. Nátr. tioszulfát i. ven., esetleg *Dicaptol* i. musc. Alkalizálás. Transfusio, esetleg vérlebocsátással párhuzamosan. Infúziók, diuresis fokozása, anuria, uraemia elleni küzdelem. C-, B_1-vitamin. O_2-inhaláció, szükség esetén sztrofantin.

Atropin. (Belladonna, maszlagos nadragulya.) L. ált. elj. 1. pont a). A gyomormosás olajozott szondával történjék. *Sevenal inj.* vagy 1 cg *morfin.* Ha morfint adunk, úgy állandóan figyeljük a légzést. Szükség esetén lekötés, kényszerzubbony.

Azophenum. L. antipyrin.

Báriumvegyületek. L. ált. eljár. 1. pont a). Hashajtás mindig szulfátos hashajtóval! (*magn.* vagy *natr.* sulfuricum). 3%-os nátr. szulfátból 20 ml i. ven. többször is, vagy nátr. tioszulfát i. ven. Fájdalmas bélgörcsök ellen *papaverin, atropin.* Légzésbénulásnál mesterséges lélegeztetés, O_2-belégzés.

Benzin. *Per os* mérgezésnél l. ált. eljár. 1. pont a). Narkózisnál légzőközpont-izgatók, O_2-, CO_2-belélegeztetés. *Koffein, Lobelin, Spiractin, Tetracor.* Nagyfokú nyugtalanságnál *Sevenal* inj.

Benzol (toluol, xilol). L. benzin.

Bizmutvegyületek. L. higany.

Botulismus. Hazánkban igen ritka! Nem tévesztendő össze a salmonellák, staphylococcusok stb. által okozott ételmérgezésekkel. A botulismust a secretiós zavarok és a bénulásos tünetek — melyek elsősorban bulbaris jellegűek — jellemzik. T: gyomormosás, erélyes hashajtás, beöntések, *Prostigmin inj., Stigmosan inj.* Ha van, az első 24 órában *botulismusszérum.* Nyelési képtelenségnél minden per os ital, étel eltiltandó (aspiratiós pneumonia!!). Mesterséges táplálás, infúziók. Naponta egyszer 1—2 mg *pilokarpin* és *sztrichnin* (2—3 mg) inj. Légzésbénulásnál mesterséges lélegeztetés. Prophylactikusan penicillin. Gondos ápolás és egyéb tüneti eljárások.

Bróm (elemi). Per os mérgezésnél ½ lit. 1%-os *nátr. tioszulfát-* vagy 1%-os nátr. hidrokarbonát-oldat itatása. Utána hashajtó és carbo activatus. Konyhasó i. ven. Belélegzés esetében (brómgőzök) l. klór v. ált. eljárás 2. pont. *Bőrről* nátr. tioszulfát- v. nátr. hidrokarbonát-oldattal mossuk le.

Brómaceton. A szemet tiszta vízzel vagy 2—3%-os nátriumbikarbonátos vízzel mossuk ki. Szemfájdalmak esetén 1—2 csepp 2%-os *prokain.* Fájdalmak, köhögés ellen fájdalomcsillapítók, *kodein.* Bőrtünetek esetén hűsítő kenőcs (Ung. alum. acet.).

Brómbenzilcianid. L. brómaceton.

Brómsók. L. altatószer-mérgezés, és konyhasó i. ven

Camphora. L. kámfor.

Carboneum sulfuratum. L. szénkéneg.

Carboneum tetrachloratum. L. széntetraklorid.

Chinin. L. ált. eljár. 1. pont a). Ezenkívül értágítók. *Amilnitrit* vagy *nikotinsav*, B_1- és A-vitamin. Bő folyadékfelvétel, diuresis fokozása.

Chlor. L. klór.

Chloroformium. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Légzőközpontizgatók, O_2-, CO_2-belélegeztetés, szükség esetén mesterséges légzés, szívmasszázs. Fenyegető szívbénulásnál *sztrofantin* i. ven., szívbénulásnál *adrenalin* intracardialisan. Adrenalin csak mély comában adható! *Belélegzésnél* mint fent, ált. eljár. nélkül.

Chlorogenium. (Chloramin, Neomagnol.) L. ált. eljár. 1. pont a). Tej, tojásfehérje, *nátr. hidrokarbonát.*

Chlorphenanum. (DDT, Gesarol, Neocid.) L. ált. eljár. 1. pont a). Olaj, zsír, tej tilos. Nyugtalanság, görcsök esetében barbiturát inj. Infúziók.

Cián és vegyületei. Per os mérgezésnél, ha a tünetek még nem fejlődtek ki, l. ált. eljár 1. pont a). A gyomormosó vízbe 1 csipetnyi (kb. 2 g) *kál. hipermangánt* teszünk. Ezután közvetlenül, esetleg ezt megelőzően 5—10 ml 4—5%-os *natr. nitrosum* inj. i. ven., lassan. Rögtön utána 20—40 ml 10%-os nátr. tioszulfát inj. i. ven. Ez utóbbit rövid időközökben (10—15 perc) kb. 3 ízben megismételjük. Ha a mérgezett állapota lényegesen nem javul, úgy 2 óra múlva az eljárást *fél* adagokkal megismételjük. Egyéb, de kevésbé értékes eljárások: *1.* 10—20 ml 1%-os *metilénkék* inj. i. ven., utána 20%-os dextróz 30—40 ml. *2.* 10%-os *nátr. tioszulfát* 30—40 ml i. ven. *3.* Pár csepp (III—V) amilnitritet lélegeztetünk be 2—3 ízben 5 percenként. Ez utóbbi bármely eljárás mellett is alkalmazható, sőt ajánlatos. *Belélegzéses* mérgezésnél mint fent, kivéve a gyomormosást stb. Légzési zavarok, bénulás esetében kitartó mesterséges lélegeztetés, O_2-inhaláció.

Cinkvegyületek. L. ált. eljár. *1.* pont b), de utána még vízben szuszpendált carbo activatust is adunk. Továbbiakban tüneti.

Clark I. L. adamsit.

Clark II. L. adamsit.

Cocain. Per os mérgezésnél l. ált. eljár. *1.* pont a), továbbá pár csepp amilnitrit vagy más értágítók. Vízszintes fektetés. Nagy nyugtalanság esetén barbiturát inj., esetleg iv. narkózis *(Intranarcon)*. Morfin, adrenalin tilos! Bénulási tüneteknél *koffein, Tetracor, Lobelin*, O_2- és CO_2-inhaláció, mesterséges lélegeztetés. Szívgyengeség esetén *sztrofantin.*

Cocainum novum (és más helyi érzéstelenítő). L. cocain.

Cuprum sulfuricum (rézgálic, kékgálic, kékkő). Óvatos, de alapos gyomormosás, utána vízben szuszpendált *carbo activatus. Nátr. tioszulfát* i. ven. Infúziók, analepticumok *Simpathomim* vagy *Pulsotyl.* Haemolysis esetén haemolytikus icterus (l. ált. eljár. *10.* pont).

Darázscsípés. L. méhcsípés.

Denaturált szesz. A közönséges, forgalomban levő denaturált szeszben nincs metilalkohol! A továbbiakban l. alkohol.

Dichlordiacthylsulfid. L. mustárgáz.

Digitalis és készítményei. Per os l. ált. eljár. 1. pont a). Továbbiakban *atropin inj.* 1 mg naponta 2—3-szor. Feltűnő sápadt arc esetén 2—3 csepp amilnitrit-belélegeztetés vagy más *nitrit* és *koffein.* Nyugtatók, mint pl. *Sevenal.* Légszomjnál O_2-inhaláció. Szívblock tüneteinél *Diaphyllin* i. ven. Morfin tilos! Teljes nyugalom, mozgástilalom!

Dinitrobenzol. L. nitrobenzol, azzal a különbséggel, hogy nagyobb metilénkékadagokra van szükség, és lefolyása lényegesen hosszabb.

o-Dinitrokrezol (sárga méreg, permetezőszer). Per os mérgezésnél l. ált. eljár. Bőséges cukorbevitel per os és parenteralisan, infúziók. Nyugtalanság, görcsök esetén *barbiturátok.* Szükség esetén keringést javító szerek. Bőrre került anyagnál szappanos vízzel, illetve vizes lemosás, szemből tiszta vízzel kimosás. Alkohol tilos!

Diphenylaminarsinchlorid. L. adamsit.

Diphenylarsinchlorid. L. adamsit.

Diphenylarsincianid. L. adamsit.

Ephedrin. L. Aktedron.

Ergotin. L. ált. eljárás. Értágítók, papaverin, *amilnitrit*, meleg fürdők. Görcsök esetében *barbiturátok*, súlyos görcsöknél i. ven. narkózis (Venobarbital stb.).

Égetett mész. *Bőrről* olajjal távolítjuk el. *Szem:* Cukros vízzel mossuk ki, utána 1—2 csepp paraffinolaj. A részecskéket úgy távolítjuk el, hogy előbb érzéstelenítjük, majd olajba mártott finom ecsettel a részecskéket eltávolítjuk és a szemet 4%-os *ammónium-klorid-oldattal* mossuk ki. *Per os* mérgezésnél cukros tej vagy olaj, tej, tojásfehérje. A továbbiakban l. marómérgek, -lúgok.

Étel-, élelmiszer-mérgezések (hús, hal, hurka, konzerv, tojás, fagylalt, tejtermékek stb.). Ha feltehető, hogy a gyomor-bélhuzamban még van a mérgezést okozó ételből, élelmiszerből, úgy l. ált. eljár. 1. pont a). Ha a hányás, hasmenés folytán már kiürült, úgy csak vízben szuszpendált *carbo activatust* adunk. Legfontosabb a víz- és sóveszteség parenteralis pótlása i. ven. adott 10—20 ml 10%-os konyhasó inj.-val vagy infúziókkal! Ugyancsak megszüntetjük a collapsust is. Legalább 8—10 órán át teljes, még folyadékokra is kiterjedő koplalás! Bélgörcsök ellen ún. *kólika-cseppek*, a fejfájást *amidazofen* kúp szünteti. Meddő hasmenéseket láztalanság esetén *ópiátokkal* kezeljük.

Etilbenzin. L. benzin. Az etilbenzinben 0,6 pro mill. ólom-tetraetil van, s így per os mérgezésben ez számításba nem jöhet.

Faszesz. L. metilalkohol.

Fenacetin: L. ált. eljár. Methaemoglobinaemia esetében l. ált. eljár. 9. pont.

Fluoracetátok. L. ált. eljár. 1. pont a). Görcsök esetén barbiturátok, narkózis i. ven. Venobarbital stb. vel. Szívzavaroknál *sztrofantin* i. ven.

Fluorfoszfátok *(szerves foszforsavvegyületek)*. L. ált. eljár. cholineszterasebénítóknál, *20.* pont.

Fluorhidrogén, fluorsav. *Belélegzés* esetében l. klór, ezenkívül *kalcium i. ven. Bőr:* bő vízzel való lemosás, még jobb *calc. chlor-* vagy *calc. gluconicum*-oldattal. Utána *magnézium glicerin-* (1 : 2) péppel vagy nedves *calc., chlor*, vagy gluconic.-os gézzel fedni. Igen jó hatásúnak mondják a 10%-os calc. gluconic.-oldattal való körülfecskendezést és ezzel nedvesített kompressz ráhelyezését. *Per os* mérgezésnél *kalcium* per os (calc. gluconic., kréta, tojáshéj, magn. usta stb.), *kalcium* i. ven. Továbbiakban l. marómérgek, -savak.

Flourvegyületek: *(szervetlenek)*. L. ált. eljár. 1. pont a), *kalcium* (calc. gluconic., calc. carbonicum, kréta stb.) per os. *Kalcium i. ven.!*

Formalin (formaldehid, Lysoform). *Per os* l. ált. eljár. 1. pont b). *Belélegzés* esetében mint klórnál. Továbbiaknál l. marómérgek.

Foszfor. Per os mérgezésnél. Hánytatás 1%-os rézszulfát-oldattal, ami egyben antidotum is. Utána, ha kivihető, gyomormosás 1 pro mill. *kal. hypermang.*-oldattal. Ezután sós hashajtó *carbo activatusszal*. Prophylactikusan májvédelem, l. ált. eljár. 11. pont. Tej, zsír, olaj, ricinus adása is tilos! 100—150 g *paraffinolaj* adható. *Foszforsérülés*, pl. foszforgyújtóbomba stb. *Szem:* azonnal bőséges öblítés, mosás 2—3%-os szódabikarb.-oldattal. Utána igyekszünk a látható foszforrészecskét csipesszel eltávolítani. Minél gyorsabban szakorvoshoz kell juttatni a beteget. Útközben is szódabikarb.-öblítések. Ha a foszfor a *ruházatra* került, úgy azonnal levetjük azt, és az egészet vagy az érintett részt víz alá merítjük. Az oltást víz hiányában nedves homokkal, földdel, nedves ronggyal, szükség esetén vizeletünkkel is végezhetjük. Óvjuk a ruhát a megszáradástól, mert ez esetben a foszfor ismét meggyullad. A *bőrre* került foszfort előbb az említett úton eloltjuk, legjobb, ha a végtagot vízbe merítjük vagy folyóvíz alá tartjuk, és kés fokával vagy más alkalmas tárggyal a többnyire ragacsos masszát lekaparjuk. Utána 5%-os rézszulfát-oldattal többször lemossuk és ezt többször megismételjük. Utána a látható barnás részecskéket eltávolítjuk és rézszulfát- vagy nátriumbicarbonát-oldatba mártott kompresszt helyezünk a sebre. Kenőcsöt, olajat a sebre csak akkor szabad tenni, ha az

összes foszfort eltávolítottuk. A *hajzatra* jutott foszfort hasonlóképpen kezeljük, de az oltás után a hajat tőből lenyírjuk, levágjuk.

Foszgén. Foszgénmérgezésre gyanús egyént, még ha tünetmentes is, teljes nyugalomban, teljes mozgástilalom mellett, 24 óráig megfigyelés alatt kell tartanunk. Szállítani is csak járművel szabad. Kezdődő vagy kifejlődött tüdővizenyő esetében l. ált. eljár., toxikus tüdővizenyőnél 3. pont. Gyógyult foszgénmérgezett hosszabb időn át pihenésre szorul.

Gázmérgezés *(világító-, kipufogó-, füst-, generátorgáz).* L. szénmonoxid.

Gombamérgezés. Gombamérgezésen csak a mérges gombák által okozott megbetegedéseket értjük. A mérgezést okozó gomba milyenségét (csoportját) s így a gyógyítást is az összevont *Rácz-féle csoportosítás* útján állapíthatjuk meg, amely a lappangási idő és a tünetek viszonyán alapul.

I. *típus* (csoport):
a) Hányás, hasmenés, rövid, $^1/_2$—3 órai lappangás;
b) koleriform hányás, hasmenés; hosszú, 6—12 órai, sőt hosszabb lappangás.

II. *típus* (csoport): Atropinmérgezéshez hasonló tünetek.

III. *típus* (csoport): Muszkarinmérgezéshez hasonló tünetek. Hányás, hasmenés a II., III. típusnál is előfordulhat, de a domináló tünetek mások.

I. *típus.* a) Gyomormosás, hashajtó *carbo activatusszal* 10 ml 10%-os konyhasó i. ven., szükség esetén infúzió, collapsus-kezelés, 8—10 órán át koplalás. 1—2 nap alatt gyógyul. Rendszerint a Boletus-, Lactarius-, Scleroderma-, Russula-gombák mérges fajtái okozzák. b) Súlyos, a kolerára vagy arzénmérgezésre hasonlító tünetek gyakran súlyos májkárosodással. Gyors exsiccosisra vezet, collapsus szívgyengeség, ritkábban anuria, uraemia. *Gyógyítás:* gyomormosás, vízben szuszpendált *carbo activatus*, ha módunkban áll, az első 24 órában *antitoxikus szérum.* I. ven. 10%-os konyhasó, napi 2—3 lit. infúzió, csepegő infúzió, 20%-os *dextróz* napi 100—150 ml, collapsus elleni szerek, *sztrofantin.* Májvédelem (9. pont). *Cholinchlorid, mellékvesekéreg-készítmények.* Anuria esetében a megfelelő eljárások.

Okozói a gyilkos galóca és rokonai, valamint ritkábban a közönséges papsapka és a vörhenyes őzlábgomba.

II. *típus.* Gyomormosás, hashajtás, *carbo activatus.* Nyugtalanság, delírium ellen *barbiturátok* vagy 1 cg *morfin*, 1—2 nap alatt gyógyul. Okozója a légyölő és párducgalóca.

III. *típus.* Gyomormosás, hashajtás, *carbo activatus.* 1 ml *atropin* inj. s. cut., 10%-os konyhasó i. ven. 10 ml. Szükség esetén infúzió. Okozói legtöbbször a susulykafajok. 1—2 nap alatt gyógyul.

Gyufaoldat. A jelenlegi használatban levő gyufák (gyufafejek oldatai) mérgezést nem okoznak, de biztonság okából l. ált. eljár. *1.* pont a).

Hamuzsír, hamulúg. (Kal. carbonicum.) L. marómérgek, -lúgok és 1. pont b).

Heresó. *Kalcium inj.* i. ven. és i. musc. Gyomormosás, hashajtás, *carbo activatus.* Továbbiakban az esetleges oliguria, anuria, uraemia kezelése. Szükség esetén per os *calc. carbonic* (kréta) vagy *calc. gluconic.*, calc. chlor., tojáshéj vagy más kalciumkészítmény bőven, majd hánytatás és újból kalcium.

Higany „fém". A fémhigany per os (lázmérőtörés, Cantor-szonda, suicid kísérlet) nem szokott mérgezést okozni. Biztonsági okokból, míg ki nem ürül, naponta 3×1 kávéskanál *carbo activatus* és hashajtó.

Higanyvegyületek (*szublimát, oxicianid, kalomel* stb.). Gyomormosás, ha lehetséges tejjel, tojásfehérjés tejjel vagy tojásfehérjés vízzel (2—3 tojásfehérje 1 literre) vagy 1%-os *nátr. tioszulfát*-oldattal. Utána hashajtó carbo activatusszal. Karlsbadi só adása tilos konyhasótartalma miatt. Utána *Dicaptol* injekciók a használati utasítás szerint vagy 10%-os *nátr. tioszulfát* 10—20 ml, napjában többször több napon át. Bélmosások 1%-os *nátr. tioszulfát*-oldattal. Infúziók, konyhasó i. ven., *dextróz* i. ven. Szájápolás H_2O_2-oldattal, gingivitist ne kezeljünk adstringens oldatokkal, a nyálát a beteg ne nyelje le. Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos eljárások. Dekapszulálás nem hoz eredményt. Továbbiakban tüneti.

Hypo „I" (mosó- és fehérítőszer). L. marómérgek, -lúgok.

Ideggázok *(Tabum, Sarin, Soman)*. L. ált. eljár. cholinesterase-bénítók.

Jódtinktúra. Keményítős vagy lisztes pépet itatni, esetleg 2—5%-os *nátr. tioszulfát*-oldatot. Shockot, collapsust, gégevizenyőt *14.* pont eljárással kell kezelni. A továbbiakban: mint marómérgezésnél.

Kalium chloricum. L. ált. eljárás *1.* pont a). Ezenkívül alkalizálás, bő folyadékbevitel per os és parenteralisan. Methaemoglobinaemiánál l. egyéb ált. eljár. *9.* pont. Oliguria, anuria, uraemiánál a szokásos eljárások. Savanyú italok, ételek, alkohol tilos.

Kalium hypermanganicum. A gyomormosás nem mindig vihető keresztül és nem döntő fontosságú. Helyette tej, cukros tej, tojásfehérjés tej vagy víz, egyéb híján cukros víz itatandó. Szájüregöblítéssel vagy enyhe vízsugárral megtisztítandó az odatapadt kristályoktól. 2—3%-os *nátr. tioszulfátos* öblögetés is jó, per os is hasznos. Továbbiakban tüneti (shock, collapszus, gégevizenyő, fájdalom stb.), egyébként mint marómérgezésnél.

Karbolsav. *Bőrről* alkohollal (den. szesz is jó) mossuk le, utána olajos kötés. *Per os* mérgezésnél 1—2 dl növényi olaj, ricinus, utána hashajtó (keserűsó, még jobb a glaubersó), nátr. szulfát. Ha kivihető, úgy előbb gyomormosás, utána *nátr. szulfát*-oldat és *carbo activatus*. 10%-os nátr. tioszulfát, vagy 3%-os nátr. szulfát i. ven. Továbbiakban analepticumok, légzőközpont-izgatók, collapsus-kezelés, szükség esetén mesterséges lélegeztetés.

Kámfor. L. ált eljár. *1.* pont a). Nyugtalanság esetén *barbiturátok inj.* alakjában. Súlyos görcsöknél i. ven. narkózis (*Venobarbital* stb.) 1 cg *morfin. Koffein* fokozhatja az izgalmat.

Kéndioxid. L. klór.

Kénhidrogén. Mesterséges lélegeztetés, légzőközpont-izgatók. O_2- és CO_2-inhaláció, analepticumok, collapsus-kezelés, szükség esetén transfusio, vérlebocsátás.

Kígyómarás. Ha a végtagon történt a marás, úgy a seb felett lekötést, leszorítást végzünk, majd a marás helyét sebészetileg feltárjuk, kivéreztetjük, kiszívjuk (Bier-harang stb.), esetleg klórmész- vagy kál. hipermangán-oldattal kimossuk. Szokásos a marás környékét 1%-os klórmész- vagy ½—1%-os hipermangán-oldattal körülfecskendezni (gyakran necrosist okoz). Ha van polivalens viperaszérumunk, úgy a marás környékét ezzel fecskendezzük körül, és még 10—20 ml-t adunk i. musc. Mérsékelt mennyiségű alkoholos ital (pálinkaféle) jót tesz, úgyszintén erős babkávé is. Analepticumok, szükség esetén mesterséges lélegeztetés, O_2-, CO_2-inhaláció. Prophylactikusan *penicillin*.

Klór. L. ált. eljár. *2.* pont a).

Klóracetofenon. L. brómaceton.

Klórmész. L. ált. eljár. marómérgek, -lúgok és l. pont b).

Klórpikrin. A szemet tiszta vagy 2—3%-os nátriumbikarbonátos vízzel mossuk ki. Alkalizálás. A hányást jól csillapítja 1—2 pohárka pálinkaféle. Methaemoglobinaemia esetén l. ált. eljár. *9.* pont. Továbbiakban l. foszgén.

Klórvinilarzinklorid. L. Lewisit.

Koffein. L. ált. eljár. *1.* pont a). Nyugalom, barbiturátok, 2—3 csepp amilnitrit és tüneti kezelés.

Kokain. L. cocain.

Kombinált porok. L. ált. eljár. 1 pont a) és tüneti.

Kőrisbogár. Óvatos gyomormosás, hashajtó (keserűsó, glaubersó!) carbo activatus. Alkalizálás, infúziók. A nyelőcső, gyomor fájdalmassága ellen 1%-os *prokain-oldat* 3×1 evőkanállal. Hólyagmosás langyos vízzel vagy 1%-os nátriumbikarbonátos oldattal. Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos eljárások. Fájdalomcsillapítás és más tüneti kezelés. Tej, olaj, zsír, alkoholos ital tilos! Az esetleges hólyagokat megnyitjuk és tartalmukat kibocsátjuk.

Krómsav és sói. Óvatos gyomormosás tejjel, tejes vízzel, tojásfehérjés tejjel vagy vízzel. Utána magn. usta és carbo activ., 10%-os nátr. tioszulfát 10—20 ml i. ven. Fájdalomcsillapítás, infúziók. Oliguria, anuria, uraemia esetén a szokásos eljárások.

Leander. L. digitalis.

Lewisit. L. mustárgáz. Azonkívül Dicaptol injekciók.

Lysoform. L. formaldehid.

Marómérgek (lúgok, savak). Az általános eljárások — l. ált. eljár. *1.* pont b) — után a helyi (nyelőcső-, gyomor-) fájdalmak és a nyelési panaszok enyhítésére a naponta 3×1 evőkanállal 1%-os *prokain-oldat* vált be. A nyelőcső- és gyomor-spasmusokat *papaverin-belladonna-amidazofen* kúpokkal vagy Troparin injekcióval szüntetjük. Glottis-oedemánál l. ált. eljár. 14. pont. Táplálékul az első napokban csak tejet rendelünk, amely, mint finom emulzió, gyógyszer is és tápszer is. Később folyékony, majd pépes diétát írunk elő és így tovább a normál étrendig, az állapotnak megfelelően. Súlyos esetekben már az első naptól infúziókat adunk és mesterséges táplálásra térünk, melyet C- és B_1-vitamin injekcióval egészítünk ki. Az esetleges perforatiók műtéti eredménye igen rossz, csaknem kilátástalan. Szűkületek (nyelőcső-, pylorus-) műtéti indicatióját, úm. gastrotomia, gastroentero-anastomosis, lúgmérgezésnél 6 hét, savmérgezésnél 4 hét előtt nem állítjuk fel. Ha a beteg állapota megengedi, jobb 8, illetve 6 hét után operálni. A korai szondázás felnőttek lúgmérgezésében nem váltotta be a reményeket. Komolyabb marómérgezés eseteiben az első napokban prophylactikusan *penicillin*-kezelés.

Metilalkohol. Közvetlen a mérgezés után ált. eljár. *1.* pont a). Etilalkohol 30—40 ml hígítva per os vagy szondán át, pár napon keresztül. Erélyes alkalizálás, bő folyadékfelvétel, infúziók. Analepticumok, légzőcentrum-izgatók, O_2-inhaláció. Első órákban vérlebocsátás. B_1-*vitamin* inj.

Metilbromid. Légzési zavarokban, fenyegető légzésbénulás esetében légzőközpont-izgatók, O_2-, CO_2-inhaláció, szükség esetén mesterséges lélegeztetés. Tüdővizenyőnél vérlebocsátás, 20—40%-os *dextróz* 50—100 ml i. ven., *sztrofantin* i. ven. Görcsök, izgalmi állapotok jelentkezésekor i. ven. narkózis (*Venobarbital* stb.). Infúziók.

Méhcsípés. Fullánkeltávolítás, a szúráshely kiszívása (szívar-, cigarettaszipka), utána szalmiákszesz- vagy

más lúgos oldattal bedörzsöljük. Általános tüneteknél *adrenalin inj.* ½ ml vagy adrenalin-spray vagy *efedrin. Calc. gluconicum inj.* i. ven., vagy i. musc. Tüdővizenyő jelentkezésekor *sztrofantin* i. ven. collapsusnál analepticumok, érszűkítők. Légzésbénulásnál mesterséges lélegeztetés. *Lobelin, Tetracor, Spiractin,* CO_2-inhaláció. A szájüregben történt szúrásnál vagy glottis-oedemánál *adrenalin-spray* vagy *inj. calc. gluconicum* i. ven. Szükség esetén tracheotomia.

Mésznitrogén *(calcium cianamid).* Per os mérgezésnél l. ált. eljár. *1.* pont b) és marómérgek, -lúgok. *Belélegzés* esetében tüneti. Alkohol tilos!

Morfin és származékai. Per os mérgezés. Ha a mérgezett állapota nem túl súlyos, úgy gyomormosás, *carbo activatus* és hashajtó. Ha légzésbénulás fenyeget, úgy előbb megszüntetjük a veszélyt, és csak azután kíséreljük meg a gyomormosást vagy csak vékony szondán át keserűsó-oldatban szuszpendált *carbo activatust* viszünk a gyomorba. Az újabb kutatások a többszöri gyomormosást feleslegesnek tartják. Minden figyelmünket a légzés fenntartására fordítsuk gyógyszeres, úm. *Lobelin, Spiractin, Tetracor, sztrichnin, n-allylmorphin (Nalorphin),* O_2 + CO_2-inhaláció és mechanikus úton, mint mesterséges lélegeztetéssel. A mesterséges lélegeztetést kisebb megszakításokkal néha órákon át kell folytatni. Alkalmanként a „vastüdő" sokat segíthet. Bélmosások ajánlatosak. Fenyegető tüdővizenyő esetén *sztrofantin.* Elhúzódóbb lefolyáskor infúzió, *penicillin.* Gondos ápolás, állandó felügyelet, katéterezés. *Parenteralis* mérgezésnél l. ált. eljár. *6.* pont.

Mosópor. L. ált. eljár. marómérgek, -lúgok és *1.* pont b).

Mustárgáz. *Bőrön csepp, permet.* A bőrre jutott mérgező anyagot vattával, gézzel, itatóspapírral vagy bármely más alkalmas anyaggal *felitatjuk* (ledörzsölni, letörölni tilos!), és a helyét klórmészpúderrel (1 rész klórmész + 1 rész talcum) behintjük, és ezt kb. 10 percig rajta hagyjuk, majd lemossuk. Még jobb, ha erre a célra az ún. gézsebesomagot használjuk, a rajta levő használati utasítás szerint. A hatástalanítás céljára alkalmas még a chlorogenium *(Neomagnol)* is, de ezek csak nedvesen, víz jelenlétében hatásosak. Szükség esetén víz hiányában a szennye-

zett területet behintés előtt nyállal nedvesítjük meg (megköpdössük), vagy vizeletet használunk erre a célra. Hatástalanító szerek hiányában igen hasznos lehet a szappanos vizes lemosás is, sőt a hatástalanító eljárások után is jó, ha szappanos vizes lemosást alkalmazunk. A mustárgáz okozta erythemára valamilyen klóros oldattal (1—2%-os chlorogenium) nedves kötést helyezünk. Ha bulla fejlődött és még nem nyílt meg, úgy fejlődésének csúcspontján (3—4. nap) a bullát a legnagyobb sterilitással az alapjához közel megnyitjuk és a tartalmát kibocsátjuk, majd a hólyag falát óvatosan eltávolítjuk. A sebre 1—2%-os chlorogeniummal átitatott gézt helyezünk és naponta többször váltjuk. Ha a gyulladásos folyamat lezajlott, úgy rátérünk a steril száraz vagy indifferens kenőcsös kezelésre. Fertőzés esetén helyi és általános chemotherapiás vagy antibioticumos kezelés.

Bőrön gőzhatás. A ruházatot levetjük és az egész testet szappanos vízzel lemossuk, esetleg még klóros vízzel is. Utána a bőrt tiszta vazelinnal bekenjük.

Szemgőzhatás. A szemet 2%-os natr. bikarbonátos vízzel mossuk ki, és ezt többször megismételjük. Az öblítések után alkáliás szemkenőcsöt alkalmazunk. A fájdalmakat 2%-os *prokain-oldat* becseppentésével enyhítjük *(kokain tilos!)*. A továbbiakban naponta 2—3-szor paraffinolajat cseppentünk a szembe. Fertőzés, komplikáció esetén szakorvos! A szemet erős fénytől óvni!

Csepphatás. Ha a szembe folyékony mustárgáz került, úgy azonnal bőséges nátriumbikarbonátos vagy tiszta vízzel való mosás, minél gyorsabban szakorvosi kezelés.

Belélegzés esetén. A belélegzett mustárgáz a légzőszerveken hurutos, álhártyás, necrotikus folyamatokat idézhet elő. Ritkábban kisfokú körülírt tüdővizenyőt. Gyakori a pneumonia is. A gyógyítás ennek megfelelően a belgyógyászati szabályok szerint történik. Penicillin már prophylactikusan is adandó. A fájdalmas gégefő localis kezelése: helyi érzéstelenítőkkel való ecsetelés. Igen jó a *metilénkék—kokainos* ecsetelés. Köptetők, inhalálás, köhögés és fájdalomcsillapítók, nyugtatók, altatók, vitaminok, szükség esetén *excitánsok, sztrofantin*. Gondos ápolás, táplálás, psychotherapia a gyakori depressio miatt. *Per os* mérgezésnél (mustárgázzal szennyezett ételek, italok fogyasztása) l. ált. eljár. *1.* pont b) és tüneti.

Nikotin. Per os l. ált. eljár. *1.* pont a). Analepticumok, koffein, babkávé, alkohol (pálinka). Légzésbénulásnál mesterséges lélegeztetés, légzőközpont izgatók, szívmasszázs. Szívbénulásnál *adrenalin* intracardialisan.

Nitrobenzol. L. anilin.

Nitrogénmustár. L. mustárgáz.

Nitroglicerin. L. amilnitrit.

Nitritek, nitrátok. L. ált. eljár. *1.* pont a). Analepticumok. Methaemoglobinaemiánál l. ált. eljár. *9.* pont. Káliumnitrát (salétromsó) esetében konyhasó i. ven., bő folyadékfelvétel.

Nitrózus gázok. L. foszgén.

Novocain *(cocainum novum, procain)*. L. cocain.

Ólomsók. L. ált. eljár. *1.* pont a). Hashajtás *nátr. szulfáttal*, 10%-os *nátr. tioszulfát* inj., i. ven., *calcium gluconicum* injekciók. Fájdalmas bélgörcsök ellen *papaverin, opiátok*.

Ólomtetraetil. Per os l. ált. eljár. *1.* pont a). 10%-os tioszulfát i. ven. Nyugtalanság, delírium esetén barbiturátok, zárt elmeosztály. Morfint ne adjunk.

Ópium. L. morfin.

Oxálsav. L. heresó.

Parathion. L. ált. eljár. cholinesteráz-bénítók okozta mérgezésnél, *20.* pont.

Petróleum. L. ált. eljár. *1.* pont a) és tüneti.

Pilokarpin. L. ált. eljár. 1. pont a). Atropin! és tüneti kezelés.

Pirogallol. *Per os* l. ált. eljár. *1.* pont a). Methaemoglobinaemiánál l. ált. eljár. *9.* pont.

Procain. L. cocain.

Ricinusmag. L. ált. eljár. *1.* pont a). Bevonószerek és tüneti. Szükség esetén infúziók és analepticumok.

Schweinfurti zöld. L. arzén.

Secale cornutum. L. ergotin.

Stibium-vegyületek. L. antimon.

Szénsav (CO_2). Mesterséges lélegeztetés! O_2-*inhaláció*, *Lobelin*, *Spiractin* i. ven.

Szénkéneg *(széndiszulfid)*. Per os l. ált. eljár. *1.* pont a). Továbbiakban légzőcentrum-izgatók. O_2-, CO_2-*inhaláció*. Szükség esetén mesterséges lélegeztetés.

Szénmonoxid. Oxigéninhaláció. Szükség esetén mesterséges lélegeztetés. Legjobb az O_2 és CO_2 (95 : 5) keverék, a „*Carbogen*" inhalációja. *Lobelin*, *Spiractin* i. ven., *sztrofantin*, *penicillin* prophylactikusan is. Decubitus-hajlam.
Kivételesen súlyos esetben vérlebocsátás párhuzamos transfusióval.

Széntetraklorid. *Per os* l. ált. eljár. *1.* pont a). Olaj, zsír, ricinus is tilos! Egyébként légzés és keringés fenntartása. Adrenalin tilos! *Calcium* inj. Májvédelem és az esetleges vesekárosodás kezelése.

Szkopolamin. *Per os* l. ált. eljár. *1.* pont a). Parenterálisan l. ált. eljár. *6.* pont. A továbbiakban légzőcentrum-izgatók. Kitűnően hat az *efedrin*. Atropin, morfin tilos!

Szóda *(mosószóda, natr. carbonicum)*. L. marómérgek, -lúgok!

Sztrichnin. Ált. eljár. 1. pont a) csak akkor, ha a görcsök még nem jelentkeztek. Narkózisban ált. eljár. sokszor keresztülvihető. Tartós altatás *(Dauer-narkózis)*, közben infúziók. Könnyebb esetekben a mérgezett *állandó barbiturát-hatás* alatt álljon. Kb. 12—16 órán át, esetleg tovább is, a szükségnek megfelelően. A legnagyobb nyugalom, csendes, sötétebb szobában, minden külső ingert, úm. fényt, zajt, de különösen érintést, tapintást kerülni, úgyszintén a felesleges vizsgálatot is.

Tetraklóretán. L. széntetraklorid.

Timsó. L. marómérgek.

Tintaceruza *(metilviolett)*. A *szövetekbe* jutott ceruzabélt eltávolítjuk, illetve kimetsszük. Szemsérülést azonnal szakorvoshoz küldjük.

Triklóretilén. *Per os* l. ált. eljár. *1.* pont a). Egyébként a légzés és keringés fenntartása és tüneti.

„Tri"-só *(trinátriumfoszfát)*. L. marómérgek, -lúgok.

Viperamarás. L. Kígyómarás.

Vízüveg. L. marómérgek, -lúgok.

Yperit. L. mustárgáz.

Függelék

Sugárzási ártalmak (*röntgen-*, *gamma-*, *neutron-sugárzás* mérgezések). Nagy sugárzó energiák behatásánál (maghasadás, magépítés, egyesülés) első teendő a shock leküzdése. Só- és folyadékveszteség (hányás, hasmenés) pótlása infúziókkal. Vérképző szervek károsodásánál transfusiók, májkészítmények, vitaminok. Fertőzések ellen *penicillin* és más *antibioticumok*. Nyugalom! Gondos ápolás és táplálás, psychotherapia és tüneti kezelés.

Radioaktív anyagok (sugárzók). *Per os* ált. eljár. *1.* pont a) és fenti. Kiválasztás gyorsítása, a diuresis fokozása. *Bőrre, testfelületre* került r. akt. anyag esetében alapos lemosások szappanos vízzel (a hajas fejbőrt is), míg a testfelület radioaktivitást mutat. Ruházat, lábbeli, használati tárgy mindaddig nem használható, amíg r. akt.-t mutat, illetve a mentesítés nem történt meg. Mérgezési tüneteknél ellátása olyan, mint a sugárzási mérgezésé. Bőrtüneteknél megfelelő eljárás.

IV. HEVENY MÉRGEZÉSEK ORVOSI SEGÉLY NYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES LEGFONTOSABB GYÓGYSZEREK

Injekciók

Coffein	Morphin
Tetracor	Calc. gluconicum
Lobelin	Natr. thiosulf.
Nalorphin	Dicaptol
Redimyl	Natr. nitrosum
Sympathomim	Papaverin
Adrenalin	Atropin
Ephedrin	Glucosum 20 és 40%-os
Strophantin	Natr. chlor. 10%-os
Venobarbital	Metilénkék 1%-os
Sevenal	Apomorphin 1%-os

Egyéb gyógyszerek

Cupr. sulfur. 1 g-os csom	5 db
Natr. hidrokarbon	50 g
Magn. oxydat.	10—15 g
Calc. gluconic	25 g
Kal. hypermangan	10 g
Amylnitrit-párnácskák	5 db
Alkohol (per os haszn.)	50 g
Carbo activatus	50—100 g
Natr. sulfuric	100 g

Szemcseppek

Procain old. 2%-os
Paraff. liqu.

Eszközök

Gyomormosó felszerelés
Nyelvfogó

V. HÁZNÁL, HÁZTARTÁSBAN RENDSZERINT MEGTALÁLHATÓ FONTOSABB ANTIDOTUMOK, ANALEPTICUMOK ÉS EGYÉB SZEREK

Hánytatáshoz: Víz, szappan, olaj, zsír, vaj, konyhasó, vidéken gyakran rézgálic is.

Hashajtáshoz: Keserűvíz, keserűsó, karlsbadi só.

Marómérgezéshez és egyes fémsómérgezéshez: Tej, tojás, olaj, tejfel (vízzel hígítva tejet pótol).

Neutralizáláshoz: *Lúgokhoz:* ecet, citrom, uborkalé, citrompótló, savanyú bor, savó, író, aludttej; *savakhoz:* égetett magnézia, fogpor, kréta (Vigyázat! A málló kréták túlnyomórészt gipszből készülnek. Ez nem használható, sőt veszélyes!), szódabikarbóna, falról lekapart mész, mosópor (erősen hígítva).

Analepticumok, excitánsok, collapsus, légzésre és vasomotor-centrumra ható: Babkávé, orosz tea, alkoholos italok mint konyak, rum, pálinkafélék, sósborszesz, erős bor, habzóbor.

Reflectorikusan ható, szagoltatás útján: Szalmiákszesz, ecet, eszencia, reszelt torma, törött bors.

Fizikális eljárások: Dörzsölés, hideg leöntések, fájdalominger, mellkas, arc ütögetése stb.

Fémsómérgezésnél: Tej (rézgálicnál kerülendő), tojásfehérje, tojásfehérjés tej, fixírsó.

Adszorpciós therapia: Faszenet finomra megtörünk, finom szitán átszitáljuk. Sütőben elszenesítünk gabonamagvakat, kenyérhéjat, megtörjük, átszitáljuk.

Kalcium-therapia: Kréta, tojáshéj összetörve, falról levakart mész.

Oxidálószerek: Kál. hipermang.

Nátr. tioszulfát: Egyszerű fixírsó.

Szulfát: Keserűvíz, karlsbadi víz, glaubersó (ólomsók, bárium)

Szénsavas-inhaláció: Szódavizes üvegből.

Lemosószerek: *Vízben oldhatók:* víz, szappanos víz; *lipoidban oldhatók:* denat. szesz, pálinka, benzin.

Eszközök:
Irrigátor gyomormosáshoz.
Tölcsér megfelelő gumicsővel használható gyomormosáshoz, beöntésre, infúzióhoz (sterilezve).

MÉRTÉKEGYSÉGEK

Gyógyszerek adagolása során használatos egységek
1 evőkanál, kb. 15 ml;
1 gyermekkanál, kb. 10 ml;
1 kávéskanál, kb. 5 ml;
1 csepp (vizes oldatból), kb. 1/20—1/25 ml;
1 csepp (szeszes oldatból), kb. 1/50—1/60 ml;
1 késhegynyi, kb. 0,5—1,0 g.

Hosszmértékegységek
1 cm = 10 mm = 10 000 μ = 10 000 000 mγ;
1 yard (91,44 cm) = 3 foot (láb, 30,48 cm) = 36 inch (hüvelyk, 2,54 cm);
1 km = 1000 m = 0,6213 mile (angol mérföld).

Térfogat-mértékegységek
1 l = 100 ml;
1 gallon (4,55 l) = 4 quart (1,14 l) = 8 pint (0,57 l) *(angol mértékegységek);*
1 gallon (3,79 l) = 4 quart (0,95 l) = 8 pint (0,47 l) *(USA mértékegységek).*

Súlymértékegységek
1 g = 100 cg = 1000 mg = 1 000 000 γ (μg);
1 μg (mikrogramm) = 1 γ (gamma)
1 ounce (31,1 g) = 8 drachm (3,9 g) = 24 scruple (1,3 g) = 480 grain (gr 0,0648 g) *(gyógyszer-mértékegységek);*
1 pound (lb. 453,9 g) = 16 ounce (oz. 28,35 g) *(kereskedelmi mértékegység).*

Számnevek

Arab szám	Római szám	Latin név
1	I.	unus, -a, -um
2	II.	duo, -ae, -o
3	III.	tres, tria
4	IV.	quattuor
5	V.	quinque
6	VI.	sex
7	VII.	septem
8	VIII.	octo
9	IX.	novem
10	X.	decem
11	XI.	undecim
12	XII.	duodecim
13	XIII.	tredecim
14	XIV.	quattuordecim
15	XV.	quindecim
16	XVI.	sedecim
17	XVII.	septemdecim
18	XVIII.	duodeviginti
19	XIX.	undeviginti
20	XX.	viginti
30	XXX.	triginta
40	XL.	quadraginta
50	L.	quinquaginta
60	LX.	sexaginta
70	LXX.	septuaginta
80	LXXX.	octoginta
90	XC.	nonaginta
100	C.	centum
200	CC.	ducenti, -ae, -a
300	CCC.	trecenti, -ae, -a
400	CD.	quadringenti, -ae, -a
500	D.	quingenti, -ae, -a
600	DC.	sescenti, -ae, -a
700	DCC.	septingenti, -ae, -a
800	DCCC.	octingenti, -ae, -a
900	CM.	nongenti, -ae, -a
1 000	M.	mille
10 000	CCIↃↃ.	decem milia
100 000	CCCIↃↃↃ.	centum milia
1 000 000	CCCCIↃↃↃↃ.	decies centena milia

GYERMEKEK SÚLY- ÉS HOSSZMÉRTÉK-TÁBLÁZATA

Születéstől 18 éves korig

(Középértékek)

FIÚK			LÁNYOK
	SZÜLETÉS		
3,4	*súly*	kg	3,26
50,6	*hossz*	cm	50,2
	3 HÓNAP		
5,72	*súly*	kg	5,62
60,4	*hossz*	cm	59,5
	6 HÓNAP		
7,58	*súly*	kg	7,26
66,4	*hossz*	cm	65,2
	9 HÓNAP		
9,07	*súly*	kg	8,71
71,2	*hossz*	cm	70,1
	12 HÓNAP		
10,07	*súly*	kg	9,75
75,2	*hossz*	cm	74,2
	15 HÓNAP		
10,75	*súly*	kg	10,43
78,5	*hossz*	cm	77,6

FIÚK		LÁNYOK
	18 HÓNAP	
11,43	*súly* kg	11,11
81,8	*hossz* cm	80,9
	2 ÉV	
12,56	*súly* kg	12,29
87,5	*hossz* cm	86,6
	2,5 ÉV	
13,61	*súly* kg	13,43
92,1	*hossz* cm	91,4
	3 ÉV	
14,61	*súly* kg	14,42
96,2	*hossz* cm	95,7
	3,5 ÉV	
15,56	*súly* kg	15,38
99,8	*hossz* cm	99,5
	4 ÉV	
16,51	*súly* kg	16,42
103,6	*hossz* cm	103,2
	4,5 ÉV	
17,42	*súly* kg	17,46
106,7	*hossz* cm	106,8
	5 ÉV	
18,89	*súly* kg	18,57
110,0	*hossz* cm	109,4
	5,5 ÉV	
20,68	*súly* kg	19,96
114,4	*hossz* cm	112,8

FIÚK		LÁNYOK
	6 ÉV	
21,91	*súly* kg	21,09
117,5	*hossz* cm	115,9
	6,5 ÉV	
23,22	*súly* kg	22,41
120,4	*hossz* cm	119,1
	7 ÉV	
24,58	*súly* kg	23,68
124,1	*hossz* cm	122,3
	7,5 ÉV	
25,9	*súly* kg	25,04
127,1	*hossz* cm	125,2
	8 ÉV	
27,26	*súly* kg	26,35
130,0	*hossz* cm	128,0
	8,5 ÉV	
28,62	*súly* kg	27,67
132,8	*hossz* cm	130,5
	9 ÉV	
29,94	*súly* kg	28,94
135,5	*hossz* cm	132,9
	9,5 ÉV	
31,3	*súly* kg	30,44
137,9	*hossz* cm	135,8
	10 ÉV	
32,61	*súly* kg	31,89
140,3	*hossz* cm	138,6

FIÚK		LÁNYOK
	10,5 ÉV	
33,93	*súly* kg	33,79
142,3	*hossz* cm	141,7
	11 ÉV	
35,2	*súly* kg	35,74
144,2	*hossz* cm	144,7
	11,5 ÉV	
36,74	*súly* kg	37,74
146,9	*hossz* cm	148,1
	12 ÉV	
38,28	*súly* kg	39,74
149,6	*hossz* cm	151,9
	12,5 ÉV	
40,23	*súly* kg	42,37
152,3	*hossz* cm	154,3
	13 ÉV	
42,18	*súly* kg	44,95
155,0	*hossz* cm	157,1
	13,5 ÉV	
45,5	*súly* kg	47,04
158,9	*hossz* cm	158,4
	14 ÉV	
48,81	*súly* kg	49,17
162,7	*hossz* cm	159,4
	14,5 ÉV	
51,66	*súly* kg	50,35
165,3	*hossz* cm	160,4

FIÚK		LÁNYOK
54,48		
167,8		
	15 ÉV	
	súly kg	51,48
	hossz cm	161,1
	15,5 ÉV	
56,65	*súly* kg	52,3
169,7	*hossz* cm	161,7
	16 ÉV	
58,83	*súly* kg	53,07
171,6	*hossz* cm	162,2
	16,5 ÉV	
60,83	*súly* kg	53,57
172,7	*hossz* cm	162,4
	17 ÉV	
61,78	*súly* kg	54,02
173,7	*hossz* cm	162,5
	17,5 ÉV	
62,41	*súly* kg	54,2
174,1	*hossz* cm	162,5
	18 ÉV	
63,05	*súly* kg	54,39
174,5	*hossz* cm	162,5

Sorszám	100 g tartalmaz	Kalória	Fehérje	Zsír	Szénhidrát
	Gyümölcs- és				
1.	Áfonya, friss	68	0,6	0,6	16,3
2.	édesített konzerv	109	0,4	0,4	27,0
3.	Alma, édes, friss	58	0,3	0,4	15,9
4.	édes, szárított	281	3,0	0,7	77,6
5.	must, édesített	80	0,2	0,1	20,3
6.	-lé, friss	52	0,1	—	13,0
7.	Citromlé	45	0,9	0,6	8,7
8.	Cseresznye, friss	60	1,1	0,4	15,1
9.	édesített konzerv	235	0,6	0,1	20,8
10.	kandírozott	352	0,5	0,2	87,5
11.	Egres	37	0,8	0,5	9,5
12.	Földieper, friss	41	0,8	0,6	9,3
13.	édesített konzerv	116	0,5	0,2	28,7
14.	Görögdinnye	31	0,5	0,2	7,5
15.	Körte, friss	61	0,3	0,4	17,0
16.	édesített konzerv	75	0,2	0,1	19,9
17.	szárított	301	2,3	0,4	78,1
18.	Málna, friss	66	1,1	0,6	17,2
19.	édesített konzerv	119	0,6	0,5	29,9
20.	-lé, friss	45	0,2	—	11,0
21.	Mazsola	298	2,3	0,5	73,0
22.	Őszibarack, friss	47	0,8	0,2	12,4
23.	édesített konzerv	75	0,4	0,1	18,4
24.	szárított	295	3,0	0,6	72,9
25.	Ribizli, friss	58	1,4	0,4	17,1
26.	Sárgabarack, friss	51	0,9	0,2	13,9
27.	édesített konzerv	89	0,6	0,1	21,8
28.	szárított	292	5,2	0,4	69,5
29.	szárított, főzött	129	1,3	—	31,07
30.	Szilva, friss	56	0,7	0,2	13,4
31.	édesített konzerv	84	0,4	0,1	20,7
32.	szárított	299	2,3	0,6	72,6
33.	Szőlő	74	0,8	0,4	21,0
34.	-lé	76	0,4	—	18,0
	Főzelék-				
35.	Bab, zöld, friss	35	2,4	0,2	9,1
36.	zöld, konzerv	19	1,0	—	4,4
37.	Bab, fehér, szárított	350	22,0	1,5	66,5
38.	fehér, konzerv	102	6,0	0,4	20,0
39.	Borsó, friss	80	6,7	0,4	17,2
40.	konzerv	69	3,4	0,4	14,2
41.	szárított	354	24,5	1,0	66,1
42.	Burgonya, hámozott, friss	85	2,0	0,1	19,5
43.	szárított	363	7,1	0,7	82,0
44.	Hagyma, friss	40	1,4	0,2	9,8
45.	szárított	350	10,1	1,0	75,2

Sorszám	Vitamin A NE	Vitamin B_1 mg	Vitamin B_2 mg	Vitamin Nikotinsav mg	Vitamin C mg	Vitamin Egyéb mg
	gyümölcsléféleségek					
1.	280	0,03	0,07	0,3	16	—
2.	100	0,02	0,07	0,18	5	—
3.	90	0,04	0,02	0,05	5	E 0,72
4.	—	0,05	0,08	0,5	11	—
5.	60	0,01	0,01	—	1	—
6.	57	0,02	—	—	2	—
7.	—	0,04	—	0,1	45	P.
8.	1000	0,05	0,06	0,14	8	—
9.	870	0,03	0,02	0,18	3	—
10.	—	—	—	—	—	—
11.	380	0,15	—	—	25	—
12.	60	0,03	0,07	0,3	60	—
13.	—	—	—	—	—	—
14.	590	0,05	0,05	0,2	6	—
15.	20	0,02	0,04	0,1	4	—
16.	—	0,01	0,02	0,1	2	—
17.	45	0,07	0,15	—	—	—
18.	150	0,03	—	—	25	—
19.	100	0,02	—	—	—	—
20.	100	0,03	—	—	25	—
21.	50	0,15	0,08	0,5	—	—
22.	880	0,02	0,05	0,9	8	—
23.	450	0,01	0,02	0,7	4	—
24.	3250	0,01	0,20	5,4	19	—
25.	120	0,05	0,14	—	35	—
26.	2790	0,03	0,04	0,7	4	—
27.	1350	0,02	0,02	0,3	4	—
28.	7430	0,01	0,16	3,3	12	—
29.	2000	0,01	0,1	0,25	2	—
30.	350	0,15	0,03	0,6	5	—
31.	230	0,03	0,03	0,4	1	—
32.	1890	0,10	0,16	1,7	3	—
33.	80	0,05	0,03	0,4	4	—
34.	—	0,03	0,08	—	2	—
	féleségek					
35.	700	0,06	0,12	0,6	12	E 3,6
36.	410	0,03	0,05	0,3	4	—
37.	—	0,60	0,24	2,1	2	E
38.	—	0,13	0,12	0,88	—	—
39.	690	0,30	0,18	1,9	26	B_6; E 2,1
40.	540	0,11	0,06	0,9	8	—
41.	370	0,87	0,29	3,0	2	E +
42.	40	0,10	0,04	1,0	23	E 0,06
43.	400	0,25	0,10	4,8	26	—
44.	50	0,03	0,03	0,1	12	E 0,27
45.	20	0,23	0,15	1,1	37	—

Sorszám	100 g tartalmaz	Kalória	Fehérje	Zsír	Szénhidrát	Vitamin A NE	Vitamin B_1 mg	Vitamin B_2 mg	Vitamin Nikotinsav mg	Vitamin C mg	Vitamin Egyéb mg	Sorszám
					Főzelék-							
46.	Karalábélevél	30	3,1	0,4	6,6	9 540	0,10	0,56	0,8	136	E 2,2	46.
47.	-fej	29	2,1	0,2	7,2	—	0,06	0,06	0,5	28	—	47.
48.	Kelkáposzta, friss	25	1,6	0,1	6,7	100	0,06	0,05	0,26	40	E 0,1; K ++	48.
49.	szárított	346	13,7	1,8	68,8	520	0,41	0,37	2,4	189	K+++	49.
50.	Káposzta, savanyított	20	1,1	0,2	4,8	—	0,03	0,20	0,2	18	—	50.
51.	Karfiol	31	2,4	0,2	5,8	90	0,10	0,11	0,6	69	K	51.
52.	Kelbimbó	47	4,7	0,5	9,9	50	0,09	0,1	0,5	68	E	52.
53.	Lencse, szárított	357	25,7	1,0	61,2	50	0,5	0,32	3,1	—	E++	53.
54.	Paprika, zöld	24	1,2	0,2	6,7	630	0,07	0,04	0,4	120	—	54.
55.	Paradicsom, friss	23	1,0	0,3	4,6	1 100	0,06	0,04	0,6	23	E 0,27; K	55.
56.	konzerv	21	1,0	0,2	4,4	1 050	0,05	0,03	0,7	16	—	56.
57.	püré	217	2,0	0,4	24,5	1 880	0,09	0,07	1,8	28	—	57.
58.	-lé, konzerv	23	1,0	0,2	4,3	1 050	0,05	0,03	0,7	16	—	58.
59.	Paraj, friss	22	2,2	0,3	4,6	6 000	0,08	0,2	0,5	21,5	E	59.
60.	konzerv	22	2,3	0,4	5,6	5 800	0,02	0,08	0,3	5	—	60.
61.	Petrezselyem	60	3,7	1,0	10,8	18 000	—	—	—	189	E; K	61.
62.	Retek	20	1,1	0,1	4,9	30	0,04	0,04	0,1	24	—	62.
63.	Répa	33	1,6	0,1	10,5	6	0,03	0,04	0,3	5,5	E	63.
64.	Répa, vörös (cékla)	33	2,0	0,3	7,0	6 700	0,05	0,17	0,3	34	E	64.
65.	Saláta, fejes	15	1,3	0,2	3,4	540	0,06	0,07	0,2	8	E 0,45	65.
66.	Sárgarépa, friss	40	1,1	0,2	10,1	6 000	0,13	0,06	0,64	4	E 0,45	66.
67.	konzerv	30	0,5	0,4	6,0	4 500	0,03	0,02	0,3	2	—	67.
68.	szárított	361	4,0	1,4	83,0	60 000	0,29	0,28	3,2	11	—	68.
69.	Spárga, friss	21	2,1	0,2	4,9	800	0,12	0,17	1,2	36	—	69.
70.	konzerv	21	1,6	0,3	3,5	600	0,06	0,09	0,8	15	—	70.
71.	Szójabab, szárított	351	34,9	18,1	16,4	110	1,14	0,31	2,1	—	E, Pant. s.	71.
72.	Torma	22	0,7	0,5	4,2	4 000	0,10	0,27	—	75	—	72.
73.	Tök és dinnye	15	0,8	0,1	4,1	3 400	0,05	0,08	0,6	8	—	73.
74.	Uborka	13	0,8	0,1	3,6	200	0,04	0,05	0,18	10	B_6; E	74.
75.	Zellerlevél	20	1,1	0,2	5,2	—	0,03	0,04	0,3	7	E 0,46	75.
76.	-fej	46	1,7	0,3	10,4	—	—	—	—	—	—	76.
					Dió-							
77.	Dió	702	15,0	64,4	17,7	*féleségek*						
78.	Gesztenye, friss	213	3,4	1,9	46,9	30	0,48	0,13	1,2	3	P	77.
79.	szárított	380	6,7	4,1	81,5	80	0,23	—	1,17	6	—	78.
80.	Mandula	640	18,6	54,1	21,6	—	—	—	—	—	—	79.
81.	Mogyoró	671	12,7	60,9	21,4	—	0,25	0,67	4,6	—	—	80.
82.	földi, pirított	546	25,9	43,3	26,7	100	0,40	—	—	3	—	81.
					Kenyér-, liszt-	—	0,30	0,16	16,2	—	B_5; Pant. s	82.
83.	Árpagyöngy („Gersli")	346	9,0	1,4	77,3	*és tésztaféleségek*						
84.	Kenyér, fehér	260	8,5	2,0	52,0	—	0,12	0,08	3,1	—	—	83.
85.	Kenyér, fekete 100%	262	9,5	3,5	49,2	—	0,07	0,03	0,8	—	E 0,23	84.
86.	Kenyér, Graham	266	8,9	1,8	53,2	—	0,28	0,15	3,5	—	B_6; E 1,3	85.
87.	Kenyér, kukorica	240	6,2	7,0	39,2	—	0,30	0,13	3,54	—	E++	86.
88.	Kenyér, rozs, sötét	263	6,4	3,4	52,2	—	0,17	0,22	1,15	—	—	87.
89.	Kétszersült	422	9,8	9,9	73,5	—	0,16	0,04	1,1	—	—	88.
						—	—	—	—	—	—	89.

Sorszám	100 g tartalmaz	Kalória	Fehérje	Zsír	Szénhidrát
					Kenyér-, liszt-
90.	Kukoricadara	356	8,3	1,2	78,0
91.	Liszt, búza, fehér	370	10,8	1,1	75,8
92.	Liszt, búza, teljes	334	12,2	2,3	73,9
93.	Liszt, rozs, sötét	319	11,0	1,9	73,1
94.	Liszt, szója, középzsíros	283	42,5	6,5	13,6
95.	Liszt, szója, zsíros	375	35,9	20,6	11,4
96.	Rizs	354	7,4	0,5	80,4
97.	Rizs, fényezetlen	351	7,6	0,3	79,6
98.	Rizs, fényezett, főzött	100	2,2	0,1	22,6
99.	Tészta, közönséges, szárított	360	13,0	1,4	74,3
100.	Tészta, közönséges, főzött	69	2,5	0,2	14,3
101.	Tészta, tojásos	385	14,3	5,0	70,9
102.	Zabpehely	385	13,0	7,5	69,7
103.	Zabpehely, főzött	62	2,8	0,5	11,7
					Cukor- és édesség-
104.	Cukor	387	—	—	100,0
105.	Csokoládé, keserű	570	5,5	52,9	18,0
106.	Csokoládé, tej	452	6,0	33,5	54,0
107.	Kandírozottgyümölcs	288	0,5	9,3	70,8
108.	Karamell	428	2,0	12,0	78,0
109.	Melasz	240	2,4	—	60,0
110.	Méz	319	0,3	—	79,5
111.	Szőlőcukor	387	—	—	100,0
					Zsír- és
112.	Csukamájolaj	902	—	100,0	—
113.	Disznózsír, olaj	884	—	100,0	—
114.	Vaj	716	0,6	81,28	0,4
115.	Zsírszalonna, sózott, zsíros	816	3,0	89,0	0,5
					Tej-, tejtermék-
116.	Író	36	3,5	3,5	4,8
117.	Sajt, Camembert	306	19,7	25,34	—
118.	Ementáli	404	28,6	31,445	2,0
119.	Parmezán	400	36,3	27,59	2,0
120.	Roquefort	390	21,7	33,35	1,9
121.	Tej (juh)	93	5,15	6,18	4,17
122.	Tej (kecske)	71	3,76	4,07	4,64
123.	Tej (tehén)	69	3,39	4,08	4,94
124.	Tejföl, tejszín	206	2,5	20,0	4,0
125.	Tejpor	496	25,8	26,7	38,0
126.	Zsíros tehéntúró	249	16,5	18,0	3,5
127.	Sovány tehéntúró	88	17,0	0,20	4,0
128.	Juhtúró	384	23,3	30,0	2,4

Vitamin						Sorszám
A NE	B_1 mg	B_2 mg	Nikotinsav mg	C mg	Egyéb mg	
					és tésztaféleségek	
300	0,15	0,06	0,9	—	—	90.
—	0,07	0,03	0,07	—	E 1,2	91.
—	0,56	0,12	0,5	—	E 2,2	92.
—	0,47	0,21	1,7	—	—	93.
110	0,82	0,34	0,25	—	—	94.
140	0,77	0,28	0,3	—	—	95.
—	0,04	—	0,2	—	E 0,35	96.
—	0,05	0,03	1,4	—	—	97.
—	—	—	—	—	—	98.
—	0,13	0,08	2,1	—	—	99.
—	0,03	0,02	0,6	—	—	100.
200	0,13	0,12	2,1	—	—	101.
—	0,55	0,14	1,1	—	E 1,9; Pant. s.	102.
—	—	—	—	—	—	103.
					féleségek	
—	—	—	—	—	—	104.
—	—	0,24	1,1	—	E 5,3; Biotin	105.
183	0,02	0,04	0,33	—	Biotin	106.
10	0,02	0,02	0,2	6	—	107.
—	—	—	—	—	—	108.
—	0,08	0,16	2,8	—	—	109.
—	—	0,04	0,2	4	—	110.
—	—	—	—	—	—	111.
					olajféleségek	
85 000	—	—	—	—	D + + + +	112.
—	—	—	—	—	E 55	113.
3 300	—	0,01	0,1	—	D 60 NE, E 24	114.
—	0,18	0,04	0,9	—	D, E, F +	115.
					tojásféleségek	
—	0,04	0,18	0,1	1,0	—	116.
3 610	—	0,33	1,60	—	D; E 1,0	117.
4 010	0,03	0,45	1,24	—	D; E 1,0	118.
1 350	0,03	0,53	0,11	—	D; E 1,0	119.
4 010	0,03	0,45	1,24	—	D; E 1,0	120.
—	—	—	—	3,6	—	121.
170	0,06	0,07	0,25	1,0	D +	122.
280	0,04	0,17	0,1	1,7	D; E 0,12	123.
1 250	0,03	0,13	—	1,0	D	124.
49 500	0,94	1—2	0,5—1	10,0	D	125.
467	0,01	0,04	—	—	D : 0,0004	126.
—	0,01	0,04	—	—	—	127.
667	0,04	0,08	—	—	D : 0,001	128.

Sorszám	100 g tartalmaz	Kalória	Fehérje	Zsír	Szénhidrát	Vitamin A NE	Vitamin B_1 mg	Vitamin B_2 mg	Vitamin Nikotinsav mg	Vitamin C mg	Vitamin Egyéb mg	Sorszám
	Tej-, tejtermék-											
129.	Tojásfehérje, nyers	47	10,8	—	1,0	—	—	0,23	0,08	—	—	129.
130.	Tojáspor	593	48,2	45,44	2,6	4 460	0,35	1,23	0,2	—	D+++ E++	130.
131.	Tojás, teljes nyers	158	12,8	11,963	0,7	1 140	0,12	0,34	0,1	—	D+++ E 1,17	131.
132.	Tojássárgája, nyers	355	16,3	33,9	0,7	3 210	0,32	0,52	—	—	D+++ E++	132.
	Hús-											
133.	Birkahús	230	18,0	17,57	0,07	—	0,21	0,26	5,9	—	—	133.
134.	Borjúhús, nyers	176	19,2	11,065	—	—	0,18	0,27	6,3	—	—	134.
135.	Borjúhús, sütve, sovány	231	32,2	11,3	—	—	0,24	0,26	7,6	—	—	135.
136.	Borjúvelő	115	10,0	10,4	—	—	—	—	4,5	—	—	136.
137.	Csirkehús	111	21,6	2,7	—	—	0,23	0,15	6,0	—	E 0,21	137.
138.	Disznóhús, középzsíros .	291	16,4	25,9	—	—	1,04	0,20	4,4	—	B; E 0,63	138.
139.	Disznómáj	130	19,6	5,22	2,0	2 700	0,43	2,70	15,50	27	D+ E+	139.
140.	Disznósonka, füstölt ...	384	16,9	35,0	—	—	0,78	0,19	3,8	—	E 0,44	140.
141.	Kacsahús, nyers	321	16,0	28,67	—	—	0,13	0,41	7,89	8	—	141.
142.	Libahús, nyers	349	16,4	31,5	—	—	0,16	0,24	13,0	—	—	142.
143.	Libamáj	176	16,5	10,0	5,0	—	0,03	—	3,6	—	D; E	143.
	Marhahús megfőzve:											
144.	Beefsteak	293	16,9	25,0	—	—	0,10	0,13	4,6	—	E 0,47	144.
145.	Pecsenye, középzsíros	341	15,5	31,0	—	—	0,10	0,12	4,2	—	—	145.
146.	Pecsenye, sovány ...	194	19,3	13,0	—	—	0,12	0,15	5,2	—	—	146.
147.	Leveshús	162	20,3	9,0	—	—	0,13	0,16	5,5	—	—	147.
148.	Nyúlhús	129	21,0	5,08	—	—	0,05	0,06	12,70	—	—	148.
149.	Pulykahús.....	262	20,1	20,2	—	—	0,12	0,19	7,9	—	—	149.
150.	Étszalonna, sózott, zsíros	781	3,9	85,0	0,5	—	0,18	0,04	9,0	—	—	150.
	Vegyes											
151.	Bor	53	Alkoh.	7,5	0,1	—	—	—	—	—	—	151.
152.	Gomba	42	3,5	0,4	6,8	—	0,11	0,42	6,37	5,0	—	152.
153.	Italok, égetett.....	250	Alkoh.	40,0	—	—	—	—	—	—	—	153.
154.	Kakaó	329	9,0	18,8	31,0	—	0,09	0,45	1,50	—	E 3,1	154.
155.	Must	41	—	5,2	1,0	—	—	—	—	—	—	155.
156.	Rum	312	Alkoh.	43,9	—	—	—	—	—	—	—	156.
157.	Sör.....	50	0,6	4,4	4,0	—	0,003	0,79	—	—	—	157.
			Alkoh.									

A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK LAPPANGÁSI IDEJE

I. Bejelentési kötelezettség alá tartozó heveny fertőző betegségek

Betegség neve:	*Lappangási idő:*
Anthrax	1—7 nap
Ankylostomiasis	5—8 hét
Brucellosis	2—4 hét, leginkább 14 nap
Cholera asiatica	1—5 nap
Diphtheria	2—5 nap
Dysenteria	1—7 nap
Dyspepsia coli	2—4 nap
Echinococcosis	1—2 év
Encephalitis epidemica	4—21 nap
Febris flava	3—6 nap
Febris recurrens	3—14 nap
Hepatitis infectiosa	15—20 nap per os fertőzés esetén, szérum- (inoculatiós) hepatitis esetén 50—160 nap
Keratoconjunctivitis epidemica	3—7 nap
Lepra	Hosszú, 1—3 év
Leptospirosis	4—20 nap
Lyssa	2—6 hét
Malária	Változó, a harmadnapos lázban leggyakrabban 14 nap
Malleus	1—5 nap
Meningitis epidemica	2—10 nap
Meningitis serosa	*a)* Choriomeningitis lymphocytica: 8—21 nap *b)* Meningitis aseptica: 2—9 nap
Mononucleosis infectiosa	5—21 nap
Morbilli	9—10 nap, a kiütés megjelenése 14 nap
Ornithosis	4—15 nap
Paratyphus	1—10 nap
Pertussis	7—10 nap

Pestis	3—6 nap
Poliomyelitis anterior acuta	3—21 nap
Q-láz	2—3 hét
Salmonellosis	1—7 nap
Scarlatina	2—8 nap
Schistosomatosis	5—12 hét
Staphylococcosis	3—30 nap
Taeniasis	4—21 nap
Tetanus	6—14 nap
Toxoplasmosis	2 héttől <
Trachoma	Ismeretlen, valószínűleg 7—14 nap
Trichinellosis	Fogyasztástól számítva 6—7 nap
Tularaemia	1—10 nap
Typhus abdominalis	3—30 nap
Typhus exanthematicus	6—20 nap
Variola	9—15 nap

II. Bejelentési kötelezettség alá nem tartozó heveny fertőző betegségek

Betegség neve:	*Lappangási idő:*
Aphthae epizooticae	3—7 nap
Ascaridosis	A petékből 2 hónap alatt fejlődnek ki az ivarérett férgek
Coryza	12—48 óra
Enterobiasis	2—4 hét
Erysipelas hominis	1—3 nap
Erysipeloid Rosenbach	1—3 nap
Febris-Pappataci	3—6 nap
Giardiasis	1—2 hét
Impetigo contagiosa	3—5 nap
Influenza	1—3 nap
Mithosis	4—15 nap
Oedema malignum	A seb fertőzéstől számítva 5 órától 5—6 napig
Parotitis epidemica	13—30 nap
Pneumonia	Változó, általában rövid 1—6 nap
R-S-vírusfertőzés	3—7 nap
Rubeola	14—21 nap
Scabies	24—28 óra
Strongyloidosis	3—12 hét
Trichurosis	1—3 hónap
Varicella	2—3 hét

NORMÁLÉRTÉKEK A VÉRBEN ÉS A LIQUORBAN

Vér

	Teljes vér	Plazma (szérum)
I. Általános adatok		
Térfogat	70 ml/testsúlykg	40 ml/testsúlykg
Fajsúly	1,050—1,066	1,025—1,029
Fagyáspontcsökkenés	—	—0,56 C°
Relatív viszkozitás	4,5—5	1,9—2,3
Süllyedés (Westergren)	5—11 mm/1 óra	—
	8—16 mm/2 óra	—
pH (arteriás vérben)	7,40	—
pH (venás vérben)	7,36	—
II. Plazmafehérjék (proteinek)		
Protein-tart. összesen	—	6,7—7,2 g%
Albumin	—	4,0—5,2 g%
Globulin (összesen)	—	2,0—2,3 g%
Albumin : globulin hányados	—	2,0—2,2
α_1'-globulin	—	0,79 g%
α_2'-globulin	—	0,31 g%
α_3'-globulin	—	0,48 g%
β-globulin	—	0,80 g%
γ-globulin	—	0,74 g%
Fibrinogén	—	0,27—0,34 g%
III. Nitrogéntartalmú anyagok (nem fehérjék)		
Maradéknitrogén	28—39 mg%	22—29 mg%
Karbamid	25,6 mg%	26,8 mg%
Karbamidnitrogén	12,0 mg%	12,2 mg%
Aminosavnitrogén	5,6 mg%	4,4 mg%
Creatin	4,0 mg%	0,5 mg%
Creatin-nitrogén	1,3 mg%	—
Creatinin	1,3 mg%	0,9 mg%
Creatinin-nitrogén	—	0,4 mg%
Húgysav	—	4,3—5,3 mg%
Húgysavnitrogén	—	1,3 mg%
Gluthathion	35,4 mg%	—
Gluthathion-nitrogén	4,6 mg%	—
Ammónianitrogén	—	0,1—0,2 mg%
Ribonukleinsav	—	4,9 mg%
Dezoxiribonukleinsav	—	0,8 mg%
Adenosin	—	1,1 mg%
Bilirubin (indirekt)	—	0,25—0,80 mg%
IV. Szénhidrátok		
Glukóz	83—92 mg%	95—100 mg%
Glikogén	5,5 mg%	—
Hexozék	—	120 mg%

	Teljes vér	Plazma (szérum)
V. Lipidek (zsírok)		
Teljes lipidtartalom	560 mg%	530 mg%
Neutrális zsírok	85—240 mg%	0—150 mg%
Zsírsavak	290—420 mg%	240—520 mg%
Foszfolipidek	—	150—250 mg%
VI. Steroidok		
Steroidok összesen	—	170 mg%
Cholesterin	—	237—261 mg%
Desoxicholsav	—	40 mg%
Epésavak és epesavas sók	—	10 mg%
Cortisol	—	10 μg%
Corticosteron	—	1 μg%
Dehydroepiandrosteron	—	80 μg%
VII. Intermediaer anyagcsere		
Ketontestek	0,5 mg%	0,3—0,9 mg%
Acetecetsav	—	0,08—0,28 mg%
α-ketosavak (összesen)		0,8 mg%
Oxálsav	—	3,0 mg%
Tejsav	—	8,0—14,0 mg%
VIII. Enzimek		
Alkalikus-phosphatase (Bodansky)	—	1,5—5 E
Alkalikus-phosphatase (King)	—	3—13 E
Savanyú-phosphatase (Bodansky)	—	0,1—1,0 E
Savanyú-phosphatase (King)	—	1—4 E
Transaminase (glutaminsav-oxalecetsav) *SGOT*	—	4—40 E
Transaminase (glutaminsav-pyruvat) *SGPT* (Cabaud-Dubach)	—	10—40 E
Amylase (Wohlgemut)	—	80—64 E
Amylase (Somogyi)	—	60—80 E
Lipase (Comfort)	—	0,2—1,5 E
Aldolase (Silbey)	—	2—10 E
Tejsavdehydrogenase (Wroblevsky)	—	300—500 E
Cholinesterase (Huerga)	—	180—330 E
Nikotinamidadenindinukleotid (NAD)	3,6 mg%	0,07 mg%
IX. Anorganikus alkotórészek		
Nátrium	—	144 maequ/l
		355 mg%
Klorid	—	103 maequ/l
		355 mg%
Kálium	—	4,3 maequ/l
		16,8 mg%
Calcium (összesen)	—	2,5 maequ/l
		10 mg%
Calcium, ionizált	—	4,8 mg%
Magnézium	—	1,6 maequ/l
		1,92 mg%
Foszfor (összesen)	30—48 mg%	10—14 mg%
Foszfor, anorganikus	3,0 mg%	3,5 mg%

	Teljes vér	Plazma (szérum)
Kén (szulfát) összesen	3,8—5,0 mg%	3,0—3,7 mg%
Kén, anorganikus	0,4 mg%	1,6 mg%
Vas	—	0,1—0,2 mg%
Réz	—	0,1 mg%
Jód (összesen)	—	6—8 μg%
Jód — fehérjéhez kötött	—	5,0—5,5 μg%
Alkalitartalék (bikarbonát)	—	28—30 maequ/l
		50—70 tf%
X. Vérgázok		
Oxigén (arteriás vérben)	17,9—20,4 tf%	—
Oxigén (venás vérben)	13,7—15,3 tf%	
Széndioxid (arteriás vérben)	48,0—49,0 tf%	—
Széndioxid (venás vérben)	51,4—53,4 tf%	
Fizikálisan oldott nitrogén	0,97 tf%	—
XI. Alakos elemek		
Haematocrit-érték	38—42	—
Vörösvértestszám	4,5—5,4 millió/μl	—
Fehérvértestszám	5000—8000/μl	—
Thrombocyta-szám	180 000—	
	360 000/μl	—
Haemoglobin-tartalom	14,4—16,0 g%	—
Vörösvértestek átlagos Hb.-tart.	30 μμg	—
Vörösvértestek átlagos conc.	34%	—
Vörösvértestek átlagos térfogata	90 μ³	—

Liquor

(cerebrospinalis összetétele egészséges felnőtt emberben lumbalpunctióval vett liquor-analízis alapján)

Szín	víztiszta, átlátszó
Fajsúly	1,006—1,009
Fagyáspontcsökkenés	—0,56 °C — —0,60 °C
pH	7,14—7,50
Nyomás	6—20 vízcm
Fehérje (összesen)	20—40 mg%
Albumin: globulin hányados	4 : 1
Maradéknitrogén	11,0—20,0 mg%
Glukóz	45—80 mg%
Klorid	410—470 mg%
Nátrium	300—350 mg%
Kálium	8—15 mg%
Kalcium	4—6 mg%
Foszfor	1,5—2,0 mg%
Fehérvérsejtszám	0—3/mm³

Megjegyzés: Az egyes értékek feltüntetése — különösen ott, ahol a különböző meghatározások szerint eltérések vannak — a hazánkban legelterjedtebb eljárások alapján történt. A fontosabb és normál esetekben is nagyobb szórást mutató értékeknél alsó-felső határ, egyébként csak átlagérték szerepel. A felsorolásban csak azok az adatok találhatók, amelyeknek laboratóriumi meghatározása elterjedt, illetve terjedőben van, és a normálistól való eltérésük kórtani jelentőségű.

Összeállította: *Dr. Forgács Iván* egyet. tanársegéd.

	Teljes vér	Plazma (szérum)
V. Lipidek (zsírok)		
Teljes lipidtartalom	560 mg%	530 mg%
Neutrális zsírok	85—240 mg%	0—150 mg%
Zsírsavak	290—420 mg%	240—520 mg%
Foszfolipidek	—	150—250 mg%
VI. Steroidok		
Steroidok összesen	—	170 mg%
Cholesterin	—	237—261 mg%
Desoxicholsav	—	40 mg%
Epesavak és epesavas sók	—	10 mg%
Cortisol	—	10 μg%
Corticosteron	—	1 μg%
Dehydroepiandrosteron	—	80 μg%
VII. Intermediaer anyagcsere		
Ketontestek	0,5 mg%	0,3—0,9 mg%
Acetecetsav	—	0,02—0,28 mg%
α-ketosavak (összesen)		0,8 mg%
Oxálsav	—	3,0 mg%
Tejsav	—	8,0—14,0 mg%
VIII. Enzimek		
Alkalikus-phosphatase (Bodansky)	—	1,5—5 E
Alkalikus-phosphatase (King)	—	3—13 E
Savanyú-phosphatase (Bodansky)	—	0,1—1,0 E
Savanyú-phosphatase (King)	—	1—4 E
Transaminase (glutaminsav-oxalecetsav) *SGOT*	—	4—40 E
Transaminase (glutaminsav-pyruvat) *SGPT* (Cabaud-Dubach)	—	10—40 E
Amylase (Wohlgemut)	—	80—64 E
Amylase (Somogyi)	—	60—80 E
Lipase (Comfort)	—	0,2—1,5 E
Aldolase (Silbey)	—	2—10 E
Tejsavdehydrogenase (Wroblevsky)	—	300—500 E
Cholinesterase (Huerga)	—	180—330 E
Nikotinamidadenindinukleotid (NAD)	3,6 mg%	0,07 mg%
IX. Anorganikus alkotórészek		
Nátrium	—	144 maequ/l
Klorid	—	335 mg%
		103 maequ/l
		355 mg%
Kálium	—	4,3 maequ/l
		16,8 mg%
Calcium (összesen)	—	2,5 maequ/l
		10 mg%
Calcium, ionizált	—	4,8 mg%
Magnézium	—	1,6 maequ/l
		1,92 mg%
Foszfor (összesen)	30—48 mg%	10—14 mg%
Foszfor, anorganikus	3,0 mg%	3,5 mg%

	Teljes vér	Plazma (szérum)
Kén (szulfát) összesen	3,8—5,0 mg%	3,0—3,7 mg%
Kén, anorganikus	0,4 mg%	1,6 mg%
Vas	—	0,1—0,2 mg%
Réz	—	0,1 mg%
Jód (összesen)	—	6—8 μg%
Jód — fehérjéhez kötött	—	5,0—5,5 μg%
Alkalitartalék (bikarbonát)	—	28—30 maequ/l
		50—70 tf%
X. Vérgázok		
Oxigén (arteriás vérben)	17,9—20,4 tf%	—
Oxigén (venás vérben)	13,7—15,3 tf%	
Széndioxid (arteriás vérben)	48,0—49,0 tf%	—
Széndioxid (venás vérben)	51,4—53,4 tf%	
Fizikálisan oldott nitrogén	0,97 tf%	—
XI. Alakos elemek		
Haematocrit-érték	38—42	—
Vörösvértestszám	4,5—5,4 millió/μl	—
Fehérvértestszám	5000—8000/μl	—
Thrombocyta-szám	180 000—	
	360 000/μl	—
Haemoglobin-tartalom	14,4—16,0 g%	—
Vörösvértestek átlagos Hb.-tart.	30 μμg	—
Vörösvértestek átlagos conc.	34%	—
Vörösvértestek átlagos térfogata	90 μ^3	—

Liquor

(cerebrospinalis összetétele egészséges felnőtt emberben lumbalpunctióval vett liquor-analízis alapján)

Szín	víztiszta, átlátszó
Fajsúly	1,006—1,009
Fagyáspontcsökkenés	—0,56 °C — —0,60 °C
pH	7,14—7,50
Nyomás	6—20 vízcm
Fehérje (összesen)	20—40 mg%
Albumin: globulin hányados	4 : 1
Maradéknitrogén	11,0—20,0 mg%
Glukóz	45—80 mg%
Klorid	440—470 mg%
Nátrium	300—350 mg%
Kálium	8—15 mg%
Kalcium	4—6 mg%
Foszfor	1,5—2,0 mg%
Fehérvérsejtszám	0—3/mm³

Megjegyzés: Az egyes értékek feltüntetése — különösen ott, ahol a különböző meghatározások szerint eltérések vannak — a hazánkban legelterjedtebb eljárások alapján történt. A fontosabb és normál esetekben is nagyobb szórást mutató értékeknél alsó-felső határ, egyébként csak átlagérték szerepel. A felsorolásban csak azok az adatok találhatók, amelyeknek laboratóriumi meghatározása elterjedt, illetve terjedőben van, és a normálistól való eltérésük kórtani jelentőségű.

Összeállította: *Dr. Forgács Iván* egyet. tanársegéd.

TERHESSÉGI NAPTÁR

Számítás: Az utolsó menstruatio első napjától három hónapot visszaszámolunk, és ehhez a naphoz hét napot hozzáadva, megkapjuk a szülés várható időpontját

Utolsó menstruatio első napja		Szülés körülbelüli napja	
Jan.	1	Okt.	8
	3		10
	5		12
	7		14
	9		16
	11		18
	13		20
	15		22
	17		24
	19		26
	21		28
	23		30
	25	Nov.	1
	27		3
	29		5
	31		7
Febr.	1		8
	3		10
	5		12
	7		14
	9		16
	11		18
	13		20
	15		22
	17		24
	19		26
	21		28
	23		30
	25	Dec.	2
	27		4
Márc.	1		6
	3		8
	5		10
	7		12
	9		14
	11		16
	13		18
	15		20
	17		22
	19		24
	21		26
	23		28
	25		30
	27	Jan.	1
	29		3
	31		5
Ápr.	1	Jan.	6
	3		8
	5		10
	7		12
	9		14
	11		16
	13		18
	15		20
	17		22
	19		24
	21		26
	23		28
	25		30
	27	Febr.	1
	29		3
Máj.	1		5
	3		7
	5		9
	7		11
	9		13
	11		15
	13		17
	15		19
	17		21
	19		23
	21		25
	23	Márc.	1
	25		3
	27		5
	29		7
	31		10
Jún.	3		12
	5		14
	7		16
	9		18
	11		20
	13		22
	15		24
	17		26
	19		28
	21		30
	23	Ápr.	1
	25		3
	27		5
	29		

Utolsó menstruatio első napja		Szülés körülbelüli napja	
Júl.	1	Ápr.	7
	3		9
	5		11
	7		13
	9		15
	11		17
	13		19
	15		21
	17		23
	19		25
	21		27
	23		29
	25	Máj.	1
	27		3
	29		5
	31		7
Aug.	3		10
	5		12
	7		14
	9		16
	11		18
	13		20
	15		22
	17		24
	19		26
	21		28
	23		30
	25	Jún.	1
	27		3
	29		5
	31		7
Szept.	1		8
	3		10
	5		12
	7		14
	9		16
	11		18
	13		20
	15		22
	17		24
	19		26
	21		28
	23		30
	25	Júl.	2
	27		4
	29		6
Okt.	1		8
Okt.	3	Júl.	10
	5		12
	7		14
	9		16
	11		18
	13		20
	15		22
	17		24
	19		26
	21		28
	23		30
	25	Aug.	1
	27		3
	29		5
	31		7
Nov.	1		8
	3		10
	5		12
	7		14
	9		16
	11		18
	13		20
	15		22
	17		24
	19		26
	21		28
	23		30
	25	Szept.	1
	27		3
	29		5
Dec.	1		7
	3		9
	5		11
	7		13
	9		15
	11		17
	13		19
	15		21
	17		23
	19		25
	21		28
	23		29
	25	Okt.	1
	27		3
	29		5
	31		7

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER

40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítása a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő gyógyszerrendelés szabályozásáról

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnál (SZTK)*, a Vasutasok Szakszervezeténél (VSZ), valamint a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézetnél (KSZKBI)* biztosítottak és igényjogosult családtagjaik (a továbbiakban: a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak) részére gyógyszert (gyógyszerkülönlegességet, szerobakteriológiai készítményt), gyógytápszert, kötözőszert, gyógyvizet és egyéb gyógyanyagot (a továbbiakban: gyógyszer) rendelhetnek:

1. Az állami egészségügyi szolgálatnak és a vasút-egészségügyi szolgálatnak a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak egészségügyi ellátását (vizsgálatát, gyógykezelését, felülvizsgálatát) végző orvosai közül az alábbi felsorolt orvosok:

a) a körzeti orvosok,

a rendelőintézetben, kórházban, klinikán, saját rendelőben biztosítottak ellátására szervezett, rendszeresen, órakerettel működő szakrendelések orvosai, ideértve a körzeti gyermekgyógyász és a körzeti szülészszakorvosokat is,

a gondozóintézeti orvosok:

a bőr-, nemibeteggondozó intézetek orvosai,

az idegbeteggondozó intézetek orvosai,

az onkológiai gondozóintézetek orvosai,

a tbc-gondozóintézetek orvosai,

a terhesgondozó intézetek orvosai,

a csecsemő- és gyermekgondozó intézetek orvosai,

* A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK), továbbá a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézet (KSZKBI) megszűnt. Jogutódja a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóság. Ez az ebben a kiadványban közzétett valamennyi szabályozásra vonatkozik.

az Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézetben működő szakrendelések orvosai,

az Országos Munkaegészségügyi Intézetben szervezett szakrendelés orvosai,

az iskolaszakorvosi rendelőintézetek orvosai,

az egyetemi, főiskolai szakrendelések orvosai,

a gyógyítva nevelő iskolák, általános iskolák és középfokú iskolák kollégiumokban elhelyezett, bentlakó tanulóit ellátó internátusi orvosok,

a területi és az üzemi bölcsődék, valamint a napközi otthonok orvosai,

az üzemi orvosok,

a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai;

b) a felülvizsgáló főorvosok, valamint a MÁV igazgatóságok ellenőrző orvosai és ellenőrző főorvosai,

a rendelőintézetek igazgatói (kórházigazgató, rendelőintézeti helyettese), a MÁV-rendelőintézetek vezető főorvosai,

c) az állami egészségügyi szolgálat központi ellenőrző főorvosai,

a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium I. Vasúti főosztályának orvosfőelőadói,

a MÁV igazgatósági főorvosok és helyetteseik;*

2. az 1. pont hatálya alá nem tartozó azok az orvosok, akiket az Egészségügyi Minisztérium, illetőleg a járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) — saját kezdeményezésére vagy az orvost alkalmazó szerv előterjesztésére — a betegellátás érdekében az illetékes társadalombiztosítási szerv előzetes hozzájárulásával vényírási joggal felruházott (pl. üdültetetteket ellátó orvos stb.);

3. a társadalombiztosítási szervek orvosai.

(2) Az (1) bekezdés 1. *a)*, 1. *b)* és 2. pontja alapján vényírási joggal rendelkező, illetőleg azzal felruházott orvosokról a járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) nyilvántartást vezet és minden változásról a társadalombiztosítási szerv területileg illetékes helyi szervét (alközpontját, kirendeltségét) nyolc napon belül értesíti.

* Lásd még 37/1962. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítást (514. oldalon)

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében 1. *a)*, 1. *b)* és 2. pontjában említett orvosok a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített vényűrlapon (11. §) — az életveszély és a halasztást nem tűrő sürgős szükség, valamint a köteles elsősegélynyújtás eseteit, továbbá a jelen § (2) bekezdésében említett eseteket kivéve — csak az ellátásukba tartozó, illetőleg az ellátásukba utalt igényjogosultak részére rendelhetnek gyógyszert. (Pl. üzemi orvos csak az üzemben dolgozó biztosítottak részére rendelhet gyógyszert, családtagok részére nem; bölcsődei orvos csak a bölcsődében gondozott gyermekeknek írhat vényt stb.).

(2) Az (1) bekezdésben említett orvos az ellátásába tartozó, illetőleg az ellátásába utalt igényjogosultakon felül gyógyszert rendelhet:

a) az éjjeli és munkaszünnapi orvosi ügyeletes szolgálat idején általa ellátott igényjogosultaknak,

b) a más orvos ellátásába tartozó (utalt) igényjogosult részére az illetékes orvos igazolható távolléte esetében,

c) sürgős szükség esetében olyan igényjogosult részére, akit szaktanácskozás keretében látott el,

d) a házastársa, mind a saját, mind a házastársa szülei és nagyszülei, a testvéreik, a gyermekeik, valamint az alkalmazottaik és a háztartásukban élők részére, ha a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak,

e) állandó lakóhelyére tekintet nélkül annak a 14. életévét be nem töltött igényjogosult gyermeknek, aki a szülők munkaideje alatt az orvos működési területén lakó gondviselőnél tartózkodik.

(3) Az 1. § (1) bekezdésének 1. *c)* és 3. pontjában említett orvosok vényírási jogosultsága az illetékes társadalombiztosítási szerv vonatkozásában minden igényjogosultságra kiterjed.

(4) A (2) bekezdésben felsorolt esetekben az orvos köteles a vényen a rendelés jogalapját röviden feltüntetni.

(5) Gyógyintézeti ápolás alatt álló igényjogosultak részére a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített vényűrlapon gyógyszer nem rendelhető. Fekvőbeteg-gyógyintézeti orvos, ha valamely egyéb címen vényírási joggal rendelkezik, a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére

rendszeresített vényűrlapon csak abban a működési körében (pl. rendelőintézeti szakorvosi, üzemi orvosi működési körében) rendelhet gyógyszert, amellyel kapcsolatban a vényírási jogosultsága fennáll.

3. §

(1) A gyógyszerrendelés előtt az orvos köteles a betegnek a társadalombiztosítás szolgáltatásaira való jogosultságát ellenőrizni.

(2) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira való jogosultságot a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok értelmében a jelen utasítás mellékletében megjelölt igazolvánnyal kell igazolni. Az I/1954. (I. 9.) M. T. számú rendelettel rendszeresített „Személyi igazolvány" a társadalombiztosítás szolgáltatásaira való jogosultság igazolására nem fogadható el.

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendelhető gyógyszerek

4. §

(1) Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett hivatalos gyógyszerek, valamint az Egészségügyi Minisztérium által kiadott „Szabványos Vénymináták Gyűjteményé"-be (Formulae Normalesbe) felvett, mintaszerűleg rendelhető gyógyszerek — a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés figyelembevételével — a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére szabadon rendelhetők.

(2) Az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett hivatalos gyógyszerek közül azoknak a gyógyszereknek a rendelésére, amelyek mint törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek is forgalomban vannak (pl. Glanducorpin stb.), az Egészségügyi Minisztérium által kiadott „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" című kiadványban (pótlásában) a gyógyszerkészítmény neve mellett levő „Megjegyzések" rovatban megadott rendelkezés az irányadó.

5. §

(1) A „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" című kiadványban (a továbbiakban Tájékoztató) és pótlásába felvett bel- és külföldi gyógyszerkészítményeknek, valamint a szerobakteriológiai készítmé-

nyeknek, a hazai természetes keserű- és gyógyvizeknek, a kötözőszereknek és a ragtapaszoknak a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő rendelésére a Tájékoztatóban (pótlásában) az egyes gyógyszerkészítmények (szerobakteriológiai készítmények stb.) neve mellett levő „Megjegyzések" rovatban megadott rendelkezés az irányadó.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnak megfelelően a Tájékoztatóba (pótlásába) felvett bel- vagy külföldi gyógyszerkészítmény (szerobakteriológiai készítmény stb.), amelynek neve mellett levő „Megjegyzések" rovatban az „SZTK* terhére szabadon rendelhető" szöveg van feltüntetve, bármelyik társadalombiztosítási szervhez tartozó biztosított (igényjogosult családtag) részére szabadon rendelhető. Az a gyógyszerkészítmény pedig, amelynek rendelését a Tájékoztatónak (pótlásának) „Megjegyzés" rovatában megadott rendelkezés feltételhez köti, a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére csak az ott meghatározott rendelkezés szerint rendelhető.

(3) Azt a gyógyszerkészítményt, amelynek rendelését külön jogszabály szabályozza, csak a vonatkozó jogszabályban foglalt rendelkezés szerint szabad a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendelni.

Térítésmentesen rendelendő gyógyszerek

6. §

Térítésmentes kiszolgáltatásra jogosító vényfürlapon (11. §) kell rendelni:

a) az üzemi baleseti sérült, valamint a 67/1958. (XII. 24.) Korm. számú rendelet II. számú mellékletében (lásd: Magyar Közlöny, 1958. év, 115. sz.) felsorolt foglalkozási megbetegedésben szenvedő biztosított részére mindazokat a gyógyszereket (kötözőszereket, gyógyvizeket), amelyekre üzemi balesetével, illetőleg foglalkozási megbetegedésével összefüggő betegsége miatt van szüksége,

b) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) biztosításra kötelezett ipari tanuló részére,

c) minden gyógyszert (kötözőszert, gyógyvizet) a Belügyminisztérium fegyveres testületeinek sorozott állományú tagjai (sorkatonák, sortiszthelyettesek) részére,

d) bármely igényjogosult részére nemi betegség gyógykezeléséhez szükséges alábbi gyógyszereket:
Medobis,
Intrajod,
Penicillin,
Szulfonamid-készítmények (gonorrhoea esetén),
Chlorocid,
ha valamely ok miatt nem a „pro ambulantia" szerekből történik a kiszolgáltatásuk,

e) bármely igényjogosult részére az anya- és csecsemővédelem hatékonyabbá tétele érdekében szükséges alábbi gyógyszereket, gyógytápszereket:
D-vitamin-készítmények,
Szulfonamid-készítmények csecsemők bélhurutjánál,
Adapta,
Lactorizan,
Maltiron,
szülészeti egységcsomag,

f) bármely igényjogosult részére az alábbi különleges gyógyszereket:
Chlorocid-drazsé,
Chlorocid-drazsé gyermekeknek,
Chlorocid-injekció,
Chlorocid-szirup,
Diphtheria-serum
Tetanus-serum,
Tetanus-anatoxin sérült személy részére,
Insulin csak diabetes mellitus esetében,
Bucarban, Oradian, Oterben csak diabetes mellitus esetében,
Retandrol, Androral csak emlőrákból eredő, meglevő csontáttétel esetében,

g) azokat a gyógyszereket, amelyeket egyéb jogszabályok értelmében térítésmentesen kell kiszolgáltatni.

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére vényen nem rendelhető gyógyszerek és egyéb gyógyanyagok

7. §

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére vényen nem rendelhetők:

* Módosítva: „Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető."

a) a „pro ambulantia" szerek [lásd a jelen § (4) bek.],

b) azok a gyógyszerek, amelyeknél a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére" című kiadványnak (pótlásának) „Megjegyzések" rovatában „SZTK* terhére nem rendelhető" szöveg van feltüntetve, valamint azok a gyógyszerek, amelyek külön jogszabály értelmében a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére vényen nem rendelhetők,

c) spiritus vini concentratus, concentratissimus v. dilutus más gyógyító szer hozzáadása nélkül, továbbá kozmetikumok (bőrápoló krémek, napolaj, hajápoló szerek, fogpor, fogkrém, szájvíz stb.), valamint gyógyszappanok, gyógyborok, konyak, fogamzást gátló szerek és aphrodisiacumok.

(2) Ostya általában csak chinin-tartalmú gyógyszerekhez rendelhető; a rendelt gyógyszerrel együtt egy vényűrlapon kell felírni.

(3) Ízjavítók általában csak 12 éven aluli gyermekeknek rendelhetők. Por eloszthatósága céljából általában adagonként legfeljebb 30 cg cukrot szabad rendelni.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából „pro ambulantia" szernek kell tekinteni:

a) azt a gyógyanyagot, laboratóriumi reagenst és röntgen-kontraszanyagot (a Bilospekt kivételével), amelyet a szakrendelés, körzeti orvos stb. a beteg vizsgálatánál az orvosi rendelőben felhasznál,

b) azt a fertőtlenítő szert, kötözőszert, ragtapaszt, sebvarróanyagot, sebhintőport, kenőcsöt, és az altatáshoz vagy helyi érzéstelenítéshez szükséges azt a gyógyszert, amelyet a szakrendelés, körzeti orvos stb. a beteg kezeléséhez a rendelőben a saját mindennapos szakmai gyakorlatában használ,

c) azt az injekciós készítményt vagy egyéb gyógyszert, amelyet a szakrendelés, körzeti orvos stb. a saját mindennapos szakmai gyakorlatában a rendelőben a beteg azonnali ellátására felhasznál (ha ezt a gyógyszert a szakrendelés, körzeti orvos stb. kúraszerűleg tovább is alkalmazza, a további kezeléshez szükséges gyógyszermennyiséget a beteg nevére kiállított vényen kell rendelni),

d) azt az injekciós készítményt, amelyet a körzeti orvos a beteg lakásán életmentési célból, vagy sürgős szükségből felhasznál. (Amennyiben ez utóbbi célra a körzeti orvos „táskája" részére kiutalt készlet nem bizonyul elegendőnek, ez a gyógyszer kivételesen a beteg részére kiállított vényen rendelhető),

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik az üzemi orvosi rendelők gyógyszerellátására vonatkozó jogszabályok hatályát.

(6) A nemibetegségek (syphilis és gonorrhoea) gyógykezeléséhez szükséges penicillin rendelésére a 8300—2/1953. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás (lásd az Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye II. kötetének 562. oldalán), a penicillin-kezelésre nem gyógyuló, szövődményes gonorrhoeának streptomycinnel vagy chlorociddal való gyógykezelésére pedig a 22/1957. (Eü. K. 11.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései az irányadók (lásd 572. oldal).

A gyógyszerrendelés általános irányelvei

8. §

(1) A gyógyszeres kezelés alapkövetelménye a hatásos, ésszerű és gazdaságos gyógyszerrendelés.

(2) Mellőzni kell valamely gyógyszernek a tudományosan általánosan elfogadott indikációs területen kívüli alkalmazását. Kerülni kell a polypragmasiát, az összetételben vagy hatásban inkompatibilis gyógyszerek együttrendelését, azonos hatású gyógyszerek felesleges kombinációját. Ez természetesen nem érinti a helyes synergismus elvét.

(3) A beteg állapotában beálló változás gyakran a gyógyszeres kezelés megváltoztatását is szükségessé teszi. Ezért egyszerre csak olyan mennyiségű gyógyszert ésszerű rendelni, amelyet a beteg előreláthatóan valóban felhasznál. Egyes gyógyszerféleségek — pl. infusumok — romlékonyságára is figyelemmel kell lenni. Ennek megfelelően a

a) a gyógyszerekből heveny megbetegedés esetében általában 2—3 napra, idült betegség esetében pedig általában 10 napra elegendő gyógyszer rendelhető;

b) a bontható gyógyszerkülönlegességeket a valóságos szükségletnek megfelelő darabszámban (mennyiségben) kell rendelni. Eredeti gyári csomagolásban („scat. orig." stb.) csak akkor rendelhető, ha a gyógykezeléshez előreláthatóan ez a teljes mennyiség szükséges;

* Módosítva: „Társadalombiztosítás terhére nem rendelhető."

c) a szükséges gyógyszert a leggazdaságosabb formában kell rendelni, több egyformán megfelelő gyógyszer közül a kevésbé költséges gyógyszert kell megválasztani, de a takarékosság nem mehet a gyógykezelés hatásosságának rovására;

d) minden esetben csak forgalomban levő, valóban beszerezhető gyógyszert szabad rendelni;

e) gyógyszert indokolt szükség nélkül, csupán azért, hogy alkalomadtán készenlétben legyen, nem szabad rendelni;

f) a gyógyításhoz szükséges gyógyszer minőségének és mennyiségének megválasztása nem a laikus ajánlások által befolyásolt beteg, hanem az orvos feladata.

9. §

(1) Az orvos a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult betegnek vizsgálat nélkül gyógyszert nem rendelhet. A más orvos által rendelt gyógyszert az illetékes orvos csak abban az esetben írhatja át a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult részére rendszeresített vényűrlapra, ha a felírt gyógyszer alkalmazásának szükségességét maga is megállapította.

(2) Az orvos köteles a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult részére rendelt gyógyszer nevét és a gyógyszer rendelt mennyiségét a betegnaplóba (kartotéklapra) röviden bejegyezni. A további gyógyszerrendelésnél az előzőleg rendelt gyógyszer mennyiségét figyelembe kell venni. Ha a beteget előzőleg már más orvos gyógyszerellátásban részesítette, a további gyógyszerrendelésnél ennek a körülménynek figyelembevételével kell eljárni.

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézeteknek a kibocsátott igényjogosult betegek részére adott zárójelentésben minden esetben ismertetniök kell, hogy a gyógyintézetben mely gyógyszerrel (gyógyszerekkel) értek el a betegnél eredményt. Ha valamely különleges gyógyszer (pl. Insulin) további kórházon kívüli alkalmazását a hatályos rendelkezések a kórháznak (klinikának) a zárójelentésben feltüntetett konkrét javaslatától teszik függővé, a zárójelentés megfelelő rovatában az alkalmazandó gyógyszert és napi adagját is meg kell jelölni.

10. §

(1) Kötözőszer és ragtapasz vénnyel általában csak abban az esetben rendelhető, ha az igényjogosultat

sürgős szükség esetében sebészeti ellátásban kell részesíteni és a szükséges kötözőszer, illetőleg ragtapasz egyéb módon nem biztosítható, vagy ha az igényjogosult nagy mennyiségű kötözőszert igénylő, huzamosabb időn át szükséges kötözését a körzeti orvos vagy a beteg saját maga látja el (pl. anus praeternaturalis, tbc-s csontsipoly).

(2) Gyógytápszer csak csecsemők és gyermekek részére, részükre is kizárólag táplálkozási zavaraik megszüntetésére rendelhető. A rendelésre a 3180/82—2/1951. (Népeg. 12.) Eü. M. számú utasítás (lásd az 573. oldalon) rendelkezései az irányadók.

A vények kiállításának szabályai

11. §

(1) A Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnál (SZTK) és a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézetnél (KSZKBI) biztosítottak és igényjogosult családtagjaik részére a gyógyszert az erre a célra rendszeresített vényűrlapon kell rendelni. Azt a gyógyszert, amelyért a biztosított (családtag) térítést fizet, a vényűrlapnak az „SZTK térítésköteles vény" feliratú oldalán, azt a gyógyszert pedig, amelyet térítésmentesen kell kiszolgáltani, a vényűrlapnak az „SZTK térítésmentes vény" feliratú oldalán kell felírni.

Ugyanazon a vényűrlapon csak térítés ellenében vagy csak térítésmentesen kiszolgáltatható gyógyszer rendelhető. A vényt általában — a kábítószerek* kivételével — egy példányban (másolat nélkül) kell kiállítani.

(2) A Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) igényjogosultjai részére a gyógyszert az erre a célra rendszeresített „Vényfüzet"-ben, illetőleg vényűrlapon kell rendelni.

(3) Ha az előírt (rendszeresített) vényűrlap elhárithatatlan okból nem áll rendelkezésre, az orvos a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult részére kivételesen előrenyomtatott vagy az orvos által magakészített magánvényűrlapon is rendelhet gyógyszert. Ilyen esetben is azonban az orvos a vényt a 12. §-ban foglal-

* Továbbá a 41/1962. (Eü. K. 17.), valamint a 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasítás mellékletében felsoroltak (lásd az 516., ill. 518. oldalt).

taknak megfelelően köteles kiállítani és ezenfelül meg kell jelölni azt a társadalombiztosítási szervet, amelyhez a biztosított (családtag) tartozik. Olyan gyógyszer rendelése esetében, amelyet térítésmentesen kell kiszolgáltatni, az orvosnak a vényűrlapra a „térítésmentes" szót is rá kell vezetnie és ezt a feljegyzést külön aláírásával és hivatalos orvosi bélyegzőjének lenyomatával meg kell erősítenie.

(4) Egy vényűrlapon általában csak egy gyógyszerféleség rendelése célszerű. Kivételesen egy vényűrlapon két gyógyszerféleség is rendelhető, de csak abban az esetben, ha a vényt író orvos biztosan tudta, hogy mindkét gyógyszer egyidejűleg minden gyógyszertárban beszerezhető. Ugyanazon a vényűrlapon egy gyógyszerkülönlegesség és egy magisztrális gyógyszer is rendelhető. Chinint tartalmazó porokhoz szükséges ostya, valamint a szemcseppentő, a szemkenőcshöz szolgáló üvegpálca a hozzá tartozó gyógyszerrel együtt, továbbá az Insulin-kezelésre szoruló cukorbetegek és az asthma bronchiale betegségben szenvedők részére az injekciós tű a benzinnel és a vattával együtt vényűrlapon rendelhető.

12. §

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére írt vényeken az orvos köteles feltüntetni:

a) a biztosított nevét,

b) a biztosított lakcímét (város, község, utca, házszám),

c) a biztosított munkáltatójának nevét vagy munkáltatói törzsszámát,

d) azt, hogy a gyógyszert a biztosított vagy mely igényjogosult családtagja (felesége, milyen idős gyermeke, egyéb családtagja) részére rendelte,

e) a rendelés keltét (a hónap nevét nem római számmal, hanem betűkkel kiírva),

f) a rendelt gyógyszer nevét és mennyiségét.

(2) Az orvos köteles a vényt aláírásával és hivatalos orvosi bélyegzőjének lenyomatával ellátni. Ha a vényen változtatást, javítást eszközöl, köteles azt kézjegyével és bélyegzőjének újabb lenyomatával külön igazolni.

(3) Ha a gyógyszert térítésmentes kiszolgáltatásra jogosító vényűrlapon kell rendelni (*6.* §), a vényűrlapon az (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül minden esetben fel kell tüntetni a kiszolgáltatás térítésmentességének indokát is (pl. üzemi baleset, ipari tanuló).

14. §

Kábítószereknek és kábítószert tartalmazó gyógyszereknek, valamint azoknak a gyógyszereknek rendelése esetében, amelyeknek rendelését és kiszolgáltatását külön jogszabályok szabályozzák, a vényt a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell kiállítani.

15. §

(1) A vényt tintával vagy tintairónnal, jól olvasható írással, szabályszerűen, a jelen utasítás rendelkezéseinek megfelelően kell megírni. A vényűrlapon a gyógyszer rendelésére vonatkozó szöveget félre nem érthető módon kell feltüntetni. A gyógyszerek nevének megjelölésére csak azokat a rövidítéseket szabad használni, amelyeket az V.* Magyar Gyógyszerkönyv megenged. Ennél rövidebb alakban a gyógyszer nevét felírni nem szabad. A gyógyszerkülönlegességek neve nem rövidíthető. A társadalombiztosítással kapcsolatos orvosi gyakorlatban előrenyomtatott vényszöveget általában nem szabad használni.

(2) A vényűrlap fejrovatát nem orvos dolgozó is kitöltheti. A gyógyszer rendelésére vonatkozó szöveget azonban az orvos sajátkezűleg köteles a vényűrlapon feltüntetni.

16. §

(1) A vényen az adagszámot, darabszámot minden esetben betűvel és római számmal is ki kell írni. [Originalis csomagoknál pl. „Phiol. orig. No. unam (I)", magisztrális készítményeknél pl. „dent. tal. dos. aequ. No. decem (X)".]

(2) A két kereszttel megjelölt, belső használatra szánt gyógyszerek rendelése esetében az orvos köteles a vényűrlapon az adagszámon és a darabszámon felül a keresztes szer mennyiségét is betűvel és számmal kiírni.

(3) Ha az orvos egy vagy két kereszttel vagy egy üres kereszttel megjelölt gyógyszert a Gyógyszerkönyvben megállapított legnagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál nagyobb mennyiségben kíván rendelni, köteles a rendelt mennyiséget aláírásával vagy kézjegyével külön is megerősíteni. Az egy és két kereszttel, valamint az egy üres kereszttel megjelölt, belső használatra szánt gyógyszerek rendelésekor az orvos köteles továbbá a

* VI. Magyar Gyógyszerkönyv.

vényen a gyógyszer használati módját tüzetesen megjelölni. Ilyen esetben használati utasításul „Rendelet szerint" vagy „Utasítás szerint" megjelöléseket használni nem szabad.

(4) Egy kereszttel, két kereszttel, vagy egy üres kereszttel megjelölt gyógyszernek csecsemő vagy 14. életévét be nem töltött gyermek részére történő rendelése esetében az orvos köteles a vényen a beteg életkorát feltüntetni. A gyógyszereknek 65 évnél idősebb betegek részére történő rendelése esetében is célszerű a beteg életkorának feltüntetése.

(5) Két kereszttel megjelölt, belső használatra szánt gyógyszert por alakban, osztatlanul rendelni nem szabad. Ha a két kereszttel megjelölt gyógyszer külső használatra szolgál, a rendelt szer tartályát „Méreg", „Halálfej" és „Külsőleg" jelzéssel kell megjelöltetni.

17. §

(1) Az orvos köteles a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített vényűrlapokat és hivatalos orvosi bélyegzőjét gondosan megőrizni és ügyelni arra, hogy azokkal senki visszaélést ne követhessen el.

(2) A hivatalos orvosi bélyegző elvesztése (eltulajdonítása) esetében az orvos köteles ezt a körülményt felettes hatóságának haladéktalanul jelenteni. Az elveszett orvosi bélyegzőt érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítést az Egészségügyi Közlönyben közzé kell tenni.

(3) Az az orvos, akinek vényírási joga bármely okból megszűnt, köteles hivatalos orvosi bélyegzőjét felettes hatóságának visszaszolgáltatni.

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatása

18. §

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendelt gyógyszerek kiszolgáltatását külön jogszabály szabályozza. [145/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítás 24. §—27. §-ai.]

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére írt vények ellenőrzése

19. §

(1) Az SZTK-nál biztosítottak és igényjogosult családtagjaik részére írt vények rendszeres ellenőrzését az SZTK vényellenőrző orvosai (a továbbiakban: vényellenőrző orvos) végzik.

(2) A vényellenőrző orvosok a vényeket a jelen utasításnak a gyógyszerrendelésre vonatkozó rendelkezései megtartása szempontjából ellenőrzik.

(3) Ha a vényellenőrző orvos a vények ellenőrzése során a jelen utasítás végrehajtása tekintetében hiányosságot vagy szabálytalanságot észlel, az SZTK illetékes helyi szerve útján értesíti erről a felülvizsgálatilag illetékes rendelőintézet igazgatóját (kórházigazgató rendelőintézeti helyettesét).

(4) A rendelőintézeti igazgató köteles a kifogásolt gyógyszerrendelést megvizsgálni, illetőleg megvizsgáltatni, adott esetben a vényt kiállító orvost megfelelően kioktatni és a helyes eljárás követésére utasítani. Ismételt vagy súlyos szabálytalanság elkövetése esetében előterjesztést tesz a fegyelmi eljárás megindítására. A fegyelmi eljárás lefolytatására az orvost alkalmazó szerv illetékes.

(5) A bejelentett szabálytalanság kivizsgálásának eredményéről és a tett intézkedésről értesíteni kell az SZTK illetékes helyi szervét.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

20. §

(1) Az alábbi (2)—(5) bekezdésekben felsorolt gyógyászati segédeszközök — az említett bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint — a gyógyszerekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően vényűrlapon is rendelhetők.

(2) Csak szakrendelések rendelhetik az alábbi gyógyászati segédeszközöket:

duodenum-szonda,
fülfecskendő,
gyomorcső,
kateter,
katéterdugó,

méhgyűrű,
orrtölcsér,
szemkötő.

(3) Szakrendelések, körzeti orvosok és üzemi orvosok rendelhetik a következő gyógyászati segédeszközöket:
üvegből készült belégző készülék asthmás beteg részére,
heretartó (1—9 számig),
kankófecskendő,
mellszívó üvegharang,
szemcseppentő,
szemecset,
szemkenőcshöz üvegpálca.

(4) Az ideál-pólya gyógyászati segédeszközt olyan helységekben lakók részére, ahol szakrendelés működik, csak a szakrendelés, egyéb helyeken lakók részére a körzeti orvos is rendelheti.

(5) Insulin-kezelésre szoruló cukorbeteg, valamint asthma bronchiale megbetegedésben szenvedő igényjogosult részére — amennyiben a befecskendezést a beteg maga végzi — Record-fecskendő, fecskendőtartó, parafadugós üveghenger és injekciós tű rendelhető. Az említett gyógyászati segédeszközöket az insulinkezelésre szoruló cukorbeteg részére az insulin-ellátást engedélyező és nyilvántartó orvos, az asthma bronchiale megbetegedésben szenvedő igényjogosult részére pedig az igényjogosult lakóhelye szerint illetékes belgyógyászati szakrendelés rendelheti.

(6) A jelen § (2)—(5) bekezdéseiben felsorolt gyógyászati segédeszközöket előzetes jogosítás nélkül közforgalmú gyógyszertárak is kiszolgáltathatják.

21. §

A honvédszemélyek és igényjogosult családtagjaik (hozzátartozóik) részére az állami egészségügyi szolgálat orvosai részéről történő gyógyszerrendelésre a 32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései az az irányadók (lásd 539. oldalon).

22. §

A jelen utasítás az 1958. évi október hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerrendelés és gyógyszerkiszolgáltatás szabályozásáról szóló 145/1955. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítás 1—23. §-ai és 28—33. §-ai az Insulin

és az Androfort elnevezésű gyógyszerkészítményeknek térítésmentes kiszolgáltatásáról szóló 8300—14/1953. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítás, a Redergam elnevezésű gyógyszerkülönlegességnek a társadalombiztosítási szervek terhére történő rendeléséről szóló 8300—19/1953. (Eü. K. 23.) Eü. M. számú utasítás és az ennek módosítása tárgyában kiadott 161/1956. (Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasítás, a penicillintartalmú gyógyszerkészítmények rendelésének, kiszolgáltatásának és alkalmazásának szabályozásáról szóló 8360—11 (1954. Eü. K. 13.) Eü. M. számú utasítás, a Threomycin rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozásáról szóló 8360—17/1954. (Eü. K. 24.) Eü. M. számú utasítás, a Rheopyrin és a Rausedyl elnevezésű gyógyszerkülönlegességeknek a társadalombiztosítás terhére történő rendeléséről szóló 32/1957. (Eü. K. 15.) Eü. M. számú utasítás, valamint a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárak működésének szabályozásáról szóló 8360—2/1954. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás 12. §-ának a jelen utasítással ellentétes rendelkezése hatályát veszti.

MELLÉKLET
A 40/1958. (EÜ. K. 19.) EÜ. M. SZÁMÚ UTASÍTÁSHOZ

Az orvosi gyógykezelésre és gyógyszerellátásra való jogosultság igazolására szolgáló okmányok

I. *Igényjogosultság*

1. a) A munkaviszonyban álló és munkaviszonyuk alapján betegség esetére biztosított dolgozók (ipari, kereskedelmi, szellemi dolgozók, házfelügyelők, háztartási alkalmazottak stb.), továbbá a szakmunkás (ipari, műszaki, kereskedelmi, mezőgazdasági) tanulók, az állami mezőgazdasági üzemek dolgozói	az állandó üzemi (hivatali) igazolványukkal, ennek hiányában a munkáltató által kiállított, időközönként érvényesített „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják. Azok, akik MÁV arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, az igényjogosultságukat ezzel is igazolhatják.
b) A kisipari termelőszövetkezetek és a háziipari termelőszövetkezetek közös műhelyben dolgozó tagjai az igényjogosultságukat	a szövetkezet által kiállított „Szövetkezeti tagsági igazolvány"-nyal vagy „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
c) A háziipari termelőszövetkezetek, valamint a kisipari termelőszövetkezetek bedolgozó tagjai az igényjogosultságukat	a szövetkezet által kiállított „Szövetkezeti tagsági igazolvány"-nyal vagy „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
d) Az *a), b), c)* pontokban említett dolgozók és szövetkezeti tagok családtagjai az igényjogosultságukat	a munkáltató, illetőleg a szövetkezet által kiállított családtagi „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
2. A mezőgazdasági biztosítottak, nevezetesen: a mezőgazdasági termelőszövetkezettel vagy egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezettel (mezőgazdasági szakszövetkezettel, mezőgazdasági társulással), legeltetési bizottsággal, valamint ezekkel egy tekintet alá eső munkáltatókkal munkaviszonyban álló, azok a szakképesítéssel nem rendelkező dolgozók, akik a mezőgazdálkodás és azzal rokon termelési ágakban dolgoznak, továbbá a magánmunkáltatóval munkaviszonyban álló és a mezőgazdálkodás vagy ezzel rokon termelési ágakban foglalkoztatott dolgozók és az említett dolgozók családtagjai az igényjogosultságukat	a társadalombiztosítás illetékes ügyviteli szerve (tanács végrehajtó bizottsága) által kiállított „Mezőgazdasági biztosítási igazolvány"-nyal és Bélyeglappal igazolják.
3. A táppénzes állományban levő dolgozók az igényjogosultságukat	„Betegségi Igazolvány"-nyal (táppénzes könyvecskével) igazolják.
4. A betegség esetére biztosított tanulók (az általános iskolák és középfokú iskolák állami gyermekotthonokban, illetőleg diákotthonokban elhelyezett bennlakó tanulói, az állami ápolónőképző, gyermekgondozónőképző, szülésznőképző iskolák és az állami védőnőképző intézet nö-	a diákotthon, illetőleg az iskola által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.

vendékei, az egyetemi és főiskolai hallgatók stb.) az igényjogosultságukat	
5. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, a képzőművészeti és az iparművészeti alkotó közösségek, valamint az ügyvédi, a földmérő munkaközösségek tagjai és családtagjaik az igényjogosultságukat	az Alap, alkotóközösség, illetőleg munkaközösség által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
6. A betegség esetére biztosított lelkészek és egyházi személyek, valamint családtagjaik	az egyházi elöljáró által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják az igényjogosultságukat.
7. a) A kandidátusképzésben részesülő személy (aspiráns) igényjogosultságát	aspiránsi igazolvánnyal, illetőleg „Munkáltatói igazolvány"-nyal igazolja.
b) A kandidátusképzésben részesülő személy (aspiráns) családtagjai igényjogosultságuk igazolására	„Biztosítási Igazolvány" szükséges. Az említett igazolványokat a Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága, illetőleg az a munkáltató állítja ki és érvényesíti, ahova az aspiránst képzésre beosztották.
8. A nemzeti gondozásban részesülő személyek és családtagjaik az igényjogosultságukat	a gondozási díjat számfejtő hivatal által kiállított „Nemzeti gondozási igazolvány"-nyal igazolják.

9. A nyugellátásban részesülő személyek és családtagjaik az igényjogosultságukat	a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított „Nyugdíjas igazolvány"-nyal igazolják.
10. A baleseti járadékban részesülő személyek az üzemi balesettel (foglalkozási betegséggel) kapcsolatban az igényjogosultságukat	a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított „Baleseti járadékos igazolvány"-nyal igazolják.
11. Az önkéntesen biztosítottak, valamint családtagjaik igényjogosultságukat	„Önkéntes betegségi biztosítási igazolvány"-nyal igazolják.
12. Az önkéntes továbbfizetéssel biztosítottak és családtagjaik az igényjogosultságukat	a társadalombiztosítás illetékes ügyviteli szerve által kiállított igazolvánnyal és a legutóbb esedékes járulék befizetését igazoló csekkszelvénnyel igazolják.
13. a) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai és családtagjaik igényjogosultságukat	mezőgazdasági termelőszövetkezeti „Tagkönyv"-vel vagy a termelőszövetkezet által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal, vagy „Munkáltatói, szövetkezeti (kisipari, háziipari, mezőgazdasági) igazolvány"-nyal,
b) az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek (mezőgazdasági szakszövetkezetek, mezőgazdasági társulások) csoportos önkéntes biztosításban résztvevő tagjai és családtagjaik igényjogosultságukat	a szövetkezet által kiállított „Betéglap"-pal igazolják.

c) Az egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek egyéni önkéntes biztosításban résztvevő tagjai és ezek családtagjai igényjogosultságukat	„Önkéntes betegségi biztosítási igazolvány"-nyal igazolják.
14. Az állami mezőgazdasági üzemek időszaki dolgozói és családtagjaik december 1. és a következő év március 31-e közötti időben igényjosogultságukat	utolsó munkáltatójuk, illetőleg a társadalombiztosítás ügyviteli szerve által kiállított és érvényességi záradékkal ellátott „Biztosítási igazolvány"-nyal igazolják.
15. A munkaviszony megszűnése után gyermekgondozási segélyben részesülő egyedül álló anya és családtagjai a segély folyósításának tartama alatt igényjogosultságukat	az utolsó munkáltató által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
16. A csökkent munkaképességük alapján átmeneti segélyben részesülő személyek és családtagjaik igényjogosultságukat	a segélyt megállapító szerv által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal és a legutóbb esedékes segély kifizetését tanúsító szelvény együttes felmutatásával igazolják.
17. a) A Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti testületeinek (rendőrség, határőrség, hivatásos tűzoltóság, hivatásos légoltalmi szervek, büntetésvégrehajtási szervek stb.), valamint a vámőrségnek és a pénzügyőrségnek hivatásos és továbbszolgáló állományú tagjai és polgári alkalmazottai az igényjogosultságukat	hivatali (szolgálati) igazolványukkal, vagy „Biztosítási Igazolvány"-nyal, vagy MÁV arcképes igazolvánnyal igazolják.

b) Az *a)* pontban említett személyek családtagjai az igényjogosultságukat.	„Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
18. a) „Egészségügyi igényjogosultsági lap"-pal ellátott — honvédszemélyek, — honvédszemélyek családtagjai, — volt honvédszemélyek családtagjai igényjogosultságukat	nevükre kiállított „Egészségügyi igényjogosultsági lap"-pal igazolják.
b) A katonai iskolai növendékek (hallgatók), a sortiszthelyettesek, sortisztesek és sorkatonák tényleges szolgálatuk tartama alatt, a tartalékos állományú tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek, a gyakorlat, kiképzés stb. tartama alatt igényjogosultságukat	katonai igazolványukkal és a 32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. M. számú utasítás 2. § 1. pontjában említett körülmények valamelyikének fennállását igazoló irattal (pl. szabadságolási igazolvány) igazolják.
c) A néphadseregben tényleges szolgálatot teljesítő sortiszthelyettesek és sorkatonák, valamint a gyakorlatra, kiképzésre behívott tartalékos állományú tisztek, tiszthelyettesek és honvédek családtagjai igényjogosultságukat	a munkáltató által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják. Ha a honvéd személy munkaviszonya megszűnt, az illetékes katonai parancsnokság igazolása is szükséges.
d) A *c)* pontban említett honvédszemélyek és családtagjaik a katonai szolgálat megszűnése után igényjogosultságukat	a munkáltató által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal és a leszerelési igazolvánnyal igazolják.

19. a) A Belügyminisztérium fegyveres testületeinek sorozott állományú tagjai (sortiszthelyettesek, sorkatonák) az igényjogosultságukat	az egészségügyi könyvecskével igazolják, amelynek borító lapján „Sorozott állományú, térítésmentes vényre jogosult" szavak vannak feltüntetve.
b) Az *a)* pontban említett személyek családtagjai az igényjogosultságukat	a munkáltató által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják. Ha az említett személy munkaviszonya megszűnt, a parancsnokság igazolása is szükséges.
20. a) A néphadsereg hivatásos és továbbszolgáló állományából, továbbá a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti testületeinek, valamint a vámőrségnek és a pénzügyőrségnek hivatásos és továbbszolgáló állományából kivált (leszerelt, elbocsátott) személyek igényjogosultságukat	a honvédség (testület stb.) által kiállított „Társadalombiztosítási igazolvány"-nyal igazolják.
b) Az *a)* pontban említett személyek családtagjai az igényjogosultságukat	a társadalombiztosítás illetékes ügyviteli szerve által kiállított „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.
II. VSZ igényjogosultak	
A munkaviszonyban álló vasutas dolgozók, úgyszintén a nyugellátásban részesülő volt vasutas dolgozók, valamint az említett személyek családtagjai az igényjogosultságukat	„Társadalombiztosítási tagsági igazolvány"-nyal igazolják.

III. Külföldi állampolgárok	
Egyes államok átmenetileg Magyarországon tartózkodó polgárai — hatályban levő szociálpolitikai egyezmények értelmében — heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén a biztosítottakra érvényes szabályok szerint részesülhetnek gyógyszerellátásban.	Bolgár, csehszlovák, jugoszláv, lengyel, NDK, román és szovjet állampolgárok útiokmányokkal (útlevél, határátlépési igazolvány) igazolják jogosultságukat.
Az osztrák hajózási vállalatok magyar Dunaszakaszon hajózó személyzete és a velük hajózó családtagok az igényjogosultságukat	magyar—német nyelvű (rózsaszínű) „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolják.

Az egészségügyi miniszter 37/1962. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítása a társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerrendelést szabályozó 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás kiegészítése, valamint a gyógyszerrendelésre jogosult orvosok bélyegzőhasználata tárgyában

(Csak a gyógyszerrendelésre jogosult orvosok körének kiterjesztésére vonatkozó rész)

A 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás hatálybalépése óta szükségessé vált a társadalombiztosítás terhére gyógyszerrendelésre jogosult orvosok körének kiterjesztése.

Ezért a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, a belügyminiszterrel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával és a Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító Intézettel egyetértésben a következőket rendelem:

I.

A társadalombiztosítás terhére gyógyszerrendelésre jogosult orvosok körének kiterjesztése.

A 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás 1. § (1) bekezdése 1. pontjában felsoroltakon felül a társadalombiztosítás terhére gyógyszerrendelésre jogosultak:

a) a fővárosi vezető főorvos, a megyei főorvosok, a megyei jogú városi főorvosok és a fővárosi kerületi főorvosok,

b) a MÁV egészségügyi szolgálat vezető főorvosa, főorvosai, felülvizsgáló főorvosai és a MÁV kerületi orvosai,

c) a főiskolák és egyetemek kollégiumokban elhelyezett bentlakó hallgatóit ellátó internátusi orvosok, a MÁV internátusi és gyógyházi orvosok,

d) a főfoglalkozású iskolaorvosok,

e) a száznál több dolgozót foglalkoztató fekvőbeteggyógyintézet igazgatója által intézetenként (klinikánként) kijelölt egy-egy orvos.

f) A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium I. Vasúti főosztálya által a vasutasszakszervezet előzetes hozzájárulásával vényírási joggal felruházott orvos.

A *c)* és *d)* pontokban megnevezett orvosok a társadalombiztosítás terhére csak az általuk ellátott gyermekek, illetőleg hallgatók részére rendelhetnek gyógyszert, az intézet dolgozói részére csak elsősegély nyújtása esetében.

Az *e)* pontban említett orvos csak a gyógyintézet dolgozói és bentlakó igényjogosult családtagjaik részére rendelhet gyógyszert a társadalombiztosítás terhére.

Az egészségügyi miniszter 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítása a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő gyógyszerrendelésre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról

Egyes gyógyszereknek a társadalombiztosítás terhére történő rendelése eddig előzetes főorvosi (rendelőintézeti igazgató-főorvosi) engedélyhez volt kötve. Ennek célja az volt, hogy a főorvosok a betegek gyógyszeres kezelését végző orvosok ez irányú munkáját szakmai szempontból ellenőrizzék és segítsék. Idők folyamán — részben az orvosok szakmai fejlődésének eredményeként — ez az előzetes engedélyezés mindinkább formálissá vált és ez idő szerint már nem felel meg a célkitűzésének. Szükségessé vált olyan új rendszer bevezetése, amely a beteg részére egyszerűbbé teszi a gyógyuláshoz feltétlenül szükséges gyógyszer beszerzését, ugyanakkor kihangsúlyozza a gyógyszeres kezelést végző orvos egyéni felelősségét. A szóban forgó gyógyszerek rendelésének szükségessége szempontjából a 8/1959. (XII. 31.) Eü. M. számú rendelet 8. §-a alapján elrendelt dokumentáció biztosítja az orvosok ez irányú tevékenysége utólagos ellenőrzésének lehetőségét.

Ezért a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem.

1. §

A társadalombiztosítás terhére előzetes főorvosi (rendelőintézeti igazgató-főorvosi) engedéllyel rendelhető gyógyszerek rendeléséhez a jelen utasítás hatálybalépése napjától kezdődően főorvosi (rendelőintézeti igazgató-főorvosi) engedély nem szükséges.

2. §

(1) A jelen utasítás 1. számú mellékletében felsorolt gyógyszerek rendelése esetén a vényt két példányban kell kiállítani. A másolati példányra rá kell vezetni a „Másolat"-jelzést. Az orvos a másolati példányt is ellátja aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával.

(2) Másolati példány nélkül a gyógyszertár — életveszély esetét kivéve — a gyógyszert nem szolgáltathatja ki.

(3) *A jelen utasítás 1. számú mellékletének szükség szerinti módosítását és kiegészítését az Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi Közlönyben közleményként teszi közzé.*

3. §

(1) A gyógyszertár az összegyűjtött vénymásolatokat (SZTK, KSZKBI, VSZTO igényjogosultak vénymásolatait) havonta kétszer, éspedig a hónap 5., illetőleg 20. napjáig a gyógyszertár helye szerint területileg illetékes SZTK Megyei Alközponthoz beküldi.

(2) A gyógyszerrendelésnek a beküldött vénymásolatok alapján történő ellenőrzése a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás 19. §-ában foglaltaknak megfelelően történik.

4. §

(1) Ez az utasítás 1962. évi szeptember hó 1. napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályukat vesztik az egyes utasításoknak (2. sz. melléklet) azok a rendelkezései, amelyek az egyes gyógyszerek rendelését előzetes főorvosi engedélyhez kötötték. Valamennyi gyógyszerrendelésre vonatkozó utasítás minden egyéb rendelkezése továbbra is érvényben marad.

1. sz. melléklet a 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasításhoz

*Androfort inj.
Centedrin tabl.,
Depersolon inj.,
*Dihydrostreptomycin inj.,
Exacthin inj.,
Gracidin tabl.,
Heparin inj.,
Hydrocortison mikrokristály inj.,
Miscleron

Nevigramon tabl.
**Pondex tabl.*,
Prednisolon tabl.,
Quinoseptyl tabl.,
Retandrol olajos inj., 250 mg,
Rheosolon tabl.,
Streptomycin inj.,
*Streptoplex inj.,
Syncumar tabl.,
Tetran inj.,
Tetranetta inj.,
Tetran B. drazsé,
Tetrinfan pulvis,
Trifavit inj.,
Vitamin B_{12} inj., 300 gamma,
Vitamin B_{12} inj., 1000 gamma.

A 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasítás mellékleteiben felsorolt külföldi gyógyszerkülönlegességek. (A mellékletben „O" jelzéssel ellátott készítmények továbbra is csak fekvőbeteg-gyógyintézet vagy szakrendelés javaslata alapján rendelhetők.)

2. sz. melléklet a 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasításhoz

A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő gyógyszerrendelés szabályozásáról szóló 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás 5. §-ának (4) bekezdése és 13. §-a.

A Glutarec elnevezésű gyógyszerkülönlegességnek a társadalombiztosítás terhére rendeléséről és kiszolgáltatásáról szóló 117/1956. (Eü. K. 3.) Eü. M. számú utasítás.

Egyes gyógyszerkülönlegességek rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozásáról szóló 157/1956. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítás (Streptomycin).

Az insulin rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozásáról szóló 11/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás.

Az oralis antidiabeticumok rendelésének és kiszolgáltatásának szabályozásáról szóló 12/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás.

* Törzskönyvből törölve.

A Szabványos Vényminták IV. Gyűjteményének (Formulae Normales IV.) életbeléptetéséről szóló 21/1959. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítás 1. §-ának (2) bekezdése.

A külföldről importált gyógyszerkülönlegességek rendeléséről és kiszolgáltatásáról szóló 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás.

VASUTASOK ORVOSI ELLÁTÁSA

Az egészségügyi miniszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter 8/1961. (Eü. K. 4.) Eü. M. számú együttes utasítása a Vasutasok Szakszervezeténél biztosítottaknak és igényjogosult családtagjaiknak orvosi ellátásáról

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendeljük:

Az igényjogosultak köre

1. §

(1) A jelen utasítás alkalmazása szempontjából a Vasutasok Szakszervezeténél (a továbbiakban: VSZ) biztosítottaknak (a továbbiakban: vasutas) és igényjogosult családtagjaiknak azokat a személyeket kell tekinteni, akik a díjtalan állami orvosi ellátásra való jogosultságukat a VSZ által kiállított állandó vagy ideiglenes — a tárgyévre vagy meghatározott időre érvényesített — „Társadalombiztosítási Tagsági Igazolvány"-nyal igazolják.

(2) A VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult családtagjaik — ideértve a félszázalékos önkéntes támogatási alap terhére elismert családtagokat is — a szolgáltatások igénybevételekor a „Társadalombiztosítási Tagsági Igazolvány" felmutatásán felül személyazonosságukat személyi igazolvánnyal vagy MÁV arcképes igazolvánnyal, illetőleg MÁV arcképes igazoló jeggyel igazolják.

Kezelőorvosi ellátás

2. §

(1) A VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagjaik általános kezelőorvosi (gyermekorvosi) ellátását az állami egészségügyi szolgálat körzeti orvosai, körzeti gyermekorvosai (a továbbiakban: körzeti orvos) végzik. A kezelőorvosi ellátásra a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnál (a továbbiakban: SZTK) biztosítottakra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(2) A szolgálatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vasutas dolgozók kezelőorvosi ellátását az átmeneti szolgálati (tartózkodási) helyük szerint illetékes körzeti orvos végzi.

(3) A körzeti orvos a VSZ biztosított igényjogosult csecsemője részére idegen anyától származó anyatejet rendelhet, ha a működési területén az állami egészségügyi szolgálatnak gyermekgyógyász szakorvosa vagy tanácsadó orvosa nincs. Az anyatejet az „Orvosi javaslat anyatejre" elnevezésű nyomtatványűrlapon kell rendelni. Az űrlapra rá kell írni a „VSZ" betűket.

(4) A körzeti orvos a VSZ biztosítottat vagy igényjogosult családtagját — ha szakorvosi vizsgálatát vagy szakorvosi kezelését tartja szükségesnek — az Orvosi beutalás — javaslat — igazolás (rakt. sz. A. 3510—64) (szabályszerűen kitöltött) nyomtatványűrlappal a 3. §-ban foglalt rendelkezések szerint illetékes szakorvosi rendelőintézetbe utalhatja. Az űrlapra rá kell írni a „VSZ" betűket.

(5) Szaktanácskozás szükségessége esetében a körzeti orvos az SZTK-nál biztosítottakra vonatkozó rendelkezések szerint az állami egészségügyi szolgálat területileg illetékes kórházának (rendelőintézetének) vezetőjétől kéri szaktanácsadó orvos kiküldését. Ha helyben MÁV kórház vagy szakorvosi rendelőintézet is működik, a MÁV kórház (rendelőintézet) vezetőjétől kell a szaktanácsadó orvos kiküldését kérni. A szaktanácskozás díja a szaktanácsadó orvost kiküldő kórház (rendelőintézet) költségvetését terheli.

Szakorvosi ellátás

(1) A VSZ-nél biztosítottak — ideértve a nyugdíjasokat is —, valamint ezek igényjogosult családtagjai szakorvosi ellátását,

a) ha MÁV szakorvosi rendelőintézet működési területén laknak, a MÁV rendelőintézet székhelyén kívül eső olyan helységben, amely területileg MÁV rendelőintézethez tartozik és helyben az állami egészségügyi szolgálatnak van szakorvosi rendelőintézete (szakrendelése), a vasutas biztosított és igényjogosult családtagja a helyben levő rendelőintézetben (szakrendelésen) is részesülhet szakorvosi ellátásban. (Pl.: Mezőtúr, Dombóvár stb.),

b) ha MÁV szakorvosi rendelőintézet működési területén kívül laknak, az állami egészségügyi szolgálatnak a beteg lakóhelye szerint illetékes rendelőintézete végzi.

(2) Ha a körzeti orvos rendelőintézetben elhelyezett közületi rendelőben rendel, a nála jelentkező vasutas biztosított és igényjogosult családtagja ebben a rendelőintézetben is részesülhet szakorvosi ellátásban. A tényleges szolgálatot teljesítő MÁV dolgozó szolgálatképességének, valamint alkalmasságának megállapításához szükséges szakorvosi vizsgálatok elvégzése az illetékes MÁV rendelőintézet hatáskörébe tartozik,

a) ha a dolgozó MÁV rendelőintézet működési területén lakik, vagy,

b) akinek MÁV ellenőrző orvosa MÁV rendelőintézet működési területén székel.

(3) A szolgálatuk miatt lakóhelyüktől távollevő vasutas dolgozók az átmeneti szolgálati (tartózkodási) helyük szerint illetékes rendelőintézetben (szakrendelésen) részesülhetnek szakorvosi ellátásban.

(4) A MÁV rendelőintézet székhelyén kívül lakó csecsemők és gyermekek az állami egészségügyi szolgálat legközelebbi egészségügyi intézményében (rendelőintézet, csecsemőgondozó stb.) is szakorvosi ellátásban részesíthetők.

(5) Azokat a szakorvosi vizsgálatokat vagy kezeléseket — beleértve a fogpótlást kivéve minden fogorvosi ellátást is —, amelyeket a területileg illetékes MÁV szakorvosi rendelőintézet, illetőleg rendelőintézeten kívüli fogszakorvos megfelelő felszerelés hiányában vagy az illetékes szakorvos távolléte miatt elvégezni nem tud, a MÁV szakorvosi rendelőintézet működési területén is az állami egészségügyi szolgálat megfelelő szakrendelése végzi. Ezekre a szakorvosi vizsgálatokra, illetőleg kezelésekre a MÁV illetékes orvosa is adhat beutalást.

(6) A fogpótlási ellátást — tekintet nélkül a VSZ

biztosítottak munka-, illetőleg lakóhelyére — minden esetben a MÁV illetékes fogszakorvosa végzi.

(7) A VSZ-nél biztosítottak és igényjogosult családtagjaik gondozóintézeti (tbc-, bőr-, nemi-, idegbeteg, onkológiai) ellátását az állami egészségügyi szolgálatnak területileg illetékes gondozóintézetek, illetőleg a MÁV gondozóintézetek végzik.

(8) A MÁV szakorvosi rendelőintézetek felsorolását és működési területük meghatározását a jelen utasítás melléklete tartalmazza.

Fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalás

4. §

A VSZ biztosított és igényjogosult családtagjainak kórházba utalásáról életveszély vagy sürgős szükség esetén előzetes helybiztosítás után a körzeti orvos vagy a szakorvos gondoskodik. Minden egyéb esetben az illetékes körzeti orvos, illetőleg szakorvos az A 3510—64 rakt. számú nyomtatványűrlapon javaslatot tesz a VSZ biztosított és igényjogosult családtagjainak kórházba utalására és felhívja a biztosítottat, illetőleg igényjogosult családtagját, hogy a kórházi utalvány kiállítása céljából forduljon szolgálati, illetőleg nyilvántartó (tüzelőanyag-nyilvántartó) főnökségéhez. A VSZ biztosítottnak, illetőleg családtagjának különleges gyógyintézetbe (szanatórium, gyógyüdülő stb.) utalására az illetékes szakorvos (gondozóintézet) tesz javaslatot az előírt nyomtatványűrlapon. A beteg gyógyintézetbe utalásáról az igényjogosultságnak a dolgozó szolgálati (nyilvántartó) főnöksége által történő igazolása után a MÁV Egészségügyi Szolgálat gondoskodik.

A szolgálatképtelen vasutas dolgozókkal kapcsolatos eljárás

5. §

(1) A körzeti orvosok, valamint az állami egészségügyi szolgálatnak a 130/1955. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítás 1. §-ának 2. pontja értelmében táppénzes állománybavételre jogosult szakorvosai (a továbbiakban: szakorvos) vasutas dolgozót táppénzes állományba nem vehetnek.

(2) Ha a körzeti orvos, illetőleg szakorvos a vasutas dolgozót vizsgálata alapján szolgálatképtelennek tartja, az A 3510—64 rakt. számú nyomtatványűrlapon a kórisme feltüntetésével javaslatot tesz a dolgozónak táppénzes állománybavételére. A javaslatban olvashatóan fel kell tüntetni a dolgozó teljes nevét, lakcímét, szolgálati főnökségét, valamint a szolgálatképtelenséget okozó betegség megnevezését (kórismét). A javaslatban továbbá fel kell tüntetni, hogy a táppénzes állományba vételre javasolt dolgozó járó- vagy fekvőbeteg-e. Ha a dolgozó fekvőbeteg, egyben meg kell jelölni a járóképtelenséget okozó fontosabb betegségi tüneteket (pl. láz, vérzés, görcsök stb.) is. A javaslatot azzal a keltezéssel kell kiállítani, amely napon a beteg az orvosnál jelentkezett, illetőleg amely napon a körzeti orvost a fekvőbeteghez hívták. A javaslat kiállításával egyidejűleg a körzeti orvos, illetőleg a szakorvos a dolgozót a „Nyilvántartási napló a keresőképtelen biztosítottakról" elnevezésű naplóban (a továbbiakban táppénzes napló) nyilvántartásba veszi, annak feltüntetésével, hogy a dolgozó VSZ biztosított.

(3) A (2) bekezdés esetében a körzeti orvos, illetőleg a szakorvos a dolgozót figyelmezteti arra, hogy a táppénzes állományba vételre csak a MÁV ellenőrző orvos illetékes. Ezért a dolgozó az orvosi javaslatot 24 órán belül köteles személyesen elvinni, a fekvőbeteg pedig haladéktalanul köteles eljuttatni az illetékes MÁV ellenőrző orvoshoz. Az illetékes MÁV ellenőrző orvos székhelyéről és rendelési idejéről bármely MÁV szolgálati hely tájékoztatást nyújt a betegnek, illetőleg hozzátartozójának. Egyebekben a vasutas betegek orvosi ellátásáról ugyanúgy kell gondoskodni, mint az SZTK biztosított betegekről.

(4) A terhes vasutas dolgozónőnek terhességi állományba vételére javaslatot az illetékes szakorvos tesz. A javaslattal a dolgozó terhes nő a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint az illetékes MÁV ellenőrző orvosnál jelentkezik.

6. §

(1) A MÁV ellenőrző orvos által táppénzes állományba vett dolgozó „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés céljára" (21. sz. Eü. minta) című űrlapjára a körzeti orvos, illetőleg a szakorvos minden esetben rávezeti a vizsgálat vagy a kezelés időpontját. Ha járó-

képes beteg járóképtelenné, vagy a járóképtelen beteg járóképessé válik, ennek időpontját az említett „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés céljára" című űrlapjának megfelelő rovatába ugyancsak be kell írni. A „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés céljára" című űrlapot a szolgálatképtelenség ideje alatt a dolgozó őrzi.

(2) A „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés céljára" című űrlapon fel kell tüntetni, hogy a táppénzes állományba vett járóképes dolgozó mikor (hány naponként) köteles a körzeti orvosnál, illetőleg a szakorvosnál jelentkezni. A jelentkezés időpontjának megállapításánál figyelembe kell venni a dolgozó betegségét, állapotát, valamint esetleges egyéb — a keresőképesség elbírálását befolyásoló — körülményeket. A körzeti orvos (szakorvos) indokolt esetben módosíthatja az előírt jelentkezési időközöket.

(3) A körzeti orvos a táppénzes állományban levő fekvőbeteg részére járóképtelenségének tartama alatt félhavonként igazolást állít ki arról, hogy a dolgozó még fekvőbeteg. Az igazolást a körzeti orvos azzal a figyelmeztetéssel adja át a fekvőbetegnek, hogy azt a táppénzes utalvány kiállítása céljából haladéktalanul juttassa el az illetékes MÁV ellenőrző orvoshoz.

(4) A táppénzes állományban levő vasutas dolgozók szolgálatképességének megállapítására a MÁV ellenőrző orvos jogosult. A MÁV ellenőrző orvos a szolgálatképessé válás időpontját rávezeti a „Beteglap betegjelentés és ellenőrzés céljára" című űrlapra.

7. §

A körzeti orvosok és a szakorvosok kötelesek a vasúti egészségügyi szolgálat és a VSZ ellenőrző orvosainak a táppénzes állományban levő vasutas dolgozókról vezetett nyilvántartásba (táppénzes naplóba) betekintést engedni és a kezelésük alatt álló vasutas dolgozókról a szükséges felvilágosítást megadni.

Gyógyszer- és gyógyászati segédeszközök rendelése

8. §

(1) A gyógyszerrendelésre a 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései irányadók. A hivatkozott utasítás 11. §-ának (2) bekezdése értelmében a VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagjaik részére gyógyszert a VSZ által rendszeresített vényfüzetben kell rendelni.

(2) Ha az előírt vényűrlap elháríthatatlan okból nem áll rendelkezésre, az orvos a díjtalan orvosi ellátásra jogosult részére kivételesen előre nyomtatott vagy az orvos által maga készített magánvényűrlapon rendel gyógyszert. Ilyen esetben azonban a vényre feltűnően rá kell írni a „VSZ" betűket. Főorvosi engedélyhez kötött gyógyszer rendelése esetében a beteget figyelmeztetni kell arra, hogy az illetékes MÁV igazgatóság főorvosának vagy az ellenőrző orvosnak engedélyét közvetlenül vagy a szolgálati főnökség útján kérje.

(3) A gyógyászati segédeszközök rendelésére az SZTK-nál biztosítottakra vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a gyógyászati segédeszközt minden esetben a vényfüzetben kell rendelni.

Ambuláns gyógyfürdőkezelés

9. §

A körzeti orvos, illetőleg a szakorvos az ellátásába tartozó VSZ biztosítottak és igényjogosult családtagjaik ambuláns gyógyfürdőkezelésének szükségessége esetében az A 3510—64. rakt. számú nyomtatványűrlapon javaslatot tesz a VSZ biztosított szolgálati (nyilvántartó) főnökségének az ambuláns kezelésre jogosító fürdőjegyek kiszolgáltatására. Az űrlapra rá kell írni a „VSZ" betűket.

Mentőszállítás

10. §

A VSZ biztosítottnak, illetőleg igényjogosult családtagjainak mentőszállítására az SZTK-nál biztosítottakra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Díjmentes utazásra javaslattétel

11. §

Ha a VSZ biztosítottaknak, illetőleg igényjogosult családtagjaiknak szakorvosi rendelőintézetbe vagy gyógyintézetbe utalása esetén más helységbe kell utaz-

niok, a körzeti orvos az A 3510—64. rakt. számú nyomtatványűrlapon külön javaslatot tesz a beteg lakóhelye szerint illetékes MÁV állomásnak díjmentes utazásra jogosító utalvány kiállítására. Ha a beteg lakóhelyén csak kiadóőrség vagy állomáskezelőség van, a javaslatot az utazás irányába eső legközelebbi MÁV állomásnak kell címezni.

12. §

Jelen utasítás az 1961. évi február hó 1. napján lép hatályba.

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

Az egészségügyi miniszter 15/1958. Eü. M. számú utasítása a közgyógyellátásról szóló 1/1958. (III. 23.) Eü. M. számú rendelet végrehajtása tárgyában

A pénzügyminiszterrel, a művelődésügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

[Az Egészségügyi Közlöny az 1/1958. (III. 23.) Eü. M. számú rendeletet, valamint a jelen utasítást a könnyebb áttekinthetőség céljából egységes szerkezetben közli. A miniszteri rendeletet (a továbbiakban: „R") az álló, a végrehajtási utasítást (a továbbiakban: „U") pedig a dőlt betűkkel szedett szöveg tartalmazza.]

A közgyógyellátásra való jogosultság

R. 1. § (1) Közgyógyellátásra jogosultak:

a) az intézetekben elhelyezett vagy nevelőszülőkhöz kihelyezett állami gondozásba vett kiskorúak,

b) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek, valamint a velük együttélő házastársak (élettársuk) és kiskorú gyermekük,

c) a pénzellátásban részesülő hadigondozottak, valamint a velük együttélő házastársuk (élettársuk) és kiskorú gyermekük,

d) a hadirokkant-otthonok gondozottai.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek közgyógyellátására csak abban az esetben jogosultak, ha a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosultsággal nem rendelkeznek.

R. 2. § (1) Kérelmére a közgyógyellátásra való jogosultsága megállapítható annak a betegségi biztosítás szolgáltatásaira nem jogosult személynek, aki kora vagy egészségi állapota miatt keresőképtelen vagy nagymértékben csökkent munkaképességű, ha sem magának, sem a házastársának (élettársának) nincs olyan keresete vagy jövedelme, amelyből a gyógyellátás költségeit viselhetné. A kérelmező jogosultságának megállapítása esetében a közgyógyellátására való jogosultság kiterjed a vele együttélő házastársra (élettársára) és kiskorú gyermekére, továbbá az olyan kiskorú mostohagyermekére és unokájára is, akinek eltartására kötelezett. A jogosult kiskorú testvérére is kiterjeszthető a közgyógyellátás, ha a jogosult háztartásában él. Az óvodáskorú gyermekre a közgyógyellátásra való jogosultság abban az esetben is kiterjed, ha a gyermek intézetben (pl. gyógypedagógiai intézetben) van elhelyezve.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek a közgyógyellátásra való jogosultságát a kérelmező lakóhelye szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) állapítja meg a kérelmező szociális körülményeinek gondos mérlegelése alapján.

(3) A közgyógyellátásra való jogosultság meghatározott időre, de legfeljebb egy évi időtartamra állapítható meg. Ha az (1) bekezdésben megállapított feltételek a meghatározott időtartam lejárta után továbbra is fennállnak, újból kérni kell a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását.

(4) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem elutasítása esetében a kérelmező a határozat kézbesítése napját követő 15 napon belül a felettes tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztályához (csoportjához) fellebbezéssel élhet. A másodfokon hozott határozat ellen további fellebbezésnek nincs helye.

R. 3. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak jogosultságukat „Közgyógyellátásra jogosító igazolvány"-ukkal igazolják. Az igazolványt a közgyógyellátásra jogosult részére a lakóhelye szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó biztottságának egészségügyi osztálya (csoportja) állítja ki.

(2) Az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság feltételének megszüntetésekor vissza kell vonni.

U. I. § (1) A községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), illetőleg a városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) a közgyógyellátásra jogosító igazolványt az R. 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában említett kiskorúak részére az állami gondozásba vételt kimondó határozat alapján a gondozásbavétellel, b) pontjában említett személyek részére a rendszeres szociális segély megállapításával, c) pontjában említett hadigondozottak részére a pénzellátás megállapításával, d) pontjában említett hadirokkantak részére pedig a hadirokkant-otthonba történő beutalással egyidejűleg állítja ki.

(2) A R. hatálybalépésekor állami gondozásban levő kiskorúak részére a közgyógyellátásra jogosító igazolványt a kiskorúak ellátásáról gondoskodó intézet vezetője által kiállított jegyzék alapján, az intézet fekvése szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) állítja ki. A R. hatálybalépésekor rendszeres szociális segélyben részesülő személyek és pénzellátásban részesülő hadigondozottak részére a közgyógyellátásra jogosító igazolványt a lakóhelyük szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) állítja ki. Az R. hatálybalépésekor hadirokkant otthonban levő gondozottak részére a közgyógyellátásra jogosító igazolványt az otthon vezetője által kiállított jegyzék alapján, az otthon fekvése szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke (titkára), illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) állítja ki.

U. 2. § (1) A „Közgyógyellátásra jogosító igazolvány" elnevezésű nyomtatványűrlap Budapesten a Nyomtatványellátó Vállalat készpénzeladási boltjában, vidéken pedig a megye székhelyén, a Kiskereskedelmi Vállalat nyomtatványszaküzletében szerezhető be.

(2) A közgyógyellátásra jogosító igazolványon fel kell tüntetni azokat a szolgáltatásokat (R. 4. és 5. §), amelyekre a közgyógyellátásra jogosult megbetegedése esetében az R. alapján az állam terhére igényt tarthat, továbbá fel kell sorolni azokat a családtagokat, akik az igazolványon feltüntetett szolgáltatásokra ugyancsak jogosultak és végül meg kell jelölni, hogy az igazolvány meddig érvényes. Az R. 1. §-ában említett személyek közgyógyellátásra jogosító igazolványán az igazolvány érvényességének időtartamát „visszavonásig érvényes" szavakkal kell megjelölni, az R. 2. §-a alapján közgyógyellátásra jogosultak igazolványán pedig fel kell tüntetni azt a naptári napot, ameddig az igazolvány érvényes. Ez utóbbi személyeknél az igazolvány érvényességét a kiállítás napjától számított legfeljebb egy évi időtartamra lehet megállapítani.

(3) A közgyógyellátásra jogosító igazolványt sorszámmal kell ellátni. Az igazolvány sorszáma megegyezik a jelen utasítás 4. §-a alapján vezetendő nyilvántartás sorszámával.

U. 3. § (1) A R. 1. §-ában említett személyektől az állami gondozottság, a rendszeres szociális segély, a pénzellátás, illetőleg a hadirokkant-otthoni ellátás megszüntetésével egyidejűleg a közgyógyellátásra jogosító igazolványt vissza kell vonni. Vissza kell vonni a közgyógyellátásra jogosító igazolványt abban az esetben is, ha az említett igazolvánnyal rendelkező személy a betegségi biztosítás szolgáltatására jogosulttá válik vagy szociális otthonban nyer elhelyezést.

(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megszűnése esetében az intézetben elhelyezett személyektől a közgyógyellátásra jogosító igazolványt az intézet vezetője vonja be és azt megküldi az igazolványt kiállító szervnek.

(3) A közgyógyellátásra jogosító igazolvány visszavonását a jelen utasítás 4. §-a alapján vezetett nyilvántartás „megjegyzés" rovatában fel kell tüntetni.

U. 4. § A községi tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a városi (fővárosi) kerületi tanácsok végrehajtó bizottságainak egészségügyi osztályai (csoportjai) kötelesek a közgyógyellátásra jogosultakról nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak

a következő rovatokat kell tartalmaznia: 1. a közgyógyellátásra jogosult neve, 2. születési éve és helye, 3. lakáscíme, 4. a közgyógyellátásra jogosító igazolvány kiállításának napja, 5. a közgyógyellátásra jogosító igazolvány mely napig érvényes, 6. a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításánál alapul vett adatok, 7. aláírás, 8. megjegyzések. A nyilvántartás 7. számú rovatában a községi tanács elnöke (titkára), illetőleg az egészségügyi osztály (csoport) szociálpolitikai csoportjának vezetője (szociálpolitikai előadója) a közgyógyellátásra való jogosultság fennállását aláírásával igazolja.

A közgyógyellátásra jogosultakat megillető szolgáltatások

R. 4. § (1) A közgyógyellátásra jogosultakat megbetegedésük esetén — a (2) bekezdésben és az 5. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével — a jelen rendeletben meghatározott keretekben, a következő természetbeni szolgáltatások illetik meg ingyenesen:

a) orvosi ellátás,
b) gyógyszer- és gyógyfürdőellátás,
c) gyógyászati segédeszköz,
d) kórházi ápolás.

(2) A pénzellátásban részesülő hadigondozottak részére a hadiszolgálat (háborús esemény) következtében beállott fogyatkozásukkal kapcsolatban szükséges gyógyászati segédeszközök kiszolgáltatására az 1933. évi VII. tv. és az ennek végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

R. 5. § (1) Az intézetekben elhelyezett vagy nevelőszülőkhöz kihelyezett, állami gondozásba vett kiskorúak, továbbá a hadirokkant-otthon gondozottai, valamint a pénzellátásában részesülő 75%-os és 100%-os hadirokkantak bármely betegség miatt, a többi pénzellátásában részesülő hadirokkant pedig a hadiszolgálat (háborús esemény) következtében beállott vagy azzal közvetlenül összefüggő betegség miatt ingyenes kórházi ápolásra jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett közgyógyellátásra jogosultak kórházi ápolása abban az esetben ingyenes, ha a kórházi betegellátás költségeiről szóló jogszabályok értelmében fizetésre kötelezhető hozzátartozóik (házastárs, nagykorú gyermek, szülő) nincsenek, vagy azok a kórházi ápolási költség megfizetésére képtelenek. Az ingyenes kórházi ápolásra való jogosultságot a közgyógyellátásra való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kell megállapítani.

Orvosi ellátás

R. 6. § (1) A közgyógyellátásra jogosult megbetegedése esetében az ingyenes orvosi ellátás keretében az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe:

a) a körzeti orvosi ellátást,
b) a kórházak (klinikák) járóbeteg-rendelésein a szakorvosi ellátást, a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosi ellátását,
c) az anya- és csecsemővédelmi tanácsadást, a gondozóintézeti és az iskola-egészségvédelmi ellátást.
d) a *szakorvosi rendelőintézetekben a szakorvosi ellátást.*

(2) Az (1) bekezdésben megállapított szolgáltatásokat a közgyógyellátásra jogosult a lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szerveknél veheti igénybe. Sürgős szükség esetében az orvosi ellátás más egészségügyi szervnél is igénybevehető.

(3) *Az (1) bekezdés d) pontja alapján igénybevehető szakorvosi rendelőintézetekben a rendelési időt a rendelőintézet vezetője állapítja meg úgy, hogy a közgyógyellátásra jogosultak szakorvosi ellátása a betegségi biztosításra jogosultak szakorvosi ellátását ne zavarja. A megállapított rendelési időt az intézet bejáratánál ki kell függeszteni.*

(4) A hadirokkant-otthonok gondozottainak orvosi gyógykezelését — ha van — a hadirokkant-otthon orvosa végzi. Szakorvosi (gondozóintézeti) ellátásukat az (1) bekezdés *b), c)* és *d)* pontjában említett szakorvosok (egészségügyi szervek) végzik.

Gyógyszer- és gyógyfürdőellátás

R. 7. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyszerellátás keretében az alábbi gyógyszerek, gyógytápszerek és kötözőszerek rendelhetők:

a) az érvényben levő Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett hivatalos gyógyszerek és kötözőszerek, azoknak

a hivatalos gyógyszereknek kivételével, amelyek mint törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek is forgalomban vannak (pl. Androfort stb.);

b) az Egészségügyi Minisztérium által kiadott Szabványos Vényminták Gyűjteményében (Formulae Normales-ben) felsorolt mintaszerűleg rendelhető gyógyszerek, valamint a 8360—6/1954. (Eü. K. 7.) Eü. M. számú utasításában és az azt módosító és kiegészítő számú utasításban és az azt módosító és kiegészítő jogszabályokban* meghatározott, törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek, szérumok és gyógytápszerek.

(2) Halasztást nem tűrő sürgős szükség esetében a közgyógyellátásra jogosult részére az (1) bekezdésben nem említett gyógyszer is rendelhető.**

(3) A közgyógyellátásra jogosultak az orvosi vényen rendelt gyógyszert bármely közforgalmú gyógyszertárban vagy kézigyógyszertárban beszerezhetik.

*U. 5. § (1) Az insulin rendelésére a 11/1958. (Eü. K. 5.)*** Eü. M. számú utasítás rendelkezései, a kábítószerek rendelésére pedig az 5/1957. (XII. 14.) Eü. M.**** számú rendelet és az annak végrehajtásáról szóló 2/1958. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései az irányadók.*

(2) Ha az orvos halasztást nem tűrő sürgős szükség esetében a közgyógyellátásra jogosult részére az R. 7. §-ának (1) bekezdésében nem említett gyógyszert rendel, köteles a vényen a kórismét és a rendelés indokolását feltüntetni.

U. 6. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére gyógyszer (gyógyszerkülönlegesség, szérum), gyógytápszer és kötözőszer (a továbbiakban: gyógyszer) rendelésére jogosultak:

a) körzeti orvosok,

b) kórházi (klinikai), rendelőintézeti járóbeteg-szakrendelések orvosai,

c) a Mozgó Szakorvosi Szolgálat szakorvosai,

d) az anya- és csecsemővédelmi intézetek orvosai, a terhesnő-védelmi és a gyermekvédelmi tanácsadók tanácsadó orvosai,

* Jelenleg a 28/1963. (Eü. K. 18., ill. 20.) Eü. M. számú utasítás hatályos.

** Ez a rendelkezés a 28/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasítással kapcsolatban is érvényes.

*** Helyette az 5/1957. (Eü. K. 2.) Eü. M. sz. utasítás érvényes.

**** Helyette a 29/1968. (Eü. K. 12.) Eü. M. sz. utasítás érvényes.

e) a gondozóintézetek szakorvosai,

f) az iskolaorvosok,

g) a hadirokkant-otthonok, az egészségügyi gyermekotthonok, a gyermekvédő otthonok, a csecsemő- és gyermekotthonok, a bölcsődék és napközi otthonok orvosai,

h) a tanácsok végrehajtó bizottságai egészségügyi osztályainak (csoportjainak) vezetői és a gyógyító-megelőző feladatokat ellátó orvosfőelőadói,

i) az állami egészségügyi szolgálat központi ellenőrző főorvosai.

(2) Sürgős szükség esetén az (1) bekezdésben nem említett, a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (a továbbiakban SZTK) terhére vényírási joggal rendelkező orvos is rendelhet a közgyógyellátásra jogosult részére gyógyszert.

U. 7. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére a gyógyszert az 1959. évi január hó 1. napjától kezdődően az erre a célra rendszeresített vényűrlapon kell rendelni. Az említett időpontig a gyógyszert az SZTK biztosítottak részére térítésmentesen kiszolgáltatható gyógyszerek rendelésére rendszeresített vényűrlapon kell rendelni. Ez utóbbi vényen fel kell tüntetni a „Közgyógyellátásra jogosító igazolvány" számát és a „Közgyógyellátás" szót vagy „KGyE" jelzést.

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére történő gyógyszerrendelésnél a jelen utasítás 6. §-ában említett orvosok közül az SZTK terhére vényírási joggal rendelkező az SZTK terhére írt vényeknél használt bélyegző lenyomatával, az SZTK terhére vényírási joggal nem rendelkező orvosok pedig a hivatali állásukra rendszeresített bélyegző lenyomatával látják el a vényt.

(3) A közgyógyellátásra jogosultak részére írt vényeket a gyógyszer kiszolgáltatása után az SZTK-vények ellenőrzésére hivatott orvosok ellenőrzik.

R. 8. § A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyfürdő-ellátás keretében járóbeteg-gyógyfürdőkezelés rendelhető.

U. 8. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére a járóbeteg-gyógyfürdőkezelést a szakorvosi ellátásukra illetékes kórházi (klinikai) járóbeteg-rendelés szakorvosai rendelik.

*(2) Gyógyfürdőkezelés szükségessége esetében a gyógyfürdőkezelés igénybevételére jogosító gyógyfürdő-jegyeket a gyógyfürdőkezelést rendelő szakorvos adja át a közgyógyellátásra jogosultnak.**

Gyógyászati segédeszköz

R. 9. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyászati segédeszköz-ellátás keretében — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott korlátozással — a betegség esetére biztosított dolgozók részére kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök rendelhetők.

(2) Villamos hallókészülék, gumiharisnya, bifokális és kontakt szemüveg, természet után készült műszem, műfog, műfogsor, fogkorona és foghíd, valamint kozmetikai jellegű gyógyászati segédeszköz közgyógyellátásra jogosult részére nem rendelhető és nem szolgáltatható ki.

(3) Közgyógyellátásra jogosult részére ortopéd cipő vagy tolókocsi kiszolgáltatását csak a fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya engedélyezheti a szakorvosi ellátásra illetékes kórház igazgatójának javaslata alapján. Az említett gyógyászati segédeszközök kiszolgáltatásának engedélyezése iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságához, illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályához (csoportjához) kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a szakorvosi ellátásra illetékes kórház igazgatója által aláírt — orvosi szakvéleménnyel és indokolással ellátott — orvosi vényt.

(4) Azonos gyógyászati segédeszköz közgyógyellátásra jogosultak részére ismételten csak akkor rendelhető, ha az orvos kétségtelenül megállapította, hogy a korábban kiszolgáltatott gyógyászati segédeszköz nem használható és kijavításra nem alkalmas.

(5) A gyógyászati segédeszközöket — a szemüveg és a közforgalmú gyógyszertárakban kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök kivételével — az orvosi vény alapján az SZTK illetékes helyi szerve szolgáltatja ki. A szemüveg közvetlenül a szaküzletben szerezhető be.

* Lásd: 34/1962. (Eü. K. 15.) Eü. M. sz. utasítást.

U. 9. § (1) Közgyógyellátásra jogosultak részére gyógyászati segédeszközt — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — csak a szakorvosi ellátásukra illetékes szakorvosok rendelhetnek. A kórházban (klinikán) bentfekvő közgyógyellátásra jogosult részére a szükséges gyógyászati segédeszközt az osztályvezető főorvos rendeli.

(2) A heretartó (1—9 számig), kankófecskendő, mellszívó-üvegharang, szemcseppentő, szemecset és szemkenőcshöz üvegpálca gyógyászati segédeszközöket, továbbá azokban a helységekben, ahol szakrendelés nem működik, az ideál-pólya gyógyászati segédeszközt körzeti orvos is rendelheti.

(3) Az insulin-kezelésre szoruló cukorbeteg, valamint az asthma bronchiale megbetegedésben szenvedő közgyógyellátásra jogosult részére — amennyiben a befecskendezést maga végzi — Record-fecskendő, fecskendőtartó, parafadugós üveghenger és injekcióstű rendelhető. Az említett gyógyászati segédeszközöket insulin-kezelésre szoruló cukorbeteg részére az insulin-ellátását engedélyező és nyilvántartó orvos, az asthma bronchiale megbetegedésben szenvedő közgyógyellátására jogosult részére pedig a lakóhelye szerint illetékes kórházi (klinikai), rendelőintézeti belgyógyászati szakrendelés rendeli.

U. 10. § (1) A gyógyászati segédeszközöket az 1959. évi január hó 1. napjától kezdődően a jelen utasítás 7. §-ának (1) bekezdésében említett vényűrlapon kell térítésmentesen rendelni. Az orvosi vényen fel kell tüntetni a rendelés szükségességét is indokoló kórismét.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított időpontig a gyógyászati segédeszközt az SZTK biztosítottak gyógyászati segédeszközzel való ellátására rendszeresített orvosi rendelvényen kell rendelni. Az orvosi rendelvényen fel kell tüntetni a „Közgyógyellátásra jogosító igazolvány" számát és a „Közgyógyellátás" szót vagy „KGyE" jelzést.

(3) A jelen utasítás 9. §-ának (2) és (3) bekezdésében említett gyógyászati segédeszközök, valamint a duodenum-szonda, a fülfecskendő, a gyomorcső, a katéter, a katéterdugó, a méhgyűrű, az orrtölcsér és a szemkötő gyógyászati segédeszközök a kijelölt, közforgalmú gyógyszertárakban is beszerezhetők.

U. 11. § (1) A végrehajtó bizottság, illetőleg egészségügyi osztály (csoport) az R. 9. §-ának (3) bekezdése alapján előterjesztett kérelmet az orvosi vénnyel és a javaslatával együtt felterjeszti a fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályához. Az egészségügyi osztály a javasolt gyógyászati segédeszköz engedélyezése esetében az engedélyt rávezeti az orvosi vényre és az orvosi vényt visszaküldi a felterjesztő végrehajtó bizottsághoz, illetőleg egészségügyi osztályhoz (csoporthoz), amely azt a kérelmezőnek kézbesíti.

(2) A fővárosi, megyei, illetőleg megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya ortopéd cipő vagy tolókocsi kiszolgáltatását csak kivételes méltánylást érdemlő esetben, a gyógyulás előmozdítása és a munkaképesség fokozása, illetőleg helyreállítása érdekében engedélyezheti.

Kórházi ápolás

R. *10.* § A közgyógyellátásra jogosultak az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó, valamint a tanácsok által fenntartott kórházakba és egyéb fekvőbetegeket ellátó gyógyintézetekbe (a továbbiakban: kórház) utalhatók.

U. 12. § (1) A közgyógyellátásra jogosultak kórházba utalására a jelen utasítás 6. §-ában említett orvosok jogosultak.

(2) A betegség esetére biztosítottaknak kórházba történő elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket (előzetes helybiztosítás, az ágynyilvántartószerv kötelező igénybevétele) a közgyógyellátásra jogosultak kórházba utalásánál is alkalmazni kell.

(3) A kórházba utalt közgyógyellátásra jogosult a helybiztosítás után a beutaló orvos által kiállított beutaló javaslattal jelentkezik a kijelölt kórházban. A beutaló javaslaton a beutaló orvos köteles feltüntetni a „Közgyógyellátásra jogosító igazolvány" számát és a „Közgyógyellátás" szót vagy „KGyE" jelzést.

A közgyógyellátás költségeinek viselése

R. *11.* § (1) A közgyógyellátásra jogosultak ingyenes orvosi ellátásáról az állami egészségügyi szolgálat keretében kell gondoskodni.

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére a jelen rendelet 7—9. §-ai alapján orvosi vényen rendelt gyógyszerek, gyógyfürdőjegyek és gyógyászati segédeszközök árát, valamint a gyógyászati segédeszközök javításának költségét az SZTK téríti meg.

(3) A jelen rendelet 5. §-a alapján ingyenes kórházi ápolásra jogosultak után felmerült kórházi ápolási költséget az állam viseli.

(4) Az ingyenes kórházi ápolásra jogosultak kórházi ápolásával kapcsolatban felmerült mentőszállítási költségeket az állam (Országos Mentőszolgálat) viseli. Az intézetben elhelyezett ingyenes kórházi ápolásra jogosultak kórházba utazási költségét az intézet, az intézetben el nem helyezett ingyenes kórházi ápolásra jogosultak kórházba utazási költségét pedig a lakóhelyük szerint illetékes községi, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottsága, a kórházból való hazautazás költségét a kórház viseli.

U. 13 § A közgyógyellátásra jogosultak részére kiszolgáltatott gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket az SZTK-biztosítottaknak kiszolgáltatott gyógyszerek elszámolására megállapított mintának megfelelő számlával — annak kiállítására irányadó rendelkezések szerint, de teljesen elkülönítetten — kell elszámolni.

Hatályba léptető rendelkezések

R. 12. § A jelen rendelet az 1958. évi április hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 999/1942. B. M. számú rendelet (Rendeletek Tára, 3010. oldal), az 520/1944. B. M. számú rendelet (Rendeletek Tára, 811. oldal) és a 188.200/1949. (VI. 4.) N. M. számú rendelet hatályát veszti.

U. 14. § A jelen utasítás az 1958. évi április hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 8360—16/1952. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti.

Az egészségügyi miniszter 28/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasítása a közgyógyellátás terhére rendelhető egyes gyógyszerféleségek tárgyában

A közgyógyellátás terhére rendelhető gyógyszerkülönlegességeket legutóbb a 29/1959. (Eü. K. 20.) Eü. M. számú utasítás határozta meg. Ennek értelmében csak azokat a gyógyszerkülönlegességeket lehetett rendelni, amelyek az utasítás mellékletében fel voltak sorolva. A közgyógyellátottak orvosi ellátásának további javítása érdekében bővíteni kívánom a rendelhető gyógyszerféleségeket, egyben lehetővé kívánom tenni az 1959. óta törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek rendelését is. Ezért a következőket rendelem:

1. §

(1) A közgyógyellátásra jogosultak részére az ingyenes gyógyszerellátás keretében — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — azokat a törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességeket, szerobakteriológiai készítményeket, gyógytápszereket, gyógyvizeket és kötözőszereket (a továbbiakban: gyógyszer) szabad rendelni, amelyek a társadalombiztosítás terhére is rendelhetők.

(2) A társadalombiztosítás terhére történő gyógyszerrendelés általános irányelveire vonatkozó rendelkezéseket, valamint az egyes gyógyszerek rendelésére vonatkozó különleges előírásokat (pl. szakorvosi rendelőintézet javaslata, orvosi vények két példányban történő kiállítása, kábítószerek rendelésére vonatkozó szabályok) a közgyógyellátás terhére történő rendelésnél is alkalmazni kell.

(3) A jelen utasítás mellékletében felsorolt gyógyszerkészítmények közgyógyellátás terhére nem rendelhetők.

2. §

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététele napján lép hatályba; egyidejűleg a 29/1959. (Eü. K. 20.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti.

MELLÉKLET

a 28/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasításhoz

Albroman tabl.
Alsol kenőcs
Anasthim inj.
Capsoderma kenőcs
Chlorocid-H kenőcs
Cholinchlorid oldat
Corhormon inj.
Erigon szirup
Gastropin inj.
Gerovit kapszula
Glutarec tabl.
Gracidin tabl.
Hévízi iszap
Hévízi rádiumos gyógyiszapkompressz
Hexetidin oldat
Hydrocortison kenőcs 2,5% (az 1%-os rendelhető)
Hyperol tabl.
Kofka tabl.
Lukullin drazsé
Neoperhepar inj. 60 gamma
Nerobol tabl.
Neroboletta tabl.
Nerobolil inj.
Polyvitaplex 8 drazsé
Polyvitaplex 10 csokoládé
Prednisolon kenőcs
Prednisolon „J" kenőcs
Redergam inj., csepp, subling. tabl.
Retabolil inj.
Somben tabl.
Sterogenol oldat
Sudeol oldat
Tardyl tabl.
Tetran-Hydrocortison kenőcs
Timidon tabl., zselé
Trifavit inj.
Trypsin sebhintőpor
Vitamin-B_{12} inj. 300 gamma
Vitamin-B_{12} inj. 1000 gamma
Vitamin-C inj. 5 ml
Yohistrin masc. inj., drazsé

FEGYVERES TESTÜLET TAGJAINAK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA

Az egészségügyi miniszter 32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. M. számú utasítása a honvédségi egészségügyi szolgáltatásokra igényjogosultaknak az állami egészségügyi szolgálat részéről történő ellátásáról

A honvédelmi miniszterrel, a közlekedés- és postaügyi miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

Az állami egészségügyi szolgálat részéről történő ellátásra jogosultak

1. § Az állami egészségügyi szolgálat részéről — a 2—35. §-okban foglalt rendelkezések szerint — egészségügyi ellátásra jogosultak:

1. a honvédség illetékes szerve által „Egészségügyi igényjogosultsági lap"-pal (a továbbiakban: Eü. igényjogosultsági lap) ellátott honvédszemélyek.

2. Az alább felsorolt — Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott — honvédszemélyek:

a) a katonai iskolai növendékek (hallgatók),

b) a sortiszthelyettesek, sortisztesek és sorkatonák (a továbbiakban: sorállományúak), tényleges szolgálatuk tartama alatt,

c) a tartalékos állományú tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek a gyakorlat, kiképzés stb. tartama alatt,

3. az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek, nevezetesen:

a) a honvédszemélyeknek Eü. igényjogosultsági lappal ellátott családtagjai (hozzátartozói),

b) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott volt honvédszemélyek és azok Eü. igényjogosultsági lappal ellátott családtagjai (hozzátartozói).

Kezelőorvosi ellátás

2. § Az állami egészségügyi szolgálat körzeti orvosai, körzeti gyermekorvosai és körzeti szülészorvosai — díjtalanul — általános kezelőorvosi (gyermekorvosi, szülészorvosi) ellátást nyújtanak:

1. a honvédszemélyek közül:

a) a honvédségi alakulat elhelyezési körletén (laktanya, tábor stb.) kívül lakó fekvőbeteg honvédszemélyeknek,

b) a szabadság, átutazás miatt átmenetileg az elhelyezési körletükön kívül tartózkodó járó- és fekvőbeteg honvédszemélyeknek,

c) az olyan honvédségi egységnél (szervnél) szolgálatot teljesítő honvédszemélyeknek, ahol sem honvédorvos, sem szerződtetett polgári orvos nem működik.

2. Az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeknek.

3. § A kezelőorvosi ellátásra való jogosultságukat:

a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek az Eü. igényjogosultsági lapjukkal,

b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott honvédszemélyek a katonai igazolványukkal és a 2. § 1. pontjában említett körülmények valamelyikének fennállását igazoló irattal (pl. szabadságolási igazolvány) igazolják.

4. § Szaktanácskozás szükségessége esetében a körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, körzeti szülészorvos) az állami egészségügyi szolgálat területileg illetékes kórházának (rendelőintézetének) vezetőjétől kéri szaktanácsadó orvos kiküldését. A szaktanácskozás díja a kórház (rendelőintézet) költségvetését terheli.

Járóbetegek szakorvosi ellátása

5. § (1) Budapesten minden honvédszemély és minden Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemély szakorvosi ellátását a honvédség egészségügyi intézményei (honvédszakorvosok) biztosítják.

(2) A Budapest területén lakó, Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek a szakorvosi ellátást — sürgős szükség esetében a fogászati ellátást is — az állami egészségügyi szolgálatnak a lakóhelyük szerint illetékes szakorvosi rendelőintézetében (gondozóintézetében) is igénybe vehetik.

6. § (1) Vidéken a honvédszemélyeknek, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeknek szakorvosi ellátását:

a) ha az állami egészségügyi szolgálatnak az ellátásra jogosult lakóhelye szerint illetékes szakorvosi rendelőintézete (gondozóintézete) működési területén honvédségi egészségügyi intézmény (kórház, rendelőintézet, honvédszakorvos) működik, a honvédségi egészségügyi intézmény;

b) ha az állami egészségügyi szolgálat szakorvosi rendelőintézetének (gondozóintézetének) működési területén honvédségi egészségügyi intézmény nem működik, vagy működik ugyan, de a beteg ellátásához szükséges szakorvossal nem rendelkezik, az állami egészségügyi szolgálatnak területileg illetékes szakorvosi rendelőintézete (gondozóintézete, szakorvosa) végzi.

(2) Azokon a helyeken, amelyek honvédségi fogászati

rendelő, honvédfogszakorvos kijelölt működési területéhez tartoznak, a honvédszemélyek, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek az állami egészségügyi szolgálat fogászati szakrendelését —a sürgős szükség esetét kivéve— nem vehetik igénybe.

7. § (1) A honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szolgálat szakrendeléseire a jelen utasítás *5.* és *6.* §-ában meghatározott esetekben mind a körzeti orvos, mind a honvédorvos adhat beutalást.

(2) Az állami egészségügyi szolgálat szakorvosi rendelőintézetében (gondozóintézetében) naponként szakorvosi ellátásban részesíthető — Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott — honvédszemélyek számát az érdekelt rendelőintézet (gondozóintézet) vezetője az illetékes honvédparancsnokság vezetőjével egyetértésben állapítja meg.

(3) A honvédszemélyek időszakos szűrővizsgálata a szűrővizsgálatot végző szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) vezetője által az illetékes honvédparancsnokság vezetőjével egyetértésben megállapított ütemterv szerint történik.

8. § A szakorvosi ellátásra való jogosultságukat:

a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek az Eü. igényjogosultsági lapjukkal,

b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott honvédszemélyek a katonai igazolványukkal és a körzeti orvos által kiállított szolgálati jeggyel igazolják.

9. § (1) A honvédség a sorállományúakat egészségügyi könyvecskével látja el. Az említett honvédszemélyek kötelesek a szakorvosi rendelőintézetben (gondozóintézetben) szakorvosi ellátásuk végett történő jelentkezésük alkalmával az egészségügyi könyvecskéjüket felmutatni.

(2) A sorállományúaknál a szakorvosi vizsgálat eredményét be kell vezetni az egészségügyi könyvecskéjükbe.

10. § A honvédszemélyeknek, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szolgálat szakorvosi rendelőintézetében (gondozóintézetében) történő szakorvosi ellátása, úgyszintén a honvédszemélyek időszakos szűrővizsgálata díjtalan.

11. § A honvédszemélyeket, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeket

a) Budapesten a honvédség fogászati szakrendelője (fogszakorvosa),

b) vidéken, azokon a helyeken, amelyek honvédségi fogászati rendelő, honvédfogszakorvos vagy honvédségi szerződéses polgári fogszakorvos kijelölt működési területéhez tartoznak, a honvédségi fogászati rendelő (fogszakorvos), egyéb helyeken pedig az állami egészségügyi szolgálat területileg illetékes fogászati szakrendelője (fogszakorvosa) részesíti fogpótlásban.

12. § Az állami egészségügyi szolgálat keretében fogpótlásra jogosultak részére a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak fogpótlási ellátásával kapcsolatban rendszeresített fogpótlási munkalapot kell kiállítani. A munkalapra feltűnően rá kell vezetni a „H. M. nem biztosított" szavakat, valamint az Eü. igényjogosultsági lapot kiállító (érvényesítő) parancsnokság nevét és az Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. Azoknál a honvédszemélyeknél, akik Eü. igényjogosultsági lappal nincsenek ellátva, a munkalaphoz csatolni kell az illetékes katonai parancsnokság igazolását arról, hogy a fogpótlást igénylő honvédszemély honvédségi egészségügyi ellátásra jogosult.

13. § (1) Az állami egészségügyi szolgálat fogszakorvosa a honvédségi igényjogosult részére igazolást állít ki arról, hogy a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultakra vonatkozó rendelkezések szerint milyen összegű térítési díjat kell befizetnie. A honvédségi igényjogosult a térítési díjat — a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultaktól eltérően — minden esetben vagy közvetlenül az Eü. igényjogosultsági lapot (igazolást) kiállító honvédségi alakulat pénzügyi szolgálatához vagy honvédségi csekkszámlára fizeti be. A befizetési lapon fel kell tüntetni a „fogpótlás" szót. A befizetés megtörténtét igazoló csekkszelvényt, illetőleg a honvédségi alakulat pénzügyi szolgálatának arra vonatkozó igazolását, hogy a fogpótlás költségeit a honvédség viseli, csatolni kell a munkalaphoz.

(2) A fogpótlási munkálatokat csak a térítési díj befizetését igazoló csekkszelvény, illetőleg a honvédségi alakulat pénzügyi szolgálata költségvállalási igazolásának átvétele után szabad megkezdeni.

14. § (1) Térítésmentes fogpótlásra jogosultak — a honvédségi rendelkezések szerint — azok a honvédszemélyek, akiknél a rágóképesség-csökkenés mérve 50%-nál nagyobb. Ilyen esetben az állami egészségügyi szolgálat fogszakorvosa javaslatot tesz a honvédszemélynek térítésmentes fogpótlásban részesítésére. A javaslatban részletesen fel kell tüntetnie, hogy

a) mely fogak pótlása szükséges,

b) fixpótlás vagy lemezespótlás szükséges-e,

c) lemezespótlás esetében akrilátot vagy más anyagot (nyelvív, fémlemez) használ-e fel.

(2) A javaslatot — az illetékes katonai parancsnokság záradékolása után — meg kell küldeni a legközelebbi honvédkórház fogászati osztályának. A fogszakorvos a fogművet csak a katonai parancsnokság pénzügyi szolgálata költségvállalási igazolásának átvétele után rendelheti meg.

(3) Szolgálati eredetű sérülés miatt szükséges fogpótlást csak honvédkórház fogászati osztálya végezhet.

15. § (1) A fogászati szakrendelő a fogpótlással kapcsolatos fogtechnikai munkát annál a fogtechnikai laboratóriumnál készítteti el, amelyet a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak fogpótlásával kapcsolatban foglalkoztat.

(2) A fogtechnikai laboratórium az elvégzett fogtechnikai munkáról — a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultakkal kapcsolatban megállapított díjtételek szerint — számlát állít ki és azt az elkészített fogművel együtt megküldi a fogászati szakrendelőnek. A fogászati szakrendelő a fogpótlási munkák befejezése után a számlán a fogmű kifogástalan elkészítését igazolja, annak átvételét a beteggel igazoltatja és a számlát visszaküldi a fogtechnikai laboratóriumnak. A fogtechnikai laboratórium a visszaküldött számlát kifizetés végett megküldi az Eü. igényjogosultsági lapot (igazolást) kiállító (érvényesítő) honvédségi alakulat pénzügyi szolgálatának.

16. § Kivehető fogsor kiszolgáltatása esetében a fogorvos köteles az Eü. igényjogosultsági lapra rávezetni — sorállományúaknál az egészségügyi könyvecskébe bevezetni — a fogpótlás megtörténtét.

17. § A fogpótlásra való jogosultság igazolására a 8. §. rendelkezései az irányadók.

Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás

18. § (1) Az állami egészségügyi szolgálat orvosa az ellátásba tartozó honvédszemélyt, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyt kórházi ápolás szükségessége esetében kórházba utalhatja.

(2) Az állami egészségügyi szolgálat orvosa

a) a honvédszemélyt — a sürgős szükség esetét kivéve — csak honvédkórházba,

b) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyt az állami egészségügyi szolgálat kórházába vagy honvédkórházba utalhatja.

(3) Honvédszemélynek honvédkórházba való beutalásához előzetes helybiztosítás nem szükséges. A jelen utasítás hatálya alá tartozó személyeknek az állami egészségügyi szolgálat kórházaiba (polgári kórházakba) történő beküldése esetében a helybiztosítás tekintetében a biztosítottnak kórházba utalásával kapcsolatos szabályok szerint kell eljárni. A kórházbautalásra vonatkozó orvosi javaslatra a „H. M." betűket kell ráírni.

19. § A honvédorvos a kórházi ápolásra szoruló honvédszemélynek vagy Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szolgálat kórházaiba való utalásánál helybiztosítás tekintetében a biztosítottakra érvényes szabályok szerint köteles eljárni.

20. § (1) Ha a körzeti orvos vagy rendelőintézeti (gondozóintézeti) orvos honvédszemélynél bármilyen természetű tbc-s megbetegedést állapít meg, javaslatot tesz a honvédszemélynek a Központi Katonai Kórház (Budapest XIII., Róbert K. krt. 44. sz.) tüdőosztályára való felvételére, illetőleg a tbc-s megbetegedésre gyanús honvédszemélyeknek a szóban forgó honvédkórház tüdőosztályának járóbeteg rendelésére való beutalására.

(2) Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemély tbc-gyógyintézeti ápolásának szükségessége esetében a területileg illetékes tbc-gondozóintézet az erre a célra szolgáló nyomtatványűrlapon javaslatot tesz a betegnek az állami egészségügyi szolgálat tbc-gyógyintézetébe történő beutalására. A javaslaton a tbc-gondozóintézet jogosítási záradékként feltünteti az Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. A tbc-gondozóintézet a szabályszerűen kiállított javaslatot megküldi Budapesten az Országos TBC Betegbeutaló Központnak, vidéken az illetékes megyei tbc-beutaló központnak,

amely intézkedik a betegnek az állami egészségügyi szolgálat tbc-gyógyintézetébe történő elhelyezése iránt.

21. § Honvédszemély vagy Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemély gyógyfürdőkórházi ápolásának szükségessége esetében az állami egészségügyi szolgálat illetékes orvosa javaslatot tesz a betegnek gyógyfürdőkórházba való elhelyezésére. A javaslatot — honvédszemély vagy annak Eü. igényjogosultsági lappal ellátott családtagja esetében az alakulat parancsnoksága útján, egyéb esetben közvetlenül — meg kell küldeni a Központi Katonai Kórház fizikoterápiás osztályának, amely intézkedik a betegnek az állami egészségügyi szolgálat gyógyfürdő kórházba történő beutalása iránt.

22. § (1) A kórházi tbc-gyógyintézeti, illetőleg gyógyfürdőkórházi (a továbbiakban: fekvőbeteg-gyógyintézeti) ápolásra való jogosultságukat:

a) az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek mind beutalás, mind sürgős szükség alapján történt ápolásbavétel esetében az Eü. igényjogosultsági lapjukkal,

b) az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott honvédszemélyek beutalás esetében az illetékes katonai parancsnokság részéről a honvédorvos, illetőleg az állami egészségügyi szolgálat orvosa által adott beutaló javaslat hátlapjára rávezetett (vagy külön kiállított) igazolással,

sürgős szükség alapján történt ápolásbavétel esetében pedig a fekvőbeteg-gyógyintézet megkeresésére az illetékes katonai parancsnokság által kiállított és a fekvőbeteg-gyógyintézetnek megküldött igazolással igazolják.

(2) Az (1) bekezdés *b)* pontjában említett igazolásnak azt kell tartalmaznia, hogy az ápolt honvédszemély az alakulat állományában katonai szolgálatot teljesít. Az igazolást a betegfelvételi iratokhoz kell csatolni.

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézet az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyektől a gyógyintézeti ápolásra való jogosultság igazolására az Eü. igényjogosultsági lapon felül egyéb igazolást nem kérhet. A fekvőbeteg-gyógyintézetben az Eü. igényjogosultsági lapról másolatot készíteni nem kell. Az Eü. igényjogosultsági lappal rendelkező személyeknél a betegfelvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az Eü. igényjogosultsági lap sorszámát. A betegfelvételi jegyzőkönyvet be kell mutatni a fekvőbeteg-gyógyintézet vezetőjének, aki a rávezetett sorszámot a bemutatott Eü. igényjogosultsági lap alapján ellenőrzi és az ellenőrzés megtörténtét a betegfelvételi jegyzőkönyvön aláírásával igazolja.

23. § (1) A sorállományú köteles a fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő felvétele alkalmával az egészségügyi könyvecskét felmutatni.

(2) A sorállományúaknál az egészségügyi könyvecskéjükbe kell bevezetni az ápolás első és utolsó napját, a kórismét, valamint a zárójelentés fontosabb adatait.

24. § (1) Honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg-gyógyintézetébe történő felvétele esetében a fekvőbeteg-gyógyintézetbe köteles a honvédszemély ápolásba vételéről, más fekvőbeteg-gyógyintézetbe való esetleges áthelyezéséről és a fekvőbeteg-gyógyintézetből való elbocsátásáról, illetőleg az elhalálozásáról az illetékes katonai parancsnokságot — ha ez nem állapítható meg, a legközelebbi helyőrség parancsnokát — 24 órán belül írásban értesíteni.

(2) Honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg-gyógyintézetébe történő beutalása esetében az illetékes honvédségi alakulat egészségügyi szolgálata a beutalásról szóló szolgálati jegyhez az (1) bekezdésben említett adatok közlésére szolgáló nyomtatvány-űrlapokat csatol. Ilyen esetben az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a szolgálati jegyhez csatolt nyomtatvány-űrlapokon kell az illetékes katonai parancsnoksággal közölni. A honvédségi alakulat egészségügyi szolgálata a nyomtatvány űrlapokon a beteg nevét és személyi adatait előre feltünteti és így a fekvőbeteg-gyógyintézetnek a nyomtatvány-űrlapokra csak a közlendő adatokat kell rávezetnie.

25. § Az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg-gyógyintézete a gyógyintézetből elbocsátott sorállományú részére legfeljebb 14 napi egészségügyi szabadságot javasolhat. A javaslatot az egészségügyi könyvecskébe kell bevezetni. Ha a fekvőbeteg-gyógyintézet osztályvezető főorvosának megítélése szerint a betegnek 14 napnál hosszabb egészségügyi szabadságra van szüksége, a vezető főorvos javaslatot tesz arra, hogy az illetékes katonai parancsnokság a beteget a honvédség szabályzata szerint a honvéd felülvizsgáló bizottság elé utalja. Az erre vonatkozó javsalatot ugyancsak be kell vezetni az egészségügyi könyvecskébe.

26. § Az állami egészségügyi szolgálat fekvőbeteg-gyógyintézetében a honvédszemélyek, valamint az Eü.

igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek után felmerült ápolási költségeket — az ápolás időtartamára tekintet nélkül — az állam terhére kell elszámolni.

Gyógyszer rendelése

27. § (1) A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, körzeti szülészorvos), úgyszintén a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) szakorvosa az ellátásába tartozó honvédszemély és Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemély részére gyógyszeres kezelés szükségessége esetében gyógyszert rendelhet.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek részére gyógyszert SZTK-vényűrlapon kell rendelni. A vényűrlap fejlécének minden rovatát pontosan ki kell tölteni. A vényűrlapon a munkáltatóra vonatkozó rovatba „H. M." betűket kell beírni.

(3) Az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek részére azt a gyógyszert, amelyért a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultnak térítést kell fizetnie, a vényűrlapnak „SZTK" térítésköteles vény feliratú oldalán, azt a gyógyszert pedig, amelyet a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultnak térítésmentesen kell kiszolgáltatni, a vényűrlapnak „SZTK térítésmentes vény" feliratú oldalán kell rendelni,

(4) A zsoldban részesülő Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek részére bármely gyógyszert a vényűrlapnak „SZTK térítésmentes vény" feliratú oldalán kell rendelni.

(5) Az állami egészségügyi szolgálat orvosai részéről történő gyógyszerrendelés tekintetében egyéb vonatkozásban a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére történő gyógyszerrendelés szabályozásáról szóló 40/1958. (Eü. K. 19.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései az irányadók.

Gyógyászati segédeszköz rendelése

28. § (1) A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, körzeti szülészorvos), valamint a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) szakorvosa az ellátásába tartozó honvédszemély és Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemély részére a következő gyógyászati segédeszközöket rendelheti:

üvegből készült belégzőkészülékek asthmás betegek részére,

heretartó (1—9 számig),
kankófecskendő,
mellszívó üvegharang,
szemcseppentő,
szemecset,
szemkenőcshöz üvegpálca.

(2) Az (1) bekezdésben említett gyógyászati segédeszközöket SZTK vényűrlapon kell rendelni. A vényűrlap kiállítására a *27.* § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt gyógyászati segédeszközöket az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személyek részére a vényűrlapnak „SZTK térítésköteles vény" feliratú oldalán, a zsoldban részesülő, Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott tiszthelyettesek, tisztesek és honvédek részére pedig a vényűrlapnak „SZTK térítésmentes vény" feliratú oldalán kell rendelni. A vényen rendelt gyógyászati segédeszköz közforgalmú gyógyszertárban szerezhető be.

29. § (1) A szakorvosi rendelőintézet szakorvosa az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személy részére lúdtalpbetétet is rendelhet. Gipszminta után készített lúdtalpbetét csak abban az esetben rendelhető, ha az előregyártott lúdtalpbetét nem megfelelő. A lúdtalpbetétet a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített nyomtatványűrlapon kell rendelni. A rendelvényre „H. M." betűket kell ráírni.

(2) A lúdtalpbetétet az SZTK alközpontja (kirendeltsége) szolgáltatja ki. Ha a lúdtalpbetétet a szakorvosi rendelőintézet szakorvosa rendeli, a beteg köteles a lúdtalpbetét kiszolgáltatásának igénylésekor az SZTK alközpontjának (kirendeltségének) az orvosi rendelvényen felül az illetékes honvédségi szervnek vagy a lakóhelye szerint illetékes községi tanács végrehajtó bizottságának, illetőleg városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának (csoportjának) arra vonatkozó igazolását is átadni, hogy honvédségi egészségügyi ellátásra jogosult. A községi tanács végrehajtó bizottsága, illetőleg az egészségügyi osztály (csoport) az igazolást a beteg Eü. igényjogosultsági lapja alapján állítja ki.

30. § Ha a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet)

szakorvosa a beteg részére a *28.* §-ban, illetőleg a *29.* §-ban nem említett gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatását tartja szükségesnek, a szakorvos üres papírlapon javaslatot tesz a szükséges gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására. Erre a célra tehát a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített nyomtatványűrlapot felhasználni nem szabad. A rendelvényül szolgáló papírlapon fel kell tüntetni a beteg nevét, a lakáscímét és a szükséges gyógyászati segédeszközre vonatkozó adatokat. A papírlapra továbbá rá kell írni a „H. M." betűket, valamint a következő szöveget: „Honvédorvosi engedély szükséges." A betegnek a javaslatot el kell juttatni a legközelebbi honvédkórház illetékes szakrendeléséhez. A javaslathoz csatolni kell a *29.* § (2) bekezdésében említett szerv igazolását arról, hogy honvédségi egészségügyi ellátásra jogosult.

31. § A körzeti orvos (körzeti gyermekorvos, körzeti szülészorvos), illetőleg a szakorvosi rendelőintézet (gondozóintézet) szakorvosa köteles gyógyászati segédeszköz rendelése, illetőleg javasolása esetében sorállományúaknál az egészségügyi könyvecskéjükbe beírni, egyéb személyeknél pedig az Eü. igényjogosultsági lapjukra rávezetni, hogy a beteg részére mely napon, milyen gyógyászati segédeszközt rendelt, illetőleg javasolt.

Anyatejellátás

32. § (1) Az állami egészségügyi szolgálat gyermekgyógyász szakorvosa, valamint az egészségvédelmi szolgálat tanácsadó orvosa az anyatej beszerzésének szabályozásáról szóló 3350—15/1951. Eü. (II. 17.) Eü. M. számú rendelet és az annak kiegészítése tárgyában kiadott 3350—15-2/1951. Eü. M. számú utasítás (lásd az Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye III. kötetének 201. és 202. oldalán) rendelkezései szerint engedélyt adhat Eü. igényjogosultsági lappal ellátott személy csecsemője részére más anyától származó anyatej beszerzésére.

(2) Az orvos az engedélyt az „Orvosi javaslat anyatejre" című nyomtatvány űrlapon adja meg, egyszerre legfeljebb egyhavi időtartamra. A nyomtatványűrlap kiállítására a 81/70/1953. Eü. M. számú utasítás (lásd az Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye III. kötetének 206. oldalán) rendelkezései az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nyomtatványűrlapon a munkáltató neve helyett „H. M." betűket és az Eü. igényjogosultsági lap sorszámát kell feltüntetni.

33. § (1) Az anyatejre jogosult részére az anyatejet Budapesten az Anya- és Csecsemővédelmi Intézet (ACSI) vagy anyatejgyűjtő állomás útján, vidéken az anyatejgyűjtő állomás vagy az egészségvédelmi szolgálat csecsemőtanácsadás útján kell biztosítani.

(2) Az anyatejet igénylő az anyatej árát számla ellenében az anyatejadónak megfizeti. A számlának tartalmaznia kell a tejadás időpontját, az adott tej mennyiségét és annak hivatalosan megállapított árát, valamint a kifizetett összeget (a számla végösszegét). A kifizetett összeget a számla, valamint az orvosi javaslat egyik példánya alapján a honvédség állományilag illetékes pénzügyi szerve az anyatejet igénylőnek a számla benyújtásakor visszatéríti.

Mentőszállítás

34. § (1) A honvédszemélyek, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyek mentőszállítására a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultakra vonatkozó rendelkezések az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a honvédszemélyeket — ha erre lehetőség van — honvédségi mentőgépkocsin kell szállítani. A betegszállítási utalványra rá kell írni a „H. M." betűket.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyeknek az Országos Mentőszolgálat által történő szállításával kapcsolatban felmerült mentőszállítási költségeket az állam terhére kell elszámolni.

Orvosi fuvardíj

35. § A honvédszemélyeknek, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal ellátott nem honvédszemélyeknek az állami egészségügyi szolgálat illetékes orvosa által történt gyógykezelésével kapcsolatban felmerült orvosi fuvardíj elszámolása a biztosítottak betegellátásának idevonatkozó szabályai szerint és költségvetése terhére történik.

36. § Az Eü. igényjogosultsági lap fényképes személyi igazolvánnyal együtt és csak arra az évre érvényes, amelyre kiállították, illetőleg, amely évre az érvényét meghosszabbították.

37. § (1) A honvédszemélyeknek betegség által okozott szolgálatképtelenségét általában csak a honvédorvos jogosult igazolni. A betegség által okozott szolgálatképtelenséget a körzeti orvos igazolhatja:

a) az alakulat elhelyezési körletén (laktanya, tábor stb.) kívül lakó vagy szabadság, átutazás miatt átmenetileg az elhelyezési körletén kívül tartózkodó honvédszemély megbetegedése esetében,

b) az olyan honvédségi egységnél (szervnél) szolgálatot teljesítő honvédszemély megbetegedése esetében, ahol sem honvédorvos, sem szerződtetett polgári orvos nem működik.

(2) A körzeti orvos a szolgálatképtelenséget a kórisme feltüntetésével a 112/901. vagy 3510—64. rakt. számú fr. lapon igazolja. Sorállományúaknál a szolgálatképtelenséget az egészségügyi könyvecskéjükbe kell bevezetni.

(3) A körzeti orvos köteles az (1) bekezdésben említett honvédszemély betegség által okozott szolgálatképtelenségéről az illetékes katonai parancsnokságot posta útján értesíteni.

38. § A jelen utasítás *27—31.* §-ai alapján a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére rendszeresített rendelvényre kiadott gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának elszámolása a Honvédelmi Minisztérium és a Szakszervezet Társadalombiztosítási Központ között létesített megállapodás szerint történik.

39. § (1) A honvédség biztosításra kötelezett polgári alkalmazottait, valamint az Eü. igényjogosultsági lappal el nem látott nyugdíjas honvédszemélyeket a dolgozók betegségi biztosítására vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint járó szolgáltatások illetik meg.

(2) A honvédség biztosításra kötelezett polgári alkalmazottainál a munkáltatói igazolványon, az orvosi vényen és minden egyéb orvosi rendelvényen a munkáltatóra vonatkozó rovatban nem „H. M.", hanem „Hon. polg. alk." szavakat kell beírni.

40. § A jelen utasítás az 1959. évi november hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 182/1955. (Eü. K. 21.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti.

1/1961. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú utasítás a néphadseregből, illetőleg a fegyveres és rendészeti testületekből kivált személyek betegségi ellátásáról szóló 46/1960. (X. 13.) Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában

A belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a külkereskedelmi miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. A néphadsereg és a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti testületei hivatásos állományából kivált és leszerelési segéllyel ellátott személy, valamint családtagja a kiválás napja után a leszerelési segéllyel való ellátás időtartama és az azt követő 15 nap alatt bekövetkezett betegség esetében, ugyanolyan feltételekkel és mértékben jogosult a betegellátásra, mint a munkaviszony alapján biztosított dolgozó és családtagjai.

2. A néphadsereg és a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti testületei hivatásos állományából kivált és leszerelési segéllyel el nem látott, a továbbszolgáló állományból, valamint a vámőrség és a pénzügyőrség állományából kivált személy és családja a szolgálat tartama alatt kezdődött, illetőleg a kiválást követő 15 nap alatt bekövetkezett betegség esetében — a munkaviszony alapján biztosított dolgozókra és családtagjaira irányadó feltételekkel és mértékben — jogosult a betegségi biztosítás minden szolgáltatására.

3. A néphadseregből, illetőleg a fegyveres és rendészeti testületekből kivált személy a betegségi ellátásra jogosultságát az illetékes parancsnokság által kiállított „Társadalombiztosítási Igazolvány"-nyal igazolja. Az igazolvány a személyi adatokon felül mindazokat az adatokat tartalmazza (szolgálati idő, leszerelés napja, leszerelési segéllyel ellátottság időtartama stb.), amelyek az igényjogosultság megállapításához szükségesek.

4. A *3.* pontban említett személy családtagjai igényjogosultságát a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ helyi szervei által kiállított és záradékolt „Biztosítási Igazolvány"-nyal igazolja.

5. Ha a leszerelési segéllyel ellátott személy betegsége miatt keresőfoglalkozást nem folytathat, részére táppénz legkorábban a leszerelési segéllyel való ellátás utolsó napját követő naptól jár. Ha a keresőképtelenség már a leszerelési segéllyel való ellátás időtartama alatt kez-

dődött, a keresőképtelenség első napjának a keresőképtelenséget megállapító orvosi vizsgálat napját kell tekinteni. A kivált személy keresőképtelenségét csak akkor lehet megállapítani, ha betegsége következtében igazolt polgári szakképzettségének vagy fizikai, szellemi képességének megfelelő foglalkozást nem folytathat. A katonai szolgálati beosztást (munkakört) a keresőképtelenség megállapításánál figyelembe venni nem lehet. A keresőképtelenség elbírálására egyébként a 130/1955. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. A társadalombiztosítás terhére a családtag részére nyújtott kórházi ápolás idejébe a szolgálat tartama alatt a családtag részére igénybevett kórházi ápolás idejét nem lehet beszámítani.

7. Ha a jelen utasítás hatálya alá eső személy az *1.*, illetőleg a *2.* pontban meghatározott időtartam alatti biztosításra kötelezett munkaviszonyba lép, és ezt követően ő vagy családtagja megbetegszik, jogosult — a biztosított dolgozókra irányadó feltételekkel és mértékben — a betegségi biztosítás minden szolgáltatására.

8. Ezt az utasítást az 1960. évi november 1. napján kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

9. Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a 831/F/16-2/1952. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti.

Az egészségügyi miniszter 23/1964. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítása a hadkötelesek jelentkezési kötelezettségével kapcsolatos szabályokról és a katonai igazolványról szóló 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendeletnek és a végrehajtása tárgyában kiadott 2/1964. (II. 9.) HM számú rendeletnek a kötelező gyógykezeltetésre vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

A 4/1964. (II. 9.) Korm. számú rendelet (a továbbiakban: R) *20.* §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a R.-nek, valamint a R. végrehajtásáról szóló 2/1964. (II. 9.) HM számú rendeletnek (a továbbiakban: Vhr.) a kötelező orvosi vizsgálatra és gyógykezeltetésre vonatkozó rendelkezései végrehajtása tárgyában — a belügyminiszterrel, a honvédelmi miniszterrel, a közlekedés- és postaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben — a következőket rendelem:

[Az Egészségügyi Közlöny a kormányrendeletnek és a honvédelmi miniszteri rendeletnek a kötelező orvosi vizsgálatra és gyógykezeltetésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint az egészségügyi miniszteri utasítást a könnyebb áttekinthetőség céljából egységes szerkezetben közli. A kormányrendelet (R.) rendelkezéseit a vastagabb betűkkel, a honvédelmi miniszteri rendelet (Vhr.) rendelkezéseit a dőlt betűkkel, az egészségügyi miniszteri utasítás (Vh. ut.) rendelkezéseit a vékonyabb álló betűkkel szedett szöveg tartalmazza.]

A katonai szolgálatra alkalmasság előzetes elbírálása

R. 2. § (1) Akit összeíráson való megjelenési kötelezettség terhel, köteles magát az összeíráson az orvosi vizsgálatnak alávetni, illetőleg az összeírás alkalmával előírt orvosi vizsgálat végett a kiegészítő parancsnokság által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megjelenni.

(2) Az összeírással kapcsolatban hozott határozat ellen, illetőleg intézkedés miatt jogorvoslatnak helye nincs.

Vhr. 1. § A hadkötelest az állami egészségügyi szolgálat valamennyi megkeresett szervének (intézményének) vizsgálatban kell részesítenie.

Vh. ut. *1.* §

(1) A kiegészítő parancsnokság által előzetes orvosi vizsgálat végett gyógyintézetbe (rendelőintézetbe, gondozóintézetbe stb.) utalt hadkötelesnél a kiegészítő parancsnokság megkeresésében megjelölt orvosi vizsgálat (vizsgálatokat) kell elvégezni.

(2) Az orvosi vizsgálat (vizsgálatok) eredményével együtt a kiegészítő parancsnoksággal közölni kell az arra vonatkozó szakvéleményt is, hogy a hadköteles fogyatékossága (betegsége, kórállapota; a továbbiakban: betegség) — a hadköteles gyógykezeltetésre kötelezése esetében — előreláthatóan egy éven belül megszüntethető-e. A vizsgálat (vizsgálatok) eredményét a szakvéleménnyel együtt, zárt borítékban a hadköteles útján kell a kiegészítő parancsnokságnak megküldeni.

A hadköteles kötelező gyógykezeltetése

R. 3. § (1) Ha a kiegészítő parancsnokság az összeírás során megállapítja, hogy a hadköteles fogyatékossága előreláthatóan egy éven belül megszüntethető, a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezheti.

(2) Az (1) bekezdés szerint jár el a kiegészítő parancsnokság akkor is, ha az összeírás után, de a sorkatonai szolgálat megkezdése előtt állapítják meg, hogy a hadkötelesnek olyan fogyatékossága van, amely egy éven belül megszüntethető.

R. 4. § (1) Akit gyógykezeltetésre kötelezteknek, köteles magát az előírt orvosi vizsgálatoknak és gyógyító eljárásnak alávetni és evégből a lakóhelye szerint illetékes járási, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztálya (csoportja) által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megjelenni.

(2) A hadkötelesen a kötelező gyógykezeltetés kapcsán sebészeti műtét csak akkor hajtható végre, ha ehhez a hadköteles előzetesen hozzájárul. A kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézetben elvégezhető műtét tekintetében az orvosi rendtartásról szóló 1959. évi 8. számú törvényerejű rendelet 6. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A kiegészítő parancsnokságnak a gyógykezeltetést elrendelő határozata ellen, illetőleg az egészségügyi szerv intézkedései miatt jogorvoslatnak helye nincs.

Vhr. 2. § (1) A kiegészítő parancsnokság a gyógykezeltetés elrendeléséről köteles értesíteni a hadköteles lakóhelye szerint illetékes járási, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztályát (csoportját; a továbbiakban: egészségügyi osztály).

(2) Az egészségügyi osztály a gyógykezeltetésre kötelezett hadköteleseket lakó- vagy munkahely szerint illetékes szakorvosi (üzemi) rendelőintézetbe, gondozóintézetbe (a továbbiakban: rendelőintézet) utalja be.

Vh. ut. 2. §

(1) A kiegészítő parancsnokság a gyógykezeltetést elrendelő határozatáról névjegyzékkel értesíti a hadköteles lakóhelye szerint illetékes járási, városi, városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi osztályát, illetőleg csoportját (a továbbiakban: egészségügyi osztály).

(2) A kiegészítő parancsnokság a névjegyzéken feltünteti a határozat számát, a gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles személyi adatait, állandó lakóhelyét, munkahelyét és azt a betegséget, amelyből kifolyólag a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezte, valamint az értesítés időpontját.

Vh. ut. 3. §

(1) Az egészségügyi osztály a gyógykezeltetésre kötelezett hadkötelest írásbeli értesítéssel utalja be a lakóhelye vagy a munkahelye szerint illetékes szakorvosi (üzemi) rendelőintézetbe, illetőleg gondozóintézetbe (a továbbiakban: rendelőintézet).

(2) A beutalásról szóló értesítésben:

a) fel kell tüntetni, hogy melyik kiegészítő parancsnokság, milyen számú határozattal, milyen betegségből kifolyólag kötelezte a hadkötelest gyógykezeltetésre;

b) meg kell jelölni, hogy a hadkötelesnek a kötelező gyógykezeltetése végett melyik napon és melyik rendelőintézetben (pontos név és cím) kell megjelennie;

c) a hadkötelest fel kell hívni arra, hogy a megjelölt napon a kézhez vett értesítéssel a rendelőintézet vezetőjénél jelentkezzék;

d) a hadkötelest figyelmeztetni kell arra, hogy ha az egészségügyi osztály által meghatározott napon a rendelőintézet vezetőjénél jelentkezni nem tud, köteles azt a rendelőintézet vezetőjének bejelenteni és távolmaradásának okát hitelt érdemlően igazolni.

(3) A beutaláról szóló értesítést tértivénnyel kell a hadkötelesnek kézbesíttetni. Az értesítést másolatban a rendelőintézet vezetőjének is meg kell küldeni.

Vhr. 3. § (1) *A rendelőintézetben a hadkötelest megfelelő vizsgálatban és gyógykezelésben kell részesíteni. A szakorvos, ha megállapítása szerint a hadköteles gyógykezelése más szakorvosi, fekvőbeteg-gyógyintézeti vagy körzeti orvosi kezelést igényel, a hadkötelest a megfelelő szakrendelésre, fekvőbeteg-gyógyintézetbe vagy körzeti orvosi kezelésre utalja.*

(2) *A kezelésre utalt hadkötelest az állami egészségügyi szolgálat valamennyi megkeresett szervének (intézményének) vizsgálatban és gyógykezelésben kell részesítenie.*

Vh. ut. *4.* §

(1) A rendelőintézet vezetője a hadköteles jelentkezésekor intézkedik aziránt, hogy a hadkötelesnél a szükséges orvosi vizsgálatokat soronkívül elvégezzék és a hadkötelest azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből kifolyólag a kiegészítő parancsnokság gyógykezeltetésre kötelezte, a Vhr. *4.* §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével megfelelő gyógykezelésben részesítsék.

(2) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, olyan szakorvosi kezelést is igényel, amely részére a rendelőintézetben nem biztosítható, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest haladéktalanul az állami egészségügyi szolgálat, illetőleg a MÁV egészségügyi szolgálat megfelelő rendelőintézetébe (szakrendelésre) utalja be.

(3) Ha a hadköteles kötelező gyógykezeltetése körzeti orvos útján is biztosítható, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest gyógykezeltetése végett a lakóhelye szerint illetékes körzeti orvoshoz utalja.

(4) Ha az egészségügyi osztály a hadkötelest a munkahely szerint illetékes rendelőintézetbe utalta be, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest — kérelmére — kötelező gyógykezeltetése végett a lakóhelye szerint illetékes rendelőintézetbe utalhatja. Ha az egészségügyi osztály a hadkötelest a lakóhelye szerint illetékes rendelőintézetbe utalta be, a rendelőintézet vezetője a hadkötelest — kérelmére — kötelező gyógykezeltetése végett a munkahelye szerint illetékes rendelőintézetbe utalhatja.

(5) A hadkötelest, ha dolgozik, a lehetőségekhez képest, a munkaidején kívüli időpontra kell vizsgálatra és gyógykezelésre berendelni.

(6) A rendelőintézet vezetője a hadkötelest „Orvosi Beutalás — Javaslat — Igazolás" című nyomtatványűrlappal utalja más rendelőintézetbe (szakrendelésre), illetőleg a körzeti orvoshoz. Az űrlapon fel kell tüntetni a hadköteles nevét és lakcímét, a munkáltató rovatba pedig be kell írni a következő szöveget: „Gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles." Az űrlapon továbbá meg kell jelölni, hogy a hadkötelesnek melyik napon és melyik rendelőintézetben (szakrendelésen), illetőleg körzeti orvosi rendelőben (pontos név és cím) kell kötelező gyógykezeltetése végett megjelennie. Az űrlapon végül fel kell tüntetni azt a betegséget (kórismét), amelyből kifolyólag a kiegészítő parancsnokság a hadkötelest gyógykezeltetésre kötelezte. Az orvosi beutalást át kell adni a hadkötelesnek. Ha a hadkötelest más rendelőintézetbe (szakrendelésre) utalták, az orvosi beutalást azzal a rendelkezéssel kell a hadkötelesnek átadni, hogy azzal a rendelőintézet (szakrendelés) vezetőjénél kell jelentkeznie.

(7) A rendelőintézet vezetője, ha a hadkötelest a (2)—(4) bekezdések alapján más rendelőintézetbe (szakrendelésre), illetőleg a körzeti orvoshoz utalta, erről — az orvosi beutaláson feltüntetett adatok közlésével — egyidejűleg írásban értesíti az illetékes rendelőintézet (szakrendelés) vezetőjét, illetőleg az illetékes körzeti orvost, azzal, hogy a Vhr. *3.* §-ának (2) bekezdése alapján intézkedjék a hadköteles megfelelő gyógykezeltetése iránt. A rendelőintézet vezetője az értesítés másolatát megküldi a hadköteles lakóhelye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjének.

Vh. ut. *5.* §

(1) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést igényel, a hadköteles gyógykezelését végző rendelőintézet (szakrendelés) vezetője, illetőleg körzeti orvos köteles a hadkötelest — előzetes helybiztosítás után — megfelelő fekvőbeteggyógyintézetbe utalni. A hadkötelesnek megfelelő fekvőbeteg-gyógyintézetbe való felvételét soronkívül kell biztosítani.

(2) A hadkötelest „Orvosi Beutalás — Javaslat — Igazolás" című nyomtatványűrlappal kell a fekvőbeteggyógyintézetbe beutalni. Az űrlap kiállítására értelemszerűen a *4.* § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. A hadköteles az orvosi beutalással jelentkezik a fekvőbeteg-gyógyintézetben. A társadalombiztosítási szerv a hadköteles részére kórházi utalványt nem állít ki.

(3) A rendelőintézet (szakrendelés) vezetője, illetőleg a körzeti orvos a hadkötelesnek fekvőbeteg-gyógyintézetbe való beutalásáról — az orvosi beutaláson feltüntetett adatok közlésével — egyidejűleg írásban érte-

síti az illetékes fekvőbeteg-gyógyintézet vezetőjét, valamint a hadköteles lakóhelye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjét.

Vhr. 4. § (1) A hadköteles gyógykezelését — ha a kiegészítő parancsnokság más időpontot nem állapított meg — lehetőleg ugyanazon év augusztus hó 1. napjáig be kell befejezni.

(2) Az egészségügyi osztály az (1) bekezdésben meghatározott időpontig köteles értesíteni a kiegészítő parancsnokságot az elrendelt gyógykezeltetés eredményéről.

(3) Ha a gyógykezelés az (1) bekezdésben meghatározott időpontig nem fejeződik be, azt a határozat keltétől számított egy év után csak a hadköteles hozzájárulásával lehet folytatni.

Vh. ut. *6.* §

(1) A hadköteles gyógykezelését a Vhr. *4.* §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével kell végezni.

(2) A hadköteles gyógykezelését végző gyógyintézet vezetője (körzeti orvos) köteles a gyógykezelés eredményéről a gyógykezelés befejezése után, de legkésőbb ugyanazon év július hó 15. napjáig a hadköteles lakóhelye szerint illetékes egészségügyi osztály vezetőjét értesíteni. Ha a hadköteles a kötelező gyógykezeltetésre nem jelentkezett vagy arról elmaradt, a gyógyintézet vezetője (körzeti orvos) ezt a körülményt köteles az említett időpontig az egészségügyi osztály vezetőjének bejelenteni.

(3) Az egészségügyi osztály vezetője az elrendelt gyógykezeltetés eredményéről a gyógykezelést végző gyógyintézet vezetője (körzeti orvos) által közölt adatok alapján értesíti a kiegészítő parancsnokságot. Ha a hadköteles gyógykezeltetésének eredményéről az egészségügyi osztály nem kapott értesítést, az egészségügyi osztály vezetője köteles a hadköteles gyógykezelését végző gyógyintézet vezetőjétől (körzeti orvostól) a gyógykezelés eredményére vonatkozó adatokat olyan időpontban bekérni, hogy a Vhr. *4.* §-ának (2) bekezdésében megállapított jelentési kötelezettségének az ott meghatározott időpontig eleget tehessen.

A gyógykezeltetés ingyenessége: gyógyszer, gyógyászati segédeszközök rendelése; a kötelező gyógykezeltetéssel kapcsolatban felmerülő útiköltség igazolása

R. 5. § (1) A gyógykezeltetés, az ahhoz szükséges gyógyszer és gyógyászati segédeszköz, valamint az ötven százalékot meghaladó rágóképességcsökkenés esetén elrendelt fogpótlás ingyenes.

(2) Ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgálataira jogosult, az (1) bekezdésben megjelölt szolgáltatások költségeit az illetékes társadalombiztosítási szerv, egyébként pedig a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) költségvetése terhére kell elszámolni.

Vhr. 3. § (3) Ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosult, a kötelező gyógykezeltetéssel kapcsolatosan a szükségképpen felmerült igazolt helyközi utazási költséget az illetékes társadalombiztosítási szerv, egyébként pedig a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ költségvetése terhére kell elszámolni.

Vh. ut. *7.* §

(1) A hadkötelesek kórházi ápolásáról az érdekelt társadalombiztosítási szervet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — jegyzékkel értesíteni nem kell.

(2) Ha a hadköteles után felmerült kórházi ápolási költség az R. *5.* §-ának (2) bekezdése értelmében a Vasutasok Szakszervezetét (VSZ) terheli, a kórház köteles a hadköteles kórházi ápolásáról — a 8300—4/1954. (Eü. K. 2.) Eü. M. számú utasítás *7.* §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően — a területileg illetékes MÁV igazgatóságot jegyzékkel értesíteni. A jegyzéken a hadköteles neve mellett fel kell tüntetni a következő szöveget: „Gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles."

Vh. ut. *8.* §

(1) A hadköteles részére azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, gyógyszert, gyógyfürdőt, gyógyászati segédeszközt, fogpótlást, ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgáltatásaira jogosult, az illetékes társadalombiztosítási szervnél biztosítottak részére rendszeresített nyom-

tatványűrlapon, ha a hadköteles a betegségi biztosítás szolgáltatásaira nem jogosult, a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központnál (SZTK) biztosítottak részére rendszeresített nyomtatványűrlapon kell rendelni. A nyomtatványűrlapon a munkáltató neve rovatba a következő szöveget kell beírni: „Gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles." A gyógyszert térítésmentes vényűrlapon kell rendelni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés irányadó a kötelező gyógykezeléssel kapcsolatban felmerült útiköltség igazolására is.

A keresőképtelenség tartamára gyógykezeltetési segély folyósítása; a keresőképtelenség igazolása

R. 6. § (1) Munkaviszony (kisipari termelőszövetkezeti tagságuk) alapján a betegségi biztosítás szerint táppénzre jogosult hadköteleseket az illetékes társadalombiztosítási szerv terhére — keresetveszteségük pótlására — a táppénzzel azonos mértékű gyógykezeltetési segélyben kell részesíteni. A táppénzre jogosult hadkötelest a gyógykezeltetési segély az e rendelet alapján foganatosított gyógykezeléssel kapcsolatosan bekövetkezett esetleges keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban 1 évig, folyamatos munkaviszonya (tagsága) időtartamára tekintet nélkül, illeti meg. A segély folyósításának idő-tartama alatt táppénz nem jár.

(2) A mezőgazdasági termelőszövetkezet (termelőszövetkezeti csoport vagy alacsonyabb típusú mezőgazdasági szövetkezet) tagjai részére a gyógykezeltetéssel összefüggő keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban egy évig, naptári naponként húsz forint, kórházi (klinikai stb.) ápolás esetén napi tíz forint gyógykezeltetési segély jár, amelyet az SZTK illetékes szerve folyósít.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett hadkötelesek, ha keresőképtelenségük egy hónapnál hosszabb ideig tart, a keresőképtelenség tartamára — legfeljebb azonban 1 évig — a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagokkal azonos mértékű gyógykezeltetési segélyben részesülnek, amelyet az SZTK illetékes szerve folyósít.

(4) Az e rendelet alapján foganatosított gyógykezeléssel kapcsolatban esetleg keresőképtelenné váló hadkötelest a keresőképtelenség időtartamára szintén díjtalan orvosi gyógykezelés, gyógyszerellátás és kórházi ápolás illeti meg.

(5) Az (1)—(4) bekezdés alapján folyósított ellátás időtartama a betegségi biztosítási szolgáltatások tekintetében előzményként nem vehető számításba.

Vh. ut. *9.* §

(1) Ha a hadköteles azzal a betegségével kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, keresőképtelen vagy a kötelező gyógykezeltetés folyamán keresőképtelenné válik, a hadkötelest keresőképtelen állományba kell venni. A hadköteles keresőképtelen állományba helyezésére és orvosi felülvizsgálatára, továbbá a döntőbizottsági eljárásra, valamint a keresőképtelenség igazolására — a (3) bekezdésben foglalt kivétellel — 130/1955. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítás és az ezt módosító jogszabályok az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a keresőképtelen állományba vételről szóló orvosi igazolásra és a táppénzutalványra feltűnő módon rá kell írni a következő szöveget: „Gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles."

(2) A R. 6. §-ának (3) bekezdésében említett hadkötelest csak abban az esetben szabad keresőképtelen állományba venni, ha a keresőképtelensége azzal a betegségével van kapcsolatban, amelyből kifolyólag gyógykezeltetésre kötelezték, és egy hónapnál hosszabb ideig áll fenn. A keresőképtelenségnek egy hónapnál hosszabb ideig fennállása esetében a keresőképtelen állományba vételről szóló orvosi igazoláson a keresőképtelenséget a keresőképtelenség első napjától kell igazolni.

(3) Ha a hadköteles a VSZ-nél biztosított, a hadköteles keresőképtelen állományba helyezésére és orvosi felülvizsgálatra a 8/1961. (Eü. K. 4.) Eü. M. számú együttes utasítás *5—7.* §-aiban foglalt rendelkezések az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a hadkötelesnek keresőképtelen állományba vételére vonatkozó javaslatra, valamint a táppénzutalványra rá kell írni a következő szöveget: „Gyógykezeltetésre kötelezett hadköteles."

A sorozás alkalmával elrendelt orvosi vizsgálat

R. 8. § (1) Akit sorozáson való megjelenési kötelezettség terhel, köteles magát sorozáson orvosi vizsgálatnak alávetni, illetőleg a sorozás alkalmával előírt orvosi vizsgálat végett a kiegészítő parancsnokság által megjelölt időpontban és gyógyintézetben megjelenni.

Vhr. 5. § (1) E rendelet 1. §-a a sorozáson, illetőleg a sorozás alkalmával előírt orvosi vizsgálat esetén is irányadó.

Vh. ut. *10.* §

A gyógyintézet köteles a kiegészítő parancsnokság által a sorozás alkalmával orvosi vizsgálatra utalt hadkötelesnél a kiegészítő parancsnokság megkeresésében megjelölt orvosi vizsgálatot (vizsgálatokat) elvégezni. A vizsgálat (vizsgálatok) eredményét zárt borítékban a hadköteles útján kell a kiegészítő parancsnokságnak megküldeni.

A katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegségek igazolása

R. 13. § A hadköteles a honvédelmi miniszter rendeletében megjelölt személyi adataiban és személyi körülményeiben beállott változásokat köteles a kiegészítő parancsnokságnak haladéktalanul, illetőleg a külön jogszabályban előírt időn belül bejelenteni.

Vhr. 8. § A hadköteles
k) a katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegségét és sérülését köteles bejelenteni.

Vhr. 11. § (3) A katonai szolgálatra alkalmasságot érintő betegség vagy sérülés bekövetkezése esetében az írásban történő bejelentéshez eredetben csatolni kell, illetőleg a szóban történő bejelentés során eredetben be kell mutatni a gyógyintézethez (kórház, szakorvosi rendelőintézet, gondozóintézet) által kiállított igazolást.

(4) A gyógyintézet (kórház, szakorvosi rendelőintézet, gondozóintézet) a hadköteles kérelmére köteles a (3) bekezdésben említett igazolást kiadni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a hadköteles egészségi állapotában beállott változás részletes orvosi leírását (kórisme stb.).

Hatályba léptető rendelkezés

Vh. ut. *11.* §

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététele napján lép hatályba.

ANTITUBERCULOTICUMOK

Az egészségügyi miniszter 27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítása a tbc-gondozóintézetekben kezelt betegeknek egyes antituberculoticumokkal való ellátásáról

A tbc-s betegek eredményesebb gondozói utókezelésének biztosítása érdekében a következőket rendelem:

1. §

(1) A tbc-gondozóintézetek térítésmentesen Streptomycint, Rigenicidet, Cycloserint és Pyrazinamidot adhatnak azoknak a betegeknek, akik részére ezt tbc-fekvőbeteg-gyógyintézet (kórház tbc-osztálya) a beteg gyógykezelésének befejezésekor a zárójelentésben javasolta, illetve a megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc-gondozóintézet igazgatója engedélyezte.

(2) Az (1) bekezdésben említett gyógyszerek felhasználására a mellékelt Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

2. §

A tbc-gondozóintézetek részére szükséges Streptomycint, Rigenicidet, Cycloserint és Pyrazinamidot költségvetése terhére a megye (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc-gondozóintézet rendeli meg.

3. §

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététele napján lép hatályba; egyidejűleg a 157/1956. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítás hatályát veszti.

Melléklet a 27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasításhoz

Tájékoztató

a tbc-gondozóintézetekben kezelt betegeknek egyes antituberkulotikumokkal való ellátásáról szóló utasítás végrehajtásáról

A)

A 27/1963. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasításban említett gyógyszerek elsősorban a tbc-s betegek gyógyszeres utókezelésének célját szolgálják, tehát olyan esetekben indikálhatók, amikor fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelés után a megoldott folyamatok utókezelését ambulánsan kell biztosítani és az utókezelés már az eddig használt antituberculotikumokkal nem folytatható.

A külföldi irodalmi adatok és a hazai tapasztalat alapján a gyógyszeres utókezelés jelentőségéről a tüdőgümőkór kezelésében többségében az alábbi egyöntetű nézetek alakultak ki:

1. Utókezelésben általában a gümőkóros folyamat (a caverna-záródás, a folyamat megnyugvása) utáni gyógyszeres kezelést értjük.

2. Az utókezelés célja: kivédeni a folyamat újbóli fellángolását, ha a nagyrészt latens állapotban levő, de élő baktériumok szaporodása esetleg megindul.

3. A gyógyszeres utókezelés általában nem igényel kombinált kezelést a már létrejött baktériumlatencia miatt.

4. Nem célravezető az utókezelést olyan gyógyszerekkel folytatni, amellyel szemben előzőleg baktériumrezisztencia jött létre.

5. A gyógyszeres utókezelés időtartama minimálisan egy év.

A gyógyszeres utókezelést minden olyan esetben, amikor a gyógykezelés folyamán INH-rezisztencia nem alakult ki, INH-monotherapia formájában indokolt végezni, még abban az esetben is, ha a megoldás műtét segítségével történt.

Sokkal nehezebb feladatot jelent azoknak a betegeknek az utókezelése, akiknél a folyamat megoldását úgy sikerült elérni, hogy előzőleg már INH-rezisztens baktériumokat ürítettek. E betegek gyógyszeres utókezelésére a tbc-gondozóintézeteknek eddig gyakorlatilag csak a PAS és a Thiomicid, és kivételesen a Streptomycin állott rendelkezésére. Az említett utasításban

foglalt rendelkezéssel lehetőség nyílik arra, hogy az INH-rezisztens betegek ambulans utókezelésére fenti gyógyszereken kívül a tbc-gondozóintézetek Streptomycint, Rigenicidet (Trecatort), Cycloserint és Pyrazinamidot is használhassanak.

Tekintettel arra, hogy ezekkel a gyógyszerekkel az ambuláns utókezelés elsősorban olyan, fekvőbeteg-gyógyintézetből megoldottan hazabocsátott betegeknél indokolt, akiknél a fekvőbeteg-gyógyintézetben ezzel a gyógyszerrel a kezelést már elkezdték és a kezelés eredményesnek mutatkozott, a gyógyszeres utókezelésre vonatkozó javaslatnak a beteg kibocsátásakor, vagy még azt megelőzően a fekvőbeteg-gyógyintézet főorvosától kell kiindulnia.

A most engedélyezett gyógyszerekkel történő utókezelés az alábbi esetekben javasolható:

a) a bakteriológiailag kimutatott, illetve klinikailag feltételezett INH-rezisztencia;

b) a folyamatot a bakteriológiailag kimutatott vagy klinikailag feltételezett INH-rezisztencia ellenére sikerült megoldani egyéb gyógyszeres kezeléssel vagy műtéttel;

c) kizárható e gyógyszerekkel szembeni rezisztencia.

A javaslatok megtételénél azonban figyelembe kell venni, hogy a Pyrazinamid önmagában utókezelésre nem látszik alkalmasnak, és így ezt a gyógyszert kombináltan kell adni. Ezért ezzel a gyógyszerrel utókezelést olyan esetben helyes végezni, amikor valamilyen oknál fogva (pl. igen kiterjedt residuum, kétoldali rezekció után stb.) bizonyos ideig az utókezelés kombinált folytatása látszik szükségesnek.

B)

Kivételesen indokolt esetekben az említett gyógyszereknek ambuláns folyamatos gyógyszeres kezelésre való kiutalását is lehet kérni.

Ambuláns folyamatos gyógyszeres kezelésről beszélünk olyan esetben, amikor a megoldható, de még nem oldott folyamatú, tehát a cavernás vagy Koch-pozitív beteget részesítjük gátlószeres kezelésben.

A meg nem oldott folyamatok ambuláns gyógyszeres kezelése általában helytelen, mert a gyógyintézetben folytatott gátlószeres kezelés sokkal jobb feltételeket biztosít a gyógyuláshoz.

Ennek ellenére kivételesen előfordulhatnak olyan esetek, amikor különböző okoknál fogva az új betegnek gyógyintézetben való ápolása vagy a folyamat megoldásáig (caverna-záródásig) gyógyintézetben való kezelése nem valósítható meg. Ilyen esetekben ambulánsan is — mindaddig, amíg a beteg INH-érzékeny baktériumokat ürít — a folyamatos gyógyszeres kezelést az INH valamely kombinációjával kell elkezdeni, illetve végezni. Ilyen esetben az INH kombinálására elsősorban a PAS és Thiomicid alkalmas. Kivételes esetekben, amikor az INH kombinálására az említett gyógyszerek egyike sem alkalmazható (gyomorpanaszok, máj-laesio stb.), akkor Streptomycint, Rigenicidet, Cycloserint vagy Pyrazinamidot is használni lehet kombinált folyamatos gyógyszeres kezelésben.

A nem megoldhatónak látszó cavernás folyamatok ambuláns gyógyszeres kezelése Streptomycinnel, Rigeniciddel, Cycloserinnel vagy Pyrazinamiddal, indokolatlan és nem engedélyezhető.

A gyógyszerek ambuláns felhasználására a javaslattétel, illetve az engedélyezés az alábbi módon történjék:

Minden osztályos főorvosnak, ha a távozó beteg további (utó- vagy folyamatos) gyógyszeres kezelésére Streptomycin, Rigenicid, Cycloserin vagy Pyrazinamid adását látja indokoltnak, azt a zárójelentésben külön indokolással kell javasolnia. Az ilyen zárójelentéseket önálló tbc-gyógyintézetben az intézet igazgatójának láttamoznia kell és egyben ellenőriznie kell azt, hogy az ambuláns kezelésre szóló javaslat megfelel-e a methodikai levélben foglalt feltételeknek. A zárójelentés egy példányát, illetőleg a gyógyszerre vonatkozó írásos javaslatot a beteg távozása előtt legalább egy héttel meg kell küldeni az illetékes megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc-gondozóintézet igazgatójának. Általános kórházak tbc-osztályainál, ahol konzultációra nincs mód, az osztályos főorvosnak a megyei tbc-gondozóintézetnek megküldött zárójelentéshez csatolni kell azokat a röntgenfilmeket is, amelyek alapján a gyógyszert indikálta. A megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc-gondozóintézet igazgatója a gyógyszer indikációját ellenőrzi és intézkedik a gyógyszernek névre szóló kiadásáról az illetékes tbc-gondozóintézetben.

Ha a tbc-gyógyintézet kezdeményezi a B) pont alapján a gondozóintézetben kezelt betegnek az említett gyógyszerekkel való kezelését, a gyógyszer kiutalását

a megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc-gondozóintézet igazgatójától kell kérnie. Az ilyen kérelmeket is egyénileg kell elbírálni a kórlap és a filmek áttanulmányozása után. A gyógyszerengedélyezést a gondozóintézeti kórlapba be kell jegyezni.

A megyei tbc-gondozóintézet igazgatója nem engedélyezheti fenti gyógyszerek ambuláns adását, ha az indikációk megtétele nem a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történt.

A gyógyszerek megrendeléséről költségvetése terhére a megyei (fővárosi központi, megyei jogú városi) tbc-gondozóintézeteknek kell gondoskodnia.

A gyógyszerek adagolását és az esetleges mellékhatásokat a következő táblázat tartalmazza:

Gátlószer	Formája	Adagja	Melléktünet
Streptomycin	1 g-os poramp. im. inj.	Napi 1/2, vagy heti 2—3×1 g im.	Hallászavar, zsibbadás, szédülés
Ilgenicid (Trecator)	0,25 g tabl. és 0,5 kúp	3×1 tabl. vagy 2×1 kúp	Gyomor-, bélpanasz, hányinger, idegrendszeri panaszok
Thiomicid	0,025 g tabl.	Emelkedően 1—4,6 tabl.	Májkárosodás, étvágytalanság
Pyrazinamid	0,5 g	3×1 tabl.	Hányinger, étvágytalanság, májkárosodás
Cycloserin	0,25 g tabl.	3—4×1 tabletta	Idegrendszeri tünetek, aluszékonyság, izgatottság, epilepsia esetében kontraindikált

Thiomicid- és Pyrazinamid-adagolás esetében 2 hetenként vizelet-vizsgálat (urobilinogen) elvégzése szükséges.

GLUTAREC

Az egészségügyi miniszter 117/1956. (Eü. K. 3.) Eü. M. számú utasítása a Glutarec elnevezésű gyógyszerkülönlegességnek a társadalombiztosítás terhére rendelése és kiszolgáltatása tárgyában. A 41/1962. (Eü. K. 17.) Eü. M. számú utasítás alapján módosított szöveg

1. § A Glutarec elnevezésű gyógyszerkülönlegesség a kórházon kívüli betegellátás keretében a társadalombiztosítás terhére rendelhető, ha a gyógyszer alkalmazását elme-idegklinika, gyermekklinikai idegszakrendelés, kórházi elme-idegosztály, az Állami Gyermeklélektani Intézet* (Bp. VI., Rippl Rónai u. 26.), az Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kórtani laboratóriuma (Bp. II., Csalogány u. 43.), idegszakrendelés vagy a fővárosi központi elme- és idegbeteggondozó intézet vezető főorvosa tartja szükségesnek és egyszersmind az említett gyógyszerrel történő gyógykezelés eredményességének időnkénti ellenőrzését is vállalja.**

2. § (1) A Glutarec gyógyszerkülönlegesség rendelésére az alábbi bekezdésben foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) Az *1.* §-ban említett gyógyintézmények közül azok, amelyeknek orvosai ebbeli minőségükben a társadalombiztosítás terhére vényírásra jogosultak, a Glutarec gyógyszerkülönlegességet maguk rendelik SZTK térítésköteles vényűrlapon, illetve VSZ-biztosítottak részére VSZTO vénytömblapon a kórisme rávezetésével.

(3) Az *1.* §-ban felsorolt gyógyintézmények közül azok, amelyeknek orvosai ebbeli minőségükben a társadalombiztosítás terhére vényírásra nem jogosultak, az általuk gyógykezelésbe vett — társadalombiztosítási szolgál-

* Új címe: M. Tud. Akad. Pszichológiai Intézete (Bp. VI., Szondy u. 83/85.)

** Utólag a Budapest Fővárosi Tanács Heim Pál Gyermekkórháza és Rendelőintézete, a makói Kórház-Rendelőintézet gyermek-szakrendelése, a Budapest Fővárosi Tanács iskolaszakorvosi hálózatának gyermek ideg-szakrendelései, a Debrecen Városi Iskola Ideggondozó Intézet, Kecskeméti Gyermek Ideggondozó Intézet, Kaposvárott működő Gyermekideggondozó Intézet is felhatalmazást kapott.

tatásokra igényjogosult — személyeknek a Glutarec gyógyszerkülönlegesség rendelésére a szakorvos által szabályszerűen megszövegezett és aláírt, valamint a gyógyintézmény hivatalos bélyegzőjével ellátott javaslatot adnak. A javaslatban fel kell tüntetni a beteg nevét, lakcímét és munkáltatójának nevét, továbbá a kórismét, valamint azt, hogy a javaslattevő gyógyintézmény a betegnek dátumszerűen kitűzött legközelebbi ellenőrzéséig milyen mennyiségű Glutarec rendelését tartja szükségesnek, külön megjelölve azt is, hogy a gyógyszerből naponta mennyit szedjen a beteg. A gyógyintézmény javaslata alapján, az abban megjelölt gyógyszermennyiség figyelembevételével és a javaslatban feltüntetett időpontig a Glutarec gyógyszerkülönlegességet a kezelő orvos rendeli.

A vényen vagy hátlapján fel kell tüntetni, hogy a Glutarec gyógyszerkülönlegesség alkalmazását melyik gyógyintézmény javasolta.

(5) Egy vényen egy alkalommal legfeljebb egy hónapi időtartamra szükséges Glutarec rendelhető.

3. § A jelen utasítás az 1956. év február hó 1. napján lép hatályba.

GONORRHOEA

Az egészségügyi miniszter 22/1957. (Eü. K. 11.) Eü. M. számú utasítása a gonorrhoeás betegeknek Streptomycinnel vagy Chlorociddal való gyógykezelése tárgyában

1. §

A penicillinkezelésre nem gyógyuló szövődményes gonorrhoeában szenvedő betegek gyógykezelésénél Streptomycin vagy Chlorocid gyógyszer is alkalmazható.

2. §

(1) A bőr-nemibeteggondozó intézetek kötelesek a penicillinkezelésre nem gyógyuló szövődményes gonorrhoeás beteg gyógykezeléséhez szükséges Streptomycin vagy Chlorocid gyógyszert a Penicillinre vonatkozó rendelkezések szerint kellő időben beszerezni.

(2) A körzeti orvosok a penicillinkezelésre nem gyógyuló szövődményes gonorrhoeás betegek gyógykezeléséhez szükséges Streptomycin vagy Chlorocid gyógyszert a területileg illetékes bőr-nemibeteggondozó intézetből természetben igénylik.

3. §

A jelen utasítás az 1957. évi június hó 1. napján lép hatályba.

GYÓGYTÁPSZEREK

3180—89/2. 1951. Eü. M. számú utasítás gyógytápszerek társadalombiztosítás terhére rendelésének újabb szabályozása tárgyában. (Megjelent a „Népegészségügy" 1951. szeptember 15-i 12. számában.)

Az Egészségügyi Minisztérium az alább felsorolt tápszerkészítményeket törzskönyvezte:

Engedélyezett gyógytápszer:

Adapta	250 g
Caphosein	100 g
Dexmaltan (Hordenzym)	300 g
Lactorizan	300 g
Maltiron	300 g
Maltosit (Hordomalt)	250 g
Oriza	220 g
Predapta	300 g

A felsorolt tápszerkészítményekre az Egészségügyi Minisztérium egyúttal forgalombahozatali engedélyt is adott.

Ezentúl tehát a Gyógyszerrendelési Útmutatóban felsorolt valamennyi tápszerkészítmény közül kizárólag a felsorolt gyógytápszerkészítmények rendelhetők a társadalombiztosítás terhére, éspedig csak gyógyítás céljára és nem táplálékmak.

Csecsemők és gyermekek részére gyógytápszereket tehát csakis táplálkozási zavaraik megszüntetésére, valamint olyan betegség gyógykezelésére rendelhetők, amelyek gyógyításában gyógytápszerre feltétlenül szükség van. (Pl. dysenteria, exudativ diathesis.) Ilyen esetekben is csak akkor rendelhetők, ha a gyógytápszer

dozóintézeti csecsemő-, gyermekgyógyászati szakrendelés, körzeti gyermekgyógyász szakorvos, gyógyintézetek, klinikák gyermekosztályai vagy a járási egészségvédelmi szolgálat tanácsadó orvosa állapították meg, illetőleg igazolták, hogy a csecsemőnek betegség miatt van gyógytápszerre szüksége.

Körzeti orvos tehát csak abban az esetben rendelhet csecsemőnek, gyermekeknek gyógytápszert, ha ennek szükségességét az előző bekezdésben említett szakorvosok állapították meg és csakis a szakorvosok által meghatározott gyógytápszerféleséget és csak a szakorvosok által megállapított időtartamra elegendő mennyiségben írhatja fel.

A körzeti orvosok csecsemők, gyermekek részére történő gyógytápszerrendelés esetén mindig közölni tartoznak a vény hátlapján, hogy melyik szakrendelés és mikor, meddig javasolta a gyógytápszer fogyasztását. A vény hátlapján a kórismét fel kell tüntetni.

Olyan esetben, amikor a gyermekszakorvos által a csecsemő vagy gyermek vizsgálata alapján rendelt gyógytápszer folytatólagosan ismételt rendelése szükséges, de az anya valamely okból csecsemőjét, gyermekét előreláthatólag a szakrendelésre újból nem viheti el, az A 3510—64. cikkszámú Orvosi Beutalás — Javaslat — Igazolás című űrlapon közölni kell a körzeti orvossal, hogy milyen betegségből kifolyólag, milyen gyógytápszernek, mennyi ideig fogyasztása szükséges.

Ilyen értelmű igazolás nélkül a körzeti orvos csecsemőknek, gyermekeknek gyógytápszert nem rendelhet.

Vidéken, amennyiben a betegellátásra jogosult csecsemő, gyermek olyan helyen lakik, ahol csecsemő-, gyermekgyógyászati szakrendelés vagy járási egészségvédelmi szolgálat nincs, vagy a szakorvos kiszállása az eset sürgőssége miatt nem várható be, az illetékes körzeti orvos szükség esetén szakorvosi (tanácsadó orvosi) javallat nélkül is rendelhet gyógytápszert.

Az Egészségügyi Minisztérium egyes, nem gyógytápszerként törzskönyvezett, hanem a csecsemőnek normál táplálására szolgáló tápszerkészítményekre is gyártási és forgalombahozatali engedélyt adott. E készítmények a társadalombiztosítás terhére nem rendelhetők.

A gyártási és forgalombahozatali engedélyt az Egészségügyi Minisztérium az alábbi tápszerkészítményekre vonatkozólag hatályon kívül helyezte:

Colostrin, Cydonin, Flossin, Lacto „B", Maltoflossin, Ovomaltin, Papion, Somit, Szitmaltin, Tápióka, Zabderce Krompecher, Zabliszt Krompecher, Zabpehely.

A fentebb felsorolt tápszerkészítmények rendelését tehát miután már nincsenek forgalomban, mellőzni kell.

INFECUNDIN

Az egészségügyi miniszter 9/1967. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítása az Infecundin nevű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelésének és kiszolgáltatásának engedélyezéséről. [A 36/1968. (Eü. K. 13.) Eü. M. számú utasítás alapján módosított szöveg.]

1. §

(1) Az Infecundin nevű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény (a továbbiakban: Infecundin) gyógykezelés és fogamzásgátlás céljából alkalmazható.

(2) Az Infecundin fogamzásgátlás céljából — a kiskorúak kivételével — minden nő számára rendelhető.

(3) Az Infecundin a fekvőbeteg-ellátásban csak gyógykezelés, a járóbeteg-ellátásban pedig gyógykezelés és fogamzásgátlás céljából alkalmazható.

2. §

(1) A szakorvosi rendelőintézet nőgyógyászati szakrendelésének orvosa (továbbiakban: szakorvos) Infecundint — mind gyógykezelés, mind fogamzásgátlás céljából — csak az 1. számú mellékletben felsorolt vizsgálatok, folyamatos használat esetén ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írhat fel. A vizsgálatokat hathavonként, indokolt esetben gyakrabban kell megismételni és azokat szükség szerint ki kell egészíteni. A szakorvos a vizsgálatok elvégzésétől eltekinthet, ha a fekvőbeteg-gyógyintézet hathónaposnál nem régebbi leleteit mutatják be. A vizsgálatok a társadalombiztosítás szolgáltatásaira nem igényjogosultak részére is ingyenesek.

(2) Az Infecundin alkalmazásával kapcsolatos kötelező vizsgálatokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A vizsgálatok eredményét a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti irataiban fel kell tüntetni.

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézet, valamint a szakorvosi rendelőintézet szakorvosának kötelessége, hogy megismertesse a gyógyszer hatását, az Infecundin szedésének pontos módját, közölje az esetleges mellékhatásoknál szükséges teendőket és felhívja a figyelmet a gyógyszer szedésének további feltételeire.

A szakorvosi rendelőintézet szakorvosa kísérje — s beosztottjaival kísértesse — figyelemmel a gyógyszert szedők állapotát és vizsgálja meg esetleges távolmaradásuk okát.

(4) Ellenjavallat: a vizsgálatok nem megfelelő, vagy hiányos eredménye esetén az Infecundint felírni nem szabad. Az ellenjavallatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Infecundint fogamzásgátlás céljából — a gyógyszerkészítmény e célból történő rendelésére vonatkozó rendelkezések szerint — az orvostudományi egyetemek és az Orvostovábbképző Intézet szülészeti-nőgyógyászati tanszékeinek tanszékvezető egyetemi tanárai, a fekvőbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nőgyógyászati osztályainak osztályvezető főorvosai vagy az általuk kijelölt szakorvos, továbbá a szülőotthonok szülészet-nőgyógyászatból szakorvosi képesítéssel rendelkező vezető főorvosa (orvosai) is felírhatja.

3. §

(1) Az Infecundin fekvőbeteg-gyógyintézeti szülészeti-nőgyógyászati osztályon fekvő betegnél, a megfelelő kórforma gyógykezelése céljából, bentfekvése tartamára alkalmazható; más osztályon csak a szülészeti-nőgyógyászati osztály főorvosának javaslatára adható. Az Infecundint szülőotthonban alkalmazni nem lehet.

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézet a beteg távozásakor a 2. számú mellékletben felsorolt esetekben külön írásbeli javaslatot tehet az illetékes szakorvosi rendelőintézetnek a szükségesnek tartott gyógykezelés folytatására; a gyógyszer szedésének tartamát is feltüntető javaslatot a fekvőbeteg-gyógyintézet szülészeti-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa vagy osztályvezető tanársegédje adja.

(3) Az Infecundinnak gyógykezelés céljából három hónapon túl történő alkalmazása csak újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti felvétel és javaslat után lehetséges. A fekvőbeteg-gyógyintézet csak a jelen utasítás hatálybalépése után kibocsátottak számára adhat javaslatot.

4. §

(1) Infecundint valamennyi szakorvosi rendelőintézet nőgyógyászati szakrendelésének orvosa rendelhet. Gyógykezelés céljából a nő állandó lakóhelye, fogamzásgátlás céljából a nő állandó vagy ideiglenes lakóhelye szerint illetékes szakorvosi rendelőintézet nőgyógyászati szakrendelésének orvosa írhatja fel az Infecundint.

5. §

(1) A szakorvosnak az Infecundint gyógykezelés céljából a társadalombiztosításra jogosult beteg részére a 2. számú mellékletben meghatározott esetekben és időtartamra az illetékes biztosítási szerv gyógyszerrendelésre szolgáló vényen, másolattal, térítéskötelesen kell rendelnie;

A társadalombiztosításra nem jogosult beteg részére a (2) bekezdésben leírt vényen teljes térítés mellett kell rendelnie.

A vényen fel kell tüntetni a gyógyszer szedését indokoló kórismét. Gyógykezelés céljából egyszerre csak egy hónapra elegendő mennyiség rendelhető. A felírt mennyiség kiadása után a vény érvényét veszti.

(2) Az Infecundin fogamzásgátlás céljából az e célra rendszeresített vényen (A. 3510—6. r. sz.) teljes térítés mellett, legfeljebb 6 hónapra szükséges mennyiségben rendelhető. A fogamzásgátlás céljára felírt mennyiség az Infecundint szedő nő kívánsága szerint egyszerre legfeljebb 2 hónapra előírt mennyiségben adható ki. A felírt mennyiség kiadása után a vény érvényét veszti.

(3) Az Infecundint mind gyógykezelés, mind fogamzásgátlás céljából ismételten csak az előzetesen rendelt gyógyszermennyiség felhasználása után szabad felírni; ennek megállapítása az orvosi dokumentáció és a gyógyszertár által havonta lebélyegzett vény alapján a gyógyszerkészítményt rendelő orvos kötelessége.

(4) A szakorvosnak az Infecundint szedő nő már meglevő vagy újonnan kiállított „Nőgyógyászati kezelési lap"ján (A. F. ny. 3510—63. r. sz.) minden fontos észrevételt, saját és mások vizsgálati leletét, a különféle eredményeket, valamint a gyógyszer rendelését és a kiadott utasításait pontosan rögzítenie kell és csatolni kell hozzá a fekvőbeteggyógyintézet esetleges javaslatát.

(5) Az Infecundin kórházi, magán-, vagy más vényen, valamint a közgyógyellátás terhére nem rendelhető.

6. §

(1) A Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti testületei Budapest területén lakó tagjainak és igényjogosult családtagjainak ellátását csak a Korvin Ottó kórház és rendelőintézet, valamint gyógyszertára végezheti; az ország más területén lakó személyek az állami egészségügyi szolgálat kijelölt szakorvosi rendelőintézeteit és gyógyszertárait vehetik igénybe.

(2) A honvédségi egészségügyi igényjogosultak az állami egészségügyi szolgálatnak lakóhelyük szerint illetékes kijelölt szakorvosi rendelőintézetét és gyógyszertárait, valamint az MN Központi kórháznak az 1. sz. Honvéd kórháznak és a 3. sz. Honvéd kórháznak szakrendelését vehetik igénybe; az állami egészségügyi szolgálat kijelölt szakorvosi rendelőintézeteinek igénybevétele esetén a honvédségi egészségügyi igényjogosultságot a 32/1959. (Eü. K. 21.) Eü. M. sz. utasítás szerint kell igazolni.

(3) A vasutasok és igényjogosult családtagjaik ellátását csak a MÁV szakorvosi rendelőintézetek végezhetik; a MÁV szakorvosi rendelőintézetek működési területén kívül lakók az állami egészségügyi szolgálat kijelölt szakorvosi rendelőintézeteit vehetik igénybe. A gyógyszert Budapesten csak a MÁV központi kórház és rendelőintézet gyógyszertárában, vidéken az állami egészségügyi szolgálat kijelölt gyógyszertáraiban lehet kiváltani. [Az egészségügyi miniszter és a közlekedés- és postaügyi miniszter 8/1961. (Eü. K. 4.) Eü. M. számú együttes utasítása.]

(4) A Központi Állami Kórház és rendelőintézet igénybevételére jogosult személyek ellátását ez a rendelőintézet és gyógyszertára biztosítja.

7. §

(1) Az Infecundin minden alkalmazásánál az Egészségügyi Minisztérium „Az oralis progestogenek és a hormonalis anticonceptio" című kiadványának szakmai irányelvei szerint kell eljárni.

(2) Minden Infecundint szedő személyről a fekvőbeteg-gyógyintézeti, szakorvosi rendelőintézeti iratokon kívül betűrendes nyilvántartást kell vezetni.

(3) A fekvőbeteg-gyógyintézetnek, a szakorvosi rendelőintézetnek és a gyógyszertárnak pontosan teljesíteniök kell az Infecundin használatával kapcsolatban elrendelt adatszolgáltatást.

8. §

(1) A fogamzásgátlás céljából használt Infecundin szedésével kapcsolatos, intézeti elhelyezést igénylő mindennemű ellátás a területileg illetékes fekvőbeteg-gyógyintézetben történik. A gyógykezelésre használt Infecundin szedésével kapcsolatos intézeti ellátás lehetőleg a gyógyszert alkalmazó vagy javasoló fekvőbeteg-gyógyintézetben történjék.

(2) Az (1) bekezdésben említett ellátás szülőotthonban nem végezhető.

9. §

Ez az utasítás a terhesség megszakításával kapcsolatos eljárás szabályozásáról szóló hatályos jogszabályokat nem érinti.

10. §

(1) A fekvőbeteg-gyógyintézet az Infecundint más gyógyszertári anyagokhoz hasonló módon kapja és felhasználását tételesen (esetenként) számolja el.

(2) A járóbetegellátás részére az Infecundin a fővárosi, a megyei és megyei jogú városi tanácsok végrehajtó bizottságai egészségügyi osztályainak vezetői által kijelölt közforgalmú gyógyszertárak útján kerül forgalomba.

A gyógyszertárak az *5.* § (1) bekezdésében megjelölt vények másolatait egy évig megőrizni kötelesek. Az *5.* § (2) bekezdésében megjelölt és az eliátott személynél maradó vényre a gyógyszertár egyszerre csak egy havi gyógyszermennyiséget szolgáltathat ki, s a gyógyszer kiadását havonta a vény hátlapján bélyegzőjével jelzi. Az Infecundin ilyen módon kérelemre, postai úton is kiadható.

11. §

(1) Az utasítás megtartását a fekvőbeteg-gyógyintézetek és a szakorvosi rendelőintézetek igazgató-főorvosai kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni, az *5.* § (1) bekezdésében említett vényeket a SZOT Társadalombiztosítási Főigazgatóságának ellenőrző főorvosai ellenőrzik.

(2) A javaslat megállapításában vagy a készítmény rendelése, kiszolgáltatása során elkövetett szabálytalanságok esetében az elkövető ellen fegyelmi eljárást kell indítani.

(3) A szakorvos — a szakorvosi rendelőintézet igazgató-főorvosának tudomásával — megtagadhatja az Infecundin rendelését attól, aki az Infecundint nem az orvosi előírásoknak megfelelően szedi, az orvos utasításait nem tartja meg, vagy a számára adott gyógyszert másnak adja át.

12. §

Jelen utasítás 1967. évi április hó 15-én lép hatályba.

1. sz. melléklet a 9/1967. Eü. M. sz. utasításhoz

1. Vizsgálatok az Infecundin gyógyszerkülönlegesség rendeléséhez, a kezelés megkezdése előtt.
   - *a)* Anamnesis.
   - *b)* Az általános állapot vizsgálata.
   - *c)* A panaszok, melléktünetek értékelése (fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, libido stb.).
   - *d)* A vérzés adatai (a ciklus hossza, a vérzés menynyisége, a mennyiség változása, közti vérzés stb.).
   - *e)* Testsúlymérés.
   - *f)* Nőgyógyászati vizsgálat (méhszáj, emlők is).
   - *g)* Vérkép vizsgálata.
   - *h)* Májműködés vizsgálata.
   - *i)* Vizelet vizsgálata.
2. Ellenőrző vizsgálatok az Infecundin gyógyszerkülönlegesség rendeléséhez, a kezelés alatt.
   Mint *1. b)—i)* vizsgálatok, és
   - *j)* A gyógyszer szedését indokoló megbetegedéssel kapcsolatosan előírt egyéb vizsgálatok.

2. sz. melléklet a 9/1967. Eü. M. sz. utasításhoz

Az alább felsorolt orvosi javallatok esetében a fekvőbeteg-gyógyintézetek javasolhatják az Infecundin nevű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelését.

A *2.* kivételével valamennyi pontban meghatározott betegség esetében a gyógyszer szedése legfeljebb három havi időtartamra javasolható. Ezen időtartam letelte után — legfeljebb három havi időtartamra — a gyógyszer csak újabb fekvőbeteg-gyógyintézeti felvétel, vizsgálatok alapján javallható, illetőleg rendelhető. A tár-

sadalombiztosítás terhére térítésköteles vényen — másolattal — havonta csak egy hónapra szükséges gyógyszermennyiség írható fel.

1. Dysmenorrhoea olyan eseteiben, amikor a menstruációval járó fájdalmak a munkaképességet befolyásolják, a gyógyszer alkalmazása előtt ki kell zárni a görcsök organikus okát.
2. Endometrosis olyan diagnosztizált eseteiben, ahol a konzervatív therapia kedvezőbbnek ítélhető meg, mint a műtéti kezelés, az endometrosis diagnosisát csak curettage és endoscopia alkalmazása után lehet kimondani.
   Javasolható az endometrosis műtéti utókezelésére is. A fenti feltételek mellett a gyógyszer folyamatosan rendelhető.
3. Praemenstrualis syndroma azon nőgyógyászati, belgyógyászati és szemészeti kivizsgálással kórismézett eseteiben, amelyek munkaképtelenséget okoznak.
4. Functionalis méhvérzések (poly-hypermenorrhoea stb.) mindazon eseteiben, ha a malignitas kizárt.
5. Functionalis alapon nyugvó sterilitas eseteiben, ha a férj egészségesnek bizonyul.

3. sz. melléklet a 9/1967. Eü. M. sz. utasításához

Orvosi ellenjavallatok az Infecundin gyógyszerkülönlegesség rendelésénél.

1. Anamnesisben szereplő thromboemboliás megbetegedés.
2. Májműködési zavarok.
3. Kóros elhízás.
4. Nem tisztázott vérzéses rendellenességek.
5. Vetélést követően a ciklus visszatérte előtt nem szedhető, szülés után pedig a szoptatás tartama alatt nem rendelhető.
6. Malignus tumorok, elsősorban emlő-carcinoma.
7. Fentieken kívül különös figyelemmel kísérendők az alábbi esetek: cerebrovascularis és cardiovascularis betegségek, diabetes, vesebetegségek, allergiás megbetegedések, epilepsia, sclerosis multiplex.

INSULIN — ORALIS ANTIDIABETICUMOK

Az egészségügyi miniszter 5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. M. számú utasítása az insulin és az oralis antidiabeticumok rendeléséről, kiszolgáltatásáról

1. §

Insulint, valamint oralis antidiabeticumot — kivéve a fekvőbeteg-gyógyintézetben ápolt betegeket — csak cukorbeteg részére szabad rendelni, a gyógykezelés szempontjából szükséges, egyszerre legfeljebb egy hónapra elegendő mennyiségben.

2. §

(1) Az insulin és az oralis antidiabeticum alkalmazásának szükségességét, valamint a naponkénti szükséges adagot első ízben fekvőbeteg-gyógyintézetben (kórház, klinika, egyéb gyógyintézet) kell megállapítani.

(2) Ha a kezelőorvos, illetőleg a kezelőorvos szolgálati, vagy szakmai felettesének véleménye szerint a betegnél szövődmény fellépése stb. miatt újabb megállapítás szükséges, a beteget fekvőbeteg-gyógyintézetbe (kórház, klinika, egyéb gyógyintézet) kell utalni.

(3) Oralis antidiabeticum napi adagjának beállítása kivételes esetekben járóbetegen is elvégezhető belgyógyászati szakrendelés (belgyógyász csoportvezető, felülvizsgáló főorvos) által, ha megvan a lehetősége a szakszerű vizsgálatnak, a vizelet- és vércukor folyamatos ellenőrzésének stb.

(4) A szakorvosi rendelőintézet igazgatója állapítja meg, hogy illetékességi területén mely járóbeteg-szakrendelés (belgyógyász csoportvezető, felülvizsgáló főorvos) jogosult az oralis antidiabeticumok napi adagjának a járóbetegen történő beállítására.

3. §

Cukorbetegség megállapítása esetén, amennyiben a beteg részére insulin vagy oralis antidiabeticum alkalmazása szükséges, a szükséges gyógyszert, annak naponként adandó mennyiségét a kórházi, klinikai zárójelentésben, illetőleg ezt a célt szolgáló orvosi igazolásban fel kell tüntetni. Ezt az igazolást a betegnek — vagy hozzátartozójának — kell átadni.

4. §

(1) Minden olyan cukorbeteget, akinek gyógykezelésére insulin vagy oralis antidiabeticum szükséges, az erre vonatkozó kórházi zárójelentés, orvosi bizonyítvány adatai alapján nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartást az igénylő lakása szerint illetékes rendelőintézeti igazgató vagy általa megbízott személy (cukorbeteggondozó, szakrendelés stb. a továbbiakban: nyilvántartásba vevő) végzi.

(2) A nyilvántartásba vevő, amennyiben megállapította, hogy a beteg az illetékessége területén lakik, a beteg nevét feljegyzi, és két példányban nyilvántartó lapot állít ki. Az e célra rendszeresített „Cukorbeteg nyilvántartó lapja antidiabeticum rendeléséhez" elnevezésű nyomtatvány C 3410—328. r. számon lehet beszerezni a Nyomtatványellátó Vállalat szaküzleteiben. A még rendelkezésre álló eltérő mintájú, a rendelőintézetben esetleg raktáron levő vagy házilag készített űrlapot fel lehet használni.

(3) A nyilvántartási lapra a következő adatokat kell rávezetni:

a) nyilvántartási szám,

b) a beteg neve, születési éve,

c) a beteg lakcíme,

d) annak a fekvőbeteg-gyógyintézetnek (kijelölt cukorbeteg-gondozónak stb.) megnevezése, amely az antidiabeticum szükségességét igazoló bizonyítványt kiállította,

e) a meghatározás időpontja,

f) a kiállított bizonyítvány szerint a beteg egy napi insulin-, illetőleg oralis antidiabeticum-szükséglete,

g) a rendelt insulin neme (rendes vagy elhúzódó hatású),

h) a kezelőorvos által rendelt insulin- (illetőleg oralis antidiabeticum) teljes mennyisége (üveg- és egységszám, illetőleg a tabletták száma) és naptári nap szerint megjelölve az az időtartam, amelyre a kezelőorvos az insulint (oralis antidiabeticumot) rendelte.

(4) A nyilvántartó lap egyik példányát át kell adni a nyilvántartásba vett betegnek. A másik lap a nyilvántartásba vevőnél marad. Ez utóbbi lapon a *h)* rovatot nem kell vezetni.

5. §

(1) Az insulin és oralis antidiabeticum vényen történő rendelésére a cukorbeteg gondozását végző kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos stb.) jogosult.

(2) Az insulin, oralis antidiabeticum rendelésére feljogosult orvos az általa esetenként — havonta — rendelt gyógyszermennyiséget a beteg nyilvántartási lapjára pontosan köteles bejegyezni. Mind a vényen, mind a beteg nyilvántartási lapján azt is fel kell tüntetni, hogy a felírt mennyiség mettől meddig terjedő időre szükséges.

(3) Amennyiben a cukorbeteg részére naponta szükséges insulin, oralis antidiabeticum mennyiségében változás állott be, a *2.* § (1) és (2) bekezdésében említett, beállításra jogosult intézmény stb. zárójelentése, orvosi igazolása alapján csak a *4.* § (1) bekezdésében említett nyilvántartásba vevő vezetheti be a betegnél levő — és saját — nyilvántartó lapjára.

(4) Ha a cukorbeteg a rendelőintézet illetékességi területéről elköltözik, az új lakóhelyén a *4.* § (1) és (2) bekezdése szerint kell eljárni. Ilyen esetben nyilvántartásbavételét a beteg nyilvántartó lapján is fel kell jegyezni, és egyidejűleg értesíteni kell azt a rendelőintézetet, amelynek területéről a beteg elköltözött.

(5) Ha a cukorbeteg csak ideiglenesen tartózkodik a rendelőintézet illetékessége területén kívül, akkor nem kell központi nyilvántartásba venni.

6. §

A beteg nyilvántartó lapját gondosan megőrizni és minden insulin, oralis antidiabeticum, injekciós fecskendő és injekciós tű rendelése alkalmával az orvosnak — ezek bejegyzése céljából — átadni köteles. Ezeket az adatokat az orvosnak a saját nyilvántartásába (karton, egészségügyi törzslap, napló) is fel kell jegyezni.

7. §

Az orvos nyilvántartásba nem vett beteg részére — illetőleg nyilvántartásba vett beteg részére szövődmény fellépése stb. esetén a nyilvántartási lapjára feltüntetett mennyiségen felül — legfeljebb 400 E insulint rendelhet, ha az insulinra életmentés céljából van szükség.

Ilyen esetben az orvos köteles a vényen az insulin halaszthatatlan szükségességét „statim" „cito" vagy „periculum in mora" jelzéssel igazolni.

8. §

(1) A társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult cukorbetegeknek „térítésmentes vény"-en kell rendelni az insulint, oralis antidiabeticumot. A vényen fel kell tüntetni a megállapított napi egységet, illetőleg darabszámot és naptárilag meg kell jelölni, hogy a rendelt mennyiség mettől meddig terjedő időre szükséges.

(2) A gyógyszertár a társadalombiztosítási szervek terhére rendelt insulin, oralis antidiabeticumot térítésmentesen köteles kiszolgáltatni abban az esetben is, ha az orvos azt tévesen nem térítésmentes vényen rendelte.

Ilyen esetben az insulinnak, oralis antidiabeticumnak a térítésmentesen történt kiszolgáltatást a vényen fel kell tüntetni.

(3) A fenti rendelkezés vonatkozik a VSZ-nél biztosítottakra, illetőleg igényjogosult családtagjaikra és a nyugdíjasokra is.

9. §

Ez az utasítás 1967. február 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú, valamint a 12/1958. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítások hatályukat vesztik.

Az egészségügyi miniszter 20/1967. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítása a külföldi gyártmányú insulin és oralis antidiabeticumok rendeléséről és kiadásáról

1. §

A külföldi gyártmányú insulin és oralis antidiabeticum (továbbiakban: külföldi antidiabeticum) rendelésére és kiadására az insulin és az oralis antidiabeticum

rendeléséről, kiszolgáltatásáról szóló 5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. M. számú utasítás rendelkezéseit az alábbi 2—4. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §

(1) Külföldi antidiabeticum fekvőbeteg-gyógyintézeten kívül történő gyógykezelés céljából cukorbeteg részére csak abban az esetben rendelhető, ha orvostudományi egyetem belklinikája (továbbiakban: belklinika) vagy az Egészségügyi Minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó egyéb fekvőbeteg-gyógyintézetnek, a fővárosi, a megyei, a megyei jogú városi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztálya által kijelölt fekvőbeteg-gyógyintézetnek, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi szolgálat, illetőleg a fegyveres erők és a fegyveres testületek egészségügyi szolgálata keretében működő fekvőbeteg-gyógyintézetnek a gyógyintézet vezetője által kijelölt belgyógyászati osztálya megállapította, hogy a beteg állapota hazai gyártmányú insulin, illetőleg oralis antidiabeticum alkalmazásával nem tartható egyensúlyban.

(2) A cukorbeteg részére csak olyan — belföldi forgalombahozatalra engedélyezett és folyamatosan beszerezhető — külföldi antidiabeticum rendelhető, amely antidiabeticum alkalmazásának szükségességét a belklinika, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt belgyógyászati osztálya megállapította.

(3) A külföldi antidiabeticum alkalmazásának szükségességét a belklinikának, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt belgyógyászati osztályának vezetője (helyettese) írásban igazolja. Az igazolást két példányban kell kiállítani. Az igazolásban fel kell tüntetni a cukorbeteg nevét, születési évét, lakáscímét, a külföldi antidiabeticum megnevezését és a naponkénti szükséges mennyiséget. A belklinika, illetőleg a belgyógyászati osztály a betegnek a gyógyintézetből való elbocsátásakor az igazolás két példányát átadja a betegnek (hozzátartozójának) azzal, hogy az egyik példányt — a beteg nyilvántartásbavétele, illetőleg ha már korábban nyilvántartásba vették, a beállott változásnak a nyilvántartó lapokra rávezetése végett — át kell adnia a beteg lakása szerint illetékes rendelőintézet igazgatójának, illetőleg az általa a nyilvántartásbavétellel megbízott személynek [a továbbiakban: nyilvántartásba vevő:

5/1967. (Eü. K. 2.) Eü. M. sz. utasítás 4. §-ának (1) bekezdése], a másik példányt pedig meg kell őriznie.

(4) A külföldi antidiabeticum alkalmazásának szükségességét megállapító belklinikai, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézeti belgyógyászati osztály köteles a cukorbeteget a gyógyintézetből való elbocsátásakor legalább két heti szükségletnek megfelelő mennyiségű antidiabeticummal ellátni.

3. §

(1) A nyilvántartásba vevő a beteg (hozzátartozója) által átadott igazolás [2. § (3) bekezdése] alapján a beteget nyilvántartásba veszi, illetőleg ha már korábban nyilvántartásba vették, a beállott változást rávezeti a nála és a betegnél levő nyilvántartó lapra. Ezt követően a nyilvántartásba vevő vényre felírja, illetőleg feliratja az igazolásban megnevezett külföldi antidiabeticumot, legfeljebb 30 napra szükséges mennyiségben és a vényt az igazolással együtt a beteggel (hozzátartozójával) vagy a posta útján megküldi a Budapest Főváros Tanácsa Gyógyszertári Központja 507. számú Gyógyszertárnak (Budapest V., Dorottya utca 13. sz.).

(2) A gyógyszertár a beteg (hozzátartozója) által átadott vényre kiadja, a vénynek a posta útján történt megküldése esetében pedig a beteg címére a szállítási díj utánvételezésével megküldi a rendelt külföldi antidiabeticumot. A gyógyszertár a gyógyszerrel együtt átadja, illetőleg megküldi a beteg folyamatos gyógykezeléséhez szükséges gyógyszermennyiség biztosításáról szóló értesítést.

(3) A cukorbetegnek a gyógyszertár értesítésével jelentkeznie kell a gondozást végző kezelőorvosnál (körzeti orvos, üzemi orvos stb.). A cukorbeteg részére — a gyógyszertár értesítése alapján — a továbbiakban a gondozását végző kezelőorvos rendeli a szükséges antidiabeticumot az előírt mennyiségben. A kezelőorvos által írt vényt a továbbiakban a cukorbetegnek (hozzátartozójának) kell eljuttatnia az (1) bekezdésben megnevezett gyógyszertárhoz, mert továbbra is ez a gyógyszertár adja ki (küldi meg a posta útján) a rendelt külföldi antidiabeticumot.

(4) Külföldi antidiabeticumnak a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosult cukorbeteg részére rendelése esetében a „térítésmentes vény"-t — az erre vonatkozó rendelkezések szerint — két példányban kell kiállítani.

A vény mindkét példányát át kell adni, illetőleg meg kell küldeni az (1) bekezdésben megnevezett gyógyszertárnak.

4. §

(1) Ha a cukorbeteg gondozását végző kezelőorvos vagy a belgyógyászati szakrendelés (belgyógyász csoportvezető, felülvizsgáló főorvos) véleménye szerint a cukorbetegnél — állapotának javulása vagy rosszabbodása, szövődmény fellépése stb. miatt — a külföldi antidiabeticum alkalmazása szükségességének, illetőleg napi mennyiségének újabb megállapítása szükséges, a beteget belklinikára, illetőleg a 2. § (1) bekezdésében említett fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt belgyógyászati osztályára kell beutalni.

(2) A belklinika, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézet kijelölt belgyógyászati osztályának vezetője (helyettese), ha a külföldi antidiabeticum alkalmazásának szükségessége megszűnt, vagy ha a cukorbeteg részére naponkénti szükséges külföldi antidiabeticum mennyiségében változás állott be, a beállott változásról két példányban igazolást állít ki. A belklinika, illetőleg a belgyógyászati osztály a betegnek a gyógyintézetből való elbocsátásakor az igazolás két példányát átadja a betegnek (hozzátartozójának) azzal, hogy az egyik példányt át kell adnia a nyilvántartásba vevőnek, a másik példányt pedig meg kell őriznie.

A belklinika, illetőleg a belgyógyászati osztály egyben a beteget — szükség esetében — ellátja legalább két heti szükségletnek megfelelő mennyiségű antidiabeticummal. A továbbiakban a *3.* §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

5. §

A fővárosi tanács, valamint a megyei és a megyei jogú városi tanácsok végrehajtó bizottságai egészségügyi osztályai kötelesek a működési területükön levő gyógyintézeteket, egészségügyi szerveket tájékoztatni arról, hogy melyik fekvőbeteg-gyógyintézetet (fekvőbeteg-gyógyintézeteket) jelölték ki arra, hogy külföldi antidiabeticum alkalmazásának szükségességét igazolhassák.

6. §

Ez az utasítás az 1967. évi szeptember hó 1. napján lép hatályba.

KÁBÍTÓSZEREK

*Az egészségügyi miniszter 29/1968. (Eü. K. 12.) Eü. M. számú utasítása a kábítószerek gyógyászati célra rendelésének és gyógyszertárból kiadásának, valamint a gyógyszertárakban és a gyógyintézetekben a kábítószerek beszerzésének, kezelésének, nyilvántartásának, selejtezésének és megsemmisítésének szabályozásáról**

A kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalombahozatalának, raktározásának és használatának szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM—Eü. M. együttes rendelet *12.* §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a kábítószereknek a társadalombiztosítás terhére történő rendelését illetően a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben — a következőket rendelem:

Orvosi vényen kábítószer rendelése

1. §

(1) Az 1/1968. (V. 12.) BM—Eü. M. számú együttes rendelet mellékleteiben felsorolt kábítószereknek és kábítószert tartalmazó készítményeknek (a továbbiakban: kábítószerek) gyógyászati célra a társadalombiztosítás, a Honvédelmi Minisztérium és a közgyógyellátás terhére gyógyszerellátásra jogosult (a továbbiakban: díjtalan orvosi ellátásra jogosult) személyek részére történő rendelésénél az egyéb gyógyszerek rendelésére vonatkozó rendelkezéseket az alábbi bekezdésekben megállapított kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) A vényt két példányban kell kiállítani. A másolati példányra rá kell írni a „Másolat" szót. Az orvos köteles a vény mindkét példányát aláírni és hivatali bélyegzőjének jól olvasható lenyomatával ellátni.

(3) A vényen fel kell tüntetni a beteg életkorát, a rendelt kábítószer mennyiségét — törzskönyvezett gyógyszerkészítményeknél, ha az többféle hatáserősségben van forgalomban, a készítmény hatáserősségét —, valamint a használati utasítást.

(4) Kábítószernek minősített törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelésénél a készítmény hatáserősségét arab számmal és betűvel [pl. Morphinum hcl. inj. 2% (duo per centum)], a rendelt adagolási egységek (inj., tabl., supp. stb.) számát pedig római számmal és betűvel kell kiírni. Ha a készítmény csak egyféle hatáserősségben van forgalomban, a vényen csak az adagok számát kell feltüntetni.

(5) Magisztrálisan elkészítendő kábítószer tartalmú gyógyszer rendelésénél a gyógyszerben foglalt kábítószer mennyiségét arab számmal és betűvel, az adagok számát (Dent. tal. doses, divide in doses) római számmal és betűvel kell feltüntetni.

(6) Ha az orvos a kábítószert a meghatározott legnagyobb egyszeri, illetőleg napi adagnál nagyobb mennyiségben rendeli, köteles a vényen a kábítószer mennyiségét az *5.* §-ban megállapított módon külön megerősíteni.

(7) A vényen a használati utasítást pontosan, félreérthetetlenül kell megadni. Ha az orvos olyan használati utasítást kíván adni, hogy pl. fájdalom esetében 10 cseppet vagy egy tablettát, a vényen azt is meg kell jelölnie, hogy a beteg naponként összesen legfeljebb hány cseppet, illetőleg tablettát vehet be. Ha az orvos a vényen használati utasításul „az orvos kezéhez" szavakat tünteti fel, külön használati utasítást adnia nem kell. A vényen használati utasításul „rendelet szerint" vagy „utasítás szerint" megjelöléseket alkalmazni nem szabad.

(8) Ha az orvos összetett gyógyszerben a Tinctura opii, a Pulvis opii, illetőleg az Extractum opii kábítószert hatáskiegészítés céljából rendeli és a rendelt összetett gyógyszer összmennyiségében a Tinctura opii a 0,75 g-ot (45 cseppet) vagy a Pulvis opii a 0,08 g-ot, illetőleg az Extractum opii a 0,05 g-ot nem haladja meg, az (5) és a (7) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

2. §

(1) A társadalombiztosítás, a Honvédelmi Minisztérium, illetőleg a közgyógyellátás terhére gyógyszerellátásra nem jogosult (a továbbiakban: díjtalan orvosi

*A 7/1969. (Eü. K. 4.) Eü. M. sz. utasítás alapján módosított szöveg.

ellátásra nem jogosult) személyek részére kábítószert csak nyomtatott vagy gumibélyegzős fejléccel ellátott vényűrlapon szabad rendelni. A vényűrlap fejlécének tartalmaznia kell az orvos nevét, az „orvos" szót vagy a szakorvosi címet és a magánorvosi rendelő címét (község, város, utca, házszám).

(2) Az orvosi vényt tintával vagy tintairónnal egy példányban kell kiállítani. A vényen fel kell tüntetni a beteg nevét, életkorát, lakáscímét és a rendelés keltét, valamint az *1.* § (4)—(8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint a rendelt kábítószert. Az orvos köteles a szabályszerűen kiállított vényen a nevét olvashatóan aláírni vagy azt kézjegyével és névbélyegzőjének lenyomatával ellátni.

(3) A kórházak és a klinikák járóbeteg-szakrendelésein a díjtalan orvosi ellátásra nem jogosult betegek részére a kábítószert a kórház (klinika) vényűrlapján kell rendelni. A vényt a rendelőorvosnak olvashatóan alá kell írnia és el kell látnia a kórház (klinika) bélyegzőjének lenyomatával.

3. §

Ha az orvos az „orvosi táskája" részére rendel kábítószert, a vényen a kábítószer nevét, mennyiségét [*1.* § (4) és (5) bek.] és az „orvosi táska részére" szavakat kell feltüntetnie.

4. §

(1) Kábítószert állatgyógyászati célra fejléccel ellátott vényűrlapon kell rendelni. A vényűrlap fejlécének tartalmaznia kell az állatorvos nevét, munkakörének megnevezését és munkahelyének címét (község, város, utca, házszám). Az Állatorvostudományi Egyetemen, valamint az állatkórházakban állatgyógyászati célra kábítószert az intézmény vényűrlapján kell rendelni.

(2) A tintával vagy tintairónnal egy példányban kiállítandó vényen fel kell tüntetni az állat tulajdonosának nevét, lakáscímét és a rendelés keltét, valamint az *1.* § (4), (5), (7) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint rendelt kábítószert. A használati utasításban az állat fajját és darabszámát is meg kell jelölni. Az állatorvos köteles a vényt aláírni és hivatali bélyegzőjének, illetőleg az intézmény bélyegzőjének lenyomatával ellátni.

5. §

Ha az orvos, illetőleg az állatorvos a már kiállított vényen változtatást (utólagos javítást) eszközöl, ezt a javított résznél külön meg kell erősítenie, éspedig a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg részére rendelése esetében — a vény mindkét példányán — kézjegyével és hivatali bélyegzőjének lenyomatával, a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra nem jogosult beteg részére rendelése esetében olvasható aláírásával vagy kézjegyével és névbélyegzőjének lenyomatával, a kábítószernek állatgyógyászati célra rendelése esetében kézjegyével és hivatali bélyegzőjének lenyomatával. A kórházban (klinikán), illetőleg az Állatorvostudományi Egyetemen vagy állatkórházban kiállított vényen eszközölt változtatást a javított résznél a vényt kiállító orvos (állatorvos) olvasható aláírásával kell megerősíteni.

6. §

(1) Ha a betegnek tíz napnál hosszabb időn át folyamatosan és rendszeresen kábítószerre van szüksége, az orvosnak a vény — a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg részére rendelése esetében a „Másolat" jelzéssel ellátott vény — hátlapján fel kell tüntetnie, hogy a beteg részére a kábítószerből előreláthatólag mely időpontig, milyen időközönként, milyen mennyiség szükséges. Az orvos köteles egyben a beteg (hozzátartozója) figyelmét felhívni arra, hogy a vényt a kábítószer kiadásának engedélyezése végett a beteg lakóhelye szerint illetékes járási, járási jogú városi, illetőleg városi (fővárosi) kerületi tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának, illetőleg csoportjának (a továbbiakban: elsőfokú egészségügyi hatóság) mutassa be, a kábítószer kiadásának engedélyezése után pedig a vényt hozza vissza a vényt kiállító orvoshoz.

(2) Az elsőfokú egészségügyi hatóság a kábítószer kiadásának engedélyezése előtt ellenőrzi, hogy a bemutatott vényt az orvos a jelen utasítás rendelkezéseinek megfelelően állította-e ki. A vény szabályszerű kiállítása esetében az elsőfokú egészségügyi hatóság a vény — a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg részére rendelése esetében a „Másolat" jelzéssel ellátott vény — hátlapjára rávezeti, hogy a gyógyszertár a rendelt kábítószerből mely időpontig, milyen időközönként, milyen mennyiséget adhat ki.

(3) Az elsőfokú egészségügyi hatóság kábítószer folyamatos kiadását legfeljebb három hónapi időtartamra engedélyezheti. Ha az orvos megállapítása szerint a betegnek három hónapon túl is szüksége van a kábítószerre, úgyszintén ha az orvos megállapítása szerint a beteg gyógykezeléséhez az engedélyezett kábítószer helyett más kábítószerre, vagy az engedélyezettnél nagyobb mennyiségű kábítószerre van folyamatosan szüksége, az elsőfokú egészségügyi hatóságtól újabb engedélyt kell kérni.

(4) Az elsőfokú egészségügyi hatóság köteles a kábítószer kiadásának engedélyezéséről, az engedély meghosszabbításáról és az engedély esetleges módosításáról megfelelő nyilvántartást vezetni. A nyilvántartást a Belügyminisztérium ellenőrző szerveinek betekintés végett rendelkezésre kell bocsátani.

7. §

(1) Az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével ellátott vény bemutatásakor az orvos a beteget nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: sorszám, a beteg neve és lakcíme, az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélye alapján milyen kábítószerből, mely időpontig, milyen időközönként, milyen mennyiség adható ki. A beteg nyilvántartásbavétele után az orvos a vény (a „Másolat" jelzéssel ellátott vény) hátlapjára az elsőfokú egészségügyi hatóság által rávezetett engedély alatt ráírja a nyilvántartás sorszámát, azt aláírja és — ha a kábítószert díjtalan orvosi ellátásra jogosult beteg részére rendelte — ellátja hivatali bélyegzőjének lenyomatával. Ezt követően a vényt átadja a betegnek.

(2) Ha az elsőfokú egészségügyi hatóság díjtalan orvosi ellátásra jogosult személy részére engedélyezte tíz napot meghaladó időtartamra a kábítószer kiadását, az orvos köteles az említett beteg részére — nyilvántartása alapján — az elsőfokú egészségügyi hatóság által megállapított időközönként az esedékes mennyiségről két példányban vényt kiállítani. A „Másolat" jelzéssel ellátott vényre rá kell írni az orvos nyilvántartásának sorszámát.

Az orvosi vényen rendelt kábítószernek közforgalmú gyógyszertárból kiadása

8. §

(1) Az orvosi vényen rendelt kábítószernek a közforgalmú gyógyszertárból történő kiadására az egyéb gyógyszerek kiadására vonatkozó rendelkezéseket az alábbi (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha az orvos a rendelt kábítószer mennyiségét és adagolva kiadandó kábítószernél az adagszámot nem az *1.* § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint tüntette fel a vényen, vagy ha a rendelt kábítószer egyszeri vagy napi adagja a megállapított legnagyobb adagokat meghaladja és ezt az orvos a vényen az *5.* §-ban megállapított módon nem erősítette meg, úgyszintén, ha az orvos a vényen a használati utasítást nem az *1.* § (7) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint tüntette fel, a közforgalmú gyógyszertár a kábítószert csak „Statim", „Cito" vagy „Periculum in mora" jelzéssel történő rendelés esetén adhatja ki, akkor is csak legfeljebb olyan összmennyiségben, amely a Gyógyszerkönyvben megállapított legnagyobb napi adagot nem haladja meg.

(3) Ha az orvos az erre vonatkozó rendelkezések ellenére a vényen a beteg lakáscímét, a beteg életkorát vagy a rendelés keltét elmulasztotta feltüntetni, a gyógyszerész a vényt átadó személytől megkérdezi a hiányzó adatot, azt a vényre rávezeti, aláírásával megerősíti és az így kiegészített vényre kiadja a kábítószert. Ha a beteg lakáscíme „BM orvosa" vagy „HM orvosa" feliratú bélyegző lenyomatával ellátott vényen nincs feltüntetve, a rendelt kábítószert a beteg lakáscímének feltüntetése nélkül kell kiadni.

(4) A kiadott kábítószer átvételét a gyógyszer átvevője a vényen — a kábítószernek díjtalan orvosi ellátásra jogosult személy részére rendelése esetében a vény mindkét példányán — aláírásával *és a személyi igazolványa számának feltüntetésével igazolja. A személyi igazolvány számának helyes feltüntetését a gyógyszerész ellenőrizni köteles. A „BM orvosa" vagy a „HM orvosa" feliratú bélyegző lenyomatával ellátott vényeken a személyi igazolvány számát feltüntetni nem kell.*

9. §

(1) Az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével ellátott vényre a kábítószert csak ugyanaz a közforgalmú gyógyszertár adhatja ki folyamatosan.

(2) A díjtalan orvosi ellátásra jogosult személy részére rendelt és az elsőfokú egészségügyi hatóság által engedélyezett kábítószert a közforgalmú gyógyszertár első ízben az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyével és az orvos nyilvántartásának sorszámával ellátott, két példányban kiállított vényre, a továbbiakban pedig az orvos részéről az elsőfokú egészségügyi hatóság által megállapított időközönként két példányban szabályszerűen kiállított vényre adja ki.

(3) A díjtalan orvosi ellátásra nem jogosult személy részére rendelt és az elsőfokú egészségügyi hatóság által engedélyezett kábítószert a közforgalmú gyógyszertár az elsőfokú egészségügyi hatóság engedélyezésével és az orvos nyilvántartásának sorszámával ellátott vényre adja ki folyamatosan. A gyógyszertár a kábítószernek első ízben történő kiadásakor a vényt visszatartja és annak alapján a kábítószert a beteg részére az elsőfokú egészségügyi hatóság által engedélyezett időközökben, az engedélyezett mennyiségben kiadja. A kábítószer átvételét és az átvétel időpontját az átvevő a vény hátlapján — hely hiányában a vényhez erősített papírlapon — igazolja az aláírásával.

(4) A közforgalmú gyógyszertár működésének ideiglenes szüneteltetése esetében a gyógyszertár vezetője köteles a szüneteltetés tartama alatt kiadandó gyógyszereket előre elkészíteni, illetőleg előkészíteni és azokat a vonatkozó vényekkel együtt jegyzőkönyv kíséretében a helyettesítő közforgalmú gyógyszertár vezetőjének átadni. A helyettesítő gyógyszertár vezetője az átvett kábítószerekről a szünetelő gyógyszertár működésének újbóli megkezdése napján elszámol ez utóbbi gyógyszertár vezetőjének.

(5) Ha a beteg (hozzátartozója) bármely okból fel nem használt kábítószert a közforgalmú gyógyszertárnak visszaszolgáltat, a gyógyszertár a visszavételről jegyzőkönyet készít. A jegyzőkönyvnek a következő adatokat kell tartalmaznia: az átvétel időpontja, a beteg neve és lakáscíme, az átvett kábítószer neve és mennyisége. A jegyzőkönyvet a kábítószert visszahozó személlyel alá kell íratni. A visszahozott kábítószert

mint selejtanyagot a jegyzőkönyvvel együtt annak megsemmisítéséig a kábítószerszekrényben elkülönítve meg kell őrizni.

10. §

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban minden vényt, amelyre kábítószert adtak ki, vissza kell tartani. A visszatartott vényeket — a díjtalan orvosi ellátásra jogosult személyek részére két példányban kiállított vényeknél a „Másolat" jelzéssel ellátott vényeket — sorszámozva és összefűzve két évig meg kell őrizni. A vények sorszámozását minden naptári évben újból kell kezdeni.

(2) Azokat a vényeket („Másolat" jelzéssel ellátott vényeket), amelyeken az orvos Tinctura opii vagy Pulvis opii, illetőleg Extractum opii kábítószert tartalmazó olyan összetett gyógyszert rendelt, amelyben az említett kábítószer összmennyisége nem haladja meg az *1.* § (8) bekezdésében meghatározott mennyiséget, sorszámozás nélkül a *14.* § (3) bekezdésében megállapított időpontig meg kell őrizni.

A közforgalmú gyógyszertáraknak kábítószerekkel való ellátása; a közforgalmú gyógyszertárakban a kábítószerek nyilvántartása, tárolása és elszámolása

11. §

(1) A közforgalmú gyógyszertár a szükséges kábítószereket az erre a célra rendszeresített megrendelőfüzetben levő rendelőlappal a megyei (fővárosi) tanács gyógyszertári központjának (a továbbiakban: gyógyszertári központ) gyógyszerraktárából szerzi be.

(2) A megrendelőlapot másolópapír alkalmazásával három példányban kell kiállítani. Az első (fehér színű) példány a megrendelőfüzetben marad, a második (sárga színű) és a harmadik (kék színű) példányt a gyógyszertár vezetője megküldi a gyógyszertári központ gyógyszerraktárának. A gyógyszertári központ gyógyszerraktára a sárga színű példányt visszatartja, a kék színű példányon pedig feltünteti a leszállított kábítószerek mennyiségét és azt igazolásával ellátva visszaküldi a közforgalmú gyógyszertárnak.

(3) Ha a leszállított kábítószerek mennyiségében eltérés mutatkozik, erről három példányban jegyzőköny-

vet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az észlelt mennyiségi eltérésre vonatkozó adatokon felül a csomagoláson feltüntetett adatokat (pl. a gyártó, esetleg a forgalombahozó nevét, a gyártási számot, a csomagoló és az ellenőr nevét, az esetleges vizsgálati számot) is. A jegyzőkönyv egy példányát a gyógyszertárban kell őrizni, két példányát pedig meg kell küldeni a gyógyszertári központnak a szükséges intézkedés megtétele végett.

12. §

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban a beszerzett, valamint a kiadott kábítószerekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) A közforgalmú gyógyszertárban minden kábítószernek minősülő anyagról és készítményről az erre a célra rendszeresített kábítószernyilvántartási lapot kell kiállítani. A különféle hatáserősségben forgalomba kerülő, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó, kábítószernek minősülő törzskönyvezett gyógyszerkészítményekről külön-külön kábítószer-nyilvántartási lapot kell kiállítani.

(3) A kábítószer-nyilvántartási lap „bevétel" részében a megrendelőlap sorszámát és a bevételezés időpontját, valamint a bevételezett anyag (készítmény) mennyiségét kell feltüntetni. A kábítószer-nyilvántartási lap „kiadás" részében — vényenként külön-külön tétel alatt — a vény sorszámát és a kiadott kábítószer mennyiségét kell bevezetni. A kábítószert tartalmazó törzskönyvezett gyógyszerkészítményeknél mind a „bevétel", mind a „kiadás" részben nem a gyári csomagolások számát, hanem az adagolási egységek (tabl., amp. stb.) darabszámát kell feltüntetni.

(4) A kábítószer-nyilvántartási lapokat minden naptári év végével le kell zárni. A bevétel és a kiadás között egyenleget kell vonni. A kábítószer-nyilvántartási lapon mutatkozó zárókészletet a következő naptári évben mint nyitókészletet kell a kábítószernyilvántartási lap „bevétel" részében — az előző évi adatoktól megfelelően elkülönítve (egy sor kihagyásával) — feltüntetni. Az előző évi kiadások lezárása után a következő évi kiadásokat új oszlopba kell bevezetni.

13. §

A kábítószereket erős falú és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy fiókban kell tartani. Szükség esetében a kábítószerek a kétkeresztes szerekkel közös szekrényben is tárolhatók, de csak külön polcon vagy fiókban.

14. §

(1) A közforgalmú gyógyszertárakban a kábítószerek kezelésével járó anyagveszteség (porlódás, száradás, bepárolgás stb.) címén — a jelen utasítás alkalmazása szempontjából — porok esetében legfeljebb 5%, folyadék esetében legfeljebb 10% számolható el.

(2) Ha a közforgalmú gyógyszertár kábítószerkészletének ellenőrzésekor valamely kábítószer készletében az (1) bekezdésben meghatározott kálón (a továbbiakban: káló) felüli hiány mutatkozik, erről négy példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzést végző kiküldött veszi át, két példányát a gyógyszertár vezetője köteles megküldeni a gyógyszertári központnak, egy példányát pedig a gyógyszertárban kell megőrizni. A gyógyszertári központ a jegyzőkönyv egy példányát megküldi a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának.

(3) Ha közforgalmú gyógyszertár kábítószerkészletének ellenőrzésekor a Tinctura opii, a Pulvis opii és az Extractum opii kábítószerekből kálón felül hiány nem mutatkozik, a *10.* § (2) bekezdése alapján visszatartott vényekre kiadott kábítószerek mennyiségét a kábítószer-nyilvántartási lapokra rávezetni nem kell és a visszatartott vényeket az ellenőrző közeg jelenlétében meg kell semmisíteni. Ha pedig ezekből a kábítószerekből kálón felüli hiány mutatkozik, a *10.* § (2) bekezdése alapján visszatartott vényekre kiadott kábítószerek mennyiségét egy tételben a kábítószer-nyilvántartási lapokra pótlólag rá kell vezetni és a visszatartott vényeket egy sorszámmal ellátva a *10.* § (1) bekezdésében megállapított rendelkezés szerint két évig meg kell őrizni. Amennyiben az említett kábítószerekből a visszatartott vények alapján kiadott kábítószerek mennyiségének a kábítószer-nyilvántartási lapokra rávezetése után is kálón felüli hiány mutatkozik, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés szerint kell eljárni.

15. §

(1) Ha a kábítószer kezelése, tárolása közben a kábítószer mennyiségében bármely okból (törés, kiszóró-

dás stb. miatt) veszteség (hiány) állott elő, a közforgalmú gyógyszertár vezetője köteles arról három példányban jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kiszóródott, használhatatlanná vált vagy megsemmisült kábítószer nevét és mennyiségét, a veszteség bekövetkezésének körülményét és időpontját. A jegyzőkönyv két példányát a gyógyszertár vezetője megküldi a gyógyszertári központnak, amely az egyik példányt a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályához továbbítja.

(2) A megsemmisült kábítószer mennyiségét a vonatkozó kábítószer-nyilvántartási lapon a „kiadás" részben fel kell tüntetni, a jegyzőkönyvnek a gyógyszertárban visszatartott példányát pedig — mint kiadási bizonylatot — a megfelelő sorszámmal ellátva a vények közé kell helyezni.

(3) A használhatatlanná vált (meg nem semmisült) kábítószert össze kell gyűjteni és mint selejtanyagot megsemmisítésig a kábítószerszekrényben elkülönítve meg kell őrizni.

16. §

Ha a közforgalmú gyógyszertár bármely okból (pl. a forgalomból történő kivonás miatt) a gyógyszertári központ gyógyszerraktárának kábítószert küld vissza, vagy egy másik gyógyszertárnak kábítószert ad át, a továbbítandó kábítószerekről három példányban szállítójegyzéket kell kiállítani. A szállítójegyzék két példányát a küldeményhez kell mellékelni, amelyek közül az egyiket az átvevő az átvétel igazolásával köteles a gyógyszertárnak visszaküldeni. A szállítójegyzékeket a kábítószer-nyilvántartási lap kiadási, illetőleg bevételezési bizonylatként meg kell őrizni.

A gyógyintézeteknek kábítószerekkel való ellátása; a gyógyintézetekben a kábítószerek nyilvántartása, kezelése és elszámolása

17. §

(1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógyszerész által vezetett gyógyszerraktárral rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetekben — ide nem értve az egyetemi klinikákat — a kábítószer-felelős az intézeti gyógyszertár, illetőleg a gyógyszerraktár vezetője. Az egyetemi klinikákon a kábítószer-felelős a klinika gyógyszerfelelős orvosa. Az egyéb fekvőbeteg-gyógyintézetekben az intézet vezetője köteles kábítószer-felelős orvost kijelölni.

(2) A kábítószer-felelős feladata a kábítószerek beszerzése iránti intézkedés, a beszerzett kábítószerek nyilvántartása és gondoskodás arról, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézetben a kábítószerek kezelése, tárolása, a betegekhez való eljuttatása és elszámolása a jelen utasítás rendelkezései szerint történjék.

(3) A kábítószer-felelős köteles évenként legalább egyszer a fekvőbeteg-gyógyintézet valamennyi fekvőbetegosztályán a kábítószerek kezelését (tárolását) és nyilvántartását (elszámolását) ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a kábítószer-nyilvántartási lapokon az időpont feltüntetésével és aláírásával igazolnia kell.

18. §

(1) Az intézeti gyógyszertár a kábítószereket a Gyógyáruértékesítő Vállalattól vagy a gyógyszertári központ gyógyszerraktárától szerzi be. A beszerzésre a *11.* § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) Az intézeti gyógyszertárral nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézet a betegellátáshoz szükséges kábítószereket a Gyógyáruértékesítő Vállalattól, a gyógyszertári központ gyógyszerraktárától, közforgalmú gyógyszertárból vagy intézeti gyógyszertárból szerzi be. A kábítószernek a Gyógyáruértékesítő Vállalattól vagy a gyógyszertári központ gyógyszerraktárától való beszerzésére a *11.* § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. A kábítószernek közforgalmú vagy intézeti gyógyszertárból való beszerzése a szükséges példányszámban kiállított megrendelőlappal történik. A megrendelőlapon fel kell tüntetni a fekvőbeteg-gyógyintézet megnevezését, a rendelés keltét, valamint az *1.* § (4)—(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint a rendelt kábítószert. Az aláírt megrendelőlapot el kell látni a fekvőbeteg-gyógyintézet bélyegzőjének lenyomatával.

(3) Ha a leszállított kábítószerek mennyiségében eltérés mutatkozik, értelemszerűen a *11.* § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint kell eljárni.

(4) A gyógyintézet betegellátó osztálya kábítószer

igénylése esetében az orvos az igénylő lapon az *1.* § (4)—(6) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles a kábítószert feltüntetni.

19. §

A kábítószereknek az intézeti gyógyszertárakban, a gyógyszerraktárakban és a fekvőbeteg-gyógyintézetek fekvőbeteg-osztályain történő kezelésére (tárolására) és nyilvántartására (elszámolására), valamint a kezelés és a nyilvántartás ellenőrzésére az egészségügyi intézmények gyógyszerkészleteinek nyilvántartására és elszámolására vonatkozó rendelkezések az irányadók az alábbi *20.* § és *21.* §-ban foglalt kiegészítésekkel.

20. §

Az intézeti gyógyszertárakban kábítószerek kezelésével járó anyagveszteség (porlódás, szóródás, bepárolgás stb.) címén — a jelen utasítás alkalmazása szempontjából — porok esetében legfeljebb 3%, folyadék esetében pedig legfeljebb 8% számolható el.

21. §

(1) Az intézeti gyógyszertárral vagy gyógyszerész által vezetett gyógyszerraktárral nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben a beszerzett, valamint a fekvőbeteg-osztályoknak átadott kábítószereknek gyógyszernyilvántartó lapon történő nyilvántartásáról a kábítószerfelelős orvos gondoskodik.

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézetek egyes fekvőbeteg-osztályain a gyógyszerfelelős orvos kezeli a kábítószereket és gondoskodik az osztálynak kiadott kábítószerek nyilvántartásáról.

22. §

(1) Az Országos Mentőszolgálat kórházánál és mentőállomásainál a *17—21.* §-okban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni az alábbi bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel.

(2) A kábítószereket a megyei mentőállomások a megyei vezető mentőállomástól, a megyei vezető mentőállomások és a budapesti mentőállomások az Országos Mentőszolgálat központi raktárától igénylik, az erre a célra rendszeresített „Igénylés" c. űrlappal.

(3) Az Országos Mentőszolgálat központi raktárának kábítószer-ellátására a *18.* § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.

23. §

(1) A járóbetegellátás intézményei (rendelőintézet, üzemi orvosi rendelő stb.) a betegellátáshoz szükséges kábítószereket — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — „pro ambulancia" gyógyszerigénylő könyvvel szerzik be. A rendelvényt — másolópapír alkalmazásával — annyi példányban kell kiállítani, hogy két példány a kábítószer kiadásakor a gyógyszertárban maradhasson. A rendelvényen fel kell tüntetni az intézmény nevét és pontos címét, a rendelés keltét, a rendelt kábítószer nevét, valamint az *1.* § (4)—(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint a kábítószer mennyiségét és az adagszámot. Az aláírt rendelvény valamennyi példányát el kell látni az intézmény hivatali bélyegzőjének lenyomatával.

(2) A fekvőbeteg-gyógyintézet járóbeteg-szakrendelése, valamint a kórház-rendelőintézeti egységben működő rendelőintézet a kábítószert olyképpen szerzi be, mint a fekvőbeteg-gyógyintézet fekvőbeteg-osztálya.

(3) A beszerzett és a betegellátáshoz felhasznált kábítószerekről nyilvántartást kell vezetni.

24. §

Az intézeti gyógyszertárakban, a fekvőbeteg-gyógyintézetek gyógyszerraktárában és fekvőbeteg-osztályain, valamint a járóbetegellátás intézményeiben a kábítószereket zárható szekrényben, a többi gyógyszerektől elkülönítetten kell tartani.

25. §

A fekvőbeteg-gyógyintézeteknél és a járóbetegellátás intézményeinél a *14.* § (2) bekezdésében, a *15.* §-ban és *16.* §-ban foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell.

26. §

A *17—21.* §-okban és a *23—25.* §-okban foglalt rendelkezések értelemszerűen kiterjednek az állategészségügyi intézményekre is.

27. §

(1) A kábítószerek selejtezését a közforgalmú és az intézeti gyógyszertárakban, továbbá a fekvőbeteg-gyógyintézetekben és a járóbetegellátás intézményeiben, valamint az állategészségügyi intézményekben a szakmai szempontok figyelembevételével folyamatosan kell végezni.

(2) A selejtezett kábítószereket — ideértve a lejárt gyógyszereket is — azok megsemmisítéséig a többi kábítószerrel egy szekrényben, de azoktól megfelelően elkülönítve kell megőrizni.

(3) A selejtezett kábítószereket évenként egy alkalommal kell megsemmisíteni. A megsemmisítésnél jelen kell lennie az intézmény vezetőjének (helyettesének) és a területileg illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztálya által megbízott szakközegnek (pl. gyógyszertári központ szakközege).

(4) A selejtezett kábítószerek megsemmisítéséről megfelelő példányszámban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megsemmisítés időpontját, a megsemmisített kábítószerek nevét és mennyiségét, valamint a megsemmisítés módját.

(5) A jegyzőkönyv egy példányát az intézménynél meg kell őrizni, egy példányát pedig meg kell küldeni a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának.

(6) A megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztálya a beérkezett jegyzőkönyvek alapján a tárgyévben megsemmisített kábítószerekről három példányban tételes kimutatást készít. A kimutatásban intézményenként kell feltüntetni a megsemmisített kábítószerek nevét és mennyiségét. A kimutatás egy példányát a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályánál meg kell őrizni, két példányát pedig legkésőbb a tárgyévet követő év február hó 1. napjáig meg kell küldeni az Egészségügyi Minisztériumnak.

28. §

Kézigyógyszertárban kábítószert készletben tartani nem szabad.

29. §

(1) A gyógyszerminta-vételezésre jogosult szervek igazolt szakközegeik útján ellenőrzés céljából a kábítószerekből mintát vehetnek. A mintavétel megfelelő elismervény ellenében történik.

(2) A kábítószerekből vett mintákat zárható helyen, a többi gyógyszermintától elkülönítve kell megőrizni. Megsemmisítésükre a *27.* § (3)—(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadók.

30. §

(1) A közforgalmú és az intézeti gyógyszertárakban, a fekvőbeteg-gyógyintézetekben, a járóbetegellátás intézményeiben és az állategészségügyi intézményekben a kábítószerek beszerzésére, kiadására és nyilvántartására vonatkozó minden iratot, valamint a leszállított kábítószerek mennyiségében mutatkozó eltérésről, a kábítószerkészlet ellenőrzésekor a kálón felüli hiányról és a kábítószerek megsemmisítéséről készített jegyzőkönyveket két évig meg kell őrizni.

(2) Az orvosi vények, valamint a *15.* § (2) bekezdésében említett jegyzőkönyv megőrzésére a *10.* §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

31. §

(1) A gyógyszertár, a fekvőbeteg-gyógyintézet, a járóbeteg-ellátó intézmény és az állategészségügyi intézmény vezetője abban az esetben, ha alapos gyanú merült fel arra, hogy kábítószerrel visszaélés történt, köteles erről a Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti Osztályát (Budapest VIII., Mosonyi utca 9.) és a területileg illetékes megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályát haladéktalanul értesíteni.

(2) A megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztálya köteles az intézmények kábítószerkészletében bármely okból bekövetkezett hiányokról tett bejelentéseket megvizsgálni és visszaélés gyanúja esetében erről a Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti Osztályát értesíteni.

32. §

(1) Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététele napján lép hatályba.

(2) Az 5/1957. (XII. 14.) Eü. M. számú rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 2/1958. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú utasítás, a kábítószerszállítási engedélyek tárgyában kiadott 183.061/1959. Eü. M. számú utasítás, a 2/1958. (Eü. K. 1.) Eü. M. számú utasítás módosításáról szóló 13/1960. (Eü. K. 7.) Eü. M. számú és 29/1963. (Eü. K. 18.) Eü. M. számú utasítások, valamint a 85.289/1959. Eü. M. számú és 113/1956. (Eü. K. 2.) Eü. M. számú utasításnak a kábítószerekre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik.

KÜLFÖLDI GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK RENDELÉSE

Az egészségügyi miniszter 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasítása az importált gyógyszerkülönlegességek rendeléséről és kiszolgáltatásáról

A közlekedés- és postaügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) Az utasítás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt külföldi gyógyszerkülönlegességek a társadalombiztosítás szolgáltatásaira jogosultak részére másolattal (két példányban) kiállított vényen, a 3. számú mellékletben felsorolt külföldi gyógyszerkülönlegességek pedig másolat nélküli vényen rendelhetők. Az 1. és 2. számú mellékletben megjelölt gyógyszer rendelése esetében a vény másolati példányára rá kell vezetni a „másolat" jelzést.

(2) A mellékletben „○" jelzéssel ellátott gyógyszerkülönlegességek a társadalombiztosítás terhére csak fekvőbeteg-gyógyintézet vagy szakrendelés javaslata alapján rendelhetők.

(3) Az 1—3. számú mellékletekben felsorolt külföldi gyógyszerkülönlegességnek magánvényen történő rendelésekor a vényen fel kell tüntetni a beteg nevét, lakcímét és a diagnózist.

2. §

(1) Az 1. számú mellékletben felsorolt gyógyszerkülönlegességeket a külföldi gyógyszerek tartására kijelölt közforgalmú gyógyszertárak, a 2. számú mellékletben felsorolt gyógyszerkülönlegességeket mind Budapesten, mind a vidéken lakó betegek részére csak a fővárosi 703. számú (Budapest VII., Rákóczi út 86.) gyógyszertár adja ki. A gyógyszertár köteles a vények másolati példányait, valamint a magánvényeket visszatartani és két évig megőrizni.

(2) A 3. számú mellékletben felsorolt gyógyszerkülönlegességek bármelyik közforgalmú gyógyszertárból beszerezhetők.

3. §

Az utasítás mellékleteinek szükség szerinti módosítását vagy kiegészítését az Egészségügyi Minisztérium az Egészségügyi Közlönyben közleményként teszi közzé.

4. §

A kizárólag csak gyógyintézetekben alkalmazható külföldi gyógyszerkülönlegességeket, valamint azokat a külföldi gyógyszereket, amelyek a jelen utasítás mellékleteiben nem szerepelnek, kórházi (klinikai) zárójelentésben utókezelésre javaslatba hozni nem szabad.

5. §

Ez az utasítás az Egészségügyi Közlönyben történt közzététel napján lép hatályba; egyidejűleg a külföldről importált gyógyszerkülönlegességek rendelése és kiszolgáltatása tárgyában kiadott 10/1961. (Eü. K. 5.) Eü. M. számú utasítás és az azt kiegészítő 34/1961. (Eü. K. 16.) Eü. M. számú utasítás, valamint az utasítás mellékleteinek módosítása és kiegészítése tárgyában kiadott közlemények hatályukat vesztik.

A kijelölt gyógyszertárakban beszerezhető külföldi gyógyszerek jegyzéke

1. számú melléklet a 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasításhoz

Ambinon amp. 1×300 NE + 1×3 ml solvens
○ Ammifurin tabl. 100×0,2 g + sol. 2% 30 ml
○ Anturan tabl. 50×100 mg
○ Avlosulfon tabl. 50×0,05 g
○ Brinaldix tabl. 20×20 mg (bontható)
○ Cyclophosphamid drg. 50×50 mg
○ Cytonal inj. 5×5 ml 250 mg
○ Di-Adreson „F" aquos. amp. 3×25 mg + 3×1 ml solvens
Dilombrin drg. 15×50 mg
Doca subling tabl. 40×1 mg
Euspiran aerosol 13 ml
○ Furosemid tabl. 20×40 mg (bontható)
○ Gestanon tabl. 20×5 mg
Gestyl amp. 3×1000 E + 3×1 ml solvens
○ Glyvenol drg. 20×200 mg
Jopagnost tabl. 6×0,5 g
○ Locacorten N kenőcs 15 g
○ Metindol kapsz. 30×25 mg
○ Mexaform tabl. 20×
○ Mexase dr. 20×
○ Mycerin sulfat (Neomycin) inj. 1×500 mg = = 500 000 E
○ Myleran tbl. 50×0,5 mg
○ Oleandomycin phosphate tabl. 25×25 mg
○ Oletetrin tabl. 25×125 mg
Orga-Steron tabl. 10×5 mg
Orga-Steron tabl. 20×1 mg
Ovestin susp. pro inj. 2×1 mg 1 ml
Ovestin tabl. 20×250 gamma
Panthenol inj. 5×500 mg 2 ml
Pilocarpin szemolaj 2% 10 ml
○ Polcortolone tabl. 30×4 mg
Pitressin Tannate in oil inj. 5 NE 10×1 ml
Protaminsulfat inj. 1% 5 ml
Sandosten drg. 20×25 mg
Sandosten Calcium inj. 10% 5×10 ml
Salazopyrin tabl. 50×0,5 g

○ Tetraolean inj. i. musc. 1×100 mg
○ Tetraolean inj i. ven. 1×250 mg
○ Tavegyl tabl. 20×1 mg
Topostasin 1×3000 E amp.
○ Tosmilen szemcsepp 1% 5 ml
○ Trasicor tabl. 40×20 mg (bontható)

1. számú melléket a 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasításhoz

○ Acecoline inj. 8×100 mg
○ Adreson tabl. 20×25 mg
○ Allergenum pollinare mixtum I—III. 1—10 000 PNU
Colchicin salicylat tabl. 15×0,5 mg
○ Cotazym forte tabl. 30×
○ Deseril drg. 20×1 mg
○ Eppy szemcsepp 1% 7,5 ml
○ Erythromycin Lactobionat inj. i. ven. 1×300 mg
Ferrlecit inj. i. ven. 5×5 ml (à. 62,5 mg Fe III.)
Isolevin spray 10 ml
○ Jectofer inj. i. musc. 5×2 ml (à. 100 mg Fe III.)
○ Kemadrin tabl. 50×5 mg
Konakion tabl. 20×10 mg
○ Leukeran tabl. 50×5 mg
○ Locacorten Tar kenőcs 60 g
○ Mestinon drag. 20×60 mg
○ Methotrexate tabl. 20×2,5 mg
○ Mintezol tabl. 20×250 mg (bontható)
○ Mintezol susp. 15 ml
○ Mytelase chloride tabl. 30×10 mg
○ Oradexon tabl. 20×0,5 mg
○ Orgametril tabl. 30×5 mg (lásd a megjegyzést a felsorolás végén)
○ Ospolot tabl. 50×200 mg (bontható)
○ Otosporin fülcsepp 5 ml
○ Pimafucin vaginalis tabl. 20×25 mg
○ Pimafucort kenőcs 15 g
○ Polymixin B sulf. inj. 1×50 mg
○ Prophyledta tabl. 50×1 g
Prostigmin szemcsepp 3% 7,5 ml
○ Raveron inj. 10×1 ml
○ Salazopyrin EN tabl. 50×0,5 mg
○ Salazopyrin kúp 10×
○ Sanocrysin inj. 1×50 mg

○ Sanocrysin inj. 1×250 mg
○ Sigmamycin csepp gyermekeknek 10 ml 100 mg/ml
○ Solcoseryl kenőcs 5% 20 g
○ Solganal B oleosa inj. 2% 5 ml
○ Solganal B oleosa inj. 20% 3 mg
○ Spironolactone tabl. 20×25 mg (bontható)
Strophosid inj. 6×0,25 mg 1 ml
○ Tace tabl. 50×24 mg
○ Tegretol tabl. 50×200 mg (bontható)
○ Thyranon drg. 100×100 mg (bontható)
○ Tremaril tabl. 20×5 mg
○ Yomesan tabl. 4×0,5 g
○ Zyloric tabl. 50×100 mg

3. számú melléklet a 60/1968. (Eü. K. 22.) Eü. M. számú utasításhoz

Aescusan liquid 20 ml
Chloracizin tabl. 30×
Cholagol sol. 10 ml
Cystenal sol. 10 ml
Dibiomycin szemkenőcs 3 g 100 000 E/g
Elenium tabl. 20×5 mg
Erythromycin tabl. 10×100 000 E-100 mg,
10×200 000 E-200 mg
Euspiran sol. 25 ml
○ Mycerin (Neomycin) tabl. 10×250 000 E
○ Polymyxin sulfate „M" tabl. 20×100 000 E
○ Polymyxin sulfate „M" tabl. 20×500 000 E
Neoeserin szemkenőcs 3% 10 ml
Panthenol tabl. 20×100 mg
Procainamid tabl. 20×250 mg
○ Psoriazin kenőcs 25 g
Sarcolysine tabl. 20×10 mg
Shostakovsky balzsam 100 g
Tachystin sol. oleos. 0,5 % 15 ml
Tryphtazin tabl. 20×5 mg

A 2. sz. mellékletben szereplő Orgametril tabl.-t kizárólag nőgyógyászati szakrendelések rendelhetik terápiás célra, valamint kórházi vagy klinikai javaslatra a belgyógyászati szakrendelések (belgyógyász csoportvezető főorvos) vérző, vagy vérzékeny, súlyosan thrombocytopenias nőbetegek részére. A diagnózist a vényen fel kell tüntetni.

SACCHARIN

116/1951. (VIII. 28.) Eü. M. számú rendelet a mesterséges édesítőszerek (saccharin) rendelésének és kiszolgáltatásának újabb szabályozása tárgyában

Egészségügyi Jogszabályok Gyűjteménye II. k. 759. és V. k. 230. oldal.

(2) A gyógyszertárak saccharint orvosi rendelvény nélkül szolgáltathatnak ki.

2. § (1) A dolgozók egészségügyi ellátására [139/1950. (V. 14.) M. T. számú rendelet] létesített állami egészségügyi szolgálat orvosai a betegség esetére biztosítottak és igényjogosult családtagjaik részére saccharint — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a társadalombiztosítás terhére nem rendelhetnek.

(2) A táplálkozási ártalmakban szenvedő csecsemők részére, valamint az egyes gyógyszerek ízjavítására szükséges saccharint az állami egészségügyi szolgálat orvosai a társadalombiztosítás terhére továbbra is rendelhetik.

SPIRITUS VINI

3406/A/20/1951. VII/1. sz. rendelet
Megjelent az „Orvosi Értesítő" 1951. 4. májusi számában

Közöljük, hogy
spiritus vini concentratissimus,
spiritus vini concentratus,
spiritus vini dilutus,
továbbá „alcohol cum benzino" sterilizált műszerek (fecskendő, injekciós tűk) eltartása céljából SZTK-vényen sem beteg nevére, sem orvosi rendelő részére nem rendelhető. Az insulin-ellátásban részesülő betegeket tájékoztatni kell, hogy az alcohol az insulint kicsapja, ezért az insulinnak alcoholban tartott fecs-

kendővel beadása helytelen és hogy megfelelő időnként kifőzéssel sterilizálják a fecskendőjüket, injekciós tűjüket.

Szakrendelések és körzeti orvosok e szereket a fenti célra csakis a havi „pro amb." igénylésük keretében igényelhetik.

E rendelkezés betartásáért az orvosok fegyelmileg és anyagilag is felelősek.

PÓTLÁSOK

Az egészségügyi miniszter 4/1971. (Eü. K. 3.) Eü. M. számú utasítása a **Bisecurin** *elnevezésű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendeléséről és kiadásáról.*

A Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1 §.

A Bisecurin elnevezésű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény (a továbbiakban: Bisecurin) kizárólag fogamzásgátlás céljából alkalmazható.

2 §.

A Bisecurin rendelésére és kiadására az Infecundin nevű törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelésének és kiszolgáltatásának engedélyezéséről szóló 9/1967. (Eü. K. 8.) Eü. M. számú utasítás és az ezt módosító 36/1968. (Eü. K. 13.) Eü. M. számú utasítás rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a gyógyszerkészítményt gyógykezelés céljára rendelni nem szabad.

*

ANTAETHYL Ch. tabl. (Rendelhetőség módosítása)

Társadalombiztosítás terhére csak az esetben rendelhető, ha az Antaethyl-lel történő elvonókúrát

fekvőbeteg-gyógyintézeti elme-, idegosztály vagy az illetékes egészségügyi szakigazgatási szerv által Antaethyl beállítására felhatalmazott alkoholelvonó-rendelés állította be és a rendszeresen szükséges ellenőrzést alkoholelvonó rendelés vagy idegbeteg-gondozó intézet vállalta. Erről a kezelés alatt álló személy részére igazolást kell kiállítani. Körzeti-, üzemi stb. orvos a vényen köteles feltüntetni, hogy a szükséges ellenőrzést melyik alkoholelvonó rendelés vagy idegbeteg-gondozó intézet vállalta.

*

MYELOBROMOL Ch. tabl. (Adagolás kiegészítése)

Adagolás *polycythaemia vera esetén:* első kezeléskor a remissio eléréséhez szükséges átlagos adag felnőtteknek naponta 1 tabletta (250 mg) kúraszerűen kb. 40 napon át. Későbbiekben a megismételt kezelések során napi 1 tabletta bevételével, a remissio eléréséhez szükséges átlagos kezelési idő már kb. 33 napra tehető.
A kezelések során elért teljes remissio hónapokig, esetleg évekig is változatlanul fennállhat anélkül, hogy közben fenntartó adagolásra szükség volna.

BRINALDIX E.Gy.T. — Sandoz XXV. tabl.

Összetétel: 1 tabl. 20 mg clopamidumot tartalmaz.
Javallatok: Különböző eredetű oedemás állapotok (szívelégtelenség okozta, terhességi, nephrosisos, postthrombotikus oedemák, májcirrhosis okozta ascites). Praemenstruatiós panaszok és elhízás eseteiben. Hypertoniában egyedül vagy más vérnyomáscsökkentőkkel kombinálva. Tartós corticosteroid-kezelés okozta folyadék-retentió.
Ellenjavallatok: Fennálló hypokalaemia, hyponatraemia, hypochloraemia. Acut glomerulonephritis, uraemia, súlyos vesekárosodás.

Adagolás: Adagolása gondos orvosi ellenőrzés mellett egyéni megítélést igényel. Átlagos adagja felnőtteknek naponta 1—2 tabletta reggel étkezés után. Az adag szükség esetén 3 tablettára emelhető. Fenntartó adagja másodnaponként 1 tabletta, esetleg naponta ½—1 tabletta.
Mellékhatások: Alkalmazása során nemkívánatos mellékhatásként nausea, fejfájás, gastrointestinalis panaszok, bőrpír, enyhe fáradságérzés előfordulhat. Bár a káliumveszteség csekély, hosszantartó kezelés — májbetegség, diabetes — esetében tanácsos a káliumszintet, illetve a vércukrot és a napi cukorürítést ellenőrizni.
Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti-, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik a javaslatban meghatározott időtartamon belül történő gyógykezelés céljából. A javaslatot adó szakrendelést (osztályt) és a javaslat keltét a vényen fel kell tüntetni.
Csomagolás: 15 tabl. 45,50 Ft, 100 tabl. 290,— Ft.

TAVEGYL E.Gy.T. — Sandoz XXXVIII. tabl.

Összetétel: 1 tabl. 1 mg 1-methyl-2-[2-(α-methyl-p-chlordiphenyl-methyloxy)-aethyl]-pyrrolidin.-ot tartalmaz hydrogenfumarat alakjában.
Javallatok: Akut és krónikus allergiás folyamatok, felső légúti allergiás megbetegedések: rhinitis allergica, rhinitis vasomotorica, pollenosis. Asthma bronchialeban a kísérő tünetek (nyálkahártya-visszketés) enyhítésére adható. Akut és krónikus urticaria, pruritus, allergiás bőrmegbetegedések, gyógyszer- és alimentaris exanthemák, kontakt-dermatitis, neurodermatitis, allergiás dermatosisok, nem specifikus bőr-affectiók. Adjuvánsként akut és krónikus ekzemák kezelésekor.
Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek általában reggel és este 1—1 tabletta. A napi adag szükség esetén 3—4 tablettára is emelhető.
Gyermekeknek 6—12 éves korig a szokásos adag reggel és este ½—½ tabletta.

Mellékhatások: Érzékeny egyéneken nagyobb napi adagok alkalmazása esetén nemkívánt hatásként: fáradtság, somnolentia, fejfájás, vertigo, nausea, mérsékelt gyomorpanaszok, szájszárazság, obstipatio jelentkezhetnek. — A szokásosnál nagyobb napi adagok alkalmazása esetén a betegek figyelmét az esetleges nemkívánt hatásokra fel kell hívni. Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért pl. járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak az orvos által — az egyéni érzékenységnek megfelelően — előírt adagban szedhetik. Gépkocsivezetőknek, gépen, veszélyes munkahelyen dolgozóknak napi 2×1 tablettánál nagyobb adaggal történő kezelése nem ajánlatos. — Tavegyl-kúra alatt alkohol fogyasztása tilos.

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik. *A vényt két példányban (másolattal) kell kiállítani.*

Csomagolás: 20 tabl. 66,20 Ft, 200 tabl. 638,— Ft.

TORECAN E.Gy.T. — Sandoz XXIII.
drazsé, végbélkúp, inj.

Összetétel: 1 drazsé 6,5 mg thiethylperazin.-ot; 1 végbélkúp 6,5 mg thiethylperazin.-ot, 1 amp. (1 ml) 6,5 mg thiethylperazin.-ot tartalmaz.

Javallatok: Mindenfajta émelység és hányás: postoperatív-hányinger és hányás, endo- és exotoxikus állapotok (uraemia, gyógyszer-intoxicatio, gastrointestinalis betegségek, malignus tumorok, májbetegségek, cholecystopathia), hyperemesis gravidarum, radiotherapiát követő nausea és vomitus, otolaryngologiai kórképek, egyéb szerekre refractaer Menière-syndroma, különböző eredetű vertigo (posttraumás szédülés, arteriosclerosis, migraine stb.), utazási betegségben prophylactikusan.

Ellenjavallatok: Minden depressiv és comatosus állapot.

Adagolás: Szokásos adagja felnőtteknek naponta 1—3 drazsé, ill. végbélkúp, súlyosabb esetekben 1 amp. i. musc. vagy i. ven. Fekvőbeteg-gyógyintézetekben szükség esetén naponta 3 amp. is adható.

Postoperatív hányás megelőzésére legcélszerűbb a műtét előtt 1 inj.-t beadni; szükség esetén a műtét után az adag megismételhető. A műtét előtti este a szokásos praemedicatio mellett 1 drazsé vagy végbélkúp adható. Hyperemesis gravidarum kezelésére naponta 3×6,5 mg oralisan vagy rectalisan, súlyos esetben naponta 1—2 inj. i. musc.
Kinetosis megelőzésére prophylactikusan 1 drazsé vagy kúp.
Gyermekek *Torecan*-kezelése 15 éves kor alatt nem kívánatos.

Mellékhatások: Nagyobb adagok és hosszan tartó kezelés után extrapyramidalis jelenségek (excitomotoros syndroma, pseudoparkinsonismus) léphetnek fel. Ha az extrapyramidalis jelenségek spontán nem fejlődnek vissza, megfelelő antiparkinsonszerekkel, antihistaminicumokkal, barbiturat-származékokkal és coffeinnel kezelendők. Az extrapyramidalis jelenségeken kívül nemkívánt hatásként általános sedatív effectus, lehangoltság, tachycardia, hypotonia, szédülés, álmatlanság, szájszárazság, gyomorpanaszok, nicotinintolerantia, bőrjelenségek, thrombopenia jelentkezhet. — Alkalmazása fokozott elővigyázatosságot igényel, ezért pl. járművezetők, magasban vagy veszélyes gépen dolgozók csak az orvos által — az egyéni érzékenységnek megfelelően — előírt adagban szedhetik.

Megjegyzés: + Az inj. társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. A drazsét vagy végbélkúpot társadalombiztosítás terhére szakrendelések szabadon rendelhetik. Körzeti, üzemi stb. orvosok csak szakrendelés (fekvőbeteg-gyógyintézet) javaslatára rendelhetik.

Csomagolás: 15 tabl. 25,50 Ft, 100 tabl. 154,— Ft;
6 db végbélkúp 13,30 Ft;
6×1 ml 16,40 Ft, 50×1 ml 125,40 Ft.

XAVIN Ch. XVI.
inj., tabl.

Összetétel: 1 amp. (2 ml) 300 mg xanthinolum nicotic.-ot; 1 tabl. 150 mg xanthinolum nicotinic.-ot tartalmaz.

peripheriás angiosclerosis, claudicatio intermittens, angiopathia-, retinopathia- és gangraena diabetica, Raynaud-kór, thrombosisok, emboliák. — Sudeck-syndroma, ulcus cruris és egyéb trophikus zavarok, thrombophlebitis, acrocyanosis, erythema induratum Bazin. — Cerebrosclerosis, cervicalis-syndroma, arteriitis temporalis, Menière-syndroma. Agyi vascularis történések esetén csak szakorvosi javallat alapján.

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi és duodeni, haemorrhagiás diathesis. Mitralstenosis fenyegető vagy kialakult jobb-szív elégtelenséggel. Labilis eredetű hypertonia esetében az injekció alkalmazásától tartózkodjunk, mert collapsushoz vezethet.

Más vérnyomáscsökkentők, különösen ganglionblokkolók és sympatholyticumok adagolását a kezelés megkezdése előtt abba kell hagyni, hogy a készítmény vérkeringést szabályozó hatását ne gátolják.

Ellenjavallt minden olyan gyógyszeres kombináció, amely a perfúziós nyomás csökkenésére vezetne.

Adagolás: Átlagos kezdeti adagja felnőtteknek naponta 2—3-szor 1 tabletta, amelyet kevés folyadékkal egészben kell lenyelni. Szükség esetén az átlagos adag naponta 3-szor 2—4 tablettára is növelhető, a beteg állapotának gondos ellenőrzésével. Későbbiek során a klinikai állapot javulásával elégséges, ha a kezelést az egyénenként megállapított — naponta 2—3-szor 1 tabletta — fenntartó adagokkal folytatjuk.

Heveny vérellátási zavarok esetén az injekciós kezelést részesítjük előnyben. A kívánt hatás szükségességének megfelelően felnőtteknek naponta 1—3-szor 2 ml i. musc., azonnali hatás elérésére i. ven. 1—2-szer 2 ml igen lassú befecskendezésével, lehetőleg fekvő helyzetben, majd naponta 1—3-szor 2 ml i. musc.

Az injekciós kezelés hatásának fokozására egyidejűleg naponta 3-szor 2 tablettát is adagolhatunk. Az injekciós kezeléssel elért eredményt az egyénenként megállapított fenntartó adagokkal (napi 2—3-szor 1 tabl.) hosszabb ideig biztosíthatjuk. A tabletták bevétele, vagy az injekciók befecs-

más testrészeken, a készítmény rövid ideig tartó, égő érzéssel járó kipirulást okozhat.

Súlyos esetek klinikai kezelésére előnyösen alkalmazható a tartós cseppinfúzió, amikor 5-ször 2 ml-es ampulla tartalmát (1500 mg) 500 ml infúziós oldathoz elegyítjük. Az infúziós oldatot olyan percenkénti cseppszámmal infundáljuk, hogy legalább 3—4 órán át tartson. Az oldat elkészítésénél az aseptikus körülményekre szigorúan ügyeljünk.

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 3 év.

Csomagolás: 10×2 ml amp. 16,60 Ft, 100×2 ml amp. 137,70 Ft; 50 tabl. 16,30 Ft, 200 tabl. 59,60 Ft.

15%-os HUMAN ALBUMIN Human oldat

Összetétel: Emberi vérplazma etilalkoholos eljárással előállított albuminfrakciójának 15%-os oldata. A szegény oldat 3% glukózt és 0,332% nátriumkaprilátot tartalmaz. Összfehérje-tartalom legalább 90%-a albumin.

Javallat: *Belgyógyászat:* Hypalbuminaemiában, különböző eredetű vízretencióban (ascites, oedema) előmozdítja az extravasalis folyadék felszívódását, ezzel fokozza a diureticumok hatását, így a compensatio elérésének hatékony eszköze. Hatása különösen hepatogen és nephrogen oedemákban érvényesül.

Nőgyógyászat: A terhesség folyamán kialakult elektrolit-eltolódások esetén, praeeclampsiás állapotokban, a fokozott érpermeabilitás miatt a dehidratáló hatású 15%-os Human Albumin előnyösen alkalmazható.

Gyermekgyógyászat: Koraszülöttek felnevelésénél, atrophiánál, fehérjehiánynál jó eredménnyel alkalmazható.

Ellenjavallat: Akut veseelégtelenség.

Adagolás: A 15%-os Human Albumin beadandó mennyisége függ a beteg általános állapotától, a haemo-koncentráció fokától, illetve az albuminhiány mértékétől.

Javallatok: Arteriás és venás peripheriás, valamint agyi vérkeringési zavarok. Endangiitis obliterans, peripheriás angiosclerosis, claudicatio intermittens, angiopathia-, retinopathia- és gangraena diabetica, Raynaud-kór, thrombosisok, emboliák. — Sudeck-syndroma, ulcus cruris és egyéb trophikus zavarok, thrombophlebitis, acrocyanosis, erythema induratum Bazin. — Cerebrosclerosis, cervicalis-syndroma, arteriitis temporalis, Menière-syndroma. Agyi vascularis történések esetén csak szakorvosi javallat alapján.

Ellenjavallatok: Ulcus ventriculi és duodeni, haemorrhagiás diathesis. Mitralstenosis fenyegető vagy kialakult jobb-szív elégtelenséggel. Labilis eredetű hypertonia esetében az injekció alkalmazásától tartózkodjunk, mert collapsushoz vezethet.

Más vérnyomáscsökkentők, különösen ganglionblokkolók és sympatholyticumok adagolását a kezelés megkezdése előtt abba kell hagyni, hogy a készítmény vérkeringést szabályozó hatását ne gátolják.

Ellenjavallt minden olyan gyógyszeres kombináció, amely a perfúziós nyomás csökkenésére vezetne.

Adagolás: Átlagos kezdeti adagja felnőtteknek naponta 2—3-szor 1 tabletta, amelyet kevés folyadékkal egészben kell lenyelni. Szükség esetén az átlagos adag naponta 3-szor 2—4 tablettára is növelhető, a beteg állapotának gondos ellenőrzésével. Későbbiek során a klinikai állapot javulásával elégséges, ha a kezelést az egyénenként megállapított — naponta 2—3-szor 1 tabletta — fenntartó adagokkal folytatjuk.

Heveny vérellátási zavarok esetén az injekciós kezelést részesítjük előnyben. A kívánt hatás szükségességének megfelelően felnőtteknek naponta 1—3-szor 2 ml i. musc., azonnali hatás elérésére i. ven. 1—2-szer 2 ml igen lassú befecskendezésével, lehetőleg fekvő helyzetben, majd naponta 1—3-szor 2 ml i. musc.

Az injekciós kezelés hatásának fokozására egyidejűleg naponta 3-szor 2 tablettát is adagolhatunk. Az injekciós kezeléssel elért eredményt az egyénenként megállapított fenntartó adagokkal (napi 2—3-szor 1 tabl.) hosszabb ideig biztosíthatjuk. A tabletták bevétele, vagy az injekciók befecskendezése után egyes esetekben az arcon, esetleg más testrészeken, a készítmény rövid ideig tartó, égő érzéssel járó kipirulást okozhat.

Súlyos esetek klinikai kezelésére előnyösen alkalmazható a tartós cseppinfúzió, amikor 5-ször 2 ml-es ampulla tartalmát (1500 mg) 500 ml infúziós oldathoz elegyítjük. Az infúziós oldatot olyan percenkénti cseppszámmal infundáljuk, hogy legalább 3—4 órán át tartson. Az oldat elkészítésénél az aseptikus körülményekre szigorúan ügyeljünk.

Megjegyzés: + Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. — Lejárati idő: inj. 3 év.

Csomagolás: 10×2 ml amp. 16,60 Ft, 100×2 ml amp. 137,70 Ft; 50 tabl. 16,30 Ft, 200 tabl. 59,60 Ft.

15%-os HUMAN ALBUMIN Human oldat

Összetétel: Emberi vérplazma etilalkoholos eljárással előállított albuminfrakciójának 15%-os oldata. A sószegény oldat 3% glukózt és 0,332% nátriumkaprilátot tartalmaz. Összfehérje-tartalom legalább 90%-a albumin.

Javallat: *Belgyógyászat:* Hypalbuminaemiában, különböző eredetű vízretencióban (ascites, oedema) elősegíti az extravasalis folyadék felszívódását, ezzel fokozza a diureticumok hatását, így a compensatio elérésének hatékony eszköze. Hatása különösen hepatogen és nephrogen oedemákban érvényesül.

Nőgyógyászat: A terhesség folyamán kialakult elektrolit-eltolódások esetén, praeeclampsiás állapotokban, a fokozott érpermeabilitás miatt a dehidratáló hatású 15%-os Human Albumin előnyösen alkalmazható.

Gyermekgyógyászat: Koraszülöttek felnevelésénél, atrophiánál, fehérjehiánynál jó eredménnyel alkalmazható.

Ellenjavallat: Akut veseelégtelenség.

Adagolás: A 15%-os Human Albumin beadandó mennyisége függ a beteg általános állapotától, a haemo-koncentráció fokától, illetve az albuminhiány mértékétől.

Krónikus hypalbuminaemiák (nephrosis, májcirrhosis) esetében naponta 100—200 ml 15%-os Human Albumint adunk mindaddig, amíg a szérumalbuminszint nem normalizálódik. Koraszülöttek hypalbuminaemiái esetén, vagy azok megelőzése céljából hetenként 2—3 ízben 20—40 ml oldat beadása ajánlatos.

Mivel a 15%-os Human Albumin intravénásan alkalmazva a vérnyomást és plazmatérfogatot növeli, *különös óvatossággal kell eljárni* dekompenzált vitiumok, hypertonia, nyelőcsővisszértágulat, haemorrhagiás diathesisek, anuria idős egyének (infundálása) esetén.

Megjegyzés: Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető. 2—10 C° hőmérsékletű, száraz, sötét helyen tartandó. — Lejárati idő: 2 év.

Csomagolás: 100 ml 287,50 Ft.