MENTOR THERAPEUTICUS

KIADJA:
PANACEA
GYÓGYSZERVEGYÉSZETI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
BUDAPEST, 1930.

Előszó.

Igen sok oldalról megnyilvánult óhajnak teszünk eleget, amikor jelen „MENTOR"-unkat a magyar orvostársadalom szíves rendelkezésére bocsátjuk.

Egyrészt az áttekinthetőség, másrészt a rövidség kedvéért igyekeztünk a tárgyalt praeparatumokkal tömören és nem túlságos részletesen foglalkozni, hiszen az érdeklődő orvos uraknak minden készítmény bő irodalmát kívánságuk esetén örömmel megküldjük.

Célunk az volt, hogy egy olyan izléses kivitelű szakkönyvecskét adjunk át a régi Nagymagyarország területén élő orvos uraknak, amelyben az általunk forgalomba hozott gyógyszerspecialitások rövid leírását foglaltuk össze és amely az orvos urak íróasztalán bizonyára meg fogja kapni azt a helyet, amelyet tartalmánál és komolyságánál fogva méltán megérdemel.

Fogadják a t. orvos urak e könyvecskét jóindulatu megértéssel és legyenek meggyőződve arról, hogy lankadatlan buzgalommal fogjuk ezentúl is folytatni azt a munkánkat, amelynek eddigi szép eredményeit éppen a magyar orvostársadalom meleg támogatása biztosította.

Budapesten, 1925. november havában.

PANACEA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI R.-T.

Nyitrazsámbokréti
Dr. FRIEDRICH VILMOS s. k.
m. kir. egészségügyi főtanácsos,
egyet. rk. professor, királyi tanácsos stb.
IG. TAG

Hindi
Dr. SZABÓ SÁNDOR s. k.
m. kir. udv. tanácsos,
egyet. m. tanár stb.
ELNÖK

Dr. PALLAY ISTVÁN s. k.
okl. gyógyszerész,
a gyógyszerészeti tudományok tudora
VEZÉRIGAZGATÓ.

E könyvecske előző kiadását bevezető előszavunkhoz csupán azt fűzzük hozzá, hogy vállalatunk azóta bekövetkezett hatalmas fejlődése bizonyítja munkánk orvosi elismerését.

Kérjük a t. Orvosi Kart, hogy újabb kiadásunkat ugyanolyan szeretettel kegyeskedjék fogadni, mint az előzőt.

Budapesten, 1930. január hó 1-én.

PANACEA
GYÓGYSZERVEGYÉSZETI R.-T.

SANGUIFERIN DR. PALLAY

et combinationes:

c. arseno mite, c. arseno forte, c. phosphoro, c. bromo, c. jodo.

Tonicum. Neuroticum. Haemodynamicum.
Stomachicum. Roborans.

Anaemia
Chlorosis
Neurasthenia
Ideges kimerültség
Táplálkozási zavarok
Fejlődési visszamaradottság
Gyermekágyas és szoptató nők
vérszegénysége stb. stb. esetében.

Ezek a klinikáinkon és kórházainkban már közel négy évtizede a legjobb gyógyeredményekkel rendelt organikus vaskészítmények 3% *vasalbuminatot,* illetőleg 3% *vaslactatot* tartalmaznak főhatóanyagként. Ezekből a vegyületekből a vas-ion az emésztő-nedvek hatására csak lassan hasad le, tehát a készítmények a szájban nem dekomponálódván, a fogak zománcát nem támadják meg. A fokozatos és lassú ionizálódás folytán a gyomorra nem fejtenek ki helybeli izgató hatást, hanem egyenletesen szívódnak fel a nedvkeringésbe. A vas-, arsen-, phosphor-, brom-, illetőleg jod-faktorok speciális hatásai közismertek. Ehelyütt csak arra óhajtunk rámutatni, hogy mindezek a komponensek oly alakban vannak jelen a *Sanguiferin*-készítményekben, hogy semminő zavart vagy izgató hatást nem fejthetnek ki. A magyar egyetemek professzorainak, docenseinek és tanársegédeinek legnagyobb része írásos szakvéleményt is adott egybehangzóan kedvező tapasztalatairól. Ezek hatalmas gyüjteményét központi irodánkban őrizzük és az orvos uraknak kívánatra bemutatjuk.

PANACEA GYÓGYSZERVEGYÉSZETI R.T. BUDAPEST.

Az *arsen*-tartalmú változatok (mite és forte) 0.01 %, illetőleg 0.02% arsentrioxydnak megfelelő arsent tartalmaznak *natriummetaarsenit* alakjában. Egy teáskanálra tehát 1, illetőleg 2 milligramm arsentrioxyd jut. A *phosphoros* Sanguiferin 0.005% szinphosphort tartalmaz organikus, könnyen felszívódó phosphorvegyület alakjában, tehát egy teáskanálra 0.5 milligramm jut. A *bromos,* illetőleg *jodos* Sanguiferin 2.5% natriumbromidnak, illetőleg natriumjodidnak megfelelő bromot, illetve jodot tartalmaz. E praeparatumok hosszabb adagolása esetén sem jelentkezik a brom- vagy jodvegyületek ismert káros mellékhatása.

Fentiekben pontosan beszámoltunk az egyes változatok hatóanyagtartalmáról, úgyhogy az orvos urak tetszésük szerint vihetnek be a hatóanyagokból annyit, amennyit az adott esetben indokoltnak tartanak.

A Ferenc József-kórház igazgatóságának rendelete alapján a kórház terhére bármely egyleti tagnak rendelhetők a SANGUIFERIN-készítmények, *külön főorvosi ellenjegyzés nélkül.*

Általában gyermekeknek naponta 1-4 kávéskanállal, felnőtteknek naponta 3-4 evőkanállal adagolhatók a *Sanguiferin*-készítmények.

CALCODYL Dr. PALLAY

Steril oldat alakjában 1.2 ccm-es ampullákban kerül forgalomba. A CALCODYL néven védjegyzett praeparatum homogen test: a *cacodylsav* (dimethylarsensav) *calciumsója.*



Szerkezeti képlete:



A *calciumcacodylat* igen nagy előnye az egyéb cacodylsavas sókkal szemben, hogy mint gyenge bázis sója kevésbé dissociál az oldatban és ezáltal felszívódása **egyenletes és lassú.** Ily módon lényegesen nagyobb mennyiségű arsen vihető be a szervezetbe minden káros és kellemetlen mellékhatás veszélye nélkül, mint az eddig alkalmazott praeparatumoknál.

A készítmény 5%-os, illetőleg 10%-os steril oldatokban jön forgalomba.

Mivel a CALCODYL-vegyület arsen-tartalma 47.8%, az említett 5%-os oldatban 2.39% szinarsen van (ccm-ként 0.0239 *g As*), míg a 10%-os oldatban 4.78% (ccm-ként 0.0478 *g As*) a színarsen-tartalom. Ezt a tekintélyes arsen-mennyiséget a fentemlített okokból a szervezet lassan és tökéletesen absorbeálja, sem fájdalom, sem helybeli izgalmi tünet, sem gyomor- vagy bélzavar nem áll be, a gyógyhatás pedig érthetően kitünő.

A „CALCODYL Dr. PALLAY" a Magyar Királyi Népjóléti és Munkaügyi Ministerium 40.000/1923. V. számú rendelete értelmében az Országos Betegápolási Alap terhére rendelhető.

SYROMEL

CALCIUMTARTALMU GUAJACOL-CHINA-MÉZ-SYRUP.
KELLEMES ÍZŰ, IDEGZSONGÍTÓ ÉS ÉTVÁGYGERJESZTŐ.

A *guajacol, phosphor* és *calcium* hatását egyesíti magában oly szerencsés alakban, hogy adagolásánál e három fontos gyógytényező mellett a China-alkaloida s egyéb ízjavító faktorok jellemző étvágyfokozó és roboráló sajátsága is érvényesül.

Javalt a tüdő és légutak legkülönbözőbb megbetegedéseinél, elsősorban tüdőtuberculosisnál. Direkt hatása a bronchusok nyálkahártyájára a váladék felhigításában és a könnyebb expectoratioban nyilvánul. A phtisis incipiensnél antipyretikus hatást fejt ki; hämoptoënál vérzéscsillapító, pneumoniánál lobellenes, tbc.-s exsudatumoknál pedig felszívó sajátsága érvényesül. Skrophulosis, rachitis és csonttuberculosis eseteiben a **calcium- és phosphor**faktor mint *szöveti inger* fejti ki hatását. Lázas cachexiánál is jó eredménynyel adagolható.

A Syromel szerencsés összetételénél fogva a gyomrot nem rontja, a chinin-tényező pedig mint *amarum* is érvényesül. A gyermekgyakorlatban különösen jól válik be, mert kellemes alakban vihetjük be a kényes gyermeki szervezetbe a calciumot, guajacolt és china-alkaloidákat. Pertussisnál is mindenben megfelel a modern therapia kivánalmainak.

Használati utasítás: Felnőtteknek 3-4 evőkanállal, gyermekeknek 1-3 teáskanállal naponta.

CHIN-AC-SAL

DR. PALLAY

CHININUM ACETYLO-SALICYLICUM

Egységes vegyület: 48·4% chinin + 51·6% acetylsalicylsav

TONSILLITIS, NEURALGIA, HEMIKRANIA, KEPHALALGIA, ASTHMA BRONCHIALE, ANGINA PECTORIS, MENORRHAGIA, DISMENORRHOE stb. esetekben.

Ez a **homogen vegyület** az acetylsalicylsavas chininester acetylsalicylsavas sója:

$$C_{20}H_{23}N_2O_2.C_9H_7O_3.C_9H_8O_4.$$

Edénytágító hatása érvényesül a véredények görcsös összehúzódásainál (trigeminus-neuralgia, migraen stb.). Az uterus-izomzatra kitünően hat menorrhagia és dysmenorrhoe esetén. A vagus tonusának zavarainál (bronchial-asthma stb.), angina pectoris esetén stb. egyenesen frappáns az antispasmodikus befolyása. A CHIN-AC-SAL nem mérgező.

E **homogen vegyületből** a komponensek csak a bélben válnak le, lassan szívódnak fel és így a chinin és acetylsalicylsav kellemetlen mellékhatásai ki vannak zárva. Aránylag kis adagja — napi 3 ostya — is elegendő szokott lenni még a legsúlyosabb esetekben is. Különleges ostyái áztathatók vízben a legkisebb szivárgás nélkül, viszont szárazon, tehát állás közben védik a hygroskopikus vegyületet. Vízben vagy nyálban azonnal megpuhulnak, de nem nyílnak ki, így a beteg a kesernyés íz nyomát sem érzi.

Fenti képletnek megfelelően egy 0.5 grammos ostya tartalma: 24.2 cg chinin és 25.8 cg acetylsalicylsav, mint homogen vegyület.

A CHIN-AC-SAL igen olcsó árban, 10, illetőleg 20 ostyát tartalmazó kartonokban, valamint 250-es kórházi csomagolásban kerül forgalomba.

Méltóztassék részletes irodalmat kérni.

Rp.

Chin-Ac-Sal Dr. Pallay

lag. orig.

D. s. suo nomine.

PANCAO

CALCIUM-THERAPIA

CALCIUM DIÄTA



1. **Pancao simplex** 10% $CaCl_2$-tartalmú gyógytápkakaó.
2. **Pancao pro usu diabet.** cukormentes, mannitizált gyógytápkakaó.
3. **Tabl. Pancao simpl.** (à 0.25 g Ca-tartalommal).
4. **Tabl. Pancao comp.** (à 0.25 g Ca+0.15 g Extr. Kolae tartalommal).
5. **Pancao-Dragée** baby-erőtápcsokoládé (à 0.20 g Ca-tartalommal).

A *Pancao* legfinomabb holl'andi kakaóhoz kötve tartalmazza a chlorcalciumot. A készítmény úgy külső megjelenésében, mint szagában és izében miben sem tér el a közönséges kakaótól, miért is tejjel vagy egyébként elkészítve a legkényesebb betegek és gyermekek is szívesen élvezik.

A Pancao-készítményeknek állandó alkalmazása székrekedést nem okoz.

EUCONTRAST-PANCAO

PRO RÖNTGEN

E készítmény főalkatrészei: 100 g Merck-féle Baryumsulfat pro Röntgen, PANCAO és különböző olyan anyagok, amelyek egyrészt az egyenletes suspensiót, másrészt a cacao consistentiáját, végül a kitünő ízt garantálják.



Egy adag porhoz részletekben 2 deciliter vizet adunk, majd ezt némi keverés után melegítjük. Közben újabb 2 dl. vizet öntünk hozzá, felforraljuk, a tűzről levéve újra keverjük és e tejfelsűrűségű pépet pohárból itatjuk.

A legkényesebb beteg is szívesen veszi be e kitünő ízű pépet és **rendkívül olcsó ára** alapján igen kiterjedt alkalmazása is lehetővé válik. A Korányi-klinika, a debreceni Tisza István Tudományegyetem Központi Röntgen Intézete, a többi egyetemi klinikák jórésze, a budapesti Gróf Apponyi Poliklinika, a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete, az Országos Társadalombiztosító Intézet, a MÁV Gépgyár, a Postás Betegsegélyző Egyesület stb. a tapasztalt eredményekre és az igen olcsó árra való tekintettel állandóan alkalmazzák praeparátumunkat.

Eucontrast-Pancao forte 150 g Merck-féle baryumsulfat-ot tartalmaz.

ALGOCRATINE

E készítmény az egész földkerekségen általános orvosi bizalomnak örvend, úgyhogy részletesebb ismertetése bizonyára felesleges. Fontosnak tartjuk azonban a következők megemlítését:

1. Az Algocratine gyártása Magyarországon történik és az ma már minden szempontból magyar praeparatumnak tekinthető.

2. Minthogy vállalatunk egyedül jogosult a közép- és keleteurópai államok ellátására, e hatalmas piac csakis budapesti gyárunkban fedezheti szükségletét. Külkereskedelmi szempontból figyelemreméltó tény, hogy Algocratine-exportunk 1929-ben meghaladta a 100.000 pengőt.

3. A készítmény sem morphiumot, sem más hasonló alkaloidát nem tartalmaz.

Az Algocratine a legkitünőbb analgeticum; nemcsak csökkenti, hanem meg is szünteti a fájdalmat, anélkül, hogy az idegrendszert, nedv- és vérkeringést, gyomrot, májat, szivet, vagy vesét megtámadná.



Köszvényes migraeneknél, heves fogfájásnál, öröklött vagy szerzett neurasthenia esetében, légzési zavaroknál, nehéz fizikai vagy szellemi munka okozta kimerültségnél, rosszullétnél stb. ugyanolyan gyorsan szünteti meg a fájdalmat, mint a legkellemetlenebb menstruációs görcsöket. Nemcsak lokálisan hat egyes idegekre, hanem az **egész idegrendszerre fejti ki gyógyító, zsongító hatását.**

Az Algocratine árát sikerült lényegesen leszállítanunk, amennyiben a háboruelőtti 4.50 pengős árral szemben ma 2.60 pengő a nagy doboz ára.

Hogy mindenki részére hozzáférhetővé tegyük az Algocratine-t, 3 ostyát tartalmazó kis dobozokat és 1 ostyát tartalmazó kis kartonokat is hozunk forgalomba megfelelően olcsó árban.



HYPOTONIN

AETHYLENDIAMIN SUCCINICUM

E vegyület felfedezője Prof. Goldschmidt, akinek berlin-charlottenburgi tudományos intézetétől Magyarország és Jugoszlávia részére vállalatunk vásárolta meg a szabadalmat, illetőleg védjegyet.

A Hypotonin gyártása és e két ország szükségletének ellátása tehát budapesti gyártelepünk hatáskörébe tartozik, így a **Hypotonin magyar gyártmánynak** tekintendő.

E homogen vegyület az *aethylendiamin borostyánkősavas sója* és fokozottabban rendelkezik az *amin*-vegyületek ismert vérnyomáscsökkentő hatásával.

A Hypotonin-t nedvesség hatására azonnal puhuló, de vízben, nyálban szét nem nyíló, tehát kényelmesen bevehető ostyákban hozzuk forgalomba.

A HYPOTONIN minden olyan esetben, amely a *hypertonia* megszüntetése útján gyógyíthaiő, kitünően bevált. *Klimakterikus* zavaroktól egészen az *arteriosklerotikus* bajokig mindenütt megállta a helyét.

A számos irodalmi adatból bemutatunk néhányat azzal a megjegyzéssel, hogy a legutóbbi bécsi kongresszuson referált újabb érdekes és rendkívül kedvező adatok feldolgozása még csak most van folyamatban.

A berlini egyetem II. orvosi klinikáján folyt kisérletekről *Dressel* tanársegéd többek között a következőket írja:

(Auszug aus einer Vorles., Berlin, 1921). „Durch die Arbeiten von PAL, MÜNZER, FRANK, KREHL, R. SCHMIDT, FR. v. MÜLLER, F. MUNK u. a. wissen wir heute, dass die arterielle Blutdrucksteigerung den sklerotischen Gefässveränderungen in vielen Fällen vorausgeht und diese erst veranlasst. F. MUNK hat das Krankheitsbild dieser Fälle unter dem Begriff der „genuinen Hypertonie" zusammengefasst. Durch diese Erkenntnis der Hypertonie als dem primären Moment im Komplex der Krankheitserscheinungen ist das Bedürfnis nach einem blutdrucksenkenden Mittel neuerdings wieder in den Vordergrund gerückt. Verf. hat eine von **Prof. GOLDSCHMIDT** und **NEUSS** hergestellte, als „Hypotonin" bezeichnete Verbindung an einer grösseren Anzahl von Krankheitsfällen mit arterieller Hypertonie in der II. med. Klinik der Charité klinisch auf seine blutdrucksenkende Wirkung untersucht. In den Frühstadien der genuinen Hypertonie, die man vorwiegend bei klimakterischen Frauen zur Beobachtung bekommt und deren allererste Erscheinungen oft mit den von PAL beschriebenen sogen. „Gefässkrisen" indentisch sind, wurde in allen Fällen eine überraschend gute Beeinflussung der vasomotorischen Störungen und Anfälle (Blutandrang, Blutwallungen, Herzklopfen, Herzbeschwerden) sowie der übrigen subjektiven Symptome beobachtet. Bei den Männern ist das Anfangsstadium der genuinen Hypertonie durch vasomotorische Gefässtörungen und Erregungszustände infolge beruflicher Aufregungen gekennzeichnet. Die in diesem Stadium anfangs nur zeitweise und in geringem Grade vorhandene Blutdrucksteigerung (130 bis 150 mm Hg) konnte nach mehrwöchigem Gebrauch fast stets zur Norm zurückgeführt werden. Die Patienten wurden im allgemeinen ruhiger und namentlich der Schlaf wurde besser. In den späteren Stadien bei ausgesprochener permanenter Hypertonie mit höheren Blutdruckwerten (170—220 mm Hg), in denen man bereits teilweise eingetretene sklerotische Gefässveränderung annehmen muss, konnte trotzdem eine Blutdrucksenkung von 20—50 mm Hg in der Mehrzahl der Fälle erreicht werden, die meist auch längere Zeit anhielt. Auch in diesen Fällen trat mit der Blutdrucksenkung eine Besserung der subjektiven Erscheinungen: Kopfdruck, Nackenschmerzen, Schwindelgefühl, Atemnot, Ermüdbarkeit, Impotenz usw. ein. In den schweren Fällen des späten Stadiums mit sehr hohen Blutdruckwerten (über 250 mm Hg) gelang es nur vorübergehend oder auch gar nicht, eine Blutdrucksenkung zu erreichen. Dennoch gaben auch diese Patienten an, eine Erleichterung der subjektiven Erscheinungen zu verspüren. Ausser bei der genuinen Hypertonie wurde Hypotonin noch in einer Anzahl von Fällen mit ausgesprochener **chronischer Glomerulonephritis** (sekundärer Schrumpfniere) angewendet. Es zeigte sich, dass auch diese Fälle in der gleichen Weise wie die genuine Hypertonie auf **Hypotonin** sowohl in Bezug auf den Blutdruck, als auf die subjektiven Krankheitserscheinungen reagierten. Die Wirkung hält selbst in den schweren Fällen längere Zeit an, wenn auch in diesen Fällen eine Blutdrucksenkung zur Norm selbst bei längerer Darreichung nicht zu erreichen ist. Das **Hypotonin** muss darum möglichst frühzeitig angewendet werden und kann dann in gewissem Umfange als ein Vorbeugungsmittel gegen die Arteriosklerose wirken. Bei bereits ausgesprochenen Erscheinungen der Herzinsuffizienz kommt die Wirkung des **Hypotonins** nicht so deutlich zum Ausdruck; doch empfinden die Kranken auch in diesen Fällen eine subjektive Erleichterung des Zustandes, während eine nachteilige Beeinflussung der Zirkulation nicht beobachtet wurde. In einigen Fällen mit hoher arterieller Spannung wurde eine vorübergehende Übelkeit, im allgemeinen jedoch keine unangenehme Nebenwirkung des **Hypotonins** beobachtet. Das **Hypotonin** hat vor anderen Mitteln den Vorzug, dass es eine ausreichende Wirkung auch **bei der Darreichung per os in Tabletten** erzielt. Die Wirkung tritt allmählich, meist erst nach 3—4 Tagen ein. Die Patienten erhielten 2 bis 3-mal täglich eine Tablette à 0.3 g, nach 10 tägiger Anwendung erfolgte eine Pause von 3—5 Tagen und in diesen Perioden wurde das Mittel 2 bis 3 Monate gegeben". (II. **medizin. Klinik der Univ. Berlin**).

F. Munk igen érdekes és Németországban közkézen forgó monográfiájában („ERGEBNISSE DER INNEREN MEDIZIN UND KINDERHEILKUNDE") külön fejezetet szentel az *arteriosklerosis*-nak és *genuin hypertoniának*. Ebben a fejezetben többek között a következőket írja:

„Für die praktische Behandlung der Hypertonie kann nur ein Mittel in Betracht kommen, das eine **ausreichende Wirkung auch bei der Darreichung per os** erzielt. Bei ausgedehnten klinischen Beobachtungen hat sich nun eine von Prof. **Goldschmidt u. Neuss** hergestellte, als „HYPOTONIN" bezeichnete Verbindung als ein diesen Postulaten entsprechendes, praktisch anzuwendendes, blutdrucksenkendes Mittel in den verschiedenen Stadien der Hypertonie bewährt. Die Ergebnisse dieser therapeutischen Versuche und die betreffenden Krankheitsfälle sind von **Dr. G. Dressel** in seiner Dissertation (Berlin 1921, ungedruckt) zusammengestellt: In den Frühstadien der **genuinen Hypertonie**, die man vorwiegend bei klimakterischen Frauen zur Beobachtung bekommt, wurde in allen Fällen eine überraschend gute Beeinflussung der subjektiven Symptome und eine nachhaltige Senkung des Blutdrucks bis zur Norm beobachtet. In den späteren Stadien mit höheren Graden einer permanenten Blutdrucksteigerung (170—200 mm Hg), bezw. bei bereits eingetretener Arteriosklerose gelang es stets, die subjektiven cardialen und cerebralen Erscheinungen und Beschwerden durch **Hypotonin** wie durch kein anderes Mittel zu mildern. Auch trat in den meisten Fällen bei längerer Darreichung eine Blutdrucksenkung von 20 bis 50 mm Hg ein, die längere Zeit anhielt. Diese Wirkung wurde selbst bei den Fällen von chronischer Glomerulonephritis (sekundäre Schrumpfniere) beobachtet. Unangenehme Nebenwirkungen traten auch in diesen Fällen nicht ein. Bei ausgesprochener Herzinsuffizienz kommt die Wirkung des **Hypotonins** auf den Blutdruck nicht so deutlich zum Ausdruck, doch empfinden die Kranken auch in diesen Fällen eine subjektive Erleichterung des Zustandes, während eine nachteilige Beeiuflussung der Zirkulation nicht beobachtet wurde. Das **Hypotonin** wurde in Tabletten zu 0.3 gr. 2- bis 3-mal täglich ein Stück verabreicht; nach 10tägiger Anwendung erfolgte eine Pause von 3—5 Tagen und in diesen Perioden wurde das Mittel 2—3 Monate gegeben.

Die günstigen klinischen Erfahrungen veranlassten mich zu experimentellen Untersuchungen über die Art der blutdrucksenkenden Wirkung der verschiedenen Mittel, die ich gemeinsam mit **Dr. Ho** anstellte und über die an anderer Stelle berichtet wird. Es zeigt sich, dass bei intravenöser Einspritzung von Vasotonin, Histamin, sowie auch von Piperazin beim Kaninchen bei direkter Messung an der Carotis eine starke und rasch einsetzende Blutdrucksenkung festzustellen ist, die aber nur eine kurze Dauer hat, während die Wirkung des **Hypotonins** langsamer auftritt, dafür aber von nachhaltiger Dauer ist. Die Blutdrucksenkung erfolgt durch eine Erweiterung der peripheren Gefässe, was sich im Ansteigen der plethysmographischen Kurve, sowie der Pulsschläge kund gibt. Die Wirkung des **Hypotonins** steht demnach der des Adrenalins diametral entgegen, kann diese aufheben und durch sie aufgehoben werden. Während aber die Adrenalinwirkung einen starken Einfluss auf die Herztätigkeit am Electrocardiogramm erkennen lässt (Kraus und Nicolai), erfährt die electrocardiographische Kurve durch **Hypotonin** auch bei beträchtlicher Einwirkung keine wesentliche Veränderung.»

Strumpf professzor „HERZKRANKHEITEN" című könyvében így emlékezik meg a HYPOTONIN-ról:

«Jedoch ist das neuerdings von **H. Goldschmidt** eingeführte **«Hypotonin»** dasjenige Medikament, das uns die besten Resultate gegeben hat. In Dosen von 1 gr. täglich, an 4—5 Tagen hintereinander, bewirkt es in den allermeisten Fällen von besonders primärer Hypertonie eine oft sehr ausgesprochene, 4—6 Wochen anhaltende Blutdruckerniedrigung, welche 40—60 mm Hg betragen kann. Die Kur wird alle 4—6 Wochen wiederholt, d. h. sobald der Blutdruck wieder die Neigung hat, zu steigen. Wir halten dieses Mittel für eine wertvolle Bereicherung unseres Arzneischatzes.»

R. Klein a Zeitschrift f. ärztl. Fortbildung 1924. évi 23. számában többek közt a következőket írja:

«Ich habe die beste Wirkung mit Hypotonin gesehen. Bei der essentiellen Hypertonie trat in jedem Falle eine viel stärkere Blutdrucksenkung nach 10tägiger Darreichung von Hypotonin ein. Die Senkung beträgt jedesmal 30—80 mm Hg nach Riva-Rocci, welche dann bei intermittierender Behandlung mit Hypotonin dauernd beibehalten werden kann, besonders wenn das diätetische und psychische Verhalten des Kranken dementsprechend war und zur Unterstützung der Hypotoninwirkung auch Kohlensäurebäder verabfolgt wurden. Auf diese Weise kann man den Kranken andauerndes Wohlbefinden sichern. Dass dieses so gut brauchbare Präparat nicht überall Eingang gefunden hat, begründe ich damit, dass das Präparat nicht genügend gut bekannt ist. Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, die Aufmerksamkeit der praktischen Ärzte auf dasselbe zu richten.»

VERMITACAT

A Tanacetum Vulgare kivonatából készült biztos hatású gyógyszer *Oxyuris Vermicularis*, giliszták, galandférgek stb. paraziták ellen.

Prof. Goldschmidt e praeparatumának kiválóságát részletes külföldi irodalom bizonyítja.

A legtöbb esetben egy adag, a legcsökönyösebb esetekben három adag biztosította a teljes sikert. Ennél többre sohasem volt szükség.

SYRUPUS HAEMOGLOBINI DESCHIENS



Dr. Deschiens haemoglobin-készítménye ma már az egész világon ismert. Ő különleges eljárással izolálta a haemoglobin-kristályokat az élő marha véréből, vacuumban hideg úton, majd aetheres közegben. Az így nyert haemoglobin nativ savóban, sűrű cukoroldatban konzerválva, megfelelő ízjavító anyagokkal kellemessé tett alakban kerül forgalomba.

Nativ haemoglobin-tartalma, valamint a vérképző szervekre gyakorolt specifikus hatása magyarázza az ismert indikációs területen betöltött előkelő szerepét.

ANHÉMOR

Az aranyér lokális kezelésének hatásos gyógyszere.

Fájdalomcsillapító, adstringens és enyhén *decongestiv.* E gyógyszer fokozatosan, de biztosan hat a véredények falainak megtámadása nélkül. Hatása a hämorrhoidális csomók elsorvasztásában, a congestio csökkentésében, majd megszüntetésében, végül a bántalmak elmulásában áll. *Fissurák* eseteiben is tüstént enyhülést szerez (Prof. *Tillaux).*

Az ANHÉMOR úgy kenőcs, mint kúpok alakjában kerül forgalomba. A tubus speciális alakja lehetővé teszi, hogy a kenőcs a fissurákig hatoljon be, anélkül, hogy maga a kezelés fájdalmas lenne. A kenőcs használata lefekvés előtt, ülőfürdő vagy lemosás után történjék.

A kúpok is teljesen fájdalommentesek és azonnal enyhülést szereznek.



Dr. SANDER Csukamájolaj-emulsio

A szervezet ásványi anyagcseréjénél szükségelt physiológiai tápsókat glycerinophosphorsavhoz kötött állapotban tartalmazó jóízű csukamájolaj-praeparatum.

Dr. SANDER Vitamin-csukamájolaj-emulsio

Calcium-, vas- és phosphortartalmú, rizshéjból kivont vitamin-anyagokkal emulgeált, jóízű csukamájolaj-praeparatum.

A gyár saját halászatelepéről nyert legfinomabb, gőzzel kiválasztott csukamájolajnak több értékes gyógytápsó vizes oldatával való emulgeálása útján készül. E gyógytápsók főképpen glycerinophosphorsavas vasfehérje- és egyéb vas-, mész- és phosphor-tartalmú physiologiai tápsók. A vitamines változat különös előnye, hogy emulsio létére a rizskorpából kivont összes vitamineket — tehát úgy a zsírban, mint a vízben oldódókat — tartalmazza.

Antiphlogistine

TRADE MARK

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ BOROGATÁS

E készítmény, amelynek gyártása rövidesen **budapesti** telepünkön fog történni, már régóta nyer alkalmazást az egész földkerekségen.

Összetétele: a legfinomabb, vízmentes, amerikai *aluminiumsilicat,* vegytiszta *glycerin,* csekély elemi *jodot* tartalmazó *jod-vegyületek,* kevés *bór-* és *salycilsav, fodormenta-, gaultheria-* és *eukalyptus-olaj* a legfinomabb keverék alakjában.

Indikációs területe rendkívül kiterjedt, hiszen a fogorvosi gyakorlatban, a sebészi praxis számos ágában, a szem-, fül-, orr-, torok-, gégegyógyászatban, dermatologiai esetekben stb. ugyanolyan sikerrel alkalmazzák, mint számos komoly belgyógyászati esetben (pneumonia, más gyulladásos esetek, mint bronchitis stb.). Rendkívül jó szolgálatokat tesz az Antiphlogistine a gynaekologiai gyakorlat számos ágában is.

Általában azt mondhatjuk, hogy mindenütt, ahol a **gyulladás** és **congestio** legyőzése fontos, nélkülözhetetlen segédeszköz az Antiphlogostine, amely eredeti fémdobozban vízfürdőn, a beteg által kibírható maximális hőmérsékre hevítve kenendő fel legtöbb esetben közvetlenül a beteg testrészre, kivételesen (szemnél stb., vagy pl. mint hüvelytampon) gaze-re és kötszerrel fixirozandó.

Függően az Antiphlogistine-réteg vastagságától, a borogatás 24-36 óra hosszat változatlanul tartja az eredeti hőmérséket és nedvességet, tehát elkerülhetővé teszi a borogatás gyakori váltását.

Égési sebeknél az Antiphlogistine hidegen alkalmazandó.

A kívánatra készséggel küldendő ismertetések részletesen foglalkoznak pneumonia, pleuritis, hörghurut, dysmenorrhoe, fagyás, rándulás, égési sebek, acne, furunculosis, fekélyek, kelések, véraláfutások, csúz, köszvény, fülgyulladás, torokbántalmak, mastitis, orbánc, heregyulladás, aranyér, peritonitis, entero-colitis, nem gennyedő appendicitis eseteiben, valamint gynaekologiai esetekben való alkalmazásával.

Az Antiphlogistine 0, I, II, III és IV jelzéssel kerül forgalomba, 150, 315, 500, 1000 és 2500 grammos különleges fémdobozokban.

A földkerekség minden államában működnek Antiphlogistine-képviseletek. A gyártás a következő telepeken történik:

Budapest,	Firenze,	Mexico,
Berlin,	Barcelona,	Rio de Janeiro,
Paris,	New York,	Buenos Aires,
London,	Montreal,	Sydney.

CASCARINE

$C_{12}H_{10}O_5$

Chronikus székrekedés, a máj és epe bántalmai, terhesség és szoptatás okozta *obstipatio*, bélrenyheség stb. eseteiben elsőrangú gyógyeredményedíg megbízható Leprince-készitmények iránt viseltetik.

A Cascarine Leprince 1928-ban ülte félszázados jubileumát és az a páratlan szeretet, amellyel a legelőkelőbb orvostudományi testületek a világ minden részéből elhalmozták az ugyancsak 50 év óta működő gyárat, legjobb bizonyitéka annak a nagyrabecsülésnek, amellyel az orvosi kar a mindíg megbízható Leprince-készítmények iránt viseltetik.

CASCARINE LEPRINCE



A CASCARINE hatalmas világirodalma a legkiválóbb szaktekintélyek referátuma alapján bizonyítja, hogy az elért eredmények összehasonlíthatatlanul kedvezőbbek a többi hasonló praeparátummal szerzett tapasztalatoknál.

8-10 napon át reggeli és vacsora közben 1-1 pilula à 0.1 g, csökönyösebb esetekben lefekvés előtt egy harmadik ilyen pilula veendő be.

RHOMNOL

$C_{40}H_{54}N_{14}P_4O_{27}$

Acidum nucleinicum puriss. és természetes nucleophosphatok együtthatása.

Org. phosphor in statu nascenti!

Anaemia, Dyscrasia, Leukaemia, Tuberculosis, a csont-, valamint idegrendszer zavarai, Neuralgia, Chorea, szédülés, reszketés, Basedow, Scrophulosis, Polyarthritis stb. eseteiben kiváló gyógyszer.

Étkezések közben 6-10 pilula à 0.15 g pro die veendő be.

Újabban injekciók és cukros granulák alakjában is forgalomban van a RHOMNOL.



NÉO-RHOMNOL

Strychninum nucleinicum- és Natrium cacodylicum-tartalmú ampullák.

Org. phosphor in statu nascenti!

Elsőrangú tonicum Anaemia, Reconvalescentia, Kardioplegia, Alkoholismus, Paralysis, továbbá Tuberculosis, Syphilis, kiütéses betegségek, Malaria, Influenza, életműködési és szöveti zavarok stb. eseteiben.

A NÉO-RHOMNOL physiologiai hatásának eredménye ezek szerint röviden a következőkben foglalható össze: az életkedv, egészséges életösztön, normális vérnyomás, élénk asszimilációs tevékenység feléledése, az életműködési zavarok és szöveti sérülések megszünte.





Naponta 1, súlyos esetekben 2 drb 1 cm^3-es ampulla tartalma (0.001 gr Strychninum nucleinicum + 0.05 gr Natrium cacodylicum) fecskendezendő be. Miután egy 12 ampullát tartalmazó doboz elfogyott, egy heti pihenés rendelendő el.

Az orvosok régen hangoztatott kívánságára újabban Néo-Rhomnol-pilulák is forgalomban vannak. Ezekből általában 15 napon át szedendő mindkét főétkezés előtt egy-egy labdacs (0.0005 gr Strychninum nucleinicum + 0.025 gr Natrium methylarsenicum). A pilulákat szétrágás nélkül kell lenyelni.

ARSYCODILE

(Natrium cacodylicum purissimum.)

Kitünő gyógyszer Tuberculosis pulmonum, Malaria, Chorea, súlyos Anaemiák, Cachexia, Neurasthenia, Psoriasis, Acne, Diabetes, Basedow, Asthma, Influenza, Syphilis II. és III. stádiuma stb. eseteiben.

Az összes világrészek klinikáin és kórházaiban szerzett tapasztalatok alapján az ARSYCODILE-t mindazok, akik gyakorlatukban kiterjedtebben alkalmazták, a legideálisabb arsen-praeparatumnak tartják.

8 napon át naponta egy injectio (0.05 gr Natrium cacodylicum), azután 8 napi pihenés, majd a kúra újrafelvétele a teljes gyógyulásig.

Újabban az Arsycodile pilulák alakjában is forgalomba kerül.



NÉO-ARSYCODILE

(Dinatriummethylarsenat, Arrhenal.)

Ugyanazok az indikációk, mint az Arsycodile-nál. E gyógyszert azonban nemcsak ampullákban, hanem főképpen pilulákban alkalmazzák. Az ampullák, különösen Malaria esetében írhatók elő.

12 napon át naponta étkezés közben 4-5 pilula à 0.01 gr., azután 8 napi pihenő, majd a kúra újrafelvétele.



FERROCODILE

(Ferrocacodylat.)

Specificum Chlorosis, Malaria, Anaemia palustris stb. eseteiben, valamint mindazokban az esetekben, amidőn vas és arsen együttes adagolása indokolt.

Naponta étkezés közben 4 pilula à 0.25 gr veendő.



FERRICODILE

(Ferricacodylat.)

Ugyanazok az indikációk, mint a Ferrocodile-nál. E praeperatum azonban csak subcutan injectiók alakjában kerül forgalomba.

A 0.05 cm^3-es ampullák dosisa ugyanaz, mint az Arsycodile-nál.



GUIPSINE

a fagyöngy (Viscum album, francia néven *Gui)* értékes hatóanyagainak kivonata.

Kiváló *hypotensor* (vérnyomáscsökkentő), *antihaemorrhagicum, antialbuminuricum, diureticum.* Arteriosclerosis, Hypertensio, Haemoptysis, köszvény, Nephritis, Nephrosclerosis, a Menopausa zavarai, Brightismus, Eclampsia stb. eseteiben.

4-10 pilula à 0.05 gr pro die, étkezés közben.

Újabban igen nagy sikerrel alkalmazzák mindenütt a GUIPSINE-INJECTIO-kat is!



GUIPSINE

EUMICTINE

(Santalol, Hexamethylentetramin, Salol.)

Antigonococcum, diureticum, antisepticum.

Gonorrhea, Cystitis, Nephritis, Urethretis, Pyelitis, Phosphaturia, Bacteriuria, vese- és hólyagkő, a vizelet ammoniás erjedése, Blenorrhoe és hólyagbántalmak eseteiben.

Veendő naponta étkezés közben 8-16 capsula (à 0.20 gr Santalol + 0.05 gr Salol + 0.05 gr Hexamethylentetramin).

EUMICTINE



PILULES DR. SÉJOURNET

Ideális Santonin-készítmény.

Diabetes mellitus-nál fokozatosan csökkenti a glykosuriát.

Minden étkezés közben egy pilula à 0.02 gr veendő.

Részletesebb magyar ismertetéseket kívánatra küldünk a Leprince-specialitásokról is.

Nujol

A beleknek vaselinolajjal való „olajozása" a modern orvostudomány szerint az obstipatio egyedüli racionális kezelése.

A NUJOL ideális vaselinolaj; színtelen, szagtalan és íztelen, sűrűsége és viscositása pontosan megfelel a belek élettani követelményeinek.



Pontos, mint az óramű.

A NUJOL-t mint ideális viscositású vaselinolajat a Rockefeller-koncernhez tartozó Stanco Inc. New York melletti gyárából kapjuk. A készítmény palackozása budapesti gyárunkban történik és úgy a közismert gyönyörű speciális üvegek, mint az összes többi csomagolószerek *magyar gyártmányok,* tehát a NUJOL itteni forgalmának emelkedése több magyar iparágnak és így sok *magyar munkásnak* nyújt bővebb foglalkoztatást.

A készítmény ma már Magyarországon is annyira ismert, indikációs területe pedig annyira kézenfekvő, hogy alkalmazási lehetőségeit bizonyára felesleges ismertetnünk.

A belsőleg alkalmazott vaselinolaj-készítményeknél rendkívül fontos a viscositas helyes megállapítása. A legtöbb olajkészítménnyel ellentétben, a NUJOL viscositása egyrészt a legprecízebben állandó, másrészt a legpontosabban van beállítva arra a fokra, amely a bél physiologiájának legjobban megfelel.

A NUJOL változatlanul távozik a szervezetből, a beleket nem ingerli és hatása kizárólag mechanikus, azaz egyszerűen «olajozza» a beleket. Ezáltal a bélfalakhoz ragadó anyagok csuszamlását idézi elő és átsegíti őket a belek hosszú, tízméteres útján.

Az az orvos, aki valaha alkalmazta a NUJOL-t, állandóan fogja rendelni, mert tapasztalatai bizonyítják, hogy mindig megkapja a kívánt therapeutikus hatást.

Az elmúlt esztendőben sikerült a NUJOL árát *lényegesen mérsékelnünk,* ami most már lehetővé teszi e hézagpótló készítmény igen széleskörű rendelését is.

Mistol

a nátha, köhögés, torokgyulladás és egyéb hüléses megbetegedések leghatásosabb ellenszere.

Közismert tény, hogy a *camphor, menthol, eukalyptus-olaj* és *chlorbutanol* (magasabbrendű buthylalkohol) kitünő gyógy- és fertőtlenítőszerek nátha és mindenféle egyéb hüléses megbetegedés esetén.

Lokálisan alkalmazva azonban e szerek nagy hátránya az, hogy maguk is gyorsan illannak, szeszes oldatuk pedig a test hőmérsékletén igen gyorsan párolog, tehát hatásuk nagyon rövid ideig tart.

A Rockefeller-koncernhez tartozó Stanco-gyár által rendelkezésünkre bocsátott magas viscositású vaselinolaj azonban speciális gyártási módszerekkel könnyen oldja a fentemlített gyógyszereket és így az általunk előállított, *Mistol* néven forgalomba hozott készítmény e szerek összes előnyeivel rendelkezik, anélkül, hogy a fenti hátránnyal számolni kellene.

A vaselinolajos oldatból igen nehezen távoznak a könnyen illó anyagok, a magas viscositású olaj pedig a nyákhártyákhoz tapad és ott a gyógyszeres oldat hosszantartó hatást fejt ki.

A Mistol-palack fémcsavaros dugójához kitünő cseppentő van erősítve, amellyel kényelmesen vihető be az orrlyukba a gyógyszer. Gargarizáláshoz is tisztán, bigítás nélkül használjuk a Mistol-t ugyanúgy, mint inhalációs célokra.

A Mistol összehúzza a duzzadt nyákhártyákat és így megelőzi a pangást és gyulladást. A helyi izgalmak megszünnek és a baktériumok szaporodása megáll.

A MISTOL szénaláznál is kitünően beválik. Asthma és bronchialis zavarok eseteiben célszerű a Mistol inhalálása.

AMINOSEL-BYLA

növények és gyümölcsök kivonata, amely minden ásványi só konyhai használatát feleslegessé teszi.

Áldásos háziszere mindazon betegeknek, akiknek ásványi só mentes, vagy sóban szegény táplálékot kell előírnunk.

A készítmény huszonnyolc különféle növényi só extractuma *(spárga, articsóka, bab, borsó, kelvirág* stb.) és sok olyan sótartalmú növényé és gyümölcsé, amelyeket a francia «Provence»-ban termelnek e célra.

Úgy konyhai, mint asztali használatra kiválóan alkalmas. Zsebben hordható szóró üvegcsékben kerül forgalomba, íze nemcsak sós, hanem érthető okokból *aromás* is.

LIPOCHOL-BYLA

Egy pilula 0.20 gr. hatóanyagot tartalmaz, amely 10 evőkanál tiszta csukamájolajnak felel meg, azonban sem íze, sem szaga erre nem emlékeztet. **Nagy cholesterin-tartalma a legaktívabb alakban van jelen.**

Felnőttek 5-10, gyermekek 2-4 labdacsot vesznek naponta.

A labdacsok be vannak vonva, úgyhogy csak a bélnedvek segítségével emészthetők. Nagy előnye még a csukamájolajjal szemben az, hogy minden évadban rendelhető.

THYRATOXINE-BYLA

(ATOXITHYROIDIN)

Ideális pajzsmirigy-praeparatum. Tökéletesen ártalmatlan, amennyiben a pajzsmirigy toxikus lipoidjai eltávolíttattak belőle.

1. *Myxoedema.*
2. *Sklerodermia.*
3. *Infantilismus, Mongolismus, Gastro-Intestinalis gyermekkori Kachexia.*
4. *Túlzsírosodás.*
5. *Krónikus hypothyreoidismus.*
6. *Arthritis, Podagra, Diabetes, krónikus Rheumatismus.*
7. *A csontok bizonyos megbetegedései, mint Rachitis, fogképződés zavarai, Osteomalacia.*
8. *Az agyműködés bizonyos zavarai.*
9. *Az idegrendszer megbetegedéseinek nagy száma (Epilepsia, Asthma, Migrän, Neurasthenia, Tetanus, Torticollis stb.).*
10. *Számos bőrbetegség (Psoriasis, Keloidok, Icthyosis, Lepra, Lupus, Pityriasis stb.).*
11. *Bizonyos vérbetegségek.*
12. *Egyes női bajok (menstruációs zavarok, uterinális vérzések, Eclampsia, Uterus-Fibroma).*
13. *Egyszerű, nem vascularis struma.*

Egy Thyratoxine-tabletta 0.025 g hatóanyagot tartalmaz.

MUSCULOSINE-BYLA



Nyers, minden külső befolyás számára hozzáférhetetlen *izomnedv-oldat vér-diastase*-val kapcsolatban.

A MUSCULOSINE-BYLA teljesen bacillusmentes, 50% albuminanyagot tartalmaz, ezenkívül enzymákat és természetes úton a szövetekből belépült erjesztő anyagokat.

DIGITALINE NATIVELLE

A DIGITALINE-t 1868-ban fedezte fel NATIVELLE professzor, aki ezért a korszakalkotó felfedezésért a Francia Akadémia legnagyobb kitüntetését, az *Orfila-díjat* kapta.

Az amorph digitalin már régebben ismert volt, de a kristályosítás addig senkinek sem sikerült. **A kristályosítás által egy tökéletesen tiszta és igen aktív készítményt nyertünk.** Azóta sem sikerült senkinek sem a Digitalis-levélből ilyen vegytiszta *kristályokat* előállítani. Az akkor kidolgozott eljárás olyan tökéletes volt, hogy az elmúlt 62 év alatt a legkisebb módosítás sem vált szükségessé.

A praeparatum hatalmas irodalma külön kiemeli a DIGITALINE-kristályok nagy előnyét a kész oldatokkal, vagy az amorph-sókkal szemben.

GRANULAE DIGITALINE NATIVELLE. 1/10, illetőleg 1/4 mg hatóanyag-tartalmú granulák vannak forgalomban; leggyakrabban az előbbit rendelik.

SOLUTIO DIGITALINE NATIVELLE néven 1‰-es oldatban is forgalomban van a praeratum, amelynek 50 cseppje 1 mg DIGITALINE-kristálynak felel meg. *Minden üvegben calibrált cseppszámláló van.*

INTRAMUSCULARIS INJECTIÓK céljaira 1/10 és 1/4 mg, INTRAVENÁS INJECTIÓK céljaira pedig 1/5 mg hatóanyag-tartalmú ampullák (steril, kétszer desztillált vizet tartalmazó külön ampullák kiséretében) kaphatók.

Prof. HUCHARD négy évtizedes tapasztalatai alapján «Les trois doses de Digitaline» című munkájában (J. B. Baillière et Fils, Paris 1911) egy helyütt a következőket írja:

«.... az összes Digitalis-készítmények — akár már megszülettek, akár ezután fognak megszületni — soha nem fogják elérni a DIGITALINE CRISTALLISÉE értékét sem tudományos, sem gyakorlati szempontból. E szer biztos és hatalmas, tökéletesen veszélytelen, mint azt negyven év tapasztalata bizonyítja.»

Indikációk: *A szív és véredények legkülönbözőbb megbetegedései, Hyposistolia, Asystolia, Endocarditis, Pericarditis, Palpitatio, Tachycardia, Asthma, Dyspnoe, Angina pectoris, Arteriosclerosis nephrosclerosissal, Grippe, Pneumonia, Pleuritis, Polyarthritis rheumatica stb. stb.*

OUABAINE ARNAUD

A **Strophantus** gyógyhatása már régen ismeretes, azonban ARNAUD professzor volt az első, aki a glycosida-hatóanyagot kristályos alakban elő tudta állítani. Az azóta forgalomban levő **strophantin**-kristályok közül egyik sem olyan egységes chemiai test, mint az OUABAINE-ARNAUD.

Az OUABAINE 1/4 mg-os tablettákban nyer leggyakrabban alkalmazást. 1/4 mg (intravénás), illetőleg 1/2 mg (intramuscularis) adagokban ampullákban is forgalomban van az OUABAINE-ARNAUD.

1‰-es oldata SOLUBAINE néven *per os* adagolható a részletes használati utasítás alapján. SOL. OUABAINE néven 4‰-es tömény oldat van forgalomban.

A közismert indikációk közül felemlítjük a következőket:

Myocarditis, a gyenge szívműködés legkülönbözőbb alakjai, Typhus, Diphteria, kiütéses Typhus, Pneumonia stb. következtében fellépő szívgyengeség, terhesség és szoptatás szívműködési zavarai.

A Digitaline-nal együtt adagolva pompásan egészítik ki egymás hatását. Ezt megkönnyítendő, NATIBAINE néven glycerin-alkoholos oldat van forgalomban 1‰ hatóanyaggal, (1/3 rész Digitaline és 2/3 rész Ouabaine).

A párisi gyár az általunk megadandó orvosi címekre készséggel fog ezekből az ideális praeparatumokból megfelelő minta-mennyiséget küldeni.

Ez a legrégibb francia gyógyszergyár összesen e két, a cardiologia körébe vágó praeparatum előállításával foglalkozik.

Mindkét készítmény végtelenül komoly tudományos praeparatum, igen nagy irodalommal rendelkezik és hazánkban eddig csak azért nem volt különösebben ismert, mert a gyár ezideig Franciaországtól keletre nem óhajtott exportálni.

INSTITUT PASTEUR, PARIS

SERUMAI ÉS VACCINÁI

A világ legelső serum-intézetével, a párisi PASTEUR-INTÉZET-tel sikerült olyan megállapodást kötnünk, mely szerint Magyarország részére a világpiaci árjegyzéseknél sokkal olcsóbban szállítják az **eredeti Pasteur-**praeparatumokat.

SERA

Antidiphtérique
Antidiphtérique purifié
Antitétanique
Antitétanique purifié
Antistreptococcique
Antiméningococcique
Antidysentérique
Antivenimeux
Anticharbonneux
Antipesteux
Antipneumococcique
Antigangréneux

VACCINAE

Anatoxine diphtérique
Antistaphylococcique
Antigonococcique
Tetra-vaccin Antipyogène
Anticholérique
Antityphoïdique
Antigène tuberculeux
Tuberculine

Az elismerten legjobb TUBERCULINE-SERUMOK az összes ismert erősségekben rendkívül olcsó áron kaphatók.

Minden alkalommal hangsúlyozni kell a vényen a „PASTEUR" szót.

Fenti serumok és vaccinák közül számosakat rendelnek nagyobb intézeteink. Újabban erősen emelkedik a tbc.-s eseteknél kitünő gyógyeredményeket biztosító *Antigène-tbc.* forgalma.

Az *Antigonococcus-vaccina* az utóbbi időben szintén komoly tért hódított a magyar rendelőintézetek recepturájában.

GENALKALOIDÁK

E gyüjtőnéven *Prof. Polonovski* és munkatársai által kidolgozott, megfelelő gyógyszeralakú olyan alkaloidákat hozunk forgalomba, amelyeknek **minimális toxicitása** az eddig alkalmazottaknál sokkal **nagyobb adagok** előirását és ezáltal sokkal biztosabb gyógyeredményeket tesz lehetővé.

Az eddig forgalomba került Genalkaloidákat alant röviden ismertetjük és meggyőződésünk, hogy igazán *hézagpótló,* mindig megbízható gyógyszereket ajánlunk az orvosi kar figyelmébe.

GENESERIN

A Calabar-babból izolált alkaloida, amelynek salicylsavas sója van e néven forgalomban. Képlete: $C_{15}H_{21}O_3N_2.C_6H_4.OH.COOH$; csak organikus oldószerekben oldható.

Hézagpótló szer dyspepsiánál. Míg a hyperacid dyspepsia számos jó gyógyszerrel rendelkezik, addig a hypoacid dyspepsia ellen nem volt megbízható gyógyszer. Lehetetlen egy-két szóval felsorolni e szer óriási indikációs területét, amelyről részletes ismertetésünk is csak röviden szól. Általában azt mondhatjuk, hogy a Geneserin specificum mindama fájdalmaknál, amelyek az emésztésnél *insufficientia secretionis* folytán lépnek fel.

Gyógyszeralakjai: **Geneserin granulae** à 0.5 mg, **Geneserin dragée** à 0.5 mg, **Geneserin solutio** à 1 ‰, **Geneserin ampullae** à 2 mg per ccm. Általában az oldatból napi LX csepp adható három részletben étkezések előtt. Az injectiókból az első 5 napon át napi 1, később kétnaponként 1 ampulla tartalma adandó. A teljes javulás 8-10 napon belül várható, de 5 napi pihenés után ajánlatos e kúra megismétlése.

GENATROPIN

Ez az uj Belladonna-alkaloida 250-szer kevésbé toxikus, mint az atropin, képlete: $C_{17}H_{23}O_4N$. Míg az atropin leginkább ¼ milligrammos adagban fecskendezhető bőr alá, addig a Genatropin akár 6 milligrammos dosisban is adható egyszerre. Ugyanez a helyzet per os is.

A kivánatra készséggel küldendő részletes ismertetés közli a leginkább ajánlható adagolást *bélfájdalmak, kólika, görcsös obstipatio, enteritis mucomembranosa, hyperacid dyspepsia, éjjeli izzadás, vagotonia, hypersecretio, hurutok, tengeri betegség* stb. eseteiben.

Gyógyszeralakjai: **Genatropin granulae** à 0.5 mg, **Genatropin solutio** à 1.5 ‰, **Genatropin ampullae** à 2 mg.

GENOSCOPOLAMIN

A scopolamin oxydatiós terméke és szemléltetően úgy arányítható hozzá, mint pl. a novocain a cocainhoz. Igen gyengén toxikus, mert kutyánál kg-ként ¼ gramm *intravenásan* is alig halálos, míg a scopolamin 1 milligrammja már *subcutan* is letalis.

Gyors és veszélytelen anaestheticum post-operativ fájdalmak legyőzésére. *Per os* cseppekben vagy 0.5 mg-os granulákban 2-3 mg Genoscopolamin adandó a műtét előestéjén, ezenkívül kb. 45 perccel a műtét előtt egy 3 mg-os Genoscopolamin-ampulla tartalma és 1.5 cg morphin injiciálandó subcutan.

GENHYOSCYAMIN

Hyoscyaminnitroxyd, amelynek salicylat-ja van forgalomban; képlete: $C_{17}H_{23}O_4N.C_6H_4.OH.COOH$; toxicitási aránya a kutyánál ugyanaz, amilyent fentebb a Genoscopolamin-nál említettünk.

Indikációi két főcsoportra oszlanak: *pathologikus idegbetegségek* és *pathologikus emésztési zavarok* csoportjára. Általában görcsös állapotoknál fejt ki egyenesen specifikus hatást (delirium tremens, más, reszketéssel járó idegzavarok, chorea, Parkinson-kór, encephalitis lethargica stb., továbbá hyperaciditas, valamint gyomor- és bélgörcsök, kólika stb..).

Gyógyszeralakjai: **Genhyoscyamin granulae** à 0.5 mg, **Genhyoscyamin solutio** à 1.5 ‰, **Genhyoscyamin ampullae** à 2 mg per ccm. A napi adag 5-6 mg-ig felvihető és lehetőleg részletekben étkezések előtt adandó. Számos esetben azonban napi 2-3 mg is elegendő.

GENOSTRYCHNIN

Strychninnitroxyd, amelynek benzoat-ja van forgalomban; képlete: $C_{21}H_{22}O_3N_2C_6H_5CO_2H_3.H_2O$; a strychninnél 200-szor kevésbé toxikus.

Nem accumulálódik a szervezetben, mert eliminatiója könnyű, tehát állandóan adható aggály nélkül. Fontos előnye még, hogy megszokás ki van zárva, minden újabb dosisa úgy hat, mintha a legelső volna, tehát adagjai csak akkor emelendők, ha a kapottnál fokozottabb hatást óhajtunk biztosítani.

Csekély toxicitására jellemző, hogy míg strychninből a kutyánál kg-onként 0.00075 g a *subcutan* halálos adag, addig Genostrychninből *intravenásan* 0.02 g. **Felnőtteknél az átlagos adag 1 centigramm!** De ½ cg-nál sohasem kevesebb! **Ez az adag két-háromszor naponta adható!**

A részletes ismertetés megadja az *idegrendszer zavarainál, postdiphteriás és egyéb bénulásoknál,* a *szív* és *vérkeringés,* valamint az *emésztés bajainál, astheniánál, alkoholismusnál* és *szemgyógyászati esetekben* ajánlható adagokat.

Gyógyszeralakjai: **Genostrychnin granulae** à 2 mg, **Genostrychnin ampullae** (subcutan) à 1 cg per ccm, **Genostrychnin solutio,** melyből xxx csepp felel meg 5 mg hatóanyagnak.

A Genalkaloidák a háború utáni években kerültek forgalomba, de máris hatalmas irodalommal rendelkeznek. A francia tudományos akadémia *(Académie des Sciences)* és a párisi orvosi akadémia *(Académie de Médecine)* számos ülésén képezték tudományos előadások tárgyát.

FELLOWS
HYPOPHOSPHIT SZÖRP

Összetétele: vegytiszta hypophosphit-só, ferrum, chinin, strychnin, calcium, mangan, kalium, kissé alkalikus kémhatású tartós szörp alakjában.

Hatvan esztendő tapasztalatai bizonyítják, hogy ez a legmegbízhatóbb ilyen összetételű praeparatum. Adagolása semminő zavarral vagy izgalommal nem jár.

Összetétele állandóan egyforma, savanyú kémhatása nincs, változatlanul eltartható és a strychnint bármennyi ideig oldatban tartja. Gyógyhatása frappánsan gyors.

Kis és nagy üvegekben van forgalomban.

Minden 3.75 g FELLOWS SZÖRP egy milligramm (0.001 g) tiszta strychnint tartalmaz.

Adagolás

Felnőtteknek:

Tonicumként. — Egy teáskanálnyi szörp egy borospohárnyi hideg vízben minden étkezéskor.

Mint stimulans és tonicum. — Két teáskanálnyi szörp két borospohárnyi hideg vízben minden étkezéskor.

Erősítő szer gyanánt. — Vérszegény, neurastheniás és egyéb ideg- és izomgyengeségi állapotban szenvedő betegeknél egy teáskanálnyi szörp minden étkezéskor egy borospohárnyi hideg vízben.

Gyermekeknek:

Az adagok kor szerint változnak és pedig 1-5 évig egy negyed, 5-9 évig egy harmad, 9-12 évig egy fél kávéskanállal.



GARDÉNAL

(phenylaethylbarbitursav)

Tabletták alakjában kerül forgalomba 1920 óta. Toxicitása gyenge, hatása *epilepsiás rohamoknál, makacs álmatlanságnál* és igen nagyszámú egyéb esetben, amikor a brom-sók, vagy más barbitursavas vegyületek alkalmazása nem járt sikerrel, mindig biztos és zavaró mellékkörülményektől ment volt. Igen részletes irodalma kiemeli, hogy pompás hypnotikus hatása ellenére mérgezés veszélye normális, vagy jóval nagyobb adagoknál sem áll fenn. A GARDÉNAL nagy előnyei közül kiemeljük a következőket:

1. Az emésztőcsatorna kitünően tűri és a gyakorlatban szokásos adagok alkalmazása semmilyen toxicitás veszélyével nem jár.

2. Kiválasztása igen gyors, sohasem tapasztalhatjuk az accumulatio, vagy megszokás tüneteit; alkalmazása mindaddig folytatható, amíg szükséges.

Egy-egy GARDÉNAL-tabletta *10 centigramm* aktív gyógyszert tartalmaz. Ha tehát például napi 0.3 gramm adagolását látjuk szükségesnek, akkor ezt a mennyiséget két-három részletben, többórás időközökben adhatjuk.

GARDÉNAL-NATRIUM (Gardénal-sodé) néven a phenylaethylbarbitursav natriumsója kerül forgalomba 10 grammos üvegekben. Mindazon esetekben, ahol a bőr alá fecskendezés célszerűbbnek látszik, kitünően alkalmazható e vegyület oldata, mely közvetlenül a befecskendezés előtt készítendő steril, kétszer desztillált vízzel.

SONERYL

(buthylaethylbarbitursav)

Kitünő *hypnoticum* és még olyan esetekben is állandóan bevált, ahol csak a legerélyesebb alkaloidák voltak hatással, — anélkül, hogy az alkaloidák ismert hátrányai a legtávolabbról is jelentkeztek volna.

Az idegrendszer összes megbetegedéseinél, *delirium tremens, epe-kólika, tabes* stb. stb. esetében ugyanúgy, mint a *fogidegek legvehemensebb fájdalmainál* és a *legmakacsabb álmatlanságnál* prompt hatást fejt ki és az **üdítő álom** mindig nyugodt, rémképektől mentes. A készítmény kizárólag per os adható, kellemetlen mellékhatás soha nem jelentkezik.

A SONERYL-tabletták egyenként *10 centigramm* aktív anyagot tartalmaznak. Toxicitásuk annyira gyenge, hogy 24 óránként két vagy több részletben akár 6 tabletta is adagolható.

Nyugodt, de nem nagyon mély álom biztosítására elegendő 1 tabletta. 2 tabletta hatása már valamivel mélyebb álomban nyilvánul, amely ellenáll az álmot külsőleg megzavaró jelenségeknek. Súlyosabb esetekben 3-5 tabletta is vehető és ez az adag olyan eredményt produkál, amely hasonlíthatatlanul jobb a más hypnoticumokkal elért hatásnál.

STOVARSOL

(acetyloxaminophenylarsensav)

Syphilis-prophylaxis, Framboesia, Amoeba-dysentheria. Állandó összetételű és korlátlan ideig konzerválható tabletták. **27.2% arsen.**

FOURNIER professzor a párisi HOPITAL COCHIN-ban számos **bizonyosan** fertőzéses esetben mutatta ki a praeparatum biztos hatását. Ő napi 0.75-1.00 gr Stovarsolt adott 3-4 napos sorozatokban, egyénenként összesen 4-12 g-t.

A preventiv kezelés hatásaképpen sem FOURNIER professzornál, sem az európai és amerikai államok egyéb nagy intézeteiben folytatott kísérleteknél nem mutatkozott egy esetben sem lues. A kezelés rendkívül kényelmes voltát az összes szerzők kiemelik.

STOVARSOL-NATRIUM (Stovarsol sodique) néven az acetyloxaminophenylarsensav natriumsója 0.50, 1.0 és 1.50 grammos adagokban van forgalomban poralakban, steril, zárt ampullákban, amelyek cimkéjén az oldáshoz szükséges kétszer desztillált víz fel van tüntetve.

NOVARSENOBENZOL-BILLON

(dioxydiamidoarsenobenzolnatriummethylensulfoxylat)

Nyugat-Európa és Amerika majdnem kizárólag ezt a készítményt alkalmazza, mert e gyógyszer soha semminő kellemetlen mellékhatást nem fejtett ki. A párisi gyár 10 évre garantálta Magyarország részére a belföldi árat, amely az export-árnál 50%-kal, az egyéb arsenobenzolos készítményekénél pedig szintén jóval olcsóbb. A legtöbb közintézmény már állandóan alkalmazza kiváló hatása, a kellemetlen tünetek teljes elmaradása és rendkívül olcsó ára miatt. Egyetemi klinikáink, a Poliklinika, a Társadalombiztosító Intézet stb. stb. rendkívül kedvező szakvéleményeit kívánatra bemutatjuk, ugyanúgy, mint a magyar szaklapok vonatkozó különlenyomatait. Adagjai: 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.90, 1.5, 3.0, és 4.5 gr.

NARSENOL néven 0.10 grammos tabletták vannak forgalomban a syphilis-therapia kiegészítésére, valamint azon esetekre, ha a vénába való fecskendezés elkerülendő. Amoeba-dysentheriánál is a tabletták előírása ajánlatos.

GONACRINE

(diaminoacridinchloromethylat)

Rendkívül erélyes hatású, de minden kellemetlen mellékhatástól mentes *antigonorrhoicum,* az urinaris csatornák fertőzéses megbetegedéseinek kitünő antisepticuma.

Igen részletes leirását külön füzetben adtuk ki, amely minden tájékoztatást megad.

A Gonacrine intravenásan fecskendezendő be. Forgalomban van kétféle csomagolás:

a) dobozonként 3 darab 3 ccm-es, 2 %-os ampulla
b) „ 6 „ 5 „ 0.5 „ „

NEPTAL

(hydroxymercuripropanolamidorthoacetyloxybenzoat)

Hatalmas *diureticum,* amelyre itt ugyancsak röviden hívjuk fel az orvosi kar figyelmét.

Tartalmas külön füzetben adtuk ki a Neptal részletes leirását és grafikonokkal illusztrált klinikai referátumait.

Intramuscularis injectiók céljaira 3 darab 2 ccm-es ampullát tartalmazó dobozokban van forgalomban.

TRYPARSAMIDE

(natriumphenylglycinamidarsenat)

Az álomkór specificuma.

1, 2, illetőleg 3 gr-ot tartalmazó csomagolásban van forgalomban.

Az e két oldalon röviden említett készítmények a legnagyobb francia vegyi tröszt: a RHÔNE-POULENC gyár szabadalmazott, illetőleg védjegyezett produktumai. Tudományos világhírnevük alapján merjük kérni a magyar orvosi kar bizalmának szives előlegezését.

STANNOXYL

MINDEN STAPHYLOCOCCUS OKOZTA BETEGSÉG LEGBIZTOSABB GYÓGYSZERE.

A nyugati államokban közel száz referátum, illetőleg szakkönyv számolt be a STANNOXYL-lal elért gyógyhatásról, amelyet lényegesen nagyobbra becsülnek minden eddigi eredménynél. Kiemelik a STANNOXYL tökéletes ártalmatlanságát és a könnyű, kényelmes, jól tűrt kezelést, valamint a *furunculosis, emlő-abscessusok* és *lymphangitis* recidiváinak feltétlen elmaradását.

Még furunculosis generalis esetén is abszolut eredményt adnak a STANNOXYL-FÜRDŐK, amelyeket úgy készítünk, hogy a fürdővíz 1-2%-ának megfelelő STANNOXYL-LIQUIDE mennyiséget öntünk a vízbe.

A legsúlyosabb grippe-esetekben egybehangzó irodalmi adatok szerint gyors és frappánsan biztos hatást mutatnak fel a STANNOXYL-INJECTIÓK. Az intramuscularis injectio teljesen fájdalmatlan.

Részletes ismertetések bármely nyelven, valamint a referátumok külön lenyomatai az érdeklődők rendelkezésére állanak.

Intern kezelés: Tablettae STANNOXYL, Injectiones STANNOXYL.
Extern kezelés: STANNOXYL LIQUIDE.

ERCÉRHINOL

AMPULLA NASALIS
A GRIPPE ÉS RHINO-PHARYNX ÖSSZES INFECTIOINAK KEZELÉSÉRE.

A **nasalis ampulla** *elektromos töltésű kolloid ezüstöt* tartalmaz a legaktivabb *Brown-féle mozgásban.* Bactericid és infekciógátló, a rhino-pharinxot inficiáló összes bacillusokra és coccusokra (staphylococcus, streptococcus, pneumococcus stb.) azonnal hat.

A **rendkívül szellemes készülék,** amelyet a dobozhoz mellékelt magyar utasítás részletesen ismertet, a steril, kényelmes és tökéletesen tiszta kezelést garantálja. A kis készülék közvetlenül az orrüregbe kerül, a nyákhártyák megsértése ki van zárva.

Alacsony ára széleskörű alkalmazást tesz lehetővé.

E két készítmény a párisi Robert et Carrière gyár szabadalmain alapul.

URODONAL

(chinodiaethylendiaryl + methylglyoxaluridin + hexamethylentetraminphosphat)

E helyütt lehetetlen megfelelően ismertetni ezt a nagyjelentőségű és az egész földkerekségen elterjedt Châtelain-specialitást, azonban gyönyörű, sokszínű illusztrációkkal alátámasztott 56 oldalas tudományos leírását a legnagyobb készséggel küldjük meg az érdeklődő orvos uraknak.

Rendkívül széleskörű indikációinak főcsoportjai:

1. rheumás, polyarthritikus stb. eredetű bajok;

2. a vizeletkiválasztó szervek különféle megbetegedései (vese-congestio, vesekő, uraemia, chloruraemia, uricaemia, vesicularis bajok, methritis stb.);

3. vérkeringési zavarok, amelyek eredete összefügg húgysav jelenlétével;

4. emésztési zavarok, amelyeknél ugyancsak a húgysav szerepel, epe-congestio, epekő stb.;

5. csúzos eredetű légzési zavarok;

6. arthritikus eredetű dermatologiai esetek;

7. érzékszervek megbetegedései (arthritikus szem- és fülbajok);

8. intoxicatiók (nicotin-mérgezés stb.).



A húgysavas kristályok lerakódása számos olyan komoly bajt okoz, amelynek eredetét évtizedekkel ezelőtt még nem tudták felismerni. *E kristályok oldása és eliminálása elsőrendűen fontos feladat.*

Az Urodonal olyan granulákban van forgalomban, amelyek alapanyaga pezsgőkeverék. Vízben oldva tehát pezsgő folyadékot nyerünk.

A legáltalánosabb adagolás:

Napi 3 kávéskanálnyi tiszta vízben, étkezés közben. Rohamok esetén napi 3 evőkanál URODONAL.

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

ANAESTHETICUM.

Összetétel. — Az Allocaïne Lumière vegyileg pontosan meghatározott készítmény, képlete azonos a Novocainéval. Ugyanolyan aktív, mint a nálánál hétszerte toxikusabb Cocain.

Indikációk. — Ugyanazok, mint a Cocainnál.

Az Allocaïne Lumière ampullákban kerül forgalomba egyszerű oldatban és a gyakran használt „Allocaïne-Adrenalin" keverék alakjában is rendkívül olcsó árban.

Allocaïne + Adrenalin:

Solutio A ½% *(Reclus-formula),* 1 darab 25 ccm-es ampulla.
Solutio AA 1%, 3 darab 10 ccm-es ampulla.
Solutio B 2%, 6 darab 2 ccm-es ampulla.
Solutio BB 2%, 100 darab 1 ccm-es ampulla.
Solutio C 5%, 6 darab 3 ccm-es ampulla.

Solutio J 10%, Adrenalin nélkül, 5 darab 2 ccm-es ampulla.

ALLOCHRYSINE LUMIÈRE

Natriumaurothiopropanolsulfonat: $C_6H_{13}O_8S_4AuNa_2$. Az **arany** közvetlenül a kénhez van kötve, amelynek másik vegyértéke organikus gyökhöz kötött, míg a natrium a thiosulfat-gyök kénjéhez kapcsolódik. Sárgás, amorph, vízben jól oldódó por.

Az Allochrysine aranytartalma 35%. 5%-os oldata igen stabil és alig toxikus; bőr alá vagy izomba fecskendezendő.

Nagyon szép gyógyeredményekkel használják a szert a nyugati államok *tbc. intézetei,* az utóbbi 2-3 évben hatalmas irodalom számolt be erről.

Kettős ampullákban kerül forgalomba: az egyik a felnőtteknél szokásos 0.20 g Allochrysine 2 ccm oldatát, a másik 8 ccm olyan oldatot tartalmaz, amely az előbbivel együtt 8‰ NaCl-oldattal isotoniás.

Általában heti 2 injectio adandó, azonban csak 13 éves kortól feljebb. Maximum 30 injectio adható, de több nem is szükséges soha.

BOROSODINE LUMIÈRE

vegytiszta natriumborotartrat vizes oldata;
aktívabb a bromidoknál, zavarmentes.

Antispasmodikus csillapító.

Sajátságok. — A Borosodine igen gyors sedativ és részben electiv hatást fejt ki neuropathologikus esetekben. Hatására csillapodnak az epilepsiás rohamok, majd eltünnek. Ez a javulás sohasem jár mély idegdepressziókkal. A közérzet és szellemi frisseség gyors regenerálódását éri el a beteg, anélkül, hogy a bromsóknál ismert hátrányok jelentkeznének.

A Borosodine-t sikeresen alkalmazták a legkülönbözőbb neurologikus tüneteknél. Igen figyelemreméltó gyógyeredményeket biztosított choreánál, éjjeli vizelésnél stb.

A **Solutio Borosodine Lumière** ccm-ként 1 g *natriumborotartratot* tartalmaz, napi adagja felnőtteknek 2-10 g két részletben, félpohár cukros vízben, főétkezés után.

A **Syrupus Borosodine Lumière** különösen a gyermekgyakorlatban szerepel. Kávéskanalankint 1 g *natriumborotartratot* tartalmaz. Napi adagja 1-14 éves korig ½—6 kávéskanálnyi.

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antisepticum.

35% színezüstöt tartalmaz argentothioglycerin-natriumsulfonat alakjában.

Erélyes bactericid készítmény. Nem izgat, nem toxikus, nem támadja meg a szöveteket. 1:10.000 oldata Eberth bacillusait és a staphylococcusokat is elpusztítja.

5%-os oldata a szem, száj, orr, végbél stb. nyákhártyáival is érintkezésbe kerülhet minden reakció nélkül.

Indikációk. — Az emésztőcsatorna radikális fertőtlenítése, diarrhoe, typhus, dysentheria, cholera, entheritis, gyermekkori hasmenés stb.

A nőgyógyászatban vaginitis, methritis, ulceratio stb.

Gyógyszeralakok. — Pilulák: napi 4 pilula étkezés közben.

Syrup: kis gyermekeknek 1-4 kávéskanál naponta, 5-6-szor annyi tejben vagy más folyadékban.

Ovulák: a szilárd glycerinbe zárt Cryptargol a legideálisabb uteruskezelést teszi lehetővé.

Nem támadja meg sem a fehérneműt, sem a bőrfelületet.

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antithermicum és Analgeticum.

Fehér, kristályos por, vízben kevéssé oldódik.

Sajátságok. — A Cryogénine Lumière az acetylsalicylsav, antipyrin, amidopyrin és phenacetin összes indikációinál megállja a helyét, e vegyületek összes előnyeit egyesíti hátrányaik nélkül.

Alkalmazás. — Mint antipyreticum: bármilyen eredetű gyengeségi állapot: bronchitis, pneumonia, pleuritis, grippe, malaria stb.; tbc.-láz és typhus esetén electiv hatást fejt ki. Kontraindikációja nincs.

Mint analgeticum: nephritis, rheumatismus, ischias, grippe, máj-kólika stb.

A Cryogénine 0.25, illetőleg 0.50 g hatóanyagtartalmú tablettákban és ostyákban kerül forgalomba, felnőttek napi adagja ½—2½ g.

RHÉANTINE LUMIÈRE

Antigonococcus vaccina keratinizált labdacsokban. 24-féle polyvalens gonococcus vaccinából áll; egy doboz 32 keratin-labdacsot tartalmaz.

Biztos gyógyszere a gonococcus infekciókból eredő komplikációknak: *orchitis, cystitis, pyelitis, pyelonephritis, vaginitis, methritis, salpingitis, prostatitis.*

Napi adagja 4 labdacs, 2 reggel, 2 este, kevés vízzel, egy órával étkezés előtt. A kezelés teljes eredmény eléréséig folytatandó.

LACTOBYL

PHYSIOLOGIÁS PRAEPARATUM, AZ EPEKÉPZÉS ÉS A BÉLSECRETIO SZABÁLYOZÓJA, BÉLFLORA-MODIFICATOR

tabletták alakjában

(1-8 tabletta naponta).

Leghelyesebb napi 2 tablettával kezdeni és az eredményhez képest emelni vagy csökkenteni az adagot.

TARTALMA:

Depigmentált epekivonat. Biligen regulator, szabályozza az epe-secretiót (Dastre, Doyon, Dufour stb.), feloldja a nyákot és ezáltal megakadályozza az álhártyák képződését.

A bélmirigyek teljes kivonata. Élénkíti a bélmirigyek kiválasztását és előnyösen hat a bél-dyspepsiára (Hallion, Enriquez, Sardou stb.).

Porosus, hyperactivált szén. Megköti és adsorbeálja a mikrobás eredetű toxinokat (Hortz).

Válogatott tejsavas fermentek. Szabályozzák a bélflorát, elősegítik a tejsavas erjedést, amely kedvező fermentatiót biztosít (Cohendy).

Laminaria flex cytoplasmás kivonata. Absorbeál és visszatart ötvenszeres súlymennyiségű vizet (Laroche, Paris, 1927).

Hypophysis (hátsó lebeny). Peristalticum. Élénkíti az emésztés salakjától megszabadult bélizom-contractiókat (Houssay, Carnot, Terris stb.).

A Lactobyl élénkíti a hatóalkatrészek progresszív felszabadítása útján a *hepato-intestinalis mirigykiválasztást* és így elősegíti az emésztést, adsorbeálja a mikrobás toxinokat és fokozza a bélcontractiót.

TAXOL

E praeparatumra mindaz vonatkozik, amit fentebb a Lactobylról mondottunk, minthogy a két testvérkészítmény között az az egyedüli különbség, hogy a Taxol *kétszerannyi epekivonatot és két és félszer annyi bélmirigykivonatot* tartalmaz, mint a Lactobyl.

A beteg a Taxolt is mindíg szívesen veszi, mert magasabb hatóanyagtartalma ellenére *soha kellemetlen tüneteket nem idéz elő.*

AZOTYL

Tartalma: Cholesterin, Extr. Fellis, Extr. Lienis, Guajacol cinnamyl., Lecithin, Amylum, Glycerin, Gelatin animalis.

Pilulákban (napi 3×2 darab étkezés közben) és *ampullákban* (24-48 óránként 1 injectio) kerül forgalomba.

A fenti összetételből önként következő igen széles indikációs területen az Azotyl mindíg biztos hatású gyógyszernek bizonyult és újabban mind gyakrabban szerepel a nagy külföldi szaklapok igen kedvező referátumaiban.

VIN BRAVAIS

E kiváló **gyógybor** háború előtt nagyon jól ismert és elterjedt volt Magyarországon, hiszen az egész világnak körülbelül ötvenmillió üvegre tehető évi fogyasztásából Nagy-Magyarországra több mint harmincötezer üveg jutott évi átlagban.

Az évtizedek óta összegyűjtött irodalom egybehangzóan állapítja meg a világ eme legjobb gyógyborának pompás hatását. Már *38 évvel ezelőtt* referál a **Presse Médicale et Scientifique** az egyik akadémiai előadásról:

„A VIN BRAVAIS a gyógyászatnak leghatásosabb stimulans gyomor- és idegerősítő szere, valamint a leghatalmasabb zsongító praeparatum, amelyet a mai napig ismerünk."

Az évi fogyasztás azóta állandóan emelkedik és ezzel folyton nő annak a sokmillió esetnek a száma, amelyekben a VIN BRAVAIS áldásos hatása gyors gyógyulást hozott.

Minden üveghez finom mérő-pohárka van mellékelve.

A bor többek között kola-, coca-, guarana- és cacao-tartalmú, ezáltal csersavas coffein, cocain és theobromin is szerepet játszanak hatásában.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
Algocratine	7
Allocaïne Lumière	28
Allochrysine Lumière	28
Aminosel Byla	18
Anhémor	10
Antiphlogistine	11
Arsycodile	13
Azotyl	30
Borosodine Lumière	28
Calcodyl Dr. Pallay	4
Cascarine Leprince	12
Chin-Ac-Sal Dr. Pallay	5
Cryogénine Lumière	29
Cryptargol Lumière	29
Deschiens Haemoglobin	10
Digitaline Nativelle	19
Ercérhinol	26
Eucontrast Pancao	6
Eumictine	15
Fellows Hypophosphit Szörp	23
Ferricodile	14
Ferrocodile	14
Gardénal	24
Genalkaloidák	21-22
Genatropin	21
Geneserin	21
Genhyoscyamin	22
Genoscopolamin	22
Genostrychnin	22
Gonacrine	25
Guipsine	15
Hémoglobine Deschiens	10
Hypotonin	8-9
Lactobyl	30
Lipochol Byla	18
Mistol	17
Musculosine Byla	18
Narsenol	25
Natibaine	19
Néo-Arsycodile	14
Néo-Rhomnol	13
Neptal	25
Novarsenobenzol Billon	25
Nujol	16
Ouabaïne Arnaud	19
Pancao	6
Pasteur sera et vaccinae	20
Rhéantine	29
Rhomnol	12
Sander dr. emulsiói	10
Sanguiferin Dr. Pallay	3
Séjournet dr. Pil.	15
Soneryl	24
Stannoxyl	26
Stovarsol	24
Syromel	4
Taxol	30
Thyratoxine Byla	18
Tryparsamide	25
Urodonal	27
Vermitacat	9
Vin Bravais	31

Hungária Hirlapnyomda R.-T. Budapest