

# A kínai Sinopharm vakcina orvosi alkalmazási előírása a Seychelle szigeteken

Egészségügyi Minisztérium, 2021. január 08.; ideiglenes útmutató

Fordította: Dobson Szabolcs

**Név:** SARS-CoV-2 inaktivált vakcina (Vero sejt)

**Gyártó:** Beijing Institute of Biological Products

**Lejáratidő:** 24 hónap.

**Alkalmazás:** 18-60 éves életkor között.

**Adagolás:** A készítmény előretöltött fecskendőben, illetve injekciós üvegben kerül forgalomba.

**Tartalom:** 0,5 ml inaktivált SARS-CoV-2 antigén.

**Segédanyagok:** dinátrium-hidrogénfoszfát, nátrium-klorid, nátrium-dihidrogén-foszfát, alumínium-hidroxid adjuváns.

A fenti összetevők bármelyikével szembeni, vagy a vakcina első adagjának beadását követő túlérzékenység esetén az adott személy nem részesülhet oltásban.

**Alkalmazás módja:** intramuszkuláris injekció (a felkarba), 2 adagban, 4 hetes időközzel. Biztosítani kell a helyes, szokásos oltási technikát. A beoltottakat 30 percen át megfigyelés alatt kell tartani.

**Adrenalin (epinefrin)** rendelkezésre kell, hogy álljon a súlyos allergia sürgősségi kezelésére.

## Ellenjavallatok:

- Gyermekek és 18 év alatti serdülők.
- Terhes vagy szoptató nők, illetve azok, akik várandósságot terveznek az elkövetkező 6 hétben.
- A vakcina bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység (allergia).
- A kórelőzményekben szereplő bármilyen súlyos allergia (anafilaxiás reakció).
- Az immunrendszer csökkent működésével járó állapotok (pl. HIV-AIDS, szteroid gyógyszerek vagy daganatellenes kemoterápia).
- Nem kontrollált epilepszia vagy egyéb neurológiai kórképek.
- Nem kontrollált kórállapotok (pl. nem kontrollált szívelégtelenség, késői stádiumú vesebetegség, nem kontrollált asztma).

## Óvatossági intézkedések

Óvatosság ajánlott vérzési rendellenességek esetén vagy véralvadást gátló kezelés (rivaroxaban, warfarin) során. Az oltandó személyt arra kell kérni, hogy a vakcina beadása előtt beszéljen orvosával. Az acetilszalicilsavat vagy klopido grelt szedők részesülhetnek a védőoltásban.

A rövid időtartamú immunszuppresszív (az immunrendszer működését elnyomó) gyógyszerek (pl. szteroidok, kemoterápiás gyógyszerek) alkalmazása csökkentheti a vakcinára adott válasz hatását és a vakcina beadását el kell halasztani a kezelés befejezése utánra.

A krónikus immunszuppresszív kezelések (pl. hosszú időtartamú szteroidkúrák vagy bizonyos gyulladás elleni gyógyszerek, pl. metotrexát) és HIV-AIDS-ben szenvedők megkaphatják a védőoltást, de annak hatásossága alacsonyabb lehet.

Nem áll rendelkezésre megfelelő kutatási adat a terhességben, szoptatásban és gyermekkori alkalmazásban való biztonságosságról. Ily módon a 18 év alatti gyermekeknél, a terhes és szoptató, valamint a következő 6 hétben gyermekvállalást tervező nőknél a vakcina beadását javasolt elhalasztani.

### **A korábban COVID-19 betegségen átesett vagy aktuálisan beteg személyeknek beadható-e a vakcina?**

A tünetes COVID-19 betegséggel diagnosztizált személyeknek nem adható be a vakcina, hanem meg kell várniuk a gyógyulást.

A COVID-19 betegséggel diagnosztizált, karanténban lévő és kezelt személyeknek a vakcina a gyógyultnak nyilvánítás után két héttel beadható.

### **Mellékhatások**

**Gyakori (>10%):** fájdalom, bőrpír, duzzanat, viszketés és/vagy induráció az injekció beadásának helyén. Átmeneti láz, kimerültségérzet, fejfájás és/vagy hasmenés.

**Nem gyakori (>1%):** bőrkiütés az injekció beadásának helyén; émelygés és hányás; viszketés más helyeken, mint ahol az injekció beadásra került; izomfájdalmak, ízületi fájdalmak, álmoság és szédülés.

Ezidáig súlyos mellékhatást nem észleltek.

### **A készítmény kezelése és tárolása**

- Alkalmazza a vakcinákkal kapcsolatos tevékenységek esetén ajánlott védő-megelőző felszereléseket.
- Biztosítsa a vakcinációs helység jó szellőzését.

### **Toxikológiai információ**

A vakcina nem toxikus. A bőrrel való érintkezés nem okoz problémákat. A belélegzés vagy a szemmel való érintkezés allergia kockázattal járhat. Tiszta vízzel alaposan, 15 percen át öblögesse a szemét.

### **Eredeti szöveg elérhetősége:**

<http://www.health.gov.sc/index.php/vaccination-resources/>